10-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПОЧВОВЕДОВ
th INTERNATIONAL CONGRESS OF SOIL SCIENCE
me CONGRES INTERNATIONAL DE LA SCIENCE DU SOL
er INTERNATIONALER BODENKUNDLICHER GONGRESS

ПОЧВЕННАЯ НОМЕНКЛАТУРА НА РУССКОМ И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

(рекомендации к материалам X Международного Конгресса почвоведов)

КНИГА ПЕРВАЯ

Москва, 1974

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА
МИНИСТЕРСТВО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
ИНСТИТУТ АГРОХИМИИ И ПОЧВОВЕДЕНИЯ АН СССР

ПОЧВЕННАЯ НОМЕНКЛАТУРА НА РУССКОМ И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

(рекомендации к материалам
X Международного Конгресса почвоведов)

Составитель -
доктор биологических
наук, профессор
Б.Г.Розанов

Книга первая

Москва, 1974

АННОТАЦИЯ

Русско-англо-французско-немецкий энциклопедический словарь почвенной номенклатуры содержит 2800 русских названий почв, принятых в разных национальных школах мира, и их переводы на английский, французский и немецкий языки. Каждому термину дано краткое определение. В конце помещены алфавитные указатели английских, французских и немецких терминов. Словарь служит как для стандартизации перевода названий почв с одного из четырех языков на другой, так и для унификации определений названий почв. Словарь рассчитан не только на почвоведов, но и на специалистов смежных дисциплин, широко пользующихся почвенными терминами: ботаников, геологов, агрономов, экологов, географов, мелиораторов, для которых он особенно полезен, поскольку дает краткие определения всех имеющихся в науке названий почв.

10 й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПОЧВОВЕДОВ
th INTERNATIONAL CONGRESS OF SOIL SCIENCE
me CONGRES INTERNATIONAL DE LA SCIENCE DU SOL
er INTERNATIONALER BODENKUNDLICHER CONGRESS

SOIL NOMENCLATURE IN RUSSIAN AND FOREIGN LANGUAGES

(Recommendations to the materials of the 10th International Congress of Soil Science)

Moscow, 1974

ПРЕДИСЛОВИЕ

В мировом почвоведении к настоящему времени имеется несколько тысяч названий почв, используемых различными научными школами, причем простые переводы с одного языка на другой обычно не дают правильного представления о почве, к которой относится тот или иной термин. Даже такие классические термины как "подзол" или "чернозём" имеют разные толкования в различных почвенных школах мира. Кроме того, до сих пор отсутствует стандартизация перевода терминов с одного языка на другой.

Создавшееся положение с номенклатурой почв, когда под одним и тем же названием разные авторы понимают различные почвы и, наоборот, часто одни и те же почвы описываются под разными названиями, приводит к исключительно большим трудностям в научном общении почвоведов разных стран, особенно в настоящее время в связи с расширением международных контактов и международного сотрудничества.

Сказанным определяется острая необходимость создания энциклопедического (толкового) полиязычного словаря почвенной номенклатуры, с тем чтобы иметь возможность однозначно понимать и использовать те или иные названия почв, имеющиеся в арсенале науки, и иметь их стандартные переводы на разные языки.

В словаре содержится 2800 номенклатурных терминов, используемых в наиболее широких почвенных школах мира: русской, франко-бельгийской, немецкой, канадской, США, ФАО/ЮНЕСКО. Кроме того, содержится большое число терминов других национальных школ, получивших широкое употребление в почвенной литературе.

Словарь построен следующим образом.

В алфавитном порядке даны термины на русском языке, которые являются частично терминами русской школы, а частично - русскими переводами терминов других национальных школ. К каждому термину дан перевод на английский, французский и немецкий языки, с указанием синонимов и вариантов перевода, если таковые имеются. Далее следует этимология термина, для его оригинальной языковой формы. В характеристике (толковании) термина дается его история (национальная школа) и краткое определение почвы, к которой он относится. В заключение даются синонимы, если таковые имеются у данного термина.

Поставленный впереди каждого русского термина порядковый номер служит для пользования алфавитными английским, французским и немецким указателями, помещенными последовательно после основного текста.

Важной особенностью словаря служит то обстоятельство, что это не список рекомендуемых для общего употребления каких-то терминов одной школы, а толковый словарь существующих в мировой практике терминов с их взаимными переводами на три языка. Также важно подчеркнуть, что даны именно переводы, а не возможные корреляции терминов. Корреляция терминов разных школ между собою не входит в задачу данного словаря и должна явиться предметом дальнейших согласованных исследований в международном масштабе.

Автор очень хорошо понимает, что выполненная им работа весьма далека от совершенства и служит лишь первым шагом на пути создания унифицированного словаря почвенных номенклатурных терминов, что должно явиться, несомненно, плодом коллективной работы многих почвоведов. В этой связи данный словарь необходимо рассматривать в качестве первого приближения и как сборник сырого материала для дальнейшей работы. Многие из приведенных терминов и толкований к ним спорны или не точны, для многих терминов отсутствует ясная формулировка связанных с ними понятий. Возможны некоторые неточности и в переводах. В процессе дальнейшей коллективной работы все эти неизбежные на первом этапе неточности должны быть исправлены. Автор заранее благодарит за любую конструктивную критику его работы, направленную на благо общего дела.

При составлении словаря использованы следующие основные источники почвенной терминологии и определений соответствующих терминов:

1. Академия Наук СССР. Всесоюзное общество почвоведов. Толковый словарь по почвоведению. Выпуск Ш. Проект. 1971.
2. Виленский Д.Г. Почвоведение. Учпедгиз. М., 1950.
3. Глазовская М.А. Почвы Мира. Изд.Моск.ун-та, М., 1972.
4. Зонн И.С. Англо-русский почвенный словарь. Изд.Гипроводхоз, М., 1963.
5. Зонн С.В., Розанов Б.Г., Соколов И.А., Таргульян В.О. Совещание по номенклатуре почв мира. Почвоведение, 1970, № 6.
6. Иванова Е.Н., Розов Н.Н. Классификация почв СССР. Почвоведение, 1967, №№ 2,3.
7. Ковда В.А., Лобова Е.В., Розанов Б.Г. Проблема классификации почв мира. Почвоведение, 1967, №№ 4,7.
8. Почвоведение. Ред. И.С.Кауричев и И.П.Гречин. Изд."Колос", М., 1969.
9. Роде А.А., Смирнов В.Н. Почвоведение. Изд."Высш.шк.", М., 1972.
10. Указания по классификации и диагностике почв. Выпуски I-У. Изд. "Колос", М., 1967.

11. Энциклопедический словарь географических терминов. Изд."Сов.энциклопедия", М., 1968.
12. Aubert G. Classification des sols. Tableaux des classes, sous-classes, groupes et sous-groupes des sols-utilisés par la section de pédologie de l'ORSTOM. Cahiers. ORSTOM, Sér.Pédologie, 1965, III, no.3.
13. Commission de pédologie et de cartographie des sols de l'INRA, France. Classification des sols. Edition, 1967.
14. Duchaufour Ph. Précis de pédologie. Paris, 1965.
15. Dudal R. Definitions of soil units for the soil map of the world. World Soil Resources Reports, FAO, Rome, 1968, No.33.
16. Dudal R. Supplement to definitions of soil units for the soil map of the world. World Soil Resources Reports, FAO, Rome, 1969, No.37.
17. Fink J. Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs. Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, Wien, 1969, Heft 13.
18. Glossary of soil science terms, 1970. Soil Sci.Soc.of America, Madison.
19. Kubiena W.L. Bestimmungsbuch und Systematik der Böden Europas. Enke, Stuttgart, 1953.
20. Lozet J. Dictionnaire de pédologie. Paris, 1956.
21. Mückenhausen E. Entstehung, Eigenschaften und Systematik der Böden der Bundesrepublik Deutschland. DLG, Frankfurt/Main, 1962.
22. Multilingual vocabulary of soil science. Ed.: Jacks G.V., Tavernier R., Boalch D.H. FAO, 1960, 2nd ed.
23. National Soil Survey Committee. The system of soil classification for Canada. Queen's Printer, Ottawa, 1970.
24. Obrejanu, Trifu I., Slusanski B., Boico A. Soil Science Dictionary. Bucharest, 1964.
25. Plaisance Q. Lexique pedologique trilingue. Paris, 1958.
26. Plaisance Q., Cailleux A. Dictionnaire des sols. Paris, 1958.
27. Proceedings of National technical work-planning conference of the Cooperative Soil Suvey, Charleston, South Carolina, January 27-31, 1969.
28. Proceedings of the seventh meeting of the National Soil Survey Committee of Canada, held at the University of Alberta, Edmonton, April 22-26, 1968.
29. Scheffer F., Schachtschabel P. Lehrbuch der Bodenkunde, 7 Auflage. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1970.

30. Soil Survey, Soil Conservation Service, U.S.Department of Agriculture. Selected chapters from the unedited text of the Soil Taxonomy of the National Cooperative Soil Survey. Washington, December, 1970.
31. U.S.Department of Agriculture, Soil Conservation Service, Soil Survey Staff. Soil classification, a comprehensive system, 7th approximation, August 1960.
32. U.S.Department of Agriculture, Soil Conservation Service, Soil Survey Staff. Supplement to soil classification system (7th approximation), March, 1967.

There are at present several thousands soil names in world pedology which are in use of various scientific schools. The simple translations of these names from one language to another do not usually give a correct understanding of a soil to which this or that name corresponds. Even such classical names as "podzol" or "chernozem" have different interpretations and meanings in different pedological schools of the world. More over, till present there are no standard translations of soil names from one language to another.

The existing position in soil nomenclature, when different authors understand different soils under one and the same name, and vice versa, one and the same soil is often described under different names, leads to very great difficulties in scientific collaboration and mutual understanding among the pedologists of various countries, especially at present time with the increasing of international cooperation in the world. The language barriers are too often misleading in international cooperation.

The above said is a base of urgent necessity for creation of multylingual encyclopedic dictionary of soil nomenclature with the purpose of uniform understanding and utilisation of these or those soil names existing in the soil science, and of uniform translations of soil names.

The present dictionary contains 2800 soil nomenclature terms, used by the largest pedological schools of the world, namely Russian, Franco-Belgian, German, Canadian, of the USA and of the FAO/UNESCO. Besides, there are numerous terms of other national schools, whidely utilised in soil literature.

The dictionary is composed by the following way.

In the alphabetical order the terms in Russian are given, which are partly, the terms of Russian school and partly Russian translations of the terms of various national schools. The translations into English, Franch and German consequently are given to each of the Russian terms with several synonima or variants of translations if any. Then the etimology of each term for its original language form follows. In the characteristics (interpretation) of each term its history (national school) and the short definition of the soil concerned is given. The synonima if any are given in a conclu-

sion of each definition.

In front of each Russian term there is an order number serving for the utilisation of alphabetical English, French and German indexes introduced consequently after the main text.

The important peculiarity of the present dictionary is, that this is not a list of recommended for general utilisation terms of any one school, but the encyclopedic dictionary of existing in the world practice terms with their translations into three languages. Also important to mention, that there are in the dictionary the translations but not the possible correlations of the terms. The correlation of the terms of various schools is beyond the scope of the present dictionary and should be the subject of consequent joint studies in international scale.

Author is fully aware of the fact that the work presented here is too far from the perfect and serves only as a first step on the way of creation of an unified dictionary of soil nomenclature, which should be the result of combined work of many scientists. In this connection the present dictionary should be regarded as a first approximation and as a more or less sorted pile of raw material for the future work. Numerous of the collected here terms and their definitions are disputable or not precise, some mistakes are possible in the translations. In the process of the following collective work all these unavoidable at the first stage incorrectnesses should be eliminated. Author is grateful in advance for any constructive criticism directed to the improvement of the dictionary.

The list of references used at the composition of the dictionary is attached to the Russian text of the foreword.

1. АБЛЯЦИО́ННАЯ ПО́ЧВА ПУСТЫ́НЬ //ablation desert soil //sol d'ablation des déserts //Ablationwüstenboden (от лат. ablatio - отнятие) - термин франц.шк. (1965) для подгруппы грубых минеральных почв пустынь (см.), поверхность которых покрыта чехлом окатанной гальки или гравия плотных пород.

2. АВТОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //automorphic soil, idiomorphic soil //sol automorphe //automorpher Boden (от греч. autós - сам и morphé - форма) - термин введен С.С.Неуструевым и сейчас широко применяется для почв, формирующихся в условиях "автономного" баланса веществ (отсутствие привноса со стороны) и влаги (только атмосферное увлажнение). Син.: автономная п., плакорная п., субаэральная п., элювиальная п.

3. АВТОНО́МНАЯ ПО́ЧВА //autonomic soil //sol autonome //autonomer Boden (от греч. autonomia- самоуправление) - термин применяется к почвам "автономного" баланса веществ и влаги. Син.: плакорная п., субаэральная п., автоморфная п., элювиальная п.

4. АВТОХТО́ННАЯ ПО́ЧВА //autochtonal soil, primary soil, sedimentary soil //sol autochtone, sol local, sol primaire, sol en place, sol authigéne //autochtoner Boden, Ortsboden, Primärboden, sedentärer Boden, ursprünglicher Boden (от греч. autóchthon - туземный) - термин, особенно широко распространенный в западно-европейских школах, применяющийся к почвам, исходный материал (материнская порода) которых возник на месте их образования. Син.: коренная п., первичная п.

5. АГРУДА́ЛЬФ //agrudalf //agrudalf //Agrudalf (от лат. ager - поле, лат, udus - влажный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удальфов (см.), которые имеют в профиле плужный[x)] горизонт.

6. АДО́БЕ ПО́ЧВА //adobe soil, adobe //adobe, sol d'argile alluviale, terrain plat d'argile alluviale //Alluvialtonboden, Alluvialtonflachland (от местного североамериканского названия) - термин американской школы для глинисто-наносных трещиноватых почв плоских аллювиальных равнин засушливого пояса со слабо дифференцированным или недифференцированным профилем.

---

x) Определение диагностических горизонтов американской системы 7-го Приближения см. в приложении.

7. АДО́БЕ ПО́ЧВА // adobe soil // sol adobé // Adobeboden (от местного североамериканского названия) - термин Марбута для темных слитых трещиноватых глинистых почв США.

8. АДЫ́РНАЯ ПО́ЧВА // adyric soil // sol adyre // Adyrboden (от тюрк. адыр - холмистоовражная земля) - местное название группы почв (почвы адыров), происходящее от названия холмисто-увалистых предгорий, окаймляющих горные хребты Тянь-Шаня в Фергане и Семиречье, сильно расчлененных оврагами и возвышающихся на 100-400 м над прилегающей равниной.

9. АЗОНА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // azonal soil // sol azonal // azonaler Boden (от греч. а - частица отрицания и zone - зона) - термин Н.М.Сибирцева (1895) для переходных образований между материнскими горными породами и собственно почвами или почв, не подчиняющихся закону зональности; в настоящее время термин не применяется, т.к. доказано, что такие образования также имеют зональные черты при современном широком понимании зональности.

10. АКВА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // aquatic soil, aqueous soil // sol aquatique // wasserbewohnender Boden (от лат. aqua - вода) - иногда употребляющийся термин для почв, формирующихся под влиянием поверхностных, в том числе паводковых, или грунтовых вод.

11. АКВА́ЛЬФ // aqualf // aqualf // Aqualf (от лат. aqua - вода и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка альфисолей (см), которые либо насыщены водой какой-то сезон, либо искусственно дренированы и имеют признаки переувлажнения: пятнистость, железисто-марганцевые конкреции крупнее 2 мм, сизую окраску сразу под $A_{пах}$ или A_1. В пределах этого подпорядка выделяются 7 больших почвенных групп: 1) альбаквальфы, 2) фраджиаквальфы, 3) глоссаквальфы, 4) натраквальфы, 5) охраквальфы, 6) тропаквальфы и 7) умбраквальфы (см.).

12. АКВЕ́НТ // aquent // aquent // Aquent (от лат. aqua - вода и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка энтисолей (см.), которые либо постоянно насыщены водой и имеют голубоватую окраску всех горизонтов ниже 25 см, изменяющуюся на воздухе, либо насыщены водой лишь какой-то период года, либо искусственно дренированы, и которые в пределах 50 см от поверхности имеют сизые тона основной окраски. Подпорядок аквентов включает 5 больших групп: 1) криаквенты,

2) гаплаквенты, 3) гидраквенты, 4) псаммаквенты и 5) тропаквенты (см.).

13. АКВЕПТ // aquept // aquept // Aquept (от лат. aqua - вода и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка инсептисолей (см.), которые либо: 1) имеют более 15% поглощенного натрия в какой-либо части верхнего 50-см слоя при постепенном уменьшении его ниже 50 см, а почва насыщена водой какой-либо период года в пределах метровой толщи, либо 2) искусственно дренированы или насыщены водой в какой-либо период года, когда не мёрзлые и имеют либо (1) торфяной[x)] или тёмный[x)] верхний горизонт и на глубине менее 50 см или сразу под гумусовым горизонт с сизой окраской или пятнами, или (2) светлый[x)] гумусовый горизонт, подстилаемый не ниже 50 см камбиевым[x)] горизонтом с сизой окраской или пятнами. В пределах этого подпорядка выделяются 8 больших почвенных групп: 1) андаквепты, 2) криаквепты, 3) фраджиаквепты, 4) галаквепты 5) гаплаквепты, 6) гумаквепты, 7) плинтаквепты и 8) тропаквепты (см.).

14. АКВОД // aquod // aquod // Aquod (от лат. aqua - вода и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка сподосолей (см.), которые либо насыщены водой в какой-то период, либо искусственно дренированы (если имеется слоеватый горизонт или дурипэн[x)], то почва не обязательно должна быть насыщена водой ниже их) и которые имеют один или несколько из следующих признаков переувлажненности: 1) торфянистый верхний горизонт, 2) пятнистость в белёсом горизонте или в верхней части сподового[x)], 3) дурипэн[x)] в белёсом горизонте; 4) если железа и марганца мало, или если окраска не достаточно яркая в верхней части сподового горизонта, то либо а) не имеют пленок железа на пылеватых и песчаных зернах материала в или сразу под сподовым горизонтом, либо б) имеют мелкую пятнистость от железа и марганца сразу под сподовым горизонтом. В пределах этого подпорядка выделяются 7 больших почвенных групп: 1) криакводы, 2) дуракводы, 3) фраджиакводы, 4) гаплакводы, 5) плакакводы, 6) сидеракводы и 7) тропакводы (см.).

15. АКВОКС // aquox // aquox // Aquox (от лат. aqua - вода и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка оксисолей (см.), которые имеют плинтит[x)], образующий сплошной слой в пределах 30 см от поверхности, или на-

сыщены водой в какой-то период года либо искусственно дренированы, и имеют окисный[x)] горизонт, имеющий один или оба из следующих признаков переувлажнения: 1) торфянистый верхний горизонт; 2) сизая окраска либо сизые и ржавые пятна. В пределах этого подпорядка выделяются 4 большие почвенные группы: 1) гиббсиаквоксы, 2) охраквоксы, 3) плинтаквоксы и 4) умбраквоксы.

16. АКВОЛЛЬ // aquoll // aquoll // Aquoll (от лат. aqua - вода и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка моллисолей (см.), которые либо насыщены водой в некоторый период года, либо искусственно дренированы, и которые имеют один или более из следующих признаков переувлажненности: 1) торфяный[x)] поверхностный горизонт; 2) насыщенность натрием более 15% в верхней части моллевого[x)] горизонта и возрастание насыщенности с глубиной ниже 50 см; 3) одну из следующих комбинаций окрасок во влажном состоянии либо сразу под моллевым горизонтом, либо в пределах 75 см от поверхности, если моллевый горизонт подстилается кальциевым[x)] или если он мощнее 75 см: а) пятнистость, б) сизые тона в окраске, в) ржавые пятна; 4) кальциевый горизонт с верхней границей в пределах 40 см от поверхности. Среди подпорядка акволлей выделяются 6 больших почвенных групп: 1) аргиакволли, 2) кальциакволли, 3) криакволли, 4) дуракволли, 5) гаплакволли и 6) натракволли (см.).

17. АКВУЛЬТ // aquult // aquult // Aquult (от лат. aqua - вода и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка ультисолей (см.), которые либо насыщены водой в какой-то сезон, либо искусственно дренированы и имеют признаки избыточного увлажнения (пятна, железо-марганцевые конкреции крупнее 2 мм, сизую окраску) и один из следующих признаков: 1) преобладание сизой окраски в плёнках на поверхности структурных отдельностей и пятнистости внутри или преобладание сизой окраски в матрице аргиллового[x)] горизонта с пятнами более яркой окраски; 2) тусклая сизая окраска аргиллового горизонта. В пределах этого подпорядка выделяются 5 больших почвенных групп: 1) фраджиаквульты, 2) охраквульты, 3) плинтаквульты, 4) тропаквульты и 5) умбраквульты.

18. АККУМУЛЯТИВНАЯ ПОЧВА // accumulative soil // sol accumulative // akkumulatischer Boden (от лат. accumulatio - накопление) - 1) Почва, формирующаяся в условиях постоянного механического

приноса вещества водными, эоловыми или гравитационными потоками. Син.: наносная п. 2) Почва, формирующаяся в условиях аккумулятивного (в педохимическом смысле) ландшафта депрессий при геохимическом приносе веществ.

19. АКРИСО́ЛЬ // **acrisol** // **acrisol** // **Akrisol** (от лат. **acris** - очень кислый и лат. **solum** - почва) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, характеризующихся наличием глинно-иллювиального диагностического (аргиллового[x]) горизонта и очень низкой степенью насыщенности основаниями; как и в лювисолях (см.), основной процесс дифференциации профиля в них - это нисходящее перемещение глины без ее разрушения, но в условиях кислой реакции среды и малой насыщенности.

20. АКРИСО́ЛЬ ГЛЕ́ЕВАЯ //**gleyic acrisol** // **acrisol gleyique**//**gleyischer Akrisol**(от русск. глей) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих светлый[x], темный[x] или торфяный[x] (не более 30 см) горизонт А, аргиллювый[x] горизонт В со степенью насыщенности основаниями менее 35% по крайней мере в нижней его части, глеевый горизонт или признаки переувлажнения в нижней части профиля, но не имеющих плинтитового[x] горизонта в пределах 125 см от поверхности и не имеющих сочетания белёсого горизонта A_2 с резким изменением мех.состава между A_2 и В.

21. АКРИСО́ЛЬ ГУ́МУСОВАЯ //**humic acrisol** // **acrisol humique** // **Humus Akrisol** (от лат. **humus** - перегной, гумус) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих темный[x] горизонт А и аргиллювый[x] горизонт В, содержащий относительно много (более 1,5%) гумуса и имеющий степень насыщенности основаниями менее 35% во всех подгоризонтах.

22. АКРИСО́ЛЬ ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ //**ferric acrisol**// **acrisol ferrique** // **ferrischer Akrisol** (от лат. **ferrum** - железо) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих светлый[x] или темный[x] горизонт А (если не эродирован), желто-бурый до красновато-бурого аргиллювый[x] горизонт В, бо́льшая часть которого имеет емкость поглощения менее 24 мэкв на 100 г глины при степени насыщенности основаниями менее 35%, по крайней мере в нижней части горизонта В, и не имеющих плинтитового[x] горизонта в пределах 125 см от поверхности.

---

x) Определение диагностических горизонтов в системе ФАО/ЮНЕСКО см. в приложении.

23. АКРИСО́ЛЬ ПЛИНТИ́ТОВАЯ // plinthic acrisol // acrisol plinthique // plinthischer Akrisol (от гр. plinthos - кирпич) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих светлый[x], темный[x] или торфяный[x] (менее 30 см) горизонт А, аргилловый[x] горизонт В со степенью насыщенности основаниями менее 35%, по крайней мере в нижней части горизонта В, плинтитовый[x] горизонт в пределах 125 см от поверхности и, возможно, глеевый горизонт или признаки переувлажнения в нижней части профиля.

24. АКРИСО́ЛЬ ТИПИ́ЧНАЯ // orthic acrisol // acrisol orthique // orthischer Akrisol (от гр. orthos - настоящий) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих светлый[x] или темный[x] горизонт А (если не эродирован), желтый или желтовато-красный аргилловый[x] горизонт В со степенью насыщенности основаниями менее 35%, по крайней мере в нижней части горизонта В, и не имеющих плинтитового[x] горизонта в пределах 125 см от поверхности.

25. АКРОГУМО́КС // acrohumox // acrohumox // Akrohumox (от греч. akros конечный, лат. humus - гумус и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы гумоксов (см.), которые: 1) имеют емкость поглощения катионов (по NH_4Cl) менее 1 мэкв на 100 г глины в каком-либо подгоризонте окисного[x] горизонта (или имеют менее 1 мэкв обменных оснований плюс обменный алюминий на 100 г глины); 2) не имеют подгоризонта окисного горизонта, который был бы темнее окрашен и более гумусирован, чем вышележащий горизонт; 3) не имеют выраженной структуры либо только очень непрочную глыбистую или призмовидную структуру; 4) не имеют прослоев, содержащих более 30% гиббсита, и имеют менее 20% по объему агрегатов размера гравия, содержащих более 30% гиббсита, в пределах 1 м от поверхности. Две подгруппы выделяются в пределах этой большой почвенной группы: 1) типичные (typic) и 2) плинтитовые (plinthic) акрогумоксы.

26. АКРОРТО́КС // acrorthox // acrorthox // Akrorthox (от греч. akros - конечный, греч. orthos - настоящий и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортоксов (см.), которые: 1) имеют в каком-либо подгоризонте окисного[x] горизонта емкость поглощения катионов (по NH_4Cl) менее 1 мэкв на 100 г глины (или менее 1 мэкв обменных оснований плюс обменный алюминий на 100 г глины); 2) не имеют различимой структуры или только слабую глыбистую либо призмо[illegible]-

ную структуру в окисном горизонте; 3) не имеют прослоев с более 30% гиббсита или агрегатов размера гравия, содержащих более 30% гиббсита в пределах 1,25 м от поверхности.

27. АКРУСТО́КС // acrustox // acrustox // Akrustox (от греч. akros - конечный, лат. ustus - обожженный и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устоксов (см.), которые: 1) имеют емкость поглощения катионов (по NH_4Cl) менее 1 мэкв на 100 г глины в каком-либо подгоризонте окисного[x)] горизонта (или менее 1 мэкв обменных оснований плюс обменный алюминий на 100 г глины); 2) имеют темный[x)] или светлый[x)] гумусовый горизонт; 3) не имеют различимой структуры в окисном горизонте или только слабую глыбистую или призмовидную структуру.

28. АКТИ́ВНАЯ ПО́ЧВА // active soil // sol actif // aktiver Boden, eutropher Boden (от лат. activus - деятельный) - редко употребляющийся термин западно-европейских школ для плодородных почв, имеющих высокую биологическую активность.

29. АЛЛИ́Т // allit // allite // Allit (от лат. aluminium - алюминий и греч. lithos - камень) - 1) Общее название продуктов выветривания и почвообразования, состоящих гл.обр. из глинозема (Al_2O_3) и его гидратов (напр., боксит, латерит). 2) Общее название глинистых осадочных пород, в которых содержание глинозема (Al_2O_3) превышает содержание кремнезема (SiO_2) и окислов железа (Fe_2O_3). 3) Кора выветривания, абсолютно или относительно обогащенная глиноземом (Al_2O_3).

30. АЛЛИТИЗИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // allitised soil // sol allitisée // allitisierter Boden (от лат. aluminium - алюминий и гр. lithos - камень) - общеупотребительный термин для почв, в которых имеет место прогрессирующий процесс обогащения глиноземом.

31. АЛЛИ́ТНАЯ ПО́ЧВА // allitic soil, allit // sol allitique, allite // allitischer Boden, Allitboden (от лат. aluminium - алюминий и греч. lithos - камень) - 1) Почва, относительно или абсолютно обогащенная глиноземом (Al_2O_3), в результате чего молекулярное отношение $SiO_2:Al_2O_3$ в глинистой фракции менее 2,0 при малом содержании окислов железа. Син.: бокситовая п. 2) Почва, сформированная на аллитной коре выветривания.

32. АЛЛОХТО́ННАЯ ПО́ЧВА // allochtonal soil, allogenic soil, allochtonous soil, allochtonic soil, allotigenous soil, exogenic soil //

sol allogène, sol allochtone, sol allotigène //Allochtonboden, allochtoner Boden, allotigener Boden (от греч. állos - другой и chthon - земля) - термин, особенно широко распространенный в западно-европейских школах, применяющийся к почвам, исходный материал (материнская порода) которых возник путем переотложения. Син.: наносная п., переотложенная п.

33. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // alluvial soil // sol alluvial, sol d'alluvion, terrain alluvionnaire // Alluvialboden, Auenboden, Schwemmlandboden, alluvialer Boden (от лат. alluvio - нанос, намыв) - общеупотребительный термин для группы почв или для сборного понятия почв, формирующихся в речных поймах и дельтах на современных аллювиальных отложениях. Син.: пойменная п., наносная п., дельтовая п.

34. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ БОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная болотная п.

35. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ БУ́РАЯ ПО́ЧВА // alluvial brown soil // sol brun alluvial // angeschwemmter Braunboden - термин западно-европейских школ для луговых буроокрашенных почв на аллювиальных отложениях. Син.: наносная бурая почва, вега.

36. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ДЕРНО́ВАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная дерновая п.

37. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ДЕРНО́ВАЯ ПО́ЧВА (ЦЕНТРА́ЛЬНОЙ ПО́ЙМЫ) - См. Пойменная дерновая п. (центральной поймы).

38. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ДЕРНО́ВАЯ КИ́СЛАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная дерновая кислая п.

39. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ДЕРНО́ВАЯ НАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная дерновая насыщенная п.

40. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ДЕРНО́ВАЯ ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА (ВЫСО́КОЙ ПО́ЙМЫ) - См. Пойменная дерновая оподзоленная п. (высокой поймы).

41. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная дерново-глеевая п.

42. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ КИ́СЛАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная дерново-глеевая кислая п.

43. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ НАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная дерново-глеевая насыщенная п.

44. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ОЖЕЛЕЗНЕННАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная дерново-глеевая ожелезненная п.

45. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ИЛОВА́ТО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная иловато-глеевая п.

46. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ИЛОВАТО-ТОРФЯ́НАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная иловато-торфяная п.

47. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ИЛОВА́ТО-ТОРФЯ́НО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная иловато-торфяно-глеевая п.

48. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ПЕРЕГНО́ИНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная перегнойно-глеевая п.

49. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ СЛОЙСТАЯ ДЕРНО́ВАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная слоистая дерновая п.

50. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ СЛОЙСТАЯ ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная слоистая дерново-глеевая п.

51. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ СЛОЙСТАЯ ПРИМИТИ́ВНАЯ СЛА́БОДЕРНО́ВАЯ ПО́ЧВА - См. - Пойменная слоистая примитивная слабодерновая п.

52. АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ СЛОЙСТАЯ СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ СЛА́БОДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная слоистая слаборазвитая слабодерново-глеевая п.

53. АЛЛЮВИА́ЛЬНО-БОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная болотная п.

54. АЛЛЮВИА́ЛЬНЫЙ СУ́ГЛИНОК // alluvial loam // limon alluvial // Auenlehm - общеупотребительный термин для аллювиального голоценового (современного) суглинистого наноса. Син.: наносный суглинок.

55. АЛЮНИ́Т //alunite //alunite //Alunit (от лат. aluminium - алюминий) - термин для кислых засоленных заболоченных почв морских побережий, содержащих растворимые соединения алюминия (обычно сульфаты), отличающихся большой токсичностью и формирующихся из глинистых заболоченных почв под влиянием морской воды.

56. А́ЛЬБАКВА́ЛЬФ //albaqualf //albaqualf //Albaqualf (от лат. albus - белый, лат. aqua - вода и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквальфов (см.), которые имеют резкий текстурный переход между белесым и аргилловым[x)] горизонтами, имеют слабую водопроницаемость в аргилловом горизонте, не имеют языков белесого горизонта в аргилловый и не имеют фраджипэна[x)], дурипэна[x)] или натриевого[x)] горизонта; имеют разницу между среднелетними и среднезимними температурами на 50 см более 5°С. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 6 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) аэральные (aeric), 3) плотные (duric), 4) молле-

вые (mollic), 5) удоллевые (udollic) и 6) трещиноватые (vertic) альбаквальфы.

57. АЛЬБАКВУ́ЛЬТ // albaquult // albaquult // Albaquult (от лат. albus - белый, лат. aqua - вода и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквультов (см.), имеющих резкий текстурный переход между светлым[x)] поверхностным горизонтом или белёсым[x)] горизонтом и аргиллювым[x)] горизонтом и имеющих малую водопроводимость в аргиллювом горизонте, не имеющих фраджипэна[x)] или плинтита[x)] в пределах 125 см от поверхности; в пределах этой большой почвенной группы выделяется две подгруппы почв: 1) типичные (typic) и 2) аэральные (aeric) альбаквульты.

58. АЛЬБО́ЛЛЬ // alboll // alboll // Alboll (от лат. albus - белый и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка моллисолеи (см.), которые: 1) имеют белесый горизонт, непосредственно лежащий под моллевым[x)] либо разделяющий горизонты, которые в сумме отвечают всем требованиям к моллевому горизонту; 2) имеют аргиллювый[x)] или натриевый[x)] горизонт; 3) имеют в белёсом горизонте и в аргиллювом или натриевом горизонте характеристики, связанные с переувлажнением, то-есть пятнистость, железисто-марганцевые конкреции более 2 мм, либо то и другое. В пределах подпорядка альболлей выделяются две большие почвенные группы: 1) аргиальболли и 2) натральболли (см.).

59. АЛЬВА́Р // alvar // alvar // Alvar (эст. народн. назв.) - местное эстонское название слаборазвитых щебнистых почв, образующихся на продуктах выветривания силурийских карбонатных пород; син.: дерново-карбонатная типичная п.

60. АЛЬВИСО́ЛЬ // alvisol // alvisol // Alvisol (от слогов al в слове allophan - аллофан и vi в слове vitric - стекловатый) - термин ново-зеландских почвоведов для вулканических пепловых почв (см.), богатых аллофанами и вулканическим стеклом.

61. АЛЬПИ́ЙСКАЯ ПО́ЧВА // alpine soil // sol alpin // alpiner Boden - общеупотребительный (особенно в западно-европейских школах) термин для обобщенной характеристики высокогорных почв, распространенных выше верхней границы лесного пояса. Син.: высокогорная п.

62. АЛЬПИ́ЙСКАЯ ГО́РНО-ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА // mountain-meadow alpine soil // sol de pré de montagne alpNique//alpiner Gebirgsweideboden -

См. Горно-луговая альпийская п.

63. АЛЬПИЙСКАЯ ГУМУСОВАЯ ПОЧВА // alpine humus soil, humic alpine soil // sol alpin humique, sol alpine humifére // Alpenhumusboden, Bergwiesenboden - высокогорная гумусовая почва. См. Ранкер альпийский.

64. АЛЬПИЙСКАЯ ДЕРНОВО-БУРОЗЕМНАЯ ПОЧВА // alpine sod brown earth // sol alpine brun forestier gazonné // alpiner Rasenbraunerde - термин немецкой школы для задернелых буроземов высокогорного пояса.

65. АЛЬПИЙСКАЯ КАРБОНАТНАЯ ГРУБОГУМУСНАЯ ПОЧВА // alpine carbonate raw soil // sol alpin brut carbonaté // alpiner Karbonatboden - термин западно-европейских школ для высокогорных полуторфянистых почв на плотных карбонатных породах.

66. АЛЬПИЙСКАЯ ЛУГОВАЯ ПОЧВА // alpine meadow soil // sol de prairie alpine // alpiner Wiesenboden - термин западно-европейских школ для сильно гумусированных почв высокогорных альпийских лугов.

67. АЛЬПИЙСКАЯ СИЛИКАТНАЯ ГРУБОГУМУСНАЯ ПОЧВА // alpine silicate raw soil // sol alpin brut silicaté // alpiner Silikatrohboden - термин западно-европейских школ для высокогорных полуторфянистых почв на плотных силикатных породах.

68. АЛЬФЕГУМУСОВАЯ ПОЧВА //alfehumic soil //sol alfehumique //alfehumischer Boden (от лат. aluminium - алюминий, ferrum - железо и humus - перегной) - термин М.А.Глазовской (1972) для семейства почв, входящих в генерацию кислых гумусовых почв (см.) и характеризующихся профилем A_{of}-A_{uf}-B_h-B_{hFeAl}-C_{sial}, где A_{of} - сухоторфянистая фульватная кислая подстилка мощностью 3-20 см, A_{uf} - гумусоаккумулятивный ульматно-фульватный горизонт, B_h - гумусо-иллювиальный горизонт; B_{hFeAl} - гумусо-иллювиальный железисто-алюминиевый горизонт и C_{sial} - бескарбонатная сиаллитная материнская порода; семейство включает следующие типы почв: 1) тундровые подбуры, 2) таежные подбуры (кислые таежные, неоподзоленные мерзлотно-таежные), 3) темно-бурые кислые горнолесные, 4) высокогорные гумусовые аллитные.

69. АЛЬФИСОЛЬ //alfisol // alfisol // Alfisol (от лат. aluminium - алюминий, ferrum - железо и solum - почва) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для порядка минеральных почв, которые

не имеют сподового[x)] или окисного[x)] горизонта, перекрывающего аргиллювый[x)]; не имеют сплошного плинтита[x)] в пределах 30 см от поверхности; не имеют моллевого[x)] поверхностного горизонта; не имеют поверхностного горизонта и верхнего подгоризонта аргиллового или натриевого[x)] горизонта, которые разделяются белёсым горизонтом и в сумме отвечают всем признакам моллевого горизонта; имеют одну из следующих комбинаций признаков: 1) не имеют фраджипэна[x)], но имеют аргиллювый или натриевый горизонт; обычно увлажнены между 18 и 50 см, если только поверхностный гумусовый горизонт не твердый и массивный в сухом состоянии; и либо имеют среднегодовую температуру почвы ниже 8°С, либо имеют степень насыщенности основаниями более 35% на 1,25 м ниже верха аргиллового горизонта или на 1,8 м ниже поверхности почвы или непосредственно над контактом с плотной породой (что ближе); 2) имеют фраджипэн в или ниже аргиллового горизонта или имеют ориентированные глинистые пленки толщиной более 1 мм в какой-либо части фраджипэна; и либо имеют среднегодовую температуру ниже 8°С, либо имеют степень насыщенности основаниями более 35% на глубине 75 см ниже верхней границы фраджипэна или над контактом с плотной породой (что ближе). В пределах этого порядка выделяются 5 подпорядков почв: 1) аквальфы, 2) боральфы, 3) удальфы, 4) устальфы и 5) ксеральфы (см.).

70. АМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //amorphous soil //sol amorphe //amorpher Boden (от гр. a - отрицание и morphé - форма) - термин для почвенной массы, представленной преимущественно неокристаллизованным органическим и глинистым минеральным веществом.

71. АМФИГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //amphigley soil //sol à amphigley //amphigley Boden (от греч. amphi - с обоих сторон и русск. глей) - термин, распространенный в Западной Европе для гидроморфных почв, в профиле которых имеются одновременно псевдоглеевый и глеевый горизонты в результате наличия верховодки и постоянного уровня грунтовых вод либо вследствие большой амплитуды сезонных колебаний уровня грунтовых вод.

72. АМФОТЕ́РНАЯ ПО́ЧВА //amphoteric soil //sol amphotére //amphotere Boden (от гр. amphi - с обеих сторон) - термин для почв, обнаруживающих либо кислотные, либо щелочные свойства в зависимости от приложенной реакции.

73. АНАЭРО́БНАЯ ПО́ЧВА //anaerobic soil //sol anaérobie //anaerober Boden (от греч. an - без, aer - воздух и bios - жизнь) - поч-

ва, формирующаяся в условиях, когда биологические, биохимические и химические процессы протекают при недостатке или отсутствии кислорода воздуха.

74. АНДАКВЕ́ПТ //andaquept //andaquept //Andaquept (от яп. an - темный, яп. do - почва, лат. aqua - вода и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквептов (см), которые: 1) имеют объемный вес мелкозёма меньше 0,85 в каком-либо горизонте, преобладание аморфного материала в обменном комплексе, а стекловатый вулканический пепел, зола или другой стекловатый пиропластический материал составляет более 60% пылеватой, песчаной и гравийной фракций; 2) имеют температуру почвы выше, чем криаквепты (см.); 3) имеют менее 15% поглощенного натрия в верхних 50 см, либо имеют постоянную либо увеличивающуюся с глубиной ниже 50 см насыщенность натрием; 4) имеют величину N менее 0,5 в каком-либо слое между 20 и 50 см; 5) не имеют сплошного или образующего более половины матрицы плинтита в пределах 125 см от поверхности. В пределах этой группы выделяются 5 подгрупп: 1) типичные андаквепты (typic), 2) аэральные андаквепты (aeric), 3) аэральные моллевые андаквепты (aeric mollic), 4) нормальные андаквепты (haplic) и 5) моллевые андаквепты (mollic).

75. АНДЕ́ПТ //andept //andept //Andept (от яп. an - темный, do - почва (в смысле andosol - вулканическая почва) и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка инсептисолей (см.), которые: 1) имеют одно или вместе: а) объемный вес мелкозема менее 0,85 в верхнем или камбиевом[x)] горизонте или в обоих и преобладание в обменном комплексе аморфного материала, б) более 60% стекловатого вулканического пепла или иного вулканического материала во фракциях пыли, песка и гравия; 2) не насыщены водой в какой-либо период и не имеют признаков переувлажнения, описанных для аквептов (см.); 3) не имеют плаггенового[x)] горизонта. В пределах этого подпорядка выделяются 6 больших групп почв: 1) криандепты, 2) дурандепты, 3) дистрандепты, 4) эутрандепты, 5) гидрандепты и 6) витрандепты (см.).

76. АНДИ́ЙСКАЯ ГО́РНО-ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА //mountain-meadow andic soil // sol de pré de montagne andique //andischer Gebirgsweideboden - См. Горно-луговая андийская п.

77. Андосо́ль //andosol // andosol //Andosol, Andoboden (от яп. an - темный, do - почва и лат. solum - почва) - 1) термин, рекомендованный Международным симпозиумом в Токио (1964) для слабо выветрелых почв с большим содержанием аллофановых минералов и вулканического стекла, обычно с профилем A-C, формирующихся на относительно молодых (четвертичных и современных) вулканических пеплах, туфах и лавах. Син.: вулканическая п. 2) Термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, богатых слабо выветрелым вулканическим материалом и аллофановыми минералами.

78. Андосо́ль гу́мусовая //humic andosol //andosol humique //Humus Andosol (от лат. humus - гумус, перегной) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для темноокрашенных андосолей (см.); имеющих с поверхности темный[x)] горизонт A.

79. Андосо́ль гу́мусовая ненасы́щенная // unsaturated humic andosol // andosol humifère désaturé // ungesättigter Humusandosol - термин франц.шк. (1967) для группы андосолей холодных стран, имеющих профиль A(B)C или AC с обильным накоплением грубого органического вещества.

80. Андосо́ль мо́ллевая //mollic andosol //andosol mollique //mollischer Andosol (от лат. mollis - мягкий) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для темноокрашенных андосолей (см.), имеющих с поверхности моллевый[x)] горизонт A.

81. Андосо́ль насы́щенная //saturated andosol //andosol saturé // gesättigter Andosol - термин франц.шк. (1967) для группы андосолей тропических стран, имеющих близкий к нейтральному pH, повышенную степень насыщенности основаниями и смесь глинистых минералов типа 2:1 с аллофанами.

82. Андосо́ль насы́щенная гу́мусовая //humic saturated andosol //andosol saturé humique //humischer gesättigter Andosol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы насыщенных андосолей, имеющих гумусовый горизонт A_1 более 25 см.

83. Андосо́ль насы́щенная сла́боразви́тая //weakly developed saturated andosol //andosol saturé peu développé //unreifer gesättiger Andosol- термин франц.шк. (1967) для подгруппы насыщенных андосолей, имеющих редуцированный профиль.

84. Андосо́ль насы́щенная типи́чная // typical saturated andosol // andosol saturé modal // typischer gesättigter Andosol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы насыщенных андосолей, имеющих гумусовый горизонт A_1 менее 25 см.

85. Андосо́ль ненасы́щенная // unsaturated andosol // andosol désaturé // ungesättigter Andosol - термин франц.шк. (1967) для группы андосолей тропических стран, имеющих низкий pH, низкую степень насыщенности основаниями, наличие глинистых минералов, причем гиббсит часто сопровождается галлуазитом.

86. Андосо́ль ненасы́щенная гу́мусовая // humic unsaturated andosol // andosol désaturé humique // humischer ungesättigter Andosol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы ненасыщенных андосолей, имеющих гумусовый горизонт A_1 более 25 см.

87. Андосо́ль ненасы́щенная сла́боразви́тая // weakly developed unsaturated andosol // andosol désaturé peu développé // unreifer ungesättigter Andosol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы ненасыщенных андосолей, имеющих редуцированный профиль.

88. Андосо́ль ненасы́щенная типи́чная // typical unsaturated andosol // andosol désaturé modal // typischer ungesättigter Andosol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы ненасыщенных андосолей, имеющих горизонт A_1 менее 25 см.

89. Андосо́ль све́тлая // ochric andosol // andosol ochrique // ochrischer Andosol (от греч. ochros - светлый) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для светлоокрашенных андосолей (см.), имеющих с поверхности светлый[x)] горизонт A.

90. Андосо́ль спо́довая // spodic andosol // andosol spodique // spodischer Andosol (от греч. spodos - древесная зола) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для андосолей (см.), имеющих наряду с общими для них признаками специфический гумусо- или железисто- или железисто-гумусовый иллювиальный (сподовый[x)]) горизонт B.

91. Андосо́ль стекло́ва́тая // vitric andosol // andosol vitrique // vitrischer Andosol (от лат. vitrum - стекло) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для андосолей (см.), имеющих в верхней 50-см толще механический состав легче легкого суглинка и характеризующихся отсутствием слитости.

92. Андосо́ль тропи́ческих стра́н // andosol of tropical regions // andosol des pays tropicaux // tropischer Andosol - термин франц.шк. (1967) для подкласса почв, входящего в класс андосолей (см.), характеризующихся профилем A(B)C с небольшой аккумуляциеи органического вещества (до 10%) или маломощным горизонтом A, и распространенных в странах жаркого климата.

93. Андосо́ль холо́дных стра́н // andosol of cold regions // andosol des pays froids // Kaltländandosol - термин франц.шк. (1967) для подкласса почв, входящего в класс андосолей (см), характеризующихся сильным накоплением грубого органического вещества (до 30%) и распространенных в странах холодного климата.

94. Аномальная по́чва // anomalous soil // sol anomale // anomaler Boden (от греч. anomalia - отклонение от нормы) - общеупотребительный термин для почв, резко отклоняющихся по своим свойствам от типичных, нормальных для данных физико-географических или почвенно-геохимических условий, почв.

95. Антропоге́нная по́чва // anthropogenic soil, man-made soil // sol anthropogéne // anthropogener Boden (от греч. ánthropos - человек и genos - происхождение) - общеупотребительный термин д почв, образующихся в результате земледельческой активности человека, сознательно направленной на формирование таких почв, или стихийно в результате нарушении естественного покрова. Граница между А.п. и окультуренными почвами установлена не достаточно строго и некоторые относят сюда мелиорированные почвы (осушенные, орошаемые и т.п.). Син.: культурная п.

96. Антрумбре́пт // anthrumbrept // anthrumbrept // Anthrumbrept (от греч. ánthrōpos - человек, лат. umbra - темная тень и порядкового корня ept для инсептисолеи) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы умбрептов (см.), которые имеют антроповый[x)] верхний горизонт и не имеют фраджипэна[x)].

97. Аргиакволлъ // argiaquoll // argiaquoll // Argiaquoll (от лат. argilla - белая глина, лат. aqua - вода и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-69) для большой группы акволлеи (см.), которые: 1) имеют аргиллювый[x)] горизонт, но не имеют натриевого[x)] горизонта или дурипэна[x)]; 2) имеют среднегодовую температуру почвы выше 8°C либо среднелетнюю температуру на 50 см выше 15°C, если почва дренирована или распахана, или выше 8°C, если почва дренирована и

имеет A_0 или торфянистый поверхностный горизонт, или выше 6°С, если почва не дренирована и имеет A_0 или торфянистый поверхностный горизонт. В пределах этой большой группы почв выделяются 7 подгрупп: 1) типичные (typic), 2) резко дифференцированные (abruptic), 3) аэральные (aeric), 4) песчаные (arenic), 5) известковые (calcic), 6) глубокопесчаные (grossarenic) и 7) трещиноватые (vertic) аргиакволли.

98. АРГИАЛЬБОЛЛЬ //argialboll // argialboll //Argialboll (от лат. argilla - белая глина, лат. albus - белый и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой почвенной группы альболлей (см.), которые имеют аргиллювый[x] горизонт, но не имеют натриевого[x] горизонта. В пределах группы аргиальболлей выделяются 6 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) аэральные (aeric), 3) вулканические (andic), 4) глинисто-гидроморфные (argiaquic), 5) глинисто-гидроморфные засушливые (argiaquic xeric) и 6) засушливые (xeric) аргиальболли.

99. АРГИБОРОЛЛЬ //argiboroll //argiboroll //Argiboroll (от лат. argilla - белая глина, греч. boreas - северный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы бороллей (см.), которые: 1) имеют аргиллювый[x] горизонт, но не имеют камбиевого[x] горизонта, перекрывающего аргиллювый и отделенного от него белёсым горизонтом; 2) не имеют натриевого[x] горизонта; 3) имеют верхнюю границу аргиллового горизонта в пределах 60 см от поверхности или имеют мех.состав легче пылеватой супеси во всех подгоризонтах выше аргиллового; 4) имеют среднелетнюю температуру на 50 см выше 15°С, если нет A_0 или выше 8°С, если есть A_0. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 10 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) резко дифференцированные (abruptic), 3) белёсые (albic), 4) вулканические (andic), 5) гидроморфные (aquic), 6) боральфовые (boralfic), 7) глоссборальфовые (glossboralfic), 8) маломощные (lithic), 9) мощные (pachic) и 10) трещиноватые (vertic) аргиборолли.

100. АРГИД // argid // argid // Argid (от лат. argilla - белая глина и порядкового корня id для аридисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка аридисолей (см.), которые имеют аргиллювый[x] или натриевый[x] горизонт. В пределах этого подпорядка выделяются 5 больших почвенных групп: 1) дураргиды,

2) гапларгиды, 3) надураргиды, 4) натрарги́ды и 5) палеаргиды (см.).

101. АРГИКСЕРО́ЛЛЬ //argixeroll //argixeroll //Argixeroll (от лат. argilla - белая глина, греч. xeros - сухой и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ксероллей (см.), которые: 1) имеют аргиллювый[x)] горизонт, но не имеют натриевого[x)] горизонта; 2) аргиллювый горизонт имеет: а) такое вертикальное распределение глины, что ее содержание уменьшается от максимального более чем на 20% в пределах менее 1,5 м от поверхности почвы, если окраска почвы светлая красноватая, и б) песчаный или суглинистый состав в верхней части, либо увеличение менее чем на 20% (абсолютных) глины в пределах 7,5 см или на 15% в пределах 2,5 см на верхней границе; 3) не имеют дурипэна[x)] в пределах 1 м от поверхности; 4) не имеют петрокальциевого[x)] горизонта в пределах 1,5 м от поверхности; 5) не имеют кальцевого[x)] или гипсового[x)] горизонта в пределах 1,5 м от поверхности, если только некоторая часть горизонта, перекрывающего кальциевый или гипсовый, не свободна от карбонатов после перемешивания верхних 18 см и легче пылеватой супеси. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 17 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) гидроморфные известковые (aquic calcic), 4) аквультовые (aquultic), 5) боральфовые (boralfic), 6) известковые (calcic), 7) известковые маломощные (calcic lithic), 8) известковые мощные (calcic pachic), 9) плотные (duric), 10) глоссаквальфовые (glossaqualfic), 11) маломощные (lithic), 12) маломощные ультовые (lithic ulthic), 13) натриевые (natric), 14) мощные (pachic), 15) мощные ультовые (pachic ultic), 16) ультовые (ultic) и 17) трещиноватые (vertic) аргиксероллы.

102. АРГИУДО́ЛЛЬ //argiudoll //argiudoll //Argiudoll (от лат. argilla - белая глина, лат. udus - влажный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удоллей (см.), которые имеют аргиллювый[x)] горизонт, характеризующийся таким распределением глины, что ее содержание уменьшается минимум на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности если 1) окраска краснее желтой и яркая по крайней мере в нижней части аргиллового горизонта или 2) имеются много грубых пятен краснее оранжевого цвета. В пре-

делах этой большой почвенной группы выделяются 6 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) глоссобораль-фовые (glossoboralfic), 4) маломощные (lithic), 5) псаммен-товые (psammentic) и 6) трещиноватые (vertic) аргиудолли.

103. АРГИУСТО́ЛЛЬ //argiustoll //argiustoll // Argiustoll (от лат. argilla - белая глина, лат. ustus - обожженный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устоллей (см.), которые: 1) имеют аргиллювый[x)] горизонт с таким распределением глины, что ее содержание уменьшается от максимального более, чем на 20% в пределах 1,5 м от поверхности, если окраска аргиллового горизонта светлая красноватая; имеют песчанистый или суглинистый состав в верхней части или увеличение менее, чем на 20% абсолютного содержания глины в пределах 7,5 см или на 15% в пределах 2,5 см на верхней границе аргиллового горизонта; 2) не имеют дурипэна[x)] в пределах 1 м от поверхности; 3) не имеют петрокальциевого[x)] горизонта в пределах 1,5 м от поверхности; 4) не имеют натриевого[x)] горизонта. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 9 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) плотные (duric), 4) маломощные (lithic), 5) маломощные влажные (lithic udic), 6) натриевые (natric), 7) мощные (pachic), 8) влажные (udic) и 9) трещиноватые (vertic) аргиустоллы.

104. АРЕ́НОСО́ЛЬ // arenosol // arenosol // Arenosol (от лат. arena - песок и лат. solum - почва) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, более грубых по механическому составу, чем супесь, содержащих относительно большие количества полуторных окислов в какой-либо части профиля и возможно имеющих с поверхности светлый[x)] горизонт А.

105. АРЕ́НОСО́ЛЬ БЕЛЕСАЯ //albic arenosol //arenosol albique //albischer Arenosol (от лат. albus - белый) термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, более грубых по механическому составу, чем супесь, содержащих менее 15% глины, возможно имеющих светлый[x)] горизонт А и характеризующихся значительным преобладанием кварца в минералогическом составе; это так называемые "белые пески", в которых горизонт В не может быть выделен в пределах 125 см от поверхности, часто относимые к подзолам или к планосолям.

106. АРЕ́НОСО́ЛЬ КА́МБИЕВАЯ //cambic arenosol //arenosol cambique// cambischer Arenosol (от лат. cambiare - изменение) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, более грубых по механическому составу, чем супесь, содержащих менее 15% глины, возможно имеющих светлый[x)] горизонт А и имеющих горизонт, характеризующийся всеми, за исключением механического состава, признаками камбиевого[x)] горизонта В.

107. АРЕ́НОСО́ЛЬ СЛОЙСТАЯ //laminic arenosol //arenosol laminique // laminischer Arenosol (от лат. lamina - пластинка) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, более грубых по механическому составу, чем супесь, содержащих менее 15% глины, возможно имеющих светлый[x)] горизонт А и имеющих горизонт, характеризующийся всеми, за исключением механического состава, признаками аргиллового[x)] горизонта В.

108. АРЕ́НОСО́ЛЬ ФЕРРА́ЛЬНАЯ //ferralic arenosol //arenosol ferralique //ferralischer Arenosol (от лат. ferrum - железо и aluminium - алюминий) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, более грубых по механическому составу, чем супесь, содержащих менее 15% глины, возможно имеющих светлый[x)] горизонт А и имеющих горизонт, характеризующийся всеми, за исключением механического состава, признаками окисного[x)] горизонта В.

109. АРЕ́НТ //arent //arent //Arent (от лат. arare - вспахивать и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка энтисолей (см.), которые: 1) имеют фрагменты диагностических горизонтов, встречающихся более или менее без видимого порядка в профиле ниже пахотного горизонта; 2) не насыщены постоянно водой и не имеют характеристик переувлажнения, описанных для аквентов (см.); во многих арентах значительная часть профиля перемешана достаточно, чтобы нарушить диагностические горизонты, но не достаточно, чтобы фрагменты этих горизонтов были неразличимы.

110. АРЗЫ́К //arzyk //arzyk // Arzyk (от узбекск.народн.назв.) - распространенный в среднеазиатских республиках термин для сцементированных гипсовых частично окарбоначенных прослоек, встречающихся в нижней части профиля гидроморфных (сазовых) почв.

111. АРИ́ДИСО́ЛЬ //aridisol //aridisol //Aridisol (от лат. aridus - сухой и лат. solum - почва) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для порядка минеральных почв, которые не имеют окисно-

го[x)] или сподового[x)] горизонтов, но имеют светлый[x)] верхний горизонт и один или несколько из следующих комбинаций признаков: 1) не имеют аргиллового[x)] или натриевого[x)] горизонтов, но в пределах 1 м от поверхности имеют один или несколько из следующих горизонтов: кальциевый[x)], петрокальциевый[x)], гипсовый[x)], камбиевый[x)] или дурипэн[x)]; и либо пересыхают обычно между 18 и 50 см, или выше контакта с плотной породой, либо имеют проводимость насыщенного экстракта при 25°С более 2 *mmho / см* в какой-либо части выше одной из следующих глубин, которая наименьшая: контакт с плотной породой, 1,25 м при песчаном составе, 90 см - при суглинистом, 75 см - при глинистом; либо с увеличением глубины в пределах горизонта С, но выше перечисленных глубин, имеется увеличение в какой-то части насыщенности натрием плюс калием; 2) не имеют аргиллового или натриевого горизонтов, но имеют солевой[x)] горизонт в пределах 75 см от поверхности и насыщены водой в пределах 1 м от поверхности на 1 месяц или более; 3) имеют поверхностный горизонт, который не массивный и не твердый в сухом состоянии; аргилловый или натриевый горизонт; обычно пересыхают в большинство лет во всей толще между 18 и 50 см или выше контакта с плотной породой; 4) после перемешивания верхних 18 см имеют содержание глины менее 30% в каком-либо горизонте в пределах 1 м, если имеются трещины минимум 1 см шириной на глубине 50 см в какой-либо период большинство лет и а) имеется микрорельеф гильгаи или б) на глубине от 25 до 100 см имеются поверхности скольжения или клиновидные параллелепипедные естественные структурные агрегаты, длинные оси которых наклонены на 10-60° к горизонтали. Среди почв этого порядка выделяются два подпорядка почв: 1) аргиды и 2) ортиды (см.).

112. АРИ́ДНАЯ ПО́ЧВА //arid soil //sol aride //trockener Boden, Dürrboden (от лат. aridus - сухой) - общеупотребительный термин для почв, формирующихся в условиях засушливого климата пустынь, полупустынь, сухих степеи и саванн, где количество испаряемой влаги превышает ее поступление с осадками. Син.: засушливая п.

113. АРКТИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА //arctic soil //sol arctique //arktischer Boden (от греч. Arctos - название созвездия Большой Медведицы) - 1) Общеупотребительный термин для сборной группы почв арктического пояса, включающего арктические пустыни и тундры.
2) Почва арктического пояса, состоящая обычно из маломощного (1-3 см) органогенного горизонта и слабо дифференцированной

минеральной массы, подстилаемой на глубине 40-50 см многолетнемерзлым слоем. Почва характеризуется нейтральной или щелочной реакцией, слабым оглеением или его отсутствием; возможным присутствием карбонатов и легкорастворимых солей, слабой гумусированностью.

114. АРКТИ́ЧЕСКАЯ БУ́РАЯ ПО́ЧВА //brown arctic soil //sol arctique brun //arktischer brauner Boden - термин Тедроу (1952) для кислых буроокрашенных ожелезненных иллювиально-гумусовых почв тундровой зоны. Син.: подбур тундровый.

115. АРКТИ́ЧЕСКАЯ ДЕРНО́ВО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ПО́ЧВА //sod brown arctic soil // sol brun gazonne arctique // brauner arktischer Rasenboden - термин русск.шк. для типа арктических почв, формирующихся на легких породах и входящих в семейство кислых дерновых почв (см.). Син.: бурая арктическая п.

116. АРКТИ́ЧЕСКАЯ ПОЛИГОНА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //polygonal arctic soil // sol polydonal arctique // arktischer Polygonalboden - термин для слаборазвитых почв арктических пустынь и тундр, имеющих на поверхности полигональные каменистые кольца с голой поверхностью внутри них.

117. А́РКТО-ТУ́НДРОВАЯ ПО́ЧВА //arctic tundra soil //sol de toundra arctique // arktischer Tundraboden - термин для группы тундровых глеевых почв с профилем T-G, выделяемых в подзоне арктических тундр. Син.: аркто-тундровая глеевая п.

118. А́РКТО-ТУ́НДРОВАЯ БУ́РАЯ ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //brown gley arctic tundra soil //sol brun gley de toundra arctique //brauner arktischer Tundragleyboden - термин Ливеровского (1965) для подтипа тундрово-глеевых почв подзоны арктических тундр, характеризующихся буроватой окраской и слабо выраженным оглеением.

119. А́РКТО-ТУ́НДРОВАЯ ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //gley arctic tundra soil //sol gley de toundra arctique //arktischer Tundragleyboden - термин для почв с профилем T-G, формирующихся в подзоне арктических тундр. Син.: аркто-турндровая п.

120. АЭРО́БНАЯ ПО́ЧВА // aerobic soil // sol aérobie // aerober Boden (от греч.aer - воздух и bios - жизнь) - почва, формирующаяся в условиях, когда биологические, биохимические и химические процессы протекают при достаточной обеспеченности кислородом воздуха.

121. БА́ДОБЕ // badobe // badobe // Badobe - местное название темных слитых трещиноватых глинистых почв типа вертисолей, распространенное в Судане.

122. БА́РРОС ПРЕ́ТОС // barros pretos // barros pretos // Barros Pretos - местное название темных слитых трещиноватых глинистых почв типа вертисолей, распространенное в Португалии и отражающее их черную окраску.

123. БАССЕ́ЙНОВАЯ ПО́ЧВА // basin soil // sol de cuvette // Talkesselboden (от франц. bassin - бассейн) - термин, используемый в Нидерландах для кольматированных почв и искусственно сооружаемых чеках (бассейнах) на польдерных землях.

124. БЭ́ДЛЭНД // badland // badland // Badland (от англ. bad - плохой, бесплодный и land - земля, территория) - 1) Резко и сложно расчлененная труднопроходимая территория, состоящая из запутанных ветвящихся оврагов и разграничивающих их узких водоразделов; обычно на плохо проницаемых глинистых породах при размыве их временными ливневыми потоками в горно-пустынных и полупустынных районах. 2) Бросовая, непригодная для земледелия территория.

125. БЕ́ЛАЯ ЗАСОЛЕННАЯ ПО́ЧВА // white saline soil // sol saline blanche // Weissalzboden - термин французской школы для поверхностно засоленных почв, имеющих выцветы солей; в настоящее время используется мало, но встречается в литературе и других западноевропейских стран. Син.: солончак.

126. БЕ́ЛАЯ ЩЕЛО́ЧНАЯ ПО́ЧВА // white alkaline soil // sol alkaline blanche // Weisalkaliboden - термин немецкой школы для поверхностно засоленных почв, имеющих выцветы солей; в настоящее время используется мало, но встречается в немецкой литературе в качестве синонима или старого названия. Син.: солончак.

127. БЕЛОЗЁМ // belozem // belozem // Belosem (от русск. белая земля) - устаревший народный термин для серозёмов (см.).

128. БЕЛУ́Н // belun // belun // Belun (от русск. белый) - устаревший народный русский термин для подзолистых почв (см.).

129. БЕЛУ́ХА // belucha // belucha // Belucha (от русск. белый) - русский народный термин, использованный Н.М.Сибирцевым для олиготрофных почв северо-западной России. Син.: подзол.

130. БЕЛЯ́К // beljak // belac // Belăk (от русск. белый) - устаревший русский народный термин для подзолистых почв (см.).

131. БЕ́ЛЫЙ СУ́ГЛИНОК // white loam // sol lehm blanc // Weißlehm - термин немецкой школы для светлых сиаллитных суглинистых почв тропиков и субтропиков, соответствующих псевдоглею. Син.: Пластосоль серая, серая гидроморфная п., серый суглинок.

132. БИ́ОГЕ́ННАЯ ПО́ЧВА // biogenic soil // sol biogéne // biogener Boden (от греч. bios - жизнь и genos - происхождение) - устаревший термин, применявшийся для зональных автоморфных почв.

133. БИ́ОГИ́ДРОГЕ́ННАЯ ПО́ЧВА // biohydrogenic soil // sol biohydrogéne // biohydrogener Boden (от греч. bios - жизнь, hýdor - вода и genos - происхождение) - устаревший термин, применявшийся для гидроморфных и полугидроморфных почв. Син.: гидрогенная п., гидроморфная п.

134. БИ́ОЛИ́ТОГЕ́ННАЯ ПО́ЧВА // biolithogenic soil // sol biolithogéne // biolithogener Boden (от греч. bios - жизнь, lithos - камень и genos - происхождение) - устаревший термин, применявшийся для почв, свойства которых определяются не зональным положением, а особенностями материнской породы. Син.: литогенная п., литоморфная п.

135. БЛЕ́ДНАЯ ПО́ЧВА // pale soil // sol pâle // Fahlerde - термин Эвальда (1958) для буроокрашенных почв Центр.Европы, близких к буроземам, но имеющих в профиле осветленный тусклый горизонт, сформированный, в отличие от подзолистого, в процессе обезиливания (лессивирования). Син.: podzol secundar (Чернеску, 1934); sol lessivé (Дюшофур, 1951), псевдоподзол (Герасимов, 1960), Parabraunerde (Мюккенхаузен, 1962), gebleichen braunen Waldboden (Штремме), luvisol (Дюдаль, 1967).

136. БОБО́ВАЯ РУДА́ - См. Болотная руда

137. БОКСИ́Т // bauxite // beauxite, bauxite // Bauxit (от франц. Beaux - название местности на юге Франции) - осадочная горная порода (кора выветривания), состоящая в основном из гидратов глинозема (30-80%) и окислов железа, обычно красноватого и серого цветов с различными оттенками. Главный вид минерального сырья для получения алюминия. В погребенном состоянии в виде древних остаточных или переотложенных образований распространен широко во всех природных зонах, а в современную эпоху образуется только в тропиках.

138. БОКСИТИЗИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // bauxitized soil // sol bauxitisé // bauxitisierter Boden - термин для почв, в которых имеет место процесс бокситизации, то-есть остаточного накопления свободного глинозёма.

139. БОКСИТИЗО́ВАННАЯ ПО́ЧВА - См. Бокситизированная п.

140. БОКСИ́ТОВАЯ ПО́ЧВА // bauxitic soil // sol bauxite // Bauxitboden - один из видов аллитных почв тропического пояса, отличающийся значительным содержанием глинозёма (30-80%) в минеральной массе; почва характеризуется преобладанием Al_2O_3 и Fe_2O_3 в составе минеральной массы, значительной глинистостью, бедностью основаниями, низким природным плодородием, неблагоприятными физическими свойствами. Син.: аллитная п.

141. БОЛО́ТНАЯ И́ЗВЕСТЬ // bog lime // cauche calcaire au fond d'un marais // Wiesenkalk, Kalkschicht im Moor - прослои извести в болотных и темноцветных почвах депрессий, формирующиеся при отложении из жестких грунтовых вод обычно по периферии низинных болот.

142. БОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА // bog soil, swamp soil // sol tourbeux, sol marécageux // Moorboden, Naßboden - сборный термин для группы разнообразных почв болотных ландшафтов и заболоченных земель, характеризующихся наличием торфяного или гумусового горизонта с поверхности и подстилающего его глеевого горизонта. Син.: глеевая почва, глей, глейсоль.

143. БОЛО́ТНАЯ ВЕРХОВА́Я ПО́ЧВА // high moor soil, upland moor soil, raised moss soil, raised bog soil, peat bog soil // sol fagne, sol marais haut, sol tourbeaux haute // Heidemoorboden, Hochmoorboden, Torfmoorboden - термин русск.шк. (1967) для торфяно-глеевых и торфяных почв верховых болот, составляющих один почвенный тип.

144. БОЛО́ТНАЯ ВЕРХОВА́Я ГУ́МУСОВО-ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ПО́ЧВА // humus-iron high moor soil // sol tourbeux haute humus-ferrugineux // Humuseisenheidemoorboden - термин русск.шк. (1967) для рода болотных верховых почв, формирующихся на песчаном субстрате и имеющих под торфяным слоем коричневый или ржаво-коричневый обогащенный железом горизонт; иногда весь органогенный горизонт обогащен железом.

145. БОЛО́ТНАЯ ВЕРХОВА́Я ОБЫ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // ordinary high moor soil // sol tourbeux haute ordinaire // gewöhnliche Heidemoorboden -

термин русск.шк. (1967) для рода болотных верховых почв, органогенный горизонт которых (или весь профиль почвы) состоит из олиготрофных типов торфа (сфагнового или кустарничково-пушицевого).

146. БОЛО́ТНАЯ ВЕРХОВА́Я ПЕРЕГНОЙНО-ТОРФЯ́НАЯ ПО́ЧВА //high moor muck-peat soil //sol muck-tourbeux haute // Heidemoormucktorfboden - термин русск.шк. (1967) для вида болотных верховых почв, степень разложения торфа в органогенном слое которых составляет 25-45%.

147. БОЛО́ТНАЯ ВЕРХОВА́Я ПЕРЕХО́ДНАЯ (ОСТА́ТОЧНО-НИЗИ́ННАЯ ЗАСФА́ГНЕННАЯ) ПО́ЧВА //transitional high moor soil //sol tourbeux haute de transition //Zwischenheidemoorboden - термин русск.шк. (1967) для рода болотных верховых почв, образующихся из болотных низинных почв при потере верхними горизонтами связи с минерализованными грунтовыми водами; поэтому под слоем олиготрофного торфа в почве имеется эутрофный торф; по типу торфа среди них выделяются два подрода: засфагненные древесно-моховые и засфагненные травяно-моховые.

148. БОЛО́ТНАЯ ВЕРХОВА́Я ТОРФЯ́НАЯ ПО́ЧВА //high moor peat soil //sol tourbeux haute// Heidemoortorfboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа болотных верховых почв, имеющих с поверхности мощный слой торфа более 50 см.

149. БОЛО́ТНАЯ ВЕРХОВА́Я ТОРФЯ́НАЯ ПО́ЧВА НА ГЛУБО́КОМ ТО́РФЕ //high moor peat soil on deep peat // sol tourbeux haute à tourbe profond // Heidemoortorfboden auf tiefer Torf - термин русск.шк. (1967) для вида болотных верховых почв с мощностью торфяного слоя более 200 см.

150. БОЛО́ТНАЯ ВЕРХОВА́Я ТОРФЯ́НАЯ ПО́ЧВА НА МЕ́ЛКОМ ТО́РФЕ // high moor peat soil on shallow peat // sol tourbeux haute à tourbe mince // Heidemoortorfboden auf dünner Torf - термин русск.шк.(1967) для вида болотных верховых почв с мощностью торфяного слоя 50-100 см.

151. БОЛО́ТНАЯ ВЕРХОВА́Я ТОРФЯ́НАЯ ПО́ЧВА НА СРЕ́ДНЕМ ТО́РФЕ // high moor peat soil on medium peat // sol tourbeux haute à tourbe moderée // Heidemoortorfboden auf mässig Torf - термин русск.шк.(1967) для вида болотных верховых почв с мощностью торфяного слоя 100-200 см.

152. БОЛО́ТНАЯ ВЕРХОВА́Я ТОРФЯ́НИСТО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //peaty-gley high moor soil // sol tourbeuse haute à gley // Heydeanmoorgleyboden - термин русск.шк. (1967) для вида болотных верховых почв, имеющих слой торфа мощностью менее 30 см.

153. БОЛО́ТНАЯ ВЕРХОВА́Я ТОРФЯ́НО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //peat-gley high moor soil // sol tourbeux gley haute // Heidemoortorfgleyboden - 1) термин русск.шк. (1967) для подтипа болотных верховых почв, имеющих профиль T-G с мощностью торфа до 50 см; 2) термин русск.шк. (1967) для вида болотных верховых почв, имеющих слой торфа мощностью 30-50 см.

154. БОЛО́ТНАЯ КИ́СЛАЯ ПО́ЧВА // acid swamp soil // sol marecageuse acide //saurer Moorboden - термин М.А.Глазовской (1972) для геохимической ассоциации почв, имеющих кислую реакцию по всему профилю и грунтовое переувлажнение бо́льшей части профиля.

155. БОЛО́ТНАЯ МИНЕРА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // mineral bog soil // sol marécageux mineraux // mineralischer Naßboden - термин немецкой школы для болотных почв без торфяного горизонта; это понятие включает гумусово-глеевые, дерново-глеевые, иловато-глеевые и т.п. почвы.

156. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ПО́ЧВА // black bog soil, flat bog soil, low moor soil, low-land bog soil, low-level bog soil // sol de marais de depression, sol tourbeux de depression, sol tourbeux basse // Niederungsmoorboden, Senkesumpfboden, Senke-Torfmoorboden - термин русск.шк. (1967) для типа торфяных и торфяно-глеевых почв низинных болот.

157. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ДЕЛЮВИА́ЛЬНО-ЗАИ́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА // deluvially silted low moor soil // sol colmatage déluvial de marais de depression // deluvialauflanderter Niederungsmoorboden - термин русск.шк. (1967) для рода болотных низинных почв речных долин, балок и логов, обогащенных илом в верхних горизонтах или перекрытых илистым наносом в результате эрозии окружающих распаханных склонов.

158. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА // calcareous low moor soil // sol calcaire de marais de depression // Kalkniederungsmoorboden - термин русск.шк. (1967) для рода болотных низинных почв, формирующихся при заболачивании жесткими грунтовыми водами, связанными с выходами карбонатных пород.

159. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ОБЕДНЕННАЯ ПО́ЧВА // low moor impoverished soil //sol maigri de marais de depression // ausgemagerter Niederungs-

moorboden - термин русск.шк. (1967) для торфяных и торфяно-глеевых почв низинных болот, формирующихся под воздействием слабоминерализованных аллохтонных грунтовых вод, преимущественно в подзонах северной и средней тайги, особенно в краевой части мезотрофных, а иногда и олиготрофных болот.

160. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ОБЕДНЕННАЯ ТОРФЯ́НАЯ ПО́ЧВА // low moor impoverished peat soil //sol tourbeux maigri de marais de depression //ausgemagerter Niederungsmoortorfboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа болотных низинных почв, формирующихся под воздействием слабоминерализованных аллохтонных грунтовых вод, преимущественно в подзонах северной и средней тайги, особенно в краевой части мезотрофных, а иногда и олиготрофных болот, и имеющих слой торфа мощностью более 50 см.

161. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ОБЕДНЕННАЯ ТОРФЯ́НО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // low moor impoverisched peat-gley soil //sol tourbeux-gley maigri de marais de depression //ausgemagerter Niederungsmoortorfgleyboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа болотных низинных почв, формирующихся под воздействием слабоминерализованных аллохтонных грунтовых вод, преимущественно в подзонах средней и северной тайги, особенно в краевой части мезотрофных, а иногда и олиготрофных болот, и имеющих слой торфа менее 50 см мощности.

162. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ОБЫ́ЧНАЯ (НОРМА́ЛЬНО-ЗО́ЛЬНАЯ) ПО́ЧВА // ordinary low moor soil //sol ordinaire de marais de depression // gewöhnliche Niederungsmoorboden - термин русск.шк. (1967) для рода болотных низинных почв с нормальной (5-10% для обедненных торфов и 10-20% для типичных торфов) зольностью торфа.

163. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ОРУДЕНЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА // limonitized low moor soil //sol limonitée de marais de depression //Eisenniderungsmoorboden - термин русск.шк. (1967) для рода болотных низинных почв, имеющих в профиле скопление железистых конкреций или ржаво-коричневую прокраску и содержащих более 5% железа.

164. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ПЕРЕГНО́ЙНАЯ ПО́ЧВА // muck low moor soil //sol muck de marais de depression //Muckniederungsmoorboden - термин русск.шк. (1967) для вида болотных низинных почв, органогенный горизонт которых имеет степень разложения торфа более 45%.

165. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ СОЛОНЧАКО́ВАЯ ПО́ЧВА // saline low moor soil// sol salin de marais de depression // Salzniederungsmoorboden -

термин русск.шк. (1967) для рода болотных низинных почв, формирующихся при заболачивании сильно минерализованными водами и содержащих более 1% водорастворимых солей.

166. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ СУЛЬФА́ТНОКИ́СЛАЯ ПО́ЧВА // acid sulphate low moor soil //sol acide sulfate de marais de depression // saurer Sulfat-Niederungsmoorboden - термин русск.шк. (1967) для рода болотных низинных почв, образующихся на породах, богатых пиритом и отличающихся сильно кислой реакцией (pH 1-2) и высоким содержанием SO_4 и Cl в растворе.

167. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ТОРФЯ́НАЯ ПО́ЧВА //low moor typic peat soil //sol tourbeux typique de marais de depression //typischer Niederungsmoortorfboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа болотных низинных почв, формирующихся в центральной части низинных болот при заболачивании средне и сильноминерализованными аллохтонными грунтовыми водами и имеющих мощность торфяного слоя более 50 см.

168. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ТОРФЯ́НО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // low moor typic peat-gley soil // sol tourbeux-gley typique de marais de depression // typischer Niederungsmoortorfgleyboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа болотных низинных почв, формирующихся по окраинам низинных болот или в мелких депрессиях при заболачивании средне- и сильно минерализованными аллохтонными грунтовыми водами и имеющими мощность торфяного слоя менее 50 см, причем нижняя часть органогенного слоя обычно имеет торфяно-перегнойный характер.

169. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ТОРФЯ́НАЯ ПО́ЧВА // peat low moor soil // sol tourbeux de marais de depression // Niederungsmoortorfboden - 1) термин русск.шк. для почв низинных болот, имеющих мощность торфяного слоя более 50 см; 2) термин русск.шк. (1967) для вида болотных низинных почв, органогенный горизонт которых имеет степень разложения торфа менее 25%.

170. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ТОРФЯ́НАЯ ПО́ЧВА НА ГЛУБО́КОМ ТО́РФЕ //peat low moor soil on deep peat //sol tourbeux de marais de depression à tourbe profond //Niederungsmoortorfboden auf tiefer Torf - термин русск.шк. (1967) для вида болотных низинных почв с мощностью торфяного слоя более 200 см.

171. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ТОРФЯ́НАЯ ПО́ЧВА НА МЕ́ЛКОМ ТО́РФЕ //peat low moor soil on shallow peat //sol tourbeux de marais de depression

à tourbe mincé // Niederungsmoortorfboden auf dünner Torf – термин русск.шк. (1967) для вида болотных низинных почв с мощностью торфяного слоя 50-100 см.

172. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ТОРФЯ́НАЯ ПО́ЧВА НА СРЕ́ДНЕМ ТО́РФЕ // peat low moor soil on medium peat // sol tourbeux de marais de depression à tourbe moderée // Niederungsmoortorfboden auf mässig Torf – термин русск.шк. (1967) для вида болотных низинных почв с мощностью торфяного слоя 100-200 см.

173. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ТОРФЯ́НИСТО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // peaty-gley low moor soil // sol tourbeux à gley de marais de depression // Torfgley Niederungsmoorboden – термин русск.шк. (1967) для вида болотных низинных почв, имеющих мощность торфа менее 30 см.

174. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ТОРФЯ́НО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // peat-gley low moor soil // sol tourbeux à gley de marais de depression // Torfgley Niederungsmoorboden – термин русск.шк. (1967) для вида болотных низинных почв, имеющих мощность торфяного слоя 30-50 см.

175. БОЛО́ТНАЯ НИЗИ́ННАЯ ТОРФЯ́НО-ПЕРЕГНОЙНАЯ ПО́ЧВА // peat-muck low moor soil // sol tourbe-muck de marais de depression // Torf-Muck Niederungsmoorboden – термин русск.шк. (1967) для вида болотных низинных почв, органогенный горизонт которых имеет степень разложения торфа 25-45%.

176. БОЛО́ТНАЯ РУДА́ // bog iron, marsh ore, bog iron ore, limonite // minerai de fer de marais, minerai de marais, limonite // Raseneisenerz, Marscherz, Raseneisenstein, Sumpferz – отложения гидроокиси железа в болотных и темноцветных почвах депрессий в форме конкреций, бобовин, землистых прослоев, желваков, обычно по периферии болот. Син.: лимонит, бобовая руда.

177. БОЛО́ТНАЯ СЛА́БОЩЕЛО́ЧНАЯ ПО́ЧВА // slightly alkaline swamp soil // sol marecageuse peu alcalin // schwach alkalischer Moorboden – термин М.А.Глазовской (1972) для геохимической ассоциации почв, имеющих близкую к нейтральной реакцию в верхней части профиля и щелочную – в нижней и грунтовое переувлажнение бо́льшей части профиля.

178. БОЛО́ТНАЯ ТОРФЯ́НО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА – См. Торфяно-глеевая п.

179. БОЛО́ТНАЯ ЩЕЛО́ЧНАЯ ПО́ЧВА // alkaline swamp soil // sol marecageuse alcalin // alkalischer Moorboden – термин М.А.Глазовской (1972) для геохимической ассоциации почв, имеющих щелочную реакцию по всему профилю и грунтовое переувлажнение бо́льшей части профиля.

180. БОЛО́ТНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // swampy-gley soil // sol marécageux à gley // Naßgley - термин немецкой школы для болотных минеральных почв, имеющих только гумусовый и глеевый горизонты. Син.: дерново-глеевая п.

181. БОЛО́ТНО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА // swamp-podzolic soil // sol marécageux-podzolique // Moorpodsolboden - термин русск.шк. для типа почв, переходного между подзолистыми и болотными почвами, характеризующихся сильным оглеением нижней части профиля в результате избыточного грунтового увлажнения, что приводит к образованию глеевого горизонта G непосредственно под подзолистым горизонтом, либо между ними имеется переходный горизонт Bg.

182. БОЛО́ТНЫЙ МЕ́РГЕЛЬ // bog marl, marsh marl // marne de marais // Moormergel, Wiesenmergel (нем. Mergel от лат. marga - мергель) - глинисто-известковые прослои в болотных и темноцветных почвах депрессий с содержанием 20-80% извести, формирующиеся при отложении извести из жестких грунтовых вод обычно по периферии низинных болот.

183. БОЛО́ТО // bog, peat, peat land, fen, morass, swamp // tourbière, marais // Moor, Moos, Ried - избыточно увлажненный участок суши, имеющий с поверхности слой торфа не менее 0,3 м (при меньшей мощности торфа или его отсутствии избыточно увлажненные территории называются заболоченными землями).

184. БОЛО́ТО АТМОСФЕ́РНОГО ПИТА́НИЯ // atmospheric swamp // marais d'origine atmosphérique // Sumpf atmosphärischen Ursprungs - термин западно-европейских школ. См. Болото верховое.

185. БОЛО́ТО АТМОСФЕ́РНОЕ // rain water bog, rain water moor // marais de pluie // Regenwassermoor - термин немецкой школы. См. Болото верховое.

186. БОЛО́ТО ВЕРХОВО́Е // high moor, peat bog, raised bog, raised moss, upland moor // fagne, marais haut, marais tourbeux, tourbière, tourbière haute // Heidemoor, Hochmoor, Torfmoor - болото с обильными мертвыми растительными остатками, развивающееся в условиях атмосферного водного питания, часто имеющее выпуклую форму вследствие более быстрого нарастания сфагнового мха в центральной части при минимальной минерализации вод. Син.: болото олиготрофное.

187. БОЛО́ТО МЕЗОТРО́ФНОЕ // mesotrophic moor, mesotrophic peat bog // marais mésotrophe // Mesotrophmoor, mesotropher Moor (от греч.

mésos - средний и trophē - питание) - болото промежуточное по режиму питания и зольности торфа между верховым и низинным. Син.: болото переходное.

188. БОЛО́ТО НИЗИ́ННОЕ // black bog, flat bog, low moor, lowland bog, low-level bog // marais de depression, tourbière de depression, tourbière basse // Niederungsmoor, Senkesumpf, Senke-Torfmoor - болото грунтового питания, развивающееся в условиях снабжения питательными веществами, растворенными в грунтовых водах, приходящих с окружающих повышенных территорий. Син.: болото эутрофное.

189. БОЛО́ТО ОЛИГОТРО́ФНОЕ // oligotrophic moor, oligotrophic peat bog // marais oligotrophe // Oligotrophmoor (от греч. oligos - незначительный и trophē - питание) - болото атмосферного питания, растительность которого утратила непосредственную связь с грунтовыми водами. Син.: болото верховое.

190. БОЛО́ТО ОМБРОГЕ́ННОЕ // ombrogenous moor // marais ombrogène // ombrogener Moor (от греч. ómbros - дождь и génos - происхождение) - термин немецкой школы. См. Болото верховое.

191. БОЛО́ТО ПЕРЕХО́ДНОЕ // transitional moor, transitional peat land // tourbière de transition, tourbière intermédiaire // Übergangsmoor, Zwischenmoor - болото, промежуточное между верховым и низинным, характеризующееся тем, что растения, обитающие на повышенных участках (кочки, повышения у пней и т.п.) живут за счет атмосферных осадков и относятся к группе олиготрофных, в то время как эутрофная растительность понижений питается за счет грунтовых вод. Син.: болото мезотрофное.

192. БОЛО́ТО ПО́ЙМЕННОЕ // back swamp // marais des fonds de vallée // Auesumpf - термин для низинных болот, формирующихся в притеррасных понижениях речных пойм.

193. БОЛО́ТО ПРЕСНОВО́ДНОЕ // fresh-water marsh // marais d'eau douce // Süsswassermoor, Süsswassersumpf - сборный термин для различного типа питания болот, объединяемых лишь тем признаком, что в их образовании участвуют пресные воды, а не солёные.

194. БОЛО́ТО ЭУТРО́ФНОЕ // eutrophic peat bog, eutrophic moor // marais eutrophe, marais fertile // Eutrophmoor, nährstoffreich Moor (от греч. éu - хорошо и trophē - питание) - болото грунтового питания. Син.: болото низинное.

195. БОРА́ЛЬФ // boralf // boralf // Boralf (от греч. boreas - северный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка альфисолей (см.), которые: 1) не насыщены водой в какой-либо период года и не имеют признаков переувлажнения, описанных для аквальфов (см.); 2) имеют среднегодовую почвенную температуру менее 8°С и 3) имеют один или оба следующих признака: а) сплошной белёсый горизонт переходит языками или затеками в аргиллювый[x)] или натриевый[x)] горизонт; если верхний горизонт супесчаный или легче, а аргиллювый горизонт выражен прослойками, белёсый горизонт должен быть сплошным от основания $A_{пах}$ (или от глубины 15 см) до аргиллового горизонта; б) среднелетняя температура почвы на 50 см или на контакте с породой, если он ближе, менее 15°С для пахотных почв или почв без подстилки и менее 8°С при наличии подстилки. В пределах этого подпорядка выделяются шесть больших почвенных групп: 1) криобораль́фы, 2) эутробораль́фы, 3) фраджибораль́фы, 4) глоссобораль́фы, 5) натрибораль́фы и 6) палеобораль́фы.

196. БОРОВА́Я ПО́ЧВА // pine forest soil // sol de forêt vierge // Kieferwaldboden (от русск. бор - сосновый лес) - термин, иногда употребляемый почвоведами, но не имеющий точного значения; обычно применяется к почвам боровых террас, то-есть низких надпойменных песчаных террас, поросших сосновым лесом (бором), преимущественно на Русской равнине; в этом смысле это обычно слабоподзолистые или скрытоподзолистые песчаные почвы.

197. БОРОВИ́НА // borovina // borovina // Borowina (от русск.нар.) - 1) термин Н.М.Сибирцева (1895), взятый им из народного употребления в качестве синонима рендзины (см.), подчеркивающий лесное происхождение рендзин; 2) народный термин, распространенный в некоторых районах Польши и Белоруссии, для темных почв, развитых на выходах мела; 3) термин Кубиены (1953) для пойменных луговых почв на карбонатном аллювии; син.: Наносная рендзиновидная почва.

198. БОРОВО́Й ПЕСО́К // pine forest sand // sable de forêt vierge // Kieferwaldsand (от русск. бор - сосновый лес) - устаревший термин для песчаных почв со слаборазвитым профилем, формирующихся под сосновыми борами в лесной, лесостепной и степной зонах.

199. БОРО́ЛЛЬ // boroll // boroll // Boroll (от греч. boreas - северный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка моллисолей (см.), которые: 1) имеют среднегодовую температуру ниже 8°С; 2) имеют либо черную окраску в моллевом[x)] горизонте до глубины минимум 15 см, либо среднелетнюю температуру на 50 см или на контакте с плотной породой (что ближе) ниже 15°С, если не имеют A_0 или ниже 8°С, если есть A_0; 3) не имеют белёсого горизонта, имеющего признаки переувлажнения, то-есть пятнистости или железо-марганцевых конкреций крупнее 2мм; 4) не насыщены водой в какой-либо период или не имеют признаков переувлажнения, характерных для акволлей (см.); 5) не имеют карбонатного горизонта, подстилающего моллевый горизонт на глубине менее 50 см и содержащего более 40% $CaCO_3$, если это не кальциевый[x)] горизонт (плотный подстилающий известняк в расчет не принимается). В пределах этого подпорядка выделяются 7 больших почвенных групп: 1) аргиборолли, 2) кальциборолли, 3) криоборолли, 4) гаплоборолли, 5) натриборолли, 6) палеборолли и 7) вермиборолли (см.).

200. БО́РОСАПРИ́СТ // borosaprist // borosaprist // Borosaprist (от греч. boreas- северный, sapros - гнилой и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы сапристов (см.), имеющих среднегодовую температуру почвы ниже 8°С и не промерзающих в течение двух летних месяцев, но промерзающих в зимний период; в пределах этой большой почвенной группы выделяются 9 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) торфянистые (fibric), 3) торфянистые землистые (fibric terric), 4) фловаквентные (fluvaquentic), 5) переходные (hemic), 6) переходные землистые (hemic terric), 7) озёрные (limnic), 8) скальные (lithic), 9) землистые (terric) сапристы.

201. БО́РОФИБРИ́СТ // borofibrist // borofibrist // Borofibrist (от греч. boreas - северный, лат. fibra - ткань и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы фибристов (см.), имеющих холодный, но не криогенный температурный режим и имеющих в составе торфа более одной четверти остатков не сфагнума, а других растений; в пределах этой большой почвенной группы выделяются 12 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) фловаквентные (fluvaquentic), 3) переходные (hemic), 4) переходные землистые (hemic terric),

5) водонасыщенные (hydric), 6) озёрные (limnic), 7) скальные (lithic), 8) перегнойные (sapric), 9) перегнойные землистые (sapric terric), 10) сфагновые (sphagnic), 11) сфагновые землистые (sphagnic terric), 12) землистые (terric) борофибристы.

202. БОРОФОЛИ́СТ // borofolist //borofolist //Borofolist (от греч. boreas - северный, лат. folia - листва и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы фолистов (см.) бореального пояса.

203. БОРОХЕМИ́СТ // borohemist // borohemist // Borohemist (от греч. boreas - северный, hemi - половина и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы хемистов (см.), имеющих среднегодовую температуру почвы ниже 8°С, не имеющих слоя многолетней мерзлоты, но ежедневно промерзающих зимой, не содержащих значительного количества сульфатов или сульфидов; среди этой большой почвенной группы выделяются 10 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) торфянистые (fibric), 3) торфянистые землистые (fibric terric), 4) флювиквентные (fluvaquentic), 5) водонасыщенные (hydric), 6) озёрные (limnic), 7) скальные (lithic), 8) перегнойные (sapric), 9) перегнойные землистые (sapric terric) и 10) землистые (terric) борохемисты.

204. БРЮНИЗЁМ // brunizem, brunigra soil, prairie soil // brunizem, sol de prairie // Brunisem, brauner Präriebodend (от франц. brun - бурый и русск. земля) - 1) термин амер.шк. для сильно гумусированных ненасыщенных черноземовидных почв прерии палеогидроморфного генезиса; 2) термин франц.шк. (1965,1967) для группы изогумусовых почв (см.), формирующихся в условиях относительно гумидного климата, имеющих частичную ненасыщенность в поверхностных горизонтах и почти полную насыщенность в более глубоких, характеризующихся тонкой полиэдрической структурой с поверхности.

205. БРЮНИЗЁМ КАРБОНА́ТНО-КО́РОВЫЙ // crust calcareous brunizem // brunizem à encroûtement calcaire // Kalkkrustbrunisem - термин франц.шк. (1967) для подгруппы брюниземов, имеющих цементированный горизонт вторичной аккумуляции карбоната кальция в нижней части профиля.

206. БРЮНИЗЁМ ЛЕССИВИ́РОВАННО-СОЛОНЦЕВА́ТЫЙ // alkali-lessive brunizem // brunizem lessivé à alcali // alkalischer lessivierter Brunisem

- термин франц.шк. (1967) для подгруппы бруниземов, характеризующихся солонцеватостью в нижней части профиля (повышенное содержание поглощенного натрия) и наличием глинисто-иллювиального горизонта (В).

207. БРЮНИЗЁМ ПСЕ́ВДОГЛЕ́ЕВЫЙ // pseudogleyic brunizem // brunizem à pseudogley // pseudogleyischer Brunisem - термин франц.шк. (1967) для подгруппы поверхностно глееватых (псевдоглеевых) бруниземов, характеризующихся временным поверхностным избыточным увлажнением.

208. БРЮНИЗЁМ ТЕКСТУ́РНЫЙ // textural brunizem // brunizem à B textural // Texturbrunisem - термин франц.шк. (1967) для подгруппы бруниземов, имеющих иллювиальную глину в горизонте В.

209. БРЮНИЗЁМ ТИПИ́ЧНЫЙ // typical brunizem // brunizem modal // typischer Brunisem - термин франц.шк. (1967) для подгруппы брюнизёмов, не имеющих текстурного горизонта В, псевдоглее, карбонатной коры, призмовидной структуры и трещиноватости, и осолоделости.

210. БРЮНИЗЁМ ТРЕЩИНОВА́ТЫЙ // vertic brunizem // brunizem à (B) vertique // vertischer Brunisem - термин франц.шк. (1967) для подгруппы брюнизёмов, имеющих крупную призмовидную структуру в горизонте (В) с трещинами между структурными отдельностями.

211. БРЮНИСО́ЛЬ // brunisol // brunisol // Brunisol (от франц. brun - бурый и лат. solum - почва) - 1) устаревший, но встречающийся в своих производных, термин американской школы для бурых лесных почв; 2) термин канадской школы (1968); см. Брюнисольная почва.

212. БРЮНИСО́ЛЬ БЕ́ДНАЯ // dystric brunisol // brunisol dystrique // dystrischer Brunisol (от гр. dys - без и trophē - пища) - термин канадской школы (1968) для большой группы почв, входящей в порядок брюнисольных почв, характеризующихся наличием маломощного (< 5 см) горизонта A_1, камбиевого[x)] горизонта В с pH ($CaCl_2$) < 5,5 и степенью насыщенности основаниями (по NaCl) от 65 до 100%; почвы формируются на кислых породах. Они могут иметь слабо выраженный элювиальный горизонт и слабый вынос глины в В.

213. БРЮНИСО́ЛЬ БЕ́ДНАЯ АЛЬПИ́ЙСКАЯ // alpine dystric brunisol // brunisol dystrique alpine // alpen dystrischer Brunisol - термин канадской школы (1968) для подгруппы бедных брюнисолей, имеющих

грубогумусный полуторфянистый горизонт A_1 под тонкой лесной подстилкой, подстилаемый камбиевым[x)] горизонтом В.

214. БРЮНИСОЛЬ БЕДНАЯ ДЕГРАДИРОВАННАЯ // degraded dystric brunisol // brunisol dystrique dégradé // degradierter dystrischer Brunisol (от лат. degradatio - снижение) - термин канадской школы (1968) для подгруппы бедных брюнисолей, имеющих в профиле слабо выраженный элювиальный горизонт и слабое накопление иллювированного материала в В.

215. БРЮНИСОЛЬ БЕДНАЯ КРИОГЕННАЯ // cryic dystric brunisol // brunisol dystrique cryique // kryischer dystrischer Brunisol (от греч. cryos - холод) - термин канадской школы (1968) для бедных брюнисолей, в профиле которых обнаруживается слой многолетней мерзлоты в пределах 100 см от поверхности.

216. БРЮНИСОЛЬ БЕДНАЯ ОГЛЕЕННАЯ // gleyed dystric brunisol // brunisol dystrique gleyifié // vergleyter dystrischer Brunisol (от русск. глей) - термин канадской школы (1968) для бедных брюнисолей, в профиле которых отмечаются признаки слабого оглеения.

217. БРЮНИСОЛЬ БЕДНАЯ СКАЛЬНАЯ // lithic dystric brunisol // brunisol dystrique lithique // lithischer dystrischer Brunisol (от греч. lithos - камень) - термин канадской школы для бедных брюнисолей, в профиле которых обнаруживается плотная порода в пределах от 10 до 50 см от поверхности.

218. БРЮНИСОЛЬ БЕДНАЯ ТИПИЧНАЯ // orthic dystric brunisol // brunisol dystrique orthique // orthischer dystrischer Brunisol (от греч. orthos - настоящий) - термин канадской школы (1968) для подгруппы бедных брюнисолей, имеющих профиль, нормальный для данной группы, т.е. камбиевый[x)] горизонт В под лесной подстилкой или под очень тонким A_1; в горизонте В иногда отмечаются конкреции железа.

219. БРЮНИСОЛЬ БОГАТАЯ // eutric brunisol // brunisol eutrique // eutrischer Brunisol (от гр. éu - хорошо и trophē - питание) - термин канадской школы (1968) для большой группы почв, входящей в порядок брюнисольных почв, которые характеризуются маломощным горизонтом A_1 (менее 5 см) под лесной подстилкой, лежащим на камбиевом[x)] горизонте В, имеющем pH ($CaCl_2$) более 5,5 и степень насыщенности основаниями (по NaCl) 100%. Они могут иметь слабо выраженный элювиальный горизонт и слабые признаки иллювиирования глины в горизонте В. Формируются эти почвы обыч-

но на карбонатных породах (в сухих долинах Кордильер, в северных лесных районах области Великих Равнин, на Юконе).

220. БРЮНИСО́ЛЬ БОГА́ТАЯ АЛЬПИ́ЙСКАЯ // alpine eutric brunisol // brunisol eutrique alpine // alpen eutrischer Brunisol - термин канадской школы (1968) для почв подгруппы богатых брюнисолей, имеющих с поверхности под подстилкой грубогумусный полуторфянистый горизонт A_1.

221. БРЮНИСО́ЛЬ БОГА́ТАЯ ДЕГРАДИ́РОВАННАЯ // degraded eutric brunisol // brunisol eutrique dégradé // degradierter eutrischer Brunisol (от лат. degradatio - снижение) - термин канадской школы (1968) для подгруппы богатых брюнисолей, в профиле которых между горизонтами A_1 и B лежит маломощный осветленный горизонт A_2, а в горизонте B содержится иллювиированная глина или полуторные окислы, но в небольшом количестве.

222. БРЮНИСО́ЛЬ БОГА́ТАЯ КРИОГЕ́ННАЯ // cryic eutric brunisol // brunisol eutrique cryique // kryischer eutrischer Brunisol (от греч. cryos - холод) - термин канадской школы (1968) для почв любой из подгрупп группы богатых брюнисолей, в профиле которых имеется слой многолетней мерзлоты в пределах 100 см от поверхности.

223. БРЮНИСО́ЛЬ БОГА́ТАЯ ОГЛЕ́ЕННАЯ // gleyed eutric brunisol // brunisol eutrique gleyifié // vergleyter eutrischer Brunisol (от русск. глей) - термин канадской школы (1968) для почв любой из подгрупп группы богатых брюнисолей, в профиле которых отмечаются признаки слабого оглеения.

224. БРЮНИСО́ЛЬ БОГА́ТАЯ СКА́ЛЬНАЯ // lithic eutric brunisol // brunisol eutrique lithique // lithischer eutrischer Brunisol (от греч. lithos - камень) - термин канадской школы (1968) для почв любой из подгрупп группы богатых брюнисолей, в профиле которых обнаруживается плотная порода в пределах от 10 до 50 см от поверхности.

225. БРЮНИСО́ЛЬ БОГА́ТАЯ ТИПИ́ЧНАЯ // orthic eutric brunisol // brunisol eutrique orthique // orthischer eutrischer Brunisol (от греч. orthos - настоящий) - термин канадской школы (1968) для подгруппы богатых брюнисолей, имеющих нормальный для этой группы профиль без признаков элювиального горизонта.

226. БРЮНИСО́ЛЬ МЕЛА́НОВАЯ // melanic brunisol // brunisol melanique // melanischer Brunisol (от лат. melanoc - мягкий) - термин канадской школы (1968) для большой группы почв, входящих в поря-

док брюнисольных почв, имеющих поверхностный гумусовый горизонт A_1 мощностью более 5 см с зернистой мюллевой структурой, камбиевый[x)] горизонт В с насыщенностью основаниями (методом NaCl) 100% и содержанием оксалатнорастворимых Fe+Al менее 0,8%.

227. БРЮНИСО́ЛЬ МЕЛА́НОВАЯ ДЕГРАДИ́РОВАННАЯ // degraded melanic brunisol // brunisol melanique dégradé // degradierter melanischer Brunisol (от лат. degradatio - снижение) - термин канадской школы (1968) для подгруппы мелановых брюнисолей, имеющих слабо выраженный элювиальный горизонт под горизонтом A_1 и слабую аккумуляцию глины в какой-либо части горизонта В.

228. БРЮНИСО́ЛЬ МЕЛА́НОВАЯ ОГЛЕ́ЕННАЯ // gleyed melanic brunisol // brunisol melanique gleyifié // vergleyter melanischer Brunisol (от русск. глей) - термин канадской школы для любой из подгрупп группы мелановых брюнисолей, в профиле которых наблюдаются признаки слабого оглеения.

229. БРЮНИСО́ЛЬ МЕЛА́НОВАЯ СКА́ЛЬНАЯ // lithic melanic brunisol // brunisol melanique lithique // lithischer melanischer Brunisol (от греч. lithos - камень) - термин канадской школы (1968) для почв любой из подгрупп группы мелановых брюнисолей, в профиле которых обнаруживается плотная порода в пределах от 10 до 50 см от поверхности.

230. БРЮНИСО́ЛЬ МЕЛА́НОВАЯ ТИПИ́ЧНАЯ // orthic melanic brunisol // brunisol melanique orthique // orthischer melanischer Brunisol (от греч. orthos - настоящий) - термин канадской школы (1968) для мелановых брюнисолей, имеющих обычный для мелановых брюнисолей (см.) профиль и карбонаты в горизонте С.

231. БРЮНИСО́ЛЬ ТЁМНАЯ // sombric brunisol // brunisol sombrique // sombrischer Brunisol (от лат. umbra - тень) - термин канадской школы (1968) для большой группы почв, входящей в порядок брюнисольных почв, имеющих под лесной подстилкой тёмный гумусовый горизонт мощностью более 5 см с гумусом типа модер, сменяемый камбиевым[x)] горизонтом В с pH ($CaCl_2$) менее 5,5 и степенью насыщенности основаниями (по NaCl) 65-100%; почвы формируются на кислых породах под хвойно-широколиственными лесами.

232. БРЮНИСО́ЛЬ ТЁМНАЯ ОГЛЕ́ЕННАЯ // gleyed sombric brunisol // brunisol sombrique gleyifié // vergleyter sombrischer Brunisol (от русск. глей) - термин канадской школы (1968) для темных брюнисолей с признаками слабого оглеения в профиле.

233. БРЮНИСО́ЛЬ ТЁМНАЯ СКА́ЛЬНАЯ // lithic sombric brunisol // brunisol sombrique lithique // lithischer sombrischer Brunisol (от греч. lithos - камень) - термин канадской школы (1968) для темных брюнисолей, в профиле которых обнаруживается плотная порода в пределах от 10 до 50 см от поверхности.

234. БРЮНИСО́ЛЬ ТЁМНАЯ ТИПИ́ЧНАЯ // orthic sombric brunisol // brunisol sombrique orthique // orthischer sombrischer Brunisol (от греч. orthos - настоящий) - термин канадской школы (1968) для подгруппы темных брюнисолей имеющих нормальный для данной группы профиль, т.е. темно-серый до черного горизонт A_1 и бурый до желто-бурого камбиевый[x)] горизонт B, лежащий на кислой материнской породе.

235. БРЮНИСО́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // brunisolic soil // sol brunisolique // brunisolischer Boden (от франц. brun - бурый и лат. solum - почва) - термин канадской школы (1968) для порядка буроокрашенных почв хорошего или удовлетворительного дренажа и хорошей или умеренной окисленности, формирующихся под лесной или травянистой растительностью лесной, альпийской или тундровой ассоциаций. В естественных условиях они могут иметь лесную подстилку и гумусовый горизонт A_1, а также слабо выраженный (соль и перец) или сильно выраженный (A_2) элювиальный горизонт. Отличительный признак - наличие камбиевого[x)] горизонта B и отсутствие аргиллового[x)] или сподового[x)] горизонтов. Син.: брюнисоль.

236. БРЮНИФИЦИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // brunified soil // sol brunifié // Brunischboden (от фр. brun - бурый) - термин франц.шк. (1967) для класса полноразвитых почв, характеризующихся высокой биологической активностью, моллевым типом гумуса (редко модер на пределе класса), имеющих профиль A(B)C или ABC со структурным-(B)- или текстурным-B-переходным горизонтом, иногда трудно выделяющимся в профиле и слабо гумусированным, обычно имеющих немного свободного железа, преимущественно связанного в глинисто-гумусовом комплексе, отличающихся отсутствием химической деградации глинистых минералов.

237. БРЮНИФИЦИ́РОВАННАЯ БОРЕА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // boreal brunified soil // sol brunifié boreal // borealischer Brunischboden - термин франц.шк. (1967) для подкласса брюнифицированных почв (см.), распространенных в районах бореального климата, включающего группу серых древесных почв.

238. БРЮНИФИЦИ́РОВАННАЯ ГУМИ́ДНО-УМЕ́РЕННАЯ ПО́ЧВА // temperate-humid brunified soil // sol brunifié de climat tempére humide // feuchtgemässigter Brunischboden - термин франц.шк. (1967) для подкласса брюнифицированных почв (см.), распространенных в районах с гумидным умеренным климатом, включающего группы бурозе-мов (с В структурным) и лессивированных (с В текстурным) почв.

239. БРЮНИФИЦИ́РОВАННАЯ КОНТИНЕНТА́ЛЬНО-УМЕ́РЕННАЯ ПО́ЧВА // temperate-continental brunified soil // sol brunifié de climat tempére continental // kontinentalgemässigter Brunischboden - термин франц.шк.(1967) для подкласса брюнифицированных почв (см.), распространенных в районах с континентальным умеренным клима-том, включающего группу серых лесных почв.

240. БРЮНИФИЦИ́РОВАННАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА // tropical brunified soil // sol brunifié tropical // tropischer Brunischboden - термин франц.шк. (1967) для подкласса брюнифицированных почв (см.), распространенных в районах тропического климата, включающего группу бурых эутрофных тропических почв.

241. БУ́РАЯ ПО́ЧВА // brown soil // sol brun // Braunboden - термин франц.шк. (1965,1967) для группы почв, входящей в подкласс брюнифицированных гумидно-умеренных почв, характеризующихся профилем А(В)С (структурный горизонт В) при практически отсут-ствующем перемещении глины по профилю (индекс лессивирования от 1 до 1:1,4); не имеющих горизонта A_2. (Соответствуют бурым лесным почвам).

242. БУ́РАЯ (СВЕ́ТЛО-КАШТА́НОВАЯ) ПО́ЧВА // brown (lightchestnut) soil // sol brun (chatain clair) // braun (hellkastanienfarbiger) Bo-den - термин канадской школы (1968) для большой группы светло-каштановых и каштановых сухостепных почв, относящихся к поряд-ку чернозёмных почв (см.).

243. БУ́РАЯ А́НДОВАЯ ПО́ЧВА // andic brown soil // sol brun andique // andischer Braunboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы бурых почв (см.), формирующихся на породах, богатых стеклова-тым материалом, имеющих профиль А(В)С и богатую аллофаном гли-нистую часть.

244. БУ́РАЯ АРКТИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА // arctic brown soil // sol brun arc-tique // brauner arktischer Boden - термин амер.шк. для аркти-ческих дерново-коричневых почв (см.).

245. БУ́РАЯ АРИ́ДНАЯ ПО́ЧВА // arid brown soil // sol brun aride // trockene Braunerde - см. Бурая полупустынная почва.

246. БУ́РАЯ АРКТИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА // brown arctic soil // sol brun arctique // braun arktischer Boden - термин франц.шк. (1967) для группы слаборазвитых мерзлотных почв (см.), не имеющих льдистых сегрегированных включений и сетчатого строения, имеющих многолетнюю мерзлоту ниже 120 см, не имеющих камней на поверхности.

247. БУ́РАЯ АРКТИ́ЧЕСКАЯ ГЛУБОКОГИ́ДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА // deeply hydromorphic brown arctic soil // sol brun arctique à hydromorphie de profondeur // tiefhydromorpher braun arktischer Boden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы бурых арктических почв (см.), имеющих явные признаки гидроморфизма в нижней части профиля.

248. БУ́РАЯ АРКТИ́ЧЕСКАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // typical brown arctic soil // sol brun arctique modal // typischer braun arktischer Boden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы бурых арктических почв (см.), не имеющих явных признаков гидроморфизма.

249. БУ́РАЯ БЕСКАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА // non-calcic brown soil// sol brun non-calcique // kalkfreier brauner Boden - термин амер.школы для сильно оглиненных буроокрашенных почв субтропических районов, характеризующихся наличием глинистоиллювиального горизонта B с обильными корочками и потёками глин на гранях призмовидных отдельностей.

250. БУ́РАЯ ГИ́ДРОМОРФНАЯ ПО́ЧВА // hydromorphic brown soil // sol brun hydromorphé // hydromorphischer Braunboden - термин франц.шк. (1967) для бурых почв (см.), имеющих признаки гидроморфизма в нижней части профиля (пятнистость, железистые конкреции).

251. БУ́РАЯ ГИ́ПСОВАЯ ПО́ЧВА // gypsic brown soil // sol brun gypseuse // braun Gipsboden - термин франц.шк. (1967) для группы гипсовых почв (см.), имеющих профиль $A(B)_R$, т.е. имеющих переходный горизонт между горизонтом A и породой.

252. БУ́РАЯ ГИ́ПСОВАЯ КО́РОВАЯ ПО́ЧВА // crust gypsic brown soil // sol brun gypseuse à encroûtement gypseux // braun Krustgipsboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы бурых гипсовых почв (см.) имеющих гипсовую кору в профиле.

253. БУ́РАЯ ГИ́ПСОВАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // typical gypsic brown soil// sol brun gypseuse modal // typischer braun Gipsboden - термин

франц.шк. (1967) для подгруппы бурых гипсовых почв (см.), не имеющих гипсовой коры в профиле.

254. БУ́РАЯ ГО́РНО-ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА // mountain brown forest soil // sol brun forestier de montagne // Gebirgsbrbaunewaldboden - термин русск.шк. для бурых лесных щебнистых почв с укороченным профилем, формирующихся в условиях горных склонов.

255. БУ́РАЯ ГО́РНО-ТАЕ́ЖНАЯ ПО́ЧВА // mountain brown taiga soil // sol brun taiga de montagne // Gebirgsbraunetaigaboden - термин русск.шк. для бурых таёжных почв с укороченным профилем, формирующихся в условиях горных склонов.

256. БУ́РАЯ ГРУ́МОВАЯ ПО́ЧВА // grumic brown soil // sol brun grumique // grumischer braun Boden (от термина грумусоль) - термин канадской школы (1968) для модификации любой из подгрупп группы бурых (светлокаштановых и каштановых сухостепных) почв, характеризующейся наличием самомульчирующегося слоя и трещин с поверхности при тяжелом мех.составе.

257. БУ́РАЯ ИЗВЕСТКО́ВАЯ ПО́ЧВА // calcareous brown soil // sol brun calcaire // braun kalkhaltiger Boden - термин франц.шк. (1967) для группы почв, входящей в подкласс карбонатных почв класса кальцемагнезиальных почв, имеющих между гумусовым горизонтом А и плотной или рыхлой карбонатной породой слабо развитый структурный горизонт (В), зернистую или комковатую структуру в горизонте А, вскипающих с HCl и имеющих pH выше 7,0.

258. БУ́РАЯ ИЗВЕСТКО́ВАЯ КО́РОВАЯ ПО́ЧВА // crust calcareous brown soil // sol brun calcaire à encroutement calcaire // braun Kalkkrustboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы бурых известковых почв, имеющих в профиле вторичную известковую кору.

259. БУ́РАЯ ИЗВЕСТКО́ВАЯ ПСЕ́ВДОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // pseudogley calcareous brown soil // sol brun calcaire à pseudogley // pseudogleyischer braun kalkhaltiger Boden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы бурых известковых почв, имеющих в профиле псевдоглеевый горизонт (поверхностное временное переувлажнение верховодкой).

260. БУ́РАЯ ИЗВЕСТКО́ВАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // typical calcareous brown soil // sol brun calcaire modal // typischer braun kalkhaltiger Boden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы бурых известковых почв, не имеющих в профиле известковой коры, псевдоглея и не трещиноватых с поверхности.

261. БУ́РАЯ ИЗВЕСТКО́ВАЯ ТРЕЩИНОВА́ТАЯ ПО́ЧВА // vertic calcareous brown soil // sol brun calcaire vertique // vertischer braun kalkhaltiger Boden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы бурых известковых почв, трещиноватых с поверхности в сухой период года.

262. БУ́РАЯ ИЗОГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА // brown isohumic soil // sol brun isohumique // braun Isohumusboden - термин франц.шк. (1965,1967) для группы изогумусовых насыщенных почв, формирующихся в степных районах с холодной зимой, характеризующихся содержанием 1-3% гумуса в верхнем 20-см слое, зернистой или ореховатой структурой с поверхности и полиэдрической - реже призмовидной - на глубине, с бескарбонатным верхним горизонтом и аккумуляцией карбонатов в средней части профиля.

263. БУ́РАЯ ИЗОГУ́МУСОВАЯ КО́РОВАЯ ПО́ЧВА // crust brown isohumic soil // sol brun isohumique encroûté // braun Krustisohumusboden - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы бурых изогумусовых почв, имеющих карбонатную кору в нижней части профиля.

264. БУ́РАЯ ИЗОГУ́МУСОВАЯ ПСЕ́ВДОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // pseudogleyic brown isohumic soil // sol brun isohumique à pseudogley // pseudogleyischer braun Isohumusboden - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы бурых изогумусовых почв, имеющих псевдоглеевый горизонт в профиле и характеризующихся временным поверхностным избыточным увлажнением.

265. БУ́РАЯ ИЗОГУ́МУСОВАЯ СЛА́БОЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА // slightly saline brown isohumic soil // sol brun isohumique faiblement salé // schwach salzhaltiger Isohumusboden - термин франц.шк. (1965, 1967) для подгруппы бурых изогумусовых почв, имеющих слабое засоление в нижней части профиля.

266. БУ́РАЯ ИЗОГУ́МУСОВАЯ СЛА́БОСОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА // slightly alkaline brown isohumic soil // sol brun isohumique faiblement alcalisé // schwach alkalischer Isohumusboden - термин франц.шк. (1965, 1967) для подгруппы бурых изогумусовых почв, имеющих повышенное содержание (до 10% от ёмкости поглощения) поглощенного натрия в средней и нижней части профиля.

267. БУ́РАЯ ИЗОГУ́МУСОВАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // typical brown isohumic soil // sol brun isohumique modal // typischer braun Isohumusboden - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы бурых изогумусовых почв, не имеющих в профиле трещиноватости, псевдоглея, карбонатной коры, солонцеватости и засоления.

268. БУ́РАЯ ИЗОГУ́МУСОВАЯ ТРЕЩИНОВА́ТАЯ ПО́ЧВА // vertic brown isohumic soil // sol brun isohumique vertique // vertischer braun Isohumusboden - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы бурых изогумусовых почв, имеющих грубую призмовидную структуру в горизонте В с трещинами между структурными отдельностями.

269. БУ́РАЯ КА́ЛЬЦИЕВАЯ ПО́ЧВА // calcic brown soil // sol brun calcique // braun Kalkboden - термин франц.шк. (1967) для группы почв, входящей в подкласс насыщенных почв класса кальцемагнезиальных почв, имеющих профиль АС или А(В)С, содержащих менее 20% гумуса, pH около 7,0, комковатую или мелкоореховатую структуру, полную насыщенность основаниями, карбонатную породу в основе профиля.

270. БУ́РАЯ КА́ЛЬЦИЕВАЯ МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА // deep calcic brown soil // sol brun calcique épais // tiefer braun Kalkboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы бурых кальциевых почв (см.), имеющих мощность профиля более 50 см.

271. БУ́РАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА // brown carbonate soil// sol brun carbonaté // Braunkalkboden, Braunkarbonatboden - термин французской школы для почв, формирующихся на малокарбонатных рыхлых материнских породах (мергели, лёссы, коллювий), характеризующихся отсутствием известковых включений, наличием переходного горизонта В, призмовидно-комковатой структурой. Син.: пararендзина (Кубиена, 1953).

272. БУ́РАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА // calcareous brown soil // sol brun calcaire // kalkhaltiger braun Boden - термин канадской школы (1968) для подгруппы светлокаштановых и каштановых сухостепных почв, вскипающих в горизонте В непосредственно под гумусовым.

273. БУ́РАЯ КИ́СЛАЯ ПО́ЧВА // acid brown soil // sol brun acide //saure Braunboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы бурых почв (см.), олиготрофных, имеющих профиль А(В)С с однообразным механическим составом по профилю, с pH менее 5,5 в горизонте (В).

274. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА // brown forest soil // sol brun forestier // braune Waldboden - термин, предложенный Штремме для почв широколиственных лесов центральной Европы, характеризующихся бурой окраской всего профиля, значительным оглинением, постепенностью переходов между горизонтами, высокой гумусированностью (3-7% гумуса), кислой или слабо кислой реакцией среды, сравнительно большим содержанием свободных окислов железа. Син.: бурозем; в русской шк. выделяется на правах типа.

275. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // gley brown forest soil // sol brun forestier à gley // braune Waldgleyboden - 1) термин русск.шк. (1967) для типа гидроморфных почв, развивающихся среди бурых лесных почв в условиях плохого дренажа или дополнительного поверхностного увлажнения и имеющих признаки бурых лесных почв при наличии оглеенного горизонта в профиле; 2) термин русск.шк. (1967) для подтипа бурых лесных глеевых почв, имеющих в нижней части профиля глеевый горизонт грунтового переувлажнения.

276. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я КИ́СЛАЯ ПО́ЧВА // acid brown forest soil // sol brun acide forestier // saure braune Waldboden - бурая лесная почва с кислой реакцией среды в верхней части профиля и низкой степенью насыщенности основаниями, но без признаков элювиально-иллювиальной дифференциации профиля.

277. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я КИ́СЛАЯ ВЛА́ЖНО-ТЁПЛАЯ ПО́ЧВА // wet-warm acid brown forest soil // sol brun acide forestier de climat chaude-humide // humid-warmer saure braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа бурых лесных почв западно-закавказской и карпатской провинций, характеризующихся отсутствием оподзоленности и сильной дифференциации профиля при кислой реакции среды.

278. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я КИ́СЛАЯ ИЛЛИМЕРИЗО́ВАННАЯ ВЛА́ЖНО-ТЁПЛАЯ ПО́ЧВА - См. Бурая лесная кислая оподзоленная влажно-тёплая почва.

279. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я КИ́СЛАЯ ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ВЛА́ЖНО-ТЁПЛАЯ ПО́ЧВА - См. Бурая лесная кислая оподзоленная влажно-тёплая п.

280. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я КИ́СЛАЯ НЕОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА // acid non-podzolized brown forest soil // sol brun forestier acid non-podzolique // saure nichtpodsolierter braune Waldboden - См. Бурая лесная кислая п.

281. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я КИ́СЛАЯ ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ВЛА́ЖНО-ТЁПЛАЯ ПО́ЧВА // wet-warm podzolized acid brown forest soil // sol brun acide forestier podzolisé de climat chaude-humide // humid-warmer podsolierter saure braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа бурых лесных почв западно-закавказской и карпатской провинций, характеризующихся морфологической и аналитической оподзоленностью верхнего горизонта (осветление, вынос ила, R_2O_3).

282. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я КИ́СЛАЯ ПСЕ́ВДООПОДЗО́ЛЕННАЯ ВЛА́ЖНО-ТЁПЛАЯ ПО́ЧВА - См. Бурая лесная кислая оподзоленная влажно-тёплая п.

283. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я КОВАРВА́ННАЯ ПО́ЧВА // kovárvány brown forest soil // sol brun forestier kovârvânique // kovarvanischer braune Waldboden - термин венгерской школы для бурых лесных песчаных почв, имеющих в нижней части профиля извилистые тонкие прослойки, обогащенные и цементированные железом и гумусом.

284. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я КРАСНОЦВЕ́ТНАЯ ПО́ЧВА // red coloured brown forest soil // sol brun forestier de coleur rouge // rotfarbiger braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для рода бурых лесных почв, формирующихся на древних ферраллитных красноцветных корах выветривания.

285. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // brown forest washed out soil, grey-brown podzolic soil, pale leached soil // sol brun léssivé, sol pâle // Fahlerde - бурая лесная почва, в которой наблюдается некоторая дифференциация илистой фракции по профилю с ее аккумуляцией в горизонте В в форме ориентированной глины и соответствующим некоторым осветлением горизонта А; состав илистой фракции при этом по профилю не меняется. Син.: бурая лесная псевдооподзоленная п., серо-бурая подзолистая п.

286. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я МА́ЛОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА // low humic brown forest soil // sol brun forestier peu humifére // humusarmer braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для вида бурых лесных почв, содержащих менее 5% гумуса в верхнем горизонте.

287. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я МНО́ГОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА // high humic brown forest soil // sol brun forestier plus humifére // hochhumushaltig braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для вида бурых лесных почв, содержащих более 10% гумуса в верхнем горизонте.

288. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я НЕПО́ЛНОРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА // non-complete brown forest soil // sol brun forestier non-complet // nichtgeschlossener braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для рода бурых лесных почв, формирующихся на элювии плотных пород и характеризующихся щебнистостью и малой мощностью профиля и отдельных горизонтов.

289. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я ОБЫ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // ordinary brown forest soil // sol brun forestier ordinaire // gewöhnlicher braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для рода бурых лесных почв, формирующихся на элювии и элюво-делювии плотных бескарбонатных осадочных и магматических пород, а также на бескарбонатных рыхлых отложениях.

290. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА // podzolized brown forest soil // sol brun forestier podzolisé // podsolierter braune Waldboden - общеупотребительный термин для бурых лесных почв, в профиле которых отмечается незначительная дифференциация на элювиальную и иллювиальную части вследствие перемещения вниз аморфных продуктов почвообразования (R_2O_3).

291. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я ОСВЕТЛЁННАЯ ПО́ЧВА // bleached brown forest soil // sol brun forestier décoloré // gebleichter braune Waldboden - устаревший термин Г.Штремме для бурых лесных почв с осветленным белесоватым горизонтом в верхней части профиля; сейчас немецкими почвоведами относятся такие почвы к парабурозёмам.

292. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я ОСТА́ТОЧНО-КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА // residually calcareous brown forest soil // sol brun forestier calcaire residuelle // restkalkarischer braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для рода бурых лесных почв, формирующихся на карбонатных породах.

293. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я ОСТА́ТОЧНО-НАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА // residually saturated brown forest soil // sol brun forestier saturé residuelle // restgesättigter braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для рода бурых лесных почв с высокой степенью насыщенности основаниями (близкой к 100%), формирующихся на основных породах.

294. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я ПОВЕ́РХНОСТНО ГЛЕЕВА́ТАЯ ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА // podzolized surfacely gleyic brown forest soil // sol brun forestier podzolisé à gley superficiel // podsolierter oberflachen gleyischer braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа бурых лесных глеевых почв, имеющих оглеение в верхней части профиля за счет поверхностного и бокового внутрипочвенного переувлажнения.

295. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я ПСЕВДОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // pseudogley brown forest soil // sol brun forestier à pseudogley // pseudogleyischer braune Waldboden - термин западноевропейских школ для бурых лесных почв, имеющих признаки оглеения в верхней части профиля вследствие временного поверхностного переувлажнения.

296. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я ПСЕ́ВДООПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА // pseudopodzolized brown forest soil // sol brun pseudopodzol // pseudopodsolierter braune Waldboden - термин советских почвоведов для бурых лесных лессивированных почв. Син.: бурая лесная лессивированная п.

297. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я РЕГОСО́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // regosolic brown forest soil // pararendzine brune // braune Pararendsina - См. Парарендзина бурая.

298. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я СЛА́БОНЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ИЛЛИМЕРИЗО́ВАННАЯ ТЁПЛАЯ ПО́ЧВА - См. Бурая лесная слабоненасыщенная оподзоленная тёплая п.

299. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я СЛА́БОНЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ИЛЛИМЕРИЗО́ВАННАЯ ХОЛО́ДНАЯ ПО́ЧВА - См. Бурая лесная слабоненасыщенная оподзоленная холодная п.

300. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я СЛАБОНЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ТЁПЛАЯ ПО́ЧВА - См. Бурая лесная слабоненасыщенная оподзоленная теплая п.

301. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я СЛА́БОНЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ХОЛО́ДНАЯ ПО́ЧВА - См. Бурая лесная слабоненасыщенная оподзоленная холодная п.

302. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я СЛА́БОНЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ТЁПЛАЯ ПО́ЧВА // warm podzolized slightly unsaturated brown forest soil// sol brun forestier peu non-saturé podzolisé de climat chaude // warmer podsolierter schwach ungesättigter braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа бурых лесных почв тёплых северо-кавказской и восточно-закавказской провинций, характеризующихся оподзоленностью верхнего горизонта (осветление, вынос ила и R_2O_3) и слабой ненасыщенностью (менее 20%) основаниями при слабокислой реакции среды.

303. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я СЛА́БОНЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ПСЕ́ВДООПОДЗО́ЛЕННАЯ ТЁПЛАЯ ПО́ЧВА - См. Бурая лесная слабоненасыщенная оподзоленная теплая п.

304. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я СЛА́БОНЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ХОЛО́ДНАЯ ПО́ЧВА // cold podzolized slightly unsaturated brown forest soil // sol brun forestier peu non-saturé podzolisé de climat froide // kalten podsolierter schwach ungesättigter braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа бурых лесных почв холодной дальневосточной провинции, характеризующихся слабой (менее 20%) ненасыщенностью основаниями, слабокислой реакцией и оподзоленностью верхнего горизонта (осветление, вынос ила и R_2O_3).

305. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я СЛА́БОНЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ПСЕ́ВДООПОДЗО́ЛЕННАЯ ХОЛО́ДНАЯ ПО́ЧВА - См. Бурая лесная слабоненасыщенная оподзоленная холодная п.

306. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я СЛА́БОНЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ТЁПЛАЯ ПО́ЧВА // warm slightly unsaturated brown forest soil // sol brun forestier peu non-saturé de climat chaude // warmer shwach ungesättiger braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа бурых лесных почв

тёплых северо-кавказской и восточно-закавказской провинций, характеризующихся близкой к нейтральной реакцией, слабой ненасыщенностью основаниями (менее 20%) и отсутствием заметной дифференциации профиля по илу и R_2O_3.

307. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я СЛА́БООПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА // slightly podzolized brown forest soil // sol brun forestier peu podzolisé // schwach podsolierter braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для вида бурых лесных оподзоленных почв, в профиле которых оподзоленный горизонт A_1A_2 выражен отдельными пятнами с комковатой структурой.

308. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я СЛА́БОНЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ХОЛО́ДНАЯ ПО́ЧВА // cold slightly unsaturated brown forest soil // sol brun forestier peu non-saturé de climat froide // kalten schwach ungesättigter braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа бурых лесных почв холодной дальневосточной провинции, характеризующихся слабой (менее 20%) ненасыщенностью основаниями, отсутствием дифференциации профиля по илу и R_2O_3 и близкой к нейтральной реакцией.

309. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я СРЕ́ДНЕГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА // moderate humic brown forest soil // sol brun forestier humifère moderée // mässig-humusierter braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для вида бурых лесных почв, содержащих 5-10% гумуса в верхнем горизонте.

310. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я СРЕ́ДНЕОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА // moderately podzolized brown forest soil // sol brun forestier podzolisé moderée // mässigpodsolierter braune Waldboden - термин русск.шк. (1967) для вида бурых лесных оподзоленных почв, в профиле которых имеется сплошной осветленный оподзоленный горизонт A_1A_2.

311. БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я СУБАРКТИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА // subarctic brown forest soil // sol brun forestier subarctique // subarktischer Braunwaldboden - термин Келлога и Нигарда (1951) для лесных неоподзоленных мерзлотно-таежных почв Канады и Аляски, имеющих слабодифференцированный буроокрашенный профиль, слабую гумусированность, кислую реакцию, хороший внутрипочвенный дренаж.

312. БУ́РАЯ ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // lessivied brown soil, brown washed out soil, washed out brown soil // sol brun lessivé // lessivierter Brownboden, Fahlerde - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы лессивированных почв (см.), имеющих слабо выраженный горизонт A_2 и текстурный горизонт B при индексе лессивирования от 1,4 до 2,0.

313. БУ́РАЯ ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ КОНТИНЕНТА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // continental lessivied brown soil // sol brun lessivé continentale // kontinentalischer lessivierter Braunboden - термин франц.шк., применяемый иногда в качестве синонима серых лесных почв.

314. БУ́РАЯ ЛУ́ГОВО-СТЕПНА́Я ПО́ЧВА // meadow-steppe brown soil, brown meadow-steppe soil // sol brun de steppe à nappe phréatique // brauner Wiesensteppenboden - См. Лугово-бурная полупустынная п.

315. БУ́РАЯ МЕЛАНИЗИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // melanized brown soil // sol brun mélanisé // melanisierter brauner Boden - термин франц.шк. (1956) для бурых лесных почв, формирующихся на богатых основаниями породах, имеющих высокую гумусированность, слабокислую реакцию (pH 6,0-6,5) и небольшую ненасыщенность основаниями (20-30%).

316. БУ́РАЯ ОГЛЕ́ЕННАЯ ПО́ЧВА // gleyed brown soil // sol brun gleyifié // vergleyter braune Boden (от русск. глей) - термин канадской школы (1968) для модификации любой из подгрупп группы бурых (светлокаштановых и каштановых сухостепных) почв, характеризующейся слабыми признаками оглеения в профиле.

317. БУ́РАЯ ОКАРБОНА́ЧЕННАЯ ПО́ЧВА // carbonated brown soil // sol brun calcique // kalkischer braune Boden - термин канадской школы (1968) для модификации любой из подгрупп группы бурых (светлокаштановых и каштановых сухостепных) почв, вскипающих с поверхности вследствие перегнанности, перерытости и др.причин.

318. БУ́РАЯ ОСОЛОДЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА // solodic brown soil // sol brun solodique // solodischer braune Boden (от русск. солодь) - термин канадской школы (1968) для подгруппы осолоделых светлокаштановых и каштановых сухостепных почв, переходных между бурыми элювированными почвами (см.) и бурыми солодями (см.).

319. БУ́РАЯ О́ХРИСТАЯ ПО́ЧВА // ochric brown soil // sol brun ocreuse // ockerischer Braunboden - устаревший термин франц.шк. См. Криптоподзолистая бурая почва.

320. БУ́РАЯ ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА // brown podzolic soil // sol ocre podzolique // Braunpodsol - термин западно-европейской и американской школ для почв, переходных между подзолом и буроземом. Син.: Подзол-бурозём.

321. БУ́РАЯ ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА // brown semidesert soil // sol brun subaride // braune Boden der Halbwüste, brauner Halbwüstenboden

- термин для почв опустыненных (преимущественно полынных) степей (полупустынь) умеренно-холодного аридного климата со слабо дифференцированным профилем светло-бурой окраски; содержание гумуса в верхнем горизонте 1,5-2,5%, карбонаты с 20-30 см с увеличением книзу; обычно солонцеваты в средней части профиля и соответственно оглинены и уплотнены; с 90-130 см имеют водорастворимые сульфаты и хлориды. Син.: бурая степная и.

322. БУ́РАЯ ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ НЕПО́ЛНОРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА // non-complete brown semidesert soil // sol brun subaride non-complet // nichtgeschlossener brauner Halbwüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода бурых полупустынных почв на плотных породах, характеризующихся щебнистостью, малой мощностью профиля (40-50 см) и отдельных горизонтов (А до 5-8 см).

323. БУ́РАЯ ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ ОБЫ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // ordinary brown semidesert soil // sol brun subaride ordinaire // gewöhnlicher brauner Halbwüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода бурых полупустынных почв, характеризующихся отсутствием солонцеватости, слоеватостью гумусового горизонта, образованием хрупкой корочки на поверхности, уплотненным горизонтом В, под которым лежит карбонатный, а далее гипсовый горизонт.

324. БУ́РАЯ ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ ОСТА́ТОЧНОГИ́ПСОВАЯ ПО́ЧВА // residually gypsic brown semidesert soil // sol brun subaride gypsique residuel // restgipsischer brauner Halbwüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода бурых полупустынных почв с солонцеватостью и повышенным засолением, в которых почвенные горизонты подстилаются шестоватым гипсом.

325. БУ́РАЯ ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ СЛА́БОДИФФЕРЕНЦИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // weakly differentiated brown semidesert soil // sol brun subaride peu differentiée // schwach differenzierter brauner Halbwüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода бурых полупустынных песчаных и супесчаных почв со слабым развитием всех горизонтов профиля, очень слабо развитой поверхностной карбонатной пленкой, без слоеватого горизонта, со слабым выделением гипса в виде жилок и слабым развитием карбонатных конкреций.

326. БУ́РАЯ ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА // solonetzic brown semidesert soil // sol brun subaride solonetzoide // solonetzartiger brauner Halbwüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода бурых полупустынных почв, характеризующихся сильным уплотнением, слитостью, глыбистой структурой горизонта В и незначи-

тельным уплотнением и ореховатой структурой карбонатного горизонта, вскипанием с поверхности и содержанием обменного натрия более 10% от емкости поглощения.

327. БУ́РАЯ ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ СОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА // solonchak-like brown semidesert soil, saline brown semidesert soil, saliniferous brown semidesert soil // sol brun subaride salifére, sol brun subaride solonchakoide // salzhaltig brauner Halbwüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода бурых полупустынных почв, содержащих легкорастворимые соли в профиле и повышенную карбонатность.

328. БУ́РАЯ ПУСТЫ́ННО-СТЕПНА́Я ПО́ЧВА // brown desert-steppe soil // sol brun subarid // brauner Wüstesteppenboden - См. Бурая полупустынная почва.

329. БУ́РАЯ РЕ́ГОВАЯ ПО́ЧВА // rego brown soil // sol brun regique // regischer braune Boden (от гр. rhegos - покров) - термин канадской школы (1968) для подгруппы светлокаштановых и каштановых сухостепных почв, в которых гумусовый горизонт залегает непосредственно на горизонте С или на переходном горизонте АС; в естественном состоянии горизонт А не содержит карбонатов, а пахотные почвы обычно карбонатны с поверхности.

330. БУ́РАЯ СКА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // lithic brown soil // sol brun lithique // lithischer braun Boden (от гр. lithos - камень) - термин канадской школы (1968) для модификации любой из подгрупп группы бурых (светлокаштановых и каштановых сухостепных) почв, характеризующейся наличием плотной породы в пределах от 10 до 50 см от поверхности.

331. БУ́РАЯ СЛА́БО ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // slightly lessivied brown soil // sol brun faiblement lessivé // schwach lessivierter Braunboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы бурых почв (см.) со слабой дифференциацией профиля по глине (индекс лессивирования от 1,1 до 1,4 при отсутствии смыва верхнего горизонта).

332: БУ́РАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА // solonetzic brown soil // sol brun solonetzique // solonetzartiger Boden (от русск. солонец) - термин канадской школы (1968) для подгруппы солонцеватых светлокаштановых и каштановых сухостепных почв, переходных к солонцам и имеющих заметное содержание поглощенного натрия.

333. БУ́РАЯ СОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //saline brown soil// sol brun salin // salzhaltiger braun Boden (от русск. солончак) - термин канадской школы (1968) для модификации любой из подгрупп группы бурых (светлокаштановых и каштановых сухостепных) почв при появлении водорастворимых солей в пределах почвенного профиля в виде морфологических новообразований.

334. БУ́РАЯ СРЕДИЗЕ́МНОМО́РСКАЯ ПО́ЧВА //brown mediterranean soil// sol brun méditerranée// braune Mediterranboden - термин западноевропейских школ для бурых, желто-бурых и буро-желтых почв с профилем АВС, образующихся на карбонатных или бескарбонатных породах в условиях субтропического средиземноморского климата, имеющих глинисто-иллювиальный (текстурный) горизонт В с глинистыми плёнками по граням призмовидных структурных отдельностей, выщелоченные от карбонатов горизонты А и бо́льшую часть В, степень насыщенности основаниями в горизонте В более 35%. Для карбонатных в нижних горизонтах почв или почв, сформированных на известняках, в Зап.Европе существующие синонимы (нем.шк.) - бурый карбонатный суглинок, терра фуска. Для бескарбонатных почв в США существовал синоним - некарбонатная бурая почва (non-calcic brown soil). В настоящее время термин подвергся сильной критике и нуждается в замене.

335. БУ́РАЯ СТЕПНА́Я ПО́ЧВА //brown steppe soil // sol brun subaride // brauner Halbwüstenboden - термин англ.школы для светло-бурых почв северных пустынных степей. Син.: бурая полупустынная п.

336. БУ́РАЯ СУБАРИ́ДНАЯ ПО́ЧВА //subarid brown soil // sol brun subaride // braune Subaridboden - термин франц.шк. (1965,1967) для группы изогумусовых насыщенных почв районов с тёплым сезоном в период дождей, характеризующихся слабой гумусированностью вследствие быстрой минерализации гумуса и относительно большой интенсивностью минеральных преобразований, проявляющихся в высвобождении железа.

337. БУ́РАЯ СУБАРИ́ДНАЯ КРАСНОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //subarid red-brown soil// sol brun rouge sub-aride// rotbraune Subaridboden - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы бурых субаридных почв,имеющих красноватую окраску вследствие повышенного содержания свободного железа.

338. БУ́РАЯ СУБАРИ́ДНАЯ ПСЕ́ВДОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //pseudogleyic subarid brown soil //sol brun sub-aride à pseudogley //pseudogleyischer braune Subaridboden - термин франц.шк.(1965,1967)

для подгруппы бурых субаридных почв, имеющих в профиле псевдоглеевый горизонт (пятнистость, железистые конкреции).

339. БУРАЯ СУБАРИДНАЯ СЛАБОЗАСОЛЁННАЯ ПОЧВА //slightly saline subarid brown soil//sol brun sub-aride faiblement salé//schwache salzhaltiger braune Subaridboden - термин франц.шк. (1965, 1967) для подгруппы бурых субаридных почв, имеющих слабое засоление в нижней части профиля.

340. БУРАЯ СУБАРИДНАЯ СЛАБОСОЛОНЦЕВАТАЯ ПОЧВА //slightly alkaline subarid brown soil // sol brun sub-aride faiblement alcalisé// schweche alkalischer braune Subaridboden - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы бурых субаридных почв, имеющих повышенное содержание поглощенного натрия в одном из горизонтов профиля (до 10% от ёмкости поглощения).

341. БУРАЯ СУБАРИДНАЯ ТИПИЧНАЯ ПОЧВА //typical subarid brown soil// sol brun sub-aride modal // typischer braune Subaridboden - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы бурых субаридных почв, не имеющих в профиле засоления, солонцеватости, трещиноватости, псевдоглея, ожелезнения.

342. БУРАЯ СУБАРКТИЧЕСКАЯ ПОЧВА //subarctic brown soil // sol brun subarctique // braune subarktischer Boden - термин Келлога и Найгарда (1951) для буроокрашенных кислых ожелезненных потечногумусных лесных почв Сев.Америки, не имеющих осветленного оподзоленного горизонта; син.: подбур таежный.

343. БУРАЯ ТАЁЖНАЯ ГЛЕЕВАЯ ПОЧВА //brown taiga gleyed soil // sol brun de taiga à gley // brauner Taigagleyboden - См. Буроглее-подзолистая п.

344. БУРАЯ ТЁМНАЯ (ТЁМНОКАШТАНОВАЯ) ПОЧВА //dark brown (dark chestnut) soil//sol brun foncé (châtain foncé)//dunkelbraune (dunkelkastanienfarbiger) Boden - термин канадской школы (1968) для большой группы темнокаштановых сухостепных почв, относящихся к порядку чернозёмных почв (см.).

345. БУРАЯ ТЁМНАЯ ГРУМОВАЯ ПОЧВА //grumic dark brown soil // sol brun foncé grumique // grumischer dunkelbraune Boden - термин канадской школы (1968) для модификации любой из подгрупп группы бурых тёмных (тёмнокаштановых) почв, обнаруживающих самомульчирование и трещиноватость с поверхности при тяжелом мех. составе.

346. БУ́РАЯ ТЁМНАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА // **calcareous dark brown soil // soil brun foncé calcaire // kalkhaltiger dunkelbraune Boden** - термин канадской школы (1968) для подгруппы темнокаштановых сухостепных почв, в которых карбонаты находятся в горизонте В непосредственно под гумусовым горизонтом.

347. БУ́РАЯ ТЁМНАЯ ОГЛЕ́ЕННАЯ ПО́ЧВА // **gleyed dark brown soil // sol brun foncé gleyifié // vergleyter dunkelbraune Boden** - термин канадской школы (1968) для модификации любой из подгрупп группы бурых тёмных (тёмнокаштановых) почв, обнаруживающих в профиле слабые признаки оглеения.

348. БУ́РАЯ ТЁМНАЯ ОКАРБОНА́ЧЕННАЯ ПО́ЧВА // **carbonated dark brown soil // sol brun foncé calcique // kalkischer dunkelbraune Boden** - термин канадской школы (1968) для модификации любой из подгрупп группы бурых темных (темнокаштановых) почв, вскипающих с поверхности вследствие перепаханности, перерытости и др.причин.

349. БУ́РАЯ ТЁМНАЯ ОСОЛОДЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА // **solodic dark brown soil //sol brun foncé solodique // solodischer dunkelbraune Boden** - термин канадской школы (1968) для подгруппы осолоделых темнокаштановых сухостепных почв, переходных между бурыми тёмными элювированными почвами (см.) и бурыми солодями (см.).

350. БУ́РАЯ ТЁМНАЯ РЕ́ГОВАЯ ПО́ЧВА // **rego dark brown soil // sol brun foncé regique // regischer dunkelbraune Boden** (от гр. rhegos - покров) - термин канадской школы (1968) для подгруппы темнокаштановых сухостепных почв, в которых горизонт А лежит непосредственно на горизонте С; в естественном состоянии такие почвы бескарбонатны в гумусовом горизонте, а пахотные почвы карбонатны с поверхности.

351. БУ́РАЯ ТЁМНАЯ СКА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // **lithic dark brown soil // sol brun foncé lithique // lithischer dunkelbraune Boden** (от гр. lithos - - камень) - термин канадской школы (1968) для модификации любой из подгрупп группы бурых тёмных (темнокаштановых) почв, для которой характерно присутствие плотной породы в пределах от 10 до 50 см от поверхности.

352. БУ́РАЯ ТЁМНАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА // **solonetzic dark brown soil // sol brun foncé solonetzique // solonetzartiger dunkelbraune Boden** (от русск. солонец) - термин канадской школы (1968) для подгруппы солонцеватых темнокаштановых сухостепных почв с заметным (но меньшим, чем в солонцах) содержанием обменного натрия.

353. БУ́РАЯ ТЁМНАЯ СОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА // saline dark brown soil // sol brun foncé salin // salzhaltiger dunkelbraune Boden (от русск. солончак) - термин канадской школы (1968) для модификации любой из подгрупп группы бурых тёмных (темнокаштановых) почв, в профиле которых морфологически выделяются легкорастворимые соли.

354. БУ́РАЯ ТЁМНАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // orthic dark brown soil // sol brun foncé orthique // orthischer dunkelbraune Boden (от гр. orthos - настоящий) - термин канадской школы (1968) для подгруппы темнокаштановых сухостепных почв, в которых горизонт А подстилается бескарбонатным камбиевым[x)] или слабо выраженным аргилловым[x)] горизонтом В, под которым залегает горизонт карбонатной аккумуляции.

355. БУ́РАЯ ТЁМНАЯ ЭЛЮВИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // eluviated dark brown soil // sol brun foncé éluvial // eluvial dunkelbraune Boden (от лат. eluo - вымывание) - термин канадской школы (1968) для подгруппы темнокаштановых сухостепных почв, в которых имеется небольшой осветленный горизонт A_2 и умеренно выраженный аргилловый[x)] горизонт В; почва слабо кислая.

356. БУ́РАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // typical brown soil // sol brun modal // typischer Braunboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы бурых почв (см.), зутрофных и мезотрофных, имеющих профиль А(В)С с однообразным механическим составом по профилю, pH более 5,5 в горизонте (В).

357. БУ́РАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // orthic brown soil // sol brun orthique // orthischer braune Boden (от гр. orthos - настоящий) - термин канадской школы (1968) для подгруппы светлокаштановых и каштановых сухостепных почв, имеющих под гумусовым горизонтом камбиевый[x)] или слабо выраженный аргилловый[x)] лишенный карбонатов горизонт В, ниже которого лежит горизонт аккумуляции карбонатов; реакция почв от слабощелочной до слабокислой; горизонт В имеет призмовидную структуру.

358. БУ́РАЯ ЭЛЮВИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // eluviated brown soil // sol brun éluvial // eluvial braune Boden (от лат. eluo - вымывание) - термин канадской школы (1968) для подгруппы светлокаштановых и каштановых сухостепных почв, в которых имеется небольшой осветленный горизонт A_2 плитчатой пористой структуры и умеренно выраженный аргиловый[x)] горизонт, лишенный карбонатов; карбонаты

аккумулируются в нижней части профиля; реакция почвы слабо кислая.

359. БУ́РАЯ ЭУТРО́ФНАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА // tropical brown eutrophic soil // sol brun eutrophe tropical // tropischer Eutrophbraunboden - термин франц.шк. (1965,1967) для группы брюнифицированных тропических почв, характеризующихся сильногумусированным горизонтом A_1 с хорошо развитой ореховатой структурой, структурным горизонтом (В) с кубовидной или полиэдрической структурой, высокой степенью насыщенности кальцием, буровато-красной окраской из-за присутствия свободного железа.

360. БУ́РАЯ ЭУТРО́ФНАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ГИ́ДРОМО́РФНАЯ ТРЕЩИНОВА́ТАЯ ПО́ЧВА // vertic hydromorphic tropical brown eutrophic soil // sol brun eutrophe tropical hydromorphé vertique // vertischer hydromorphischer tropischer Eutrophbraunboden - термин франц.шк.(1965, 1967) для подгруппы бурых эутрофных тропических почв (см.), имеющих трещиноватость в верхней части профиля и признаки гидроморфизма (пятнистость или железистые конкреции) в нижней части профиля.

361. БУ́РАЯ ЭУТРО́ФНАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ОЖЕЛЕЗНЁННАЯ ПО́ЧВА // ferruginous tropical brown eutrophic soil // sol brun eutrophé tropical ferruginisé // eisenhaltiger tropischer Eutrophbraunboden - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы бурых эутрофных тропических почв (см.), содержащих повышенное количество свободного железа.

362. БУ́РАЯ ЭУТРО́ФНАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА // weakly developed tropical brown eutrophic soil // sol brun eutrophé tropical peu évolué // unreifer tropischer Eutrophbraunboden - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы бурых эутрофных тропических почв (см.), имеющих маломощный профиль и слабо выраженные генетические горизонты.

363. БУРОВА́ТО-СВЕ́ТЛО-СЕ́РАЯ ПО́ЧВА // brownish light gray soil // sol brunâtre-gris clair // hellbraungrauer Boden - термин русск.шк. (1967) для светло-серых лесных почв западно- и южно-европейской фации, формирующихся под широколиственными лесами с грабом и характеризующихся яркой бурой окраской горизонта В; почвы переходные к бурым лесным.

364. БУРОВА́ТО-СЕ́РАЯ ПО́ЧВА // brownish gray soil // sol brunâtre-gris // braungrauer Boden - термин русск.шк. (1967) для серых лес-

ных почв западно- и южно-европейской фации, формирующихся под широколиственными лесами с буком и характеризующихся буроватой окраской профиля при преобладании серых тонов; почвы переходные к бурым лесным.

365. БУРОВА́ТО-ТЁМНО-СЕ́РАЯ ПО́ЧВА // brownish dark gray soil // sol brunâtre-gris foncé // dunkelbraungrauer Boden - термин русск. шк. (1967) для темно-серых лесных почв западно- и южно-европейской фации, формирующихся под широколиственными лесами с буком и характеризующихся буроватым оттенком темного сероокрашенного профиля; почвы переходные к бурым лесным.

366. БУ́РО-ГЛЕ́ЕПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА // surfacely gleyed brown-earth-podzol // sol brun-podzol à gley surfacé // obergleyischer Braunerde-Podsol - термин для плакорных почв Приморья, имеющих поверхностное оглеение и переходный характер между буроземами и подзолами. Син.: буроподзолистая поверхностно глеевая почва, подбел.

367. БУ́РО-ЖЕ́ЛТАЯ КИ́СЛАЯ ПО́ЧВА // acid brown-yellow soil // sol brun-jaune acide // saurer braungelbfarbener Boden - термин амер.шк. для ферраллитизованных кислых сильно гумусированных почв высокогорных лесов тропического и субтропического поясов.

368. БУРОЗЁМ // brown earth // sol brun, sol tempéré // Braunerde - 1) термин Раманна (1905) для бурых лесных почв широколиственных и хвойно-широколиственных лесов Центральной Европы. Кубиена (1953) и Мюккенхаузен (1962) дали новое определение термина бурозем, указав основные почвенные признаки, в частности оглинение почвы без дифференциации глины по профилю. Син.: бурая лесная п. 2) В некоторых европейских школах термин имеет более узкое значение, будучи применяем лишь к одному типу группы бурых лесных почв, т.е. к типичным бурым почвам, не имеющим признаков лессивирования, оподзоливания, оглеения, сильной кислотности и т.д. (напр. в венгерской школе).

369. БУРОЗЁМ ГЛЕ́ЕВЫЙ // gleic brown earth // sol brun à gley // Gley-Braunerde - бурая лесная почва с глеевым горизонтом в нижней части профиля, образующимся за счет избыточного грунтового увлажнения в нижних частях склонов на переходе к гидроморфным условиям. Син.: бурая лесная глеевая п.

370. БУРОЗЁМ-ГЛЕ́Й // brown earth-gley // sol brun-gley // Braunerde-Gley - термин немецкой школы для почв, переходных между бурыми лесными и болотными (глеевыми).

371. БУРОЗЁМ ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ //ferrimorphic brown earth //sol brun ferrimorphé //ferritische Braunerde - термин Р.Сторриера и А.Мьюра (1962) для буроземов, формирующихся на богатых железом и алюминием породах и за счет этого сильно обогащенных вторичными соединениями железа.

372. БУРОЗЁМ КИ́СЛЫЙ // acid brown earth // sol brun acid // Saurbraunerde - термин для бурых лесных почв, имеющих высокую кислотность (pH < 5,0) и низкую степень насыщенности (до 50%) основаниями. Син.: буроземненасыщенный, буроземолиготрофный.

373. БУРОЗЁМ НА РЫ́ХЛЫХ ПОРО́ДАХ // brown earth on friable deposits // sol brun sur la roche friable // Lockersedimentbraunerde - термин австрийск.шк. для бурых лесных почв, сформированных на рыхлых осадочных породах, богатых мелкозёмом.

374. БУРОЗЁМ НАСЫ́ЩЕННЫЙ // base saturated brown earth // sol brun saturé en bases // basenreichen Braunerde - термин для буроземов, имеющих слабо кислую или близкую к нейтральной реакцию и высокую (более 50%) степень насыщенности основаниями. Син.: бурозём эутрофный.

375. БУРОЗЁМ НЕНАСЫ́ЩЕННЫЙ // unsaturated brown earth // sol brun nonsaturé // basenarmen Braunerde - термин, иногда применяемый для кислых бурых лесных почв в качестве синонима. Син.: буроземкислый, буроземолиготрофный.

376. БУРОЗЁМНО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА // brown-earth-podzol // sol brun-podzol // Braunerde-Podsol - термин для почв, переходных между бурозёмами и подзолами. Син.: буро-подзолистая почва, бурозём-подзол.

377. БУРОЗЁМ ОЛИГОТРО́ФНЫЙ // oligotrophic brown earth // sol brun oligotrophé // oligotrophe Braunerde - термин, иногда используемый в литературе для кислых ненасыщенных буроземов. Син.: буроземкислый, буроземненасыщенный.

378. БУРОЗЁМ ОПОДЗО́ЛЕННЫЙ // podzolized brown earth // sol brun podzolisée // podsolierter Braunerde - термин для буроземов, имеющих признаки оподзоливания в виде осветления верхнего горизонта, перемещения полуторных окислов по профилю, подкисления верхнего горизонта.

379. БУРОЗЁМ-ПА́РАБУРОЗЁМ // brown earth-parabrowneaith //sol brun-Parabraunerde // Braunerde-Parabraunerde - термин немецкой школы для почв, переходных между бурозёмом и парабурозёмом.

380. БУРОЗЁМ-ПОДЗО́Л // brown earth-podzol // sol brun-podzol // Braunerde-Podsol - термин немецкой школы для почв, переходных между буроземом и подзолом. Син.: буроподзолистая почва, буроземно-подзолистая почва.

381. БУРОЗЁМ ПСЕ́ВДОГЛЕ́ЕВЫЙ // pseudogleic brown earth // sol brun pseudogley // Pseudogley-Braunerde - термин немецкой школы для почв, переходных между псевдоглеем и буроземом.

382. БУРОЗЁМ-РЕНДЗИ́НА // brown earth-rendzina // sol brun-rendzina // Braunerde-Rendzina - термин немецкой школы для почв, переходных между буроземом и рендзиной.

383. БУРОЗЁМ РЫ́ХЛЫЙ // mellow brown earth // sol brun meuble // Lockerbraunerde - термин Е.Шёнхальса (1960) для олиготрофных (кислых, ненасыщенных) буроземов на рыхлых бескарбонатных породах.

384. БУРОЗЁМ СКА́ЛЬНЫЙ // hard rock brown earth // sol brun rocheux // Felsbraunerde - термин австрийск.шк. для бурых лесных почв, сформированных на плотных коренных скальных породах.

385. БУРОЗЁМ СКРЫ́ТОПОДЗО́ЛИСТЫЙ // cryptopodzolic brown earth // sol brun cryptopodzolique // kryptopodsolierter Braunerde - термин Мюккенхаузена (1950) для неоподзоленных кислых многогумусовых почв верхнего пояса горных еловых и елово-пихтовых лесов.

386. БУРОЗЁМ СРЕДИЗЕ́МНОМО́РСКИЙ // Mediterranean brown earth // sol brun-roux méditerranéen// mediterranische Braunerde - термин западно-европейских школ для красноватоокрашенных буроземов средиземноморской территории, переходных к краснозёмам. Син.: красновато-бурая лесная п.

387. БУРОЗЁМ-ЧЕРНОЗЁМ // brown earth-chernozem // sol brun-chernozem // Braunerde-Schwarzerde - термин немецкой школы для почв, переходных между бурозёмом и черноземом.

388. БУРОЗЁМ ШАНЬТУ́НЬСКИЙ // Shangtung brown earth, Shangtung brown soil // sol brun de Changtung // schangtunger Braunerde, schangtunger brauner Boden - устаревший термин для красновато-бурых сильно оглиненных почв редколесий субтропических районов Восточного Китая, вероятнее всего относящихся к типу коричневых почв сухих кустарников.

389. БУРОЗЁМ ЭУТРО́ФНЫЙ // eutrophic brown earth // sol brun eutrophé // eutrophe Braunerde - термин Кубиены (1953) для насыщенных, богатых питательными элементами буроземов, формирующихся на

богатых основаниями породах. Син.: бурозём насыщенный, бурая меланизированная п., бурая лесная слабоненасыщенная п.

390. БУ́РО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА // brown-earth-podzol // sol brun-podzol // Braunerde-Podsol - термин для почв, переходных между бурозёмом и подзолом. Син.: буроземно-подзолистая почва, бурозём-подзол.

391. БУ́РО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПОВЕ́РХНОСТНО ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // surfacely gleyed brown-earth-podzol // sol brun-podzol à gley surfacé // obergleyischer Braunerde-Podsol - термин Н.А.Крейды (1970) для плакорных почв Приморья, характеризующихся поверхностным оглеением и имеющих переходный между буроземами и подзолами общий характер. Син.: буро-глееподзолистая почва, подбел.

392. БУ́РО-ТАЁЖНАЯ ПО́ЧВА // brown taiga soil // sol brun de taiga // braune Taigaboden - термин Ливеровского и Рубцовой (1959) для бурookрашенных кислых ожелезненных потечногумусовых почв светлохвойной тайги, не имеющих осветленного оподзоленного горизонта; син.: подбур таежный.

393. БУ́РЫЙ ПОДВО́ДНЫЙ ТО́РФ // brown subwater peat, limnic peat, peat mud // tourbe brun de submersion, sol lacustre acide, vase tourbeuse // Braunschlammboden, Torfmudde - устаревший термин немецкой школы для богатых органическим веществом бурых иловатых подводных почв. Син.: дьи.

394. БУ́РЫЙ СУ́ГЛИНОК // brown loam // limon brun // Braunlehm, brauner Lehm - термин немецкой школы (Кубиена, 1956) для бурых суглинистых сиаллитных почв тропиков и субтропиков, относимых к реликтовым почвенным образованиям. Син.: пластосоль бурая.

395. БУ́РЫЙ СУ́ГЛИНОК КА́РБОНАТНЫЙ // brown calcareous loam // sol brun carbonaté // Kalkstein-Braunlehm - термин немецкой школы для формирующихся на известняках, мергелях, гипсах и т.п. в субтропиках и тропиках суглинистых почв бурой окраски. Син.: терра фуска, бурая средиземноморская почва.

396. БУ́РЫЙ СУ́ГЛИНОК-РЕНДЗИ́НА // brown loam-rendzina // limon brun-rendzine // Braunlehm-Rendzina - термин немецкой школы для рендзин с намечающимся бурым горизонтом В под горизонтом А.

397. ВА́ДИ // vadi // vadi // Vadi (от арабск.) - термин, распространенный в Северной Африке для сухих долин в пустынях Аравии и С.Африки, периодически или временно наполняющихся водой после

редких сильных ливней; термин относится и к наносам,и слабо развитым почвам, формирующимся в таких долинах (руслах).

398. ВАДИ́ЙНАЯ ПО́ЧВА // vadi soil // sol de vadi // Vadiboden (от арабск. ва́ди - сухая долина) - термин, распространенный в Северной Африке, для почв днищ сухих долин в пустынях Аравии и Северной Африки, периодически или временно наполняющихся водой после редких сильных ливней.

399. ВАЛУ́ННАЯ ПО́ЧВА - См. Завалуненная п.

400. ВАЛУ́ННО-ГА́ЛЕЧНИКОВАЯ ПО́ЧВА // facette soil // sol à facettes, sol en mosaique // Schachbrettboden, Mesaikboden - термин для почв, имеющих на поверхности в верхних слоях большое количество валунов и гальки.

401. ВЕ́ГА // vega // vega // Vega - термин Кубиены для луговых пойменных и лугово-глеевых пойменных почв с профилем A-B-G. Син.: наносная бурая п.

402. ВЕ́ГА АЛЛОХТО́ННАЯ // allochtonal vega // vega allochtoné // allochtone Vega - термин Кубиены для луговых и лугово-глеевых пойменных почв с профилем A-B-G, сформированных путем переотложения материала ранее сформированных и разрушенных водной эрозией почв. Син.: наносная бурая аллохтонная п.

403. ВЕ́ГА АУТОХТО́ННАЯ // autochtonal vega // vega autochtoné // autochtone Vega - термин Кубиены для луговых и лугово-глеевых пойменных почв с профилем A-B-G, сформированных путем переотложения материала, образовавшегося при выветривании пород данной территории без их длительного транспортирования. Син.: наносная бурая аутохтонная п.

404. ВЕ́РМИБОРО́ЛЛЬ // vermiboroll // vermiboroll // Vermiboroll (от лат. vermes - червь, греч. boreas - северный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы бороллей (см.), которые не имеют аргиллового[x)] или натриевого[x)] горизонта, но имеют моллевый[x)] горизонт с 50% или более объема ходов червей, капролитов или кротовин, который либо лежит на контакте с плотной породой, либо имеет переход к подстилающему горизонту, в котором 25% или более по объему составляют ходы червей, капролиты или кротовины. В пределах этой большой почвенной группы выделяются две подгруппы почв: 1) типичные (typic) и 2) нормальные (haplic) вермибородли.

405. ВЕ́РМУДО́ЛЛЬ // vermudoll // vermudoll // Vermudoll (от лат. vermes - червь, лат. udus - влажный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удоллей (см.), которые не имеют аргиллового[x)] горизонта, но имеют моллевый горизонт, который ниже $A_{пах}$ имеет более 50% объёма ходов червей, капролитов или кротовин и который либо лежит на контакте с плотной породой, либо имеет переход к нижележащему горизонту, в котором более 25% объема составляют разбросанные ходы червей, капролиты или кротовины. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 4 подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) энтовые (entic), 3) нормальные (haplic) и 4) маломощные (lithic) вермудолли.

406. ВЕ́РМУСТО́ЛЛЬ // vermustoll // vermustoll // Vermustoll (от лат. vermes - червь, лат. ustus - обожженный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устоллей (см.), которые: 1) не имеют аргиллового[x)] или натриевого[x)] горизонта; 2) имеют моллевый[x)] горизонт ниже $A_{пах}$, содержащий более 50% объема ходов червей, капролитов или кротовин и лежащий либо на контакте с плотной породой, либо имеющий переход к подстилающему горизонту, в котором более 25% объема составляют дискретные ходы червей, карполиты или кротовины. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 5 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) энтовые (entic), 3) нормальные (haplic), 4) маломощные (lithic) и 5) мощные (pachic) вермустоллы.

407. ВЕ́РТИСО́ЛЬ // vertisol // vertisol // Vertisol (от лат. vertere - оборачивать и лат. solum - почва) - 1) термин американской школы, ставший международным, для темных слитых набухающих трещиноватых почв с профилем A-C, сильно глинистых, бедных гумусом, преимущественно монтмориллонитового состава; термин связан со способностью таких почв к самомульчированию или самовспашке (самооборачиванию) в связи с сезонным чередованием набухания при увлажнении и резкого сжатия при высыхании, причем последнее сопровождается образованием глубоких и широких трещин. Син.: грумусоль и много местных национальных наименований; 2) термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв тяжелого механического состава, развивающих сильную трещиноватость в некоторый период года, образующих микрорельеф гильгаи и имеющих на некоторой глубине между 25 и 100 см перемежа-

ющиеся поверхности скольжения и призмовидные агрегаты; 3) термин франц.шк. (1965,1967) для класса темных малогумусных глинистых почв с профилем A(B)C, A(Bg)C или A(B)Cg, характеризующихся глубокой трещиноватостью, наличием поверхностей скольжения, глыбисто-призмовидной структурой, часто микрорельефом "гильгаи", большой вязкостью во влажном и твердостью в сухом состоянии; 4) термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для порядка почв, не имеющих плотной породы в пределах 50 см от поверхности, которые после перемешивания верхних 18 см имеют 30% или более глины во всех горизонтах до контакта с породой, до кальциевого[x)] горизонта или до 1 м (что ближе), в какой-либо период большинство лет образуют трещины шириной более 1 см и глубиной более 50 см, если не орошаются, и имеют один из следующих признаков: а) гильгаи, б) поверхности скольжения между 25 и 100 см, в) столбчатые или призмовидные структурные отдельности между 25 и 100 см; в пределах порядка вертисолей выделяются 4 подпорядка почв: 1. торреры, 2. удерты, 3. устерты и 4. ксереры.

408. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ВРЕ́МЕННО ГИ́ДРОМО́РФНАЯ // temporarily hydromorphic vertisol // vertisol hydromorphé temporaire // zeitweilige hydromorphischer Vertisol - устаревший термин франц.шк. для вертисолей дренированных склонов. См.: Вертисоль поверхностно дренированная.

409. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ГИ́ДРОМО́РФНАЯ // hydromorphic vertisol // vertisol hydromorphé // hydromorphischer Vertisol - устаревший термин франц.шк. для темных слитых почв депрессии рельефа. См.: Вертисоль поверхностно недренированная или слабодренированная.

410. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ДЕПРЕ́ССИЙ // vertisol of depressions // vertisol des dépressions // Senkungvertisol (от лат. depressio - подавление) - устаревший термин франц.шк., употреблявшийся для темных слитых почв депрессий рельефа. См.: Вертисоль поверхностно недренированная или слабодренированная.

411. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ЛИ́ТОМО́РФНАЯ // lithomorphic vertisol // vertisol lithomorphé // lithomorphischer Vertisol (от гр. lithos - камень и morphé - форма) - устаревший термин франц.шк. для вертисолей дренированных склонов. См.: Вертисоль поверхностно дренированная.

412. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ЛИ́ТОМО́РФНАЯ ГРУ́МУСО́ЛЬНАЯ // grumusolic lithomorphic vertisol // vertisol lithomorphe grumusolique // grumusolischer

lithomorphischer Vertisol - термин франц.шк. (1965) для литоморфных вертисолей, имеющих с поверхности 20-см самомульчирующийся слой.

413. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ЛИ́ТОМО́РФНАЯ НЕГРУ́МУСО́ЛЬНАЯ // non-grumusolic lithomorphic vertisol // vertisol lithomorphé non grumusolique // nichtgrumusolischer lithomorphischer Vertisol - термин франц.шк. (1965) для литоморфных вертисолей, не имеющих в поверхностном 20-см слое самомульчирования почвы.

414. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ОКРА́ШЕННАЯ // chromic vertisol // vertisol chromique // chromischer Vertisol (от греч. chromos - цвет) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для буроокрашенных вертисолей (см.).

415. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО ДРЕНИ́РОВАННАЯ // externally drained vertisol // vertisol à drainage externe possible // äusserliche dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для подкласса почв, входящего в класс вертисолей (см.), характеризующихся относительно хорошей дренированностью с поверхности вследствие положения на склонах, накоплением глин с решеткой типа 2:1 и формирующихся на породах, исходно богатых кальцием и/или магнием (мергели, основные и ультраосновные породы). Термин предложен вместо ранее распространенных терминов Вертисоль литоморфная, Вертисоль слабо гидроморфная, Вертисоль временно гидроморфная, Степной тирс, Тирсифицированная каштановая почва.

416. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО ДРЕНИ́РОВАННАЯ КРУ́ПНОСТРУКТУРНАЯ // angularstructured externally drained vertisol // vertisol à drainage possible à structure anguleuse // blockigscharfkantiger äusserliche dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для группы вертисолей, входящей в подкласс поверхностно дренированных вертисолей, характеризующихся 15-см поверхностным горизонтом с крупной глыбистой или призмовидной структурой.

417. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО ДРЕНИ́РОВАННАЯ КРУ́ПНОСТРУКТУ́РНАЯ ГА́ЛОМО́РФНАЯ // halomorphic angularstructured externally drained vertisol // vertisol à drainage externe possible à structure anguleuse halomorphé // halomorphischer blockigscharfkantiger äusserliche dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы крупноструктурных поверхностно дренированных вертисолей, характеризующихся слабым засолением в нижней части профиля.

418. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО ДРЕНИ́РОВАННАЯ КРУ́ПНОСТРУКТУ́РНАЯ ГИ́ДРОМО́РФНАЯ // hydromorphic angular-structured externally drained vertisol // vertisol à drainage externe possible à structure anguleuse hydromorphé // hydromorphischer blockigscharfkantiger äusserliche dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы крупноструктурных поверхностно дренированных вертисолей, характеризующихся признаками гидроморфизма (пятна или конкреции) в нижней части профиля.

419. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО ДРЕНИ́РОВАННАЯ КРУ́ПНОСТРУКТУ́РНАЯ САМОМУЛЬЧИ́РУЮЩАЯСЯ // self-mulching angular-structured externally drained vertisol // vertisol à drainage external possible à structure anguleuse à auto-division // selbstmulchiger blockigscharfkantiger äusserliche dränierter Vertisol - термин франц. шк. (1967) для подгруппы крупноструктурных поверхностно дренированных вертисолей, имеющих самомульчирующийся поверхностный 20-см слой.

420. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО ДРЕНИ́РОВАННАЯ КРУ́ПНОСТРУКТУ́РНАЯ ТИПИ́ЧНАЯ // typical angular-structured externally drained vertisol // vertisol à drainage externe possible à structure anguleuse modal // typischer blockigscharfkantiger äusserliche dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы крупноструктурных поверхностно дренированных вертисолей, характеризующихся отсутствием самомульчирующегося поверхностного 20-см слоя, существенной глубокой трещиноватости в сухой период года и признаков гидроморфизма или засоления в нижней части профиля.

421. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО ДРЕНИ́РОВАННАЯ КРУ́ПНОСТРУКТУ́РНАЯ ТРЕЩИНОВА́ТАЯ // vertic angular-structured externally drained vertisol // vertisol à drainage externe possible à structure anguleuse vertique // vertischer blockigscharfkantiger äusserliche dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы крупноструктурных поверхностно дренированных вертисолей, характеризующихся существенной глубокой трещиноватостью в сухой период года.

422. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО ДРЕНИ́РОВАННАЯ ТО́НКОСТРУКТУ́РНАЯ // round-structured externally drained vertisol // vertisol à drainage externe possible à structure arrondie // krümeliger äusserliche dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для группы вертисолей, входящей в подкласс поверхностно дренированных вертисолей, характеризующихся 15-см поверхностным горизонтом с мелкой структурой (зернистой, комковатой или ореховатой).

423. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО ДРЕНИ́РОВАННАЯ ТО́НКОСТРУКТУ́РНАЯ ГА́ЛОМО́РФНАЯ // halomorphic round-structured externally drained vertisol // vertisol à drainage externe possible à structure arrondie halomorphé // halomorphischer krümeliger äusserliche dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы тонкоструктурных поверхностно дренированных вертисолей, имеющих слабое засоление в нижней части профиля.

424. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО ДРЕНИ́РОВАННАЯ ТО́НКОСТРУКТУ́РНАЯ ГИ́ДРОМО́РФНАЯ // hydromorphic round-structured externally drained vertisol // vertisol à drainage externe possible à structure arrondie hydromorphé // hydromorphischer krümeliger äusserliche dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы тонкоструктурных поверхностно дренированных вертисолей, характеризующихся признаками гидроморфизма (пятна или конкреции) в нижней части профиля.

425. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО ДРЕНИ́РОВАННАЯ ТО́НКОСТРУКТУ́РНАЯ ТИПИ́ЧНАЯ // typical round-structured externally drained vertisol // vertisol à drainage externe possible à structure arrondie modal // typischer krümeliger äusserliche dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы тонкоструктурных поверхностно дренированных вертисолей, не имеющих признаков гидроморфизма или засоления в нижней части профиля и не имеющих существенной глубокой трещиноватости в сухой период года.

426. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО ДРЕНИ́РОВАННАЯ ТО́НКОСТРУКТУ́РНАЯ ТРЕЩИНОВА́ТАЯ // vertic round-structured externally drained vertisol // vertisol à drainage externe possible à structure arrondie vertique // vertischer krümeliger äusserliche dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы тонкоструктурных поверхностно дренированных вертисолей, характеризующихся существенной глубокой трещиноватостью в сухой период года.

427. ВЕРТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО НЕДРЕНИ́РОВАННАЯ ИЛИ СЛА́БОДРЕНИ́РОВАННАЯ // externally undrained or poorly drained vertisol // vertisol à drainage externe nul ou réduit // äusserliche undränierter oder schwache dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для подкласса почв; входящего в класс вертисолей (см.), характеризующихся повышенной влажностью с поверхности вследствие отсутствия внешнего дренажа (в депрессиях или на плоских поверхностях) в течение длительного периода в году. Термин предложен вместо ра-

нее распространенных терминов Вертисоль топоморфная, Вертисоль депрессий, Вертисоль гидроморфная, Черная тропическая глина, Гидроморфный Тирс, Вертисоль топо-литоморфная.

428. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО НЕДРЕНИ́РОВАННАЯ ИЛИ СЛА́БОДРЕНИ́РОВАННАЯ КРУ́ПНОСТРУКТУ́РНАЯ // angular-structured externally undrained or poorly drained vertisol // vertisol à drainage externe nul ou réduit à structure anguleuse // blockigscharfkantiger äusserliche undränierter oder schwache dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для группы вертисолей, характеризующихся 15-см поверхностным горизонтом с крупной глыбистой или призмовидной структурой или имеющих слоистую полиэдрическую корку на поверхности при высыхании, имеющих темную окраску горизонта А при малой гумусированности, повышенную влажность верхних горизонтов значительную часть года вследствие отсутствия внешнего дренажа (в депрессиях рельефа или на плоских поверхностях).

429. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО НЕДРЕНИ́РОВАННАЯ ИЛИ СЛА́БОДРЕНИ́РОВАННАЯ КРУ́ПНОСТРУКТУ́РНАЯ ГА́ЛОМО́РФНАЯ // halomorphic angular-structured externally undrained or poorly drained vertisol // vertisol à drainage externe nul ou réduit à structure anguleuse halomorphé // halomorphischer blockigscharfkantiger äusserliche undränierter oder schwache dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы крупноструктурных поверхностно недренированных или слабо дренированных вертисолей, характеризующихся слабым засолением в нижней части профиля.

430. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО НЕДРЕНИ́РОВАННАЯ ИЛИ СЛА́БОДРЕНИ́РОВАННАЯ КРУ́ПНОСТРУКТУ́РНАЯ ГИ́ДРОМО́РФНАЯ // hydromorphic angular-structured externally undrained or poorly drained vertisol // vertisol à drainage externe nul ou réduit à structure anguleuse hydromorphé // hydromorphischer blockigscharfkantiger äusserliche undränierter oder schwache dränierter Vertisol - термин франц. шк. (1967) для подгруппы крупноструктурных поверхностно недренированных или слабо дренированных вертисолей, характеризующихся признаками гидроморфизма (пятна или конкреции) в нижней части профиля.

431. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО НЕДРЕНИ́РОВАННАЯ ИЛИ СЛА́БОДРЕНИ́РОВАННАЯ КРУ́ПНОСТРУКТУ́РНАЯ САМОМУЛЬЧИ́РУЮЩАЯСЯ // self-mulching angular-structured externally undrained or poorly drained vertisol // vertisol à drainage externe nul ou réduit à structure anguleuse finement divisée (autodivision) // selbstmulchiger blockigscharf-

kantiger äusserliche undränierter oder schwache dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы крупноструктурных поверхностно недренированных или слабо дренированных вертисолей, характеризующихся самомульчирующимся поверхностным 10-см слоем.

432. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО НЕДРЕНИ́РОВАННАЯ И́ЛИ СЛА́БОДРЕНИ́РОВАННАЯ КРУ́ПНОСТРУКТУ́РНАЯ ТИПИ́ЧНАЯ // typical angular-structured externally undrained or poorly drained vertisol // vertisol à drainage externe nul ou réduit à structure anguleuse modal // typischer blockigscharfkantiger äusserliche undränierter oder schwache dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы крупноструктурных поверхностно недренированных или слабо дренированных вертисолей, характеризующихся отсутствием существенной глубокой трещиноватости, самомульчирования в поверхностном 10-см слое, солевых аккумуляций и признаков гидроморфизма в нижней части профиля.

433. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО НЕДРЕНИ́РОВАННАЯ И́ЛИ СЛА́БОДРЕНИ́РОВАННАЯ КРУ́ПНОСТРУКТУ́РНАЯ ТРЕЩИНОВА́ТАЯ // vertic angular-structured externally undrained or poorly drained vertisol // vertisol à drainage externe nul ou réduit à structure anguleuse vertique// vertischer blockigscharfkantiger äusserliche undränierter oder schwache dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы крупноструктурных поверхностно недренированных или слабо дренированных вертисолей, характеризующихся существенной глубокой трещиноватостью в сухой период года.

434. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО НЕДРЕНИ́РОВАННАЯ И́ЛИ СЛА́БОДРЕНИ́РОВАННАЯ ТО́НКОСТРУКТУ́РНАЯ // round-structured externally undrained or poorly drained vertisol // vertisol à drainage externe nul ou réduit à structure arrondie // krümeliger äusserliche undränierter oder schwache dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для группы вертисолей, характеризующихся 15-см поверхностным горизонтом с мелкой структурой (зернистой, комковатой или ореховатой), темной окраской при небольшой гумусированности, повышенной влажностью верхних горизонтов значительную часть года вследствие отсутствия внешнего дренажа (в депрессиях рельефа или на плоских поверхностях).

435. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО НЕДРЕНИ́РОВАННАЯ И́ЛИ СЛА́БОДРЕНИ́РОВАННАЯ ТО́НКОСТРУКТУ́РНАЯ ГА́ЛОМО́РФНАЯ // halomorphic round-structured externally undrained or poorly drained vertisol// vertisol à drai-

nage externe nul ou réduit à structure arrondie halomorphé // halomorphischer krümeliger äusserliche undränierter oder schwache dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы вертисолей, характеризующихся 15-см поверхностным горизонтом с мелкой структурой (зернистой, комковатой или ореховатой), тёмной окраской при небольшой гумусированности, повышенной влажностью верхних горизонтов значительную часть года вследствие отсутствия внешнего дренажа (в депрессиях рельефа или на плоских поверхностях), наличием слабого засоления в нижней части профиля.

436. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО НЕДРЕНИ́РОВАННАЯ И́ЛИ СЛА́БОДРЕНИ́РОВАННАЯ ТО́НКОСТРУКТУ́РНАЯ ГИ́ДРОМО́РФНАЯ // hydromorphic round-structured externally undrained or poorly drained vertisol // vertisol à drainage externe nul ou réduit à structure arrondie hydromorphé // hydromorphischer krümeliger äusserliche undränierter oder schwache dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы вертисолей, характеризующихся 15-см поверхностным горизонтом с мелкой структурой (зернистой, комковатой или ореховатой), темной окраской при небольшой гумусированности, повышенной влажностью верхних горизонтов значительную часть года вследствие отсутствия внешнего дренажа (в депрессиях рельефа или на плоских поверхностях), признаками гидроморфизма в нижней части профиля (пятна или конкреции).

437. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО НЕДРЕНИ́РОВАННАЯ И́ЛИ СЛА́БОДРЕНИ́РОВАННАЯ ТО́НКОСТРУКТУ́РНАЯ ТИПИ́ЧНАЯ // typical round-structured externally undrained or poorly drained vertisol // vertisol à drainage externe nul ou réduit à structure arrondie modal // typischer krümeliger äusserliche undränierter oder schwache dränierter Vertisol - термин франц.шк. (1967), для подгруппы вертисолей, характеризующихся 15-см поверхностным горизонтом с мелкой структурой (зернистой, комковатой или ореховатой), темной окраской при небольшой гумусированности, повышенной влажностью верхних горизонтов значительную часть года вследствие отсутствия внешнего дренажа (в депрессиях рельефа или на плоских поверхностях), отсутствием существенной глубокой трещиноватости в сухой период, отсутствием солевых аккумуляций и признаков гидроморфизма в нижней части профиля.

438. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ПОВЕ́РХНОСТНО НЕДРЕНИ́РОВАННАЯ И́ЛИ СЛА́БОДРЕНИ́РОВАННАЯ ТО́НКОСТРУКТУ́РНАЯ ТРЕЩИНОВА́ТАЯ // vertic round-structured exter-

nally undrained or poorly drained vertisol // vertisol à drainage externe nul ou réduit à structure arrondie vertique // vertischer krümeliger äusserliche undränierter oder schwache dränierter Vertisol – термин франц.шк. (1967) для подгруппы вертисолей, характеризующихся 15-см поверхностным горизонтом с мелкой структурой (зернистой, комковатой или ореховатой), темной окраской при небольшой гумусированности, повышенной влажностью верхних горизонтов значительную часть года вследствие отсутствия внешнего дренажа (в депрессиях рельефа или на плоских поверхностях), отсутствием солевых аккумуляций и признаков гидроморфизма в нижней части профиля, умеренно выраженной в сухой период глубокой трещиноватостью.

439. ВЕ́РТИСО́ЛЬ СЛА́БОГИ́ДРОМО́РФНАЯ // slightly hydromorphic vertisol // vertisol peu hydromorphé // schwache hydromorphischer Vertisol – устаревший термин франц.шк. для вертисолей дренированных склонов. См.: Вертисоль поверхностно дренированная.

440. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ТЁМНАЯ // pellic vertisol // vertisol pellique // pellischer Vertisol (от греч. pellos – темный, лишенный окраски) – термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для темноокрашенных (серых, темносерых, черных) вертисолей (см.).

441. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ТО́ПО-ЛИ́ТОМО́РФНАЯ // topo-lithomorphic vertisol // vertisol topo-lithomorphe // topo-litomorphischer Vertisol (от гр. tópos – место, líthos – камень и morphē – форма) – устаревший термин франц.шк. для темных слитых почв депрессий рельефа. См.: Вертисоль поверхностно недренированная или слабодренированная.

442. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ТО́ПОМО́РФНАЯ // topomorphic vertisol // vertisol topomorphe // topomorphischer Vertisol (от гр. tópos – место и morphē – форма) – устаревший термин франц.шк., употреблявшийся для темных слитых почв депрессий. См.: Вертисоль поверхностно недренированная или слабодренированная.

443. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ТО́ПОМО́РФНАЯ ГРУ́МУСО́ЛЬНАЯ // grumusolic topomorphic vertisol // vertisol topomorphé grumusolique // grumusolischer topomorphischer Vertisol – термин франц.шк. (1965) для топоморфных вертисолей, имеющих с поверхности 20-см самомульчирующийся слой.

444. ВЕ́РТИСО́ЛЬ ТО́ПОМО́РФНАЯ НЕГРУ́МУСО́ЛЬНАЯ // non-grumusolic topomorphic vertisol // vertisol topomorphé non grumusolique // nichtgrumusolischer topomorphischer Vertisol – термин франц.шк. (1965)

для топоморфных вертисолей, не имеющих в поверхностном 20-см слое самомульчирования почвы.

445. ВИ́ТРАНДЕ́ПТ // vitrandept // vitrandept // Vitrandept (от лат. vitrum - стекло, яп. an - темный, яп. do - почва и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы андептов (см.), которые: 1) не тиксотропны и имеют влагоемкость менее 20% при 15 барах в среднем для всей почвы между 25 см и 1 м; 2) имеют температуру почвы теплее, чем криандепты (см.); 3) не имеют глин, переходящих при дегидратации необратимо в агрегаты размера гравия; 4) не имеют дурипэна[x)] в пределах 1 м. Среди почв этой группы выделяются 7 подгрупп: 1) типичные витрандепты (typic), 2) гидроморфные витрандепты (aquic), 3) маломощные витрандепты (lithic), 4) маломощные моллевые витрандепты (lithic mollic), 5) маломощные темные витрандепты (lithic umbric), 6) моллевые витрандепты (mollic) и 7) темные витрандепты (umbric).

446. ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я ПО́ЧВА // wet meadow soil // sol mouillé à nappe phréatique // Nasswiesenboden - 1) термин русск.шк. (1967) для подтипа луговых почв степной зоны, формирующихся при уровне грунтовых вод 1-1,5 м и имеющих оглеение в средней и верхней части профиля; 2) См. Пойменная влажнолуговая п.

447. ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА // wet meadow semi-desert soil // sol mouillé subaride à nappe phréatique // Nasswiesenhalbwüstenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа луговых полупустынных почв, формирующихся при уровне грунтовых вод около 1 м и характеризующихся повышенной гумусностью, карбонатностью, оглеенностью.

448. ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я ТЕМНОЦВЕ́ТНАЯ ПО́ЧВА - См. Пойменная влажнолуговая тёмноцветная п.

449. ВЛЕ́Й // vlei // vlei // Vlei (англ. vlei и бурск. flei или fley вероятно, от голл. vallei - долина) - термин, распространенный в Южной и Центральной Африке, для темных слитых глинистых трещиноватых почв впадин округлой или овальной формы, часто встречающихся на равнинах, сложенных рыхлыми суглинистыми породами; поперечник таких впадин колеблется от нескольких метров до нескольких километров; грунтовые воды обычно довольно близко от поверхности. Син.: вертисоль.

450. ВНУТРИЗОНА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА - См. Интразональная п.

451. ВОЙЛОК - См. Войлок степной.

452. ВОЙЛОК ЛЕСНОЙ // forest leaf litter // couverture forestiere // Waldstreu - термин для вида лесной подстилки, формирующейся в относительно сухих условиях и состоящей из побуревших травянистых остатков.

453. ВОЙЛОК СТЕПНОЙ // steppe leaf litter // couverture morte de steppe, couverture de steppe, litière steppique // Steppebodenstreu, Steppestreu - термин русск.шк. для слоя мертвого органического вещества на поверхности степных почв, образующегося в результате накопления растительного опада, составляющий горизонт A_0 степных почв; см.также: Подстилка.

454. ВТОРИЧНО-ЗАСОЛЁННАЯ ПОЧВА // secondary saline soil // sol saline secondaire // sekundär Salzboden - термин для почв, засоление которых связано с вторичным по отношению к основному почвообразованию процессом в результате нарушения природной обстановки, например в результате ирригации.

455. ВТОРИЧНО-КАРБОНАТНАЯ ПОЧВА // secondary calcareous soil // sol calcaire secondaire // sekundär Kalkboden - термин для почв, обогащенных карбонатами в результате почвообразования и развивающихся на исходно бескарбонатной породе. Син.: окарбоначенная п.

456. ВТОРИЧНО-ОДЕРНОВАННАЯ ПОЧВА // secondary sod soil // sol gazonné secondaire // sekundär Rasenboden - термин для задерненных, преимущественно окультуренных различных кислых (но не оподзоленных) лесных почв, которые в результате длительной обработки, смены лесной растительности на культурную травянистую, внесения органических и минеральных удобрений утратили свой первоначальный характер, обогатились гумусом, приобрели зернисто-комковатую структуру.

457. ВТОРИЧНО-ОПОДЗОЛЕННАЯ ПОЧВА // secondary podzolized soil // sol secondairement podzolisé // sekundär podsolierter Boden - общеупотребительный термин для почв, имеющих морфологические или аналитические признаки оподзоленности, вторичные, более поздно проявившиеся по отношению к основному процессу, которым был сформирован данный тип почвы.

458. ВТОРИЧНО-ПОДЗОЛИСТАЯ ПОЧВА // secondary podzolic soil // sol podzolique secondaire // sekundär Podsolboden - термин русской

школы для дерново-подзолистых или серых лесных почв, имеющих сразу под подзолистым горизонтом сплошной или проявляющийся пятнами второй гумусовый горизонт с постоянной глубиной залегания и интенсивной темной окраской даже при небольшом абсолютном содержании в нем гумуса. Син.: подзол вторичный, Почва со вторым гумусовым горизонтом.

459. ВТОРИ́ЧНЫЙ ПОДЗО́Л - См. Подзол вторичный.

460. ВУЛКАНИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА // volcanic soil // terre volcanique, terre ignée // vulkanischer Boden (от лат. Vulcanus - бог огня и кузн.дела у др.римлян) - термин,часто употребляемый для слабо выветрелых почв с большим содержанием аллофановых минералов и вулканического стекла, обычно с профилем А-С, формирующихся на относительно молодых (четвертичных и современных) вулканических пеплах, туфах и лавах. Син.: андосоль, андепт.

461. ВУЛКАНИ́ЧЕСКАЯ ГУ́МУСО-АЛЛОФА́НОВАЯ ПО́ЧВА // humus-allophanous volcanic soil // sol volcanique humus-allophanouse // humus-allophanhaltig vulkanischer Boden - См. Вулканическая пепловая п.

462. ВУЛКАНИ́ЧЕСКАЯ О́ХРИСТАЯ ПО́ЧВА // ochric volcanic soil // sol ocre volcanique // vulkanischer Ockerboden - термин И.А.Соколова для слоистых пепловых вулканических почв влажноокеанических районов (Камчатки), отличающихся ожелезнением профиля.

463. ВУЛКАНИ́ЧЕСКАЯ ПЕ́ПЛОВАЯ ПО́ЧВА // volcanic ash soil // sol volcanique en couches de cendre // vulkanischer aschen Boden - термин для почв, сформированных на молодых (четвертичных и современных) вулканических слоистых пеплах и характеризующихся слоистостью, наличием погребенных слоев, высокой гумусностью, высоким содержанием вулканического стекла и аллофанов.

464. ВЫ́ПАХАННАЯ ПО́ЧВА // ploughed out soil, degraded soil //sol dégradée // degradierter Boden - общеупотребительный термин для почв, снизивших свое плодородие вследствие длительного неправильного использования в земледелии, но не претерпевших существенного изменения строения профиля; в.почва характеризуется ухудшением структуры и физических свойств, понижением биологической активности, снижением запаса питательных веществ. Син.: деградированная п.

465. ВЫСОКОГО́РНАЯ ПО́ЧВА //high mountain soil, alpine soil //sol de haute montagne, sol alpine// Hochgebirgsboden, alpiner Boden -

общеупотребительный термин для группы разнообразных почв, формирующихся на больших высотах в горных условиях. Син.: альпийская п.

466. ВЫСОКОГО́РНАЯ ГУ́МУСОВАЯ АЛЛИ́ТНАЯ ПО́ЧВА // **allitic humic high mauntainous soil** // **sol humique allitique de haute montagne** // **humusischer allitischer Hochgebirgsboden** - термин С.В.Зонна (1964) для почв высокогорных лесов тропического и субтропического поясов, имеющих аллитный или ферраллитный состав, кислую реакцию, ожелезненность, потечный характер гумуса, высокую гумусированность.

467. ВЫСОКОГО́РНАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА // **high mountain desert soil**// **sol désertique de haute montagne** // **hochgebirger Wüstenboden** - термин для почв, формирующихся на высоких пустынных нагорьях (Памир, Тянь-Шань и т.п.) в районах с холодным сухим климатом под разреженной преимущественно солянковой растительностью; почва характеризуется низкой гумусностью (до 1%), карбонатностью, засоленностью нижней части профиля, слабой выветрелостью минеральной части, слабой дифференциацией профиля, часто с криотурбацией и иногда такыровидна.

468. ВЫ́ЩЕЛОЧЕННАЯ ПО́ЧВА // **leached soil** // **sol lessivé, sol lévigé**// **asgelaugter Boden** - общеупотребительный термин без твердого содержания, несколько различного толкования у разных авторов; наиболее обычно относится к почвам, лишенным легкорастворимых солей, гипса и карбонатов на всю глубину профиля; более редко употребляется в приложении к почвам, в профиле которых намечается слабое перемещение вниз аморфных веществ и ила; часто используется для почв, лишенных карбонатов в пределах гумусового горизонта.

469. ГА́ЖЕВАЯ ПО́ЧВА // **gazha soil** // **sol à gaja** // **Gashaboden** - термин азербайджанских почвоведов, взятый из народного языка, для почв аридных и полуаридных районов, содержащих прослои гипса в профиле в виде мучнистой массы из мельчайших кристалликов гипса с содержанием последнего до 60-90%.

470. ГА́ЛАКВЕ́ПТ // **halaquept** // **halaquept** // **Halaquept** (от греч. **hals** - соль, лат. **aqua** - вода и порядкового корня **ept** для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквептов (см.), которые 1) имеют поглощенного Na более 15% в какой-либо части верхних 50 см, причем его количество умень-

шается с глубиной ниже 50 см, а почва насыщена водой в какой-либо период в пределах 1 м; 2) имеют величину N менее 0,5 в каком-либо слое между 20 и 50 см; 3) имеют почвенную температуру выше, чем криаквепты (см.); 4) не имеют сплошного или составляющего более половины матрицы плинтита в пределах 125 см от поверхности. В пределах этой группы выделяются 5 подгрупп: 1) типичные галаквепты (typic), 2) аэральные галаквепты (aeric), 3) аэральные вулканические галаквепты (aeric andic), 4) вулканические галаквепты (andic) и 5) флювентные галаквепты (fluventic).

471. ГА́ЛЕЧНИКОВАЯ ПО́ЧВА // coarse gravelly soil, shinglic soil // sol galetique, sol à gravier grossier // Geröllboden, Grobkiesboden (от русск. галька) - 1) общеупотребительный термин для почв, формирующихся на галечниковых (современных или древних аллювиальных) отложениях; 2) термин для почв, содержащих в поверхностном горизонте округлые окатанные и отшлифованные водой обломки горных пород размером от 2 до 10 см (в западно-европейских школах от 2 до 7,5 см).

472. ГАЛОГЕ́ННАЯ ПО́ЧВА // halogenous soil // sol halogénée // halogenischer Boden (от греч. hals - соль и génos - рождение) - См. Галоморфная п.

473. ГАЛОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА // halomorphic soil // sol halomorphé // halomorpher Boden (от греч. hals - соль и morphē - форма) - термин, часто употребляемый для почв, генезис которых обусловлен присутствием воднорастворимых солей; объединяет в одну группу солончаковатые почвы, солончаки, солонцы и солоди; в настоящее время используется в связи с широким толкованием засоления почв. Син.: засоленная п.

474. ГАМА́ДА // hammada // hammada // Hamada, Hammada (от арабск. hamada) - название типов каменистых пустынь в Сахаре, распространенных на плато, сложенных плотными породами; термин употребляется также для обозначения вообще каменистых пустынь. Син.: хамада, пустыня каменистая.

475. ГА́ПЛАКВЕ́НТ // haplaquent // haplaquent // Haplaquent (от греч. haplous - простой, лат. aqua - вода и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквентов (см.), которые: 1) имеют почвенную температуру выше, чем криаквенты (см.) и имеют средние летние и средние зимние температуры на глубине 50 см различающиеся на

5°С или более; 2) имеют величину N 0,5 или менее в каком-либо из подгоризонтов между 20 и 50 см; 3) имеют мех.состав тяжелее супеси ниже пахотного горизонта или 25 см (что ниже), но выше 1 м либо контакта с плотной породой (что глубже). Большая группа гаплаквентов включает 4 подгруппы: 1) типичные гаплаквенты (typic), 2) аэральные гаплаквенты (aeric), 3) вулканические гаплаквенты (andic) и 4) трещиноватые гаплаквенты (vertic).

476. ГАПЛАКВЕПТ // haplaquept // haplaquept // Haplaquept (от греч. haplous - простой, лат. aqua - вода и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквептов (см.), которые: 1) имеют почвенные температуры выше, чем криаквепты (см.), а разницу между среднелетней и среднезимней температурами на глубине 50 см более 5°С; 2) имеют светлый[x)] верхний горизонт; 3) имеют преобладание в поглощающем комплексе алюмосиликатных кристаллических глинистых минералов и менее 60% стекловатого вулканического пепла или другого стекловатого пирокластического материала во фракциях пыли, песка и гравия; 4) имеют величину N менее 0,5 в каком-либо слое между 20 и 50 см; 5) имеют менее 15% обменного натрия в верхних 50 см либо постоянное или увеличивающееся с глубиной ниже 50 см насыщение натрием; 6) не имеют фраджипэна[x)]; 7) не имеют сплошного или составляющего более половины матрицы плинтита в пределах 125 см от поверхности. В пределах группы выделяются 11 подгрупп: 1) типичные (typic), 2) аэральные (aeric), 3) аэральные вулканические (aeric andic), 4) хромудертовые (chromudertic), 5) аэральные флювентные (aeric fluventic), 6) флювентные (fluventic), 7) гумусовые (humic), 8) маломощные (lithic), 9) моллевые (mollic), 10) погребенно-торфяные (thapto-histic) и 11) трещиноватые (vertic).

477. ГАПЛАКВОД // haplaquod // haplaquod // Haplaquod (от греч. haplous - простой, лат. aqua - вода и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы акводов (см.), которые: 1) имеют температуру выше, чем криакводы (см.), а разницу между среднелетними и среднезимними температурами на 50 см более 5°С; 2) имеют один или оба следующих признаков: а) не менее чем 50% каждого профиля имеет сподовый[x)] горизонт, содержащий диспергированное органическое вещество и алюминий при недостаточном содержании свободного железа для покраснения почвы при прокаливании (менее 0,5% Fe в мелкоземе); б) горизонт $A_{пах}$ темно-серый и лежит сразу на спо-

довом горизонте, имеющем в верхней части подгоризонт или языки с диспергированным органическим веществом и содержанием свободного Fe менее 0,7%; 3) не имеют фраджипэна[x] ниже сподового горизонта; 4) не имеют цементированного или уплотненного подгоризонта в белесом горизонте. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 6 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) аэральные (aeric), 3) альфовые (alfic), 4) песчаные (arenic), 5) энтовые (entic) и 6) ультовые (ultic) гаплакводы.

478. ГАПЛАКВО́ЛЛЬ // haplaquoll // haplaquoll // Haplaquoll (от греч. haplous - простой, лат. aqua - вода и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы акволлей (см.), которые: 1) не имеют аргиллового[x] или натриевого[x] горизонта; 2) не имеют дурипэна[x] в пределах 1 м от поверхности; 3) не имеют кальциевого[x] горизонта в пределах 40 см от поверхности; 4) имеют среднегодовую температуру почвы выше 8°С или среднелетнюю температуру на 50 см выше 15°С если почва дренирована и распахана или выше 6°С если почва недренирована и имеет A_0 или торфянистый верхний горизонт. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 9 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) вулканические (andic), 3) известковые (calcic), 4) намытые (cumulic), 5) плотные (duric), 6) флювентные (fluventic), 7) торфянистые (histic), 8) маломощные (lithic) и 9) трещиноватые (vertic) гаплакволли.

479. ГА́ПЛАРГИД // haplargid // haplargid // Haplargid (от греч. haplous - простой, лат. argilla - белая глина и порядкового корня id для аридисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аргидов (см.), которые 1) не имеют дурипэна[x] в пределах 1 м от поверхности или столбчатого натриевого[x] горизонта; 2) имеют аргиллювый[x] горизонт либо призматический или глыбистый натриевый горизонт, который имеет либо а) менее 35% глины во всех подгоризонтах и/ или увеличение абсолютное на 15% глины на расстоянии 2,5 см на верхней границе аргиллового горизонта или увеличение менее чем на 10% глины, если почва распахана и нижняя граница $A_{пах}$ является верхней границей аргиллового горизонта; 3) не имеют петрокальциевого[x] горизонта в пределах 1 м от поверхности. Среди почв этой группы выделяются 11 подгрупп: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) песчаные (arenic), 4) плотные (duric), 5) плотные моллевые

(duric mollic), 6) маломощные (lithic), 7) маломощные моллевые (lithic mollic), 8) моллевые (mollic), 9) моллевые погребенно-глинистые (mollic thapto-argic), 10) комплексно-энтовые маломощные моллевые (ruptic-entic lithic mollic) и 11) трещиноватые (vertic) гапларгиды.

480. ГА́ПЛОБОРО́ЛЛЬ // haploboroll // haploboroll // Haploboroll (от греч. haplous - простой, греч. boreas - северный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы бороллей (см.), которые: 1) имеют почвенные температуры выше криобороллей (см.); 2) не имеют аргиллового[x)] или натриевого[x)] горизонта, если только он не подстилает камбиевый горизонт, от которого отделяется белесым горизонтом; 3) имеют переход между моллевым и подстилающим горизонтом, содержащий менее 25% по объему ходов червей, капролитов или кротовин. Среди большой почвенной группы гаплобороллей выделяются 9 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) вулканические (andic), 3) гидроморфные (aquic), 4) намытые (cumulic), 5) энтовые (entic), 6) флювентовые (fluventic), 7) маломощные (lithic), 8) мощные (pachic) и 9) трещиноватые (vertic) гаплоборолли.

481. ГА́ПЛОГУМО́Д // haplohumod // haplohumod // Haplohumod (от греч. haplous - простой, лат. humus - гумус и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы гумодов (см.), которые имеют температуры выше, чем криогумоды (см.) и разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см более 5°С, и не имеют фраджипэна[x)]. В пределах этой большой почвенной группы выделяются три подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) энтовые (entic) и 3) феррудальфовые (ferrudalfic) гаплогумоды.

482. ГА́ПЛОГУМО́КС // haplohumox // haplohumox // Haplohumox (от греч. haplous - простой, лат. humus - гумус и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы гумоксов (см.), которые: 1) имеют во всех подгоризонтах окисного[x)] горизонта емкость поглощения катионов (по NH_4Cl) более 1 мэкв на 100 г глины (или имеют более 1 мэкв обменных оснований плюс обменный алюминий на 100 г глины); 2) не имеют подгоризонта в окисном горизонте, который был бы темнее и более гумусированным, чем вышележащий подгоризонт. В пределах этой большой почвенной группы выделяются две подгруппы

почв: 1) типичные (typic) и 2) тропептовые (troperptic) гаплогумоксы.

483. ГАПЛОГУМУЛЬТ // haplohumult // haplohumult // Haplohumult (от греч. haplous - простой, лат. humus - гумус и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы гумультов (см.), которые: 1) не имеют фраджипэна[x)], 2) имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с породой, если он ближе, более 5°С, 3) имеют такое распределение глины, что ее содержание уменьшается более чем на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, а слой, в котором происходит уменьшение содержания глины, не показывает признаков элювиирования глины; 4) имеют более 10% способных к выветриванию минералов во фракции 20-200 μ аргиллового[x)] горизонта. В пределах этой большой почвенной группы выделяются три подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) вулканические (andic) и 3) засушливые (xeric) гаплогумульты.

484. ГАПЛОКСЕРАЛЬФ // haploxeralf // haploxeralf // Haploxeralf (от греч. haplous - простой, греч. xeros - сухой и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ксеральфов (см.), которые: 1) имеют аргиллювый[x)] горизонт, но не имеют натриевого[x)] горизонта или дурипэна[x)] в пределах 1 м и петрокальциевого[x)] горизонта в пределах 1,5 м от поверхности; 2) не имеют сплошного плинтита[x)] в пределах 1,25 м от поверхности; 3) имеют преобладание желто-оранжевой окраски; 4) имеют аргиллювый горизонт с менее 35% глины во всех частях либо с более 35% глины, если увеличение глины менее, чем на 15% в пределах 2,5 см на его верхней границе или для пахотной почвы менее чем на 10%, когда верхняя граница аргиллового горизонта является нижней пахотного; содержание глины уменьшается более чем на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 9 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) аквультовые (aquultic), 4) маломощные (lithic), 5) маломощные моллевые (lithic mollic), 6) моллевые (mollic), 7) натриевые (natric), 8) ультовые (ultic) и 9) трещиноватые (vertic) гаплоксеральфы.

485. ГАПЛОКСЕРОЛЛЬ // haploxeroll // haploxeroll // Haploxeroll (от греч. haplous - простой, греч. xeros - сухой и порядкового

корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ксероллей (см.), которые: 1) не имеют аргиллового[x)] или натриевого[x)] горизонта и не имеют дурипэна[x)] в пределах 1 м от поверхности; 2) не имеют петрокальциевого[x)] горизонта с верхней границей в пределах 1,5 м от поверхности; 3) не имеют кальциевого[x)] или гипсового[x)] горизонта с верхней границей в пределах 1,5 м от поверхности, если только какая-то часть перекрывающего их горизонта не свободна от карбонатов и не имеет мех.состав легче пылеватой супеси. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 21 подгруппа почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) гидроморфные известковые (aquic calcic), 4) гидроморфные флювентные (aquic fluventic), 5) аквультовые (aquultic), 6) известковые (calcic), 7) известковые энтовые (calcic entic), 8) известковые маломощные (calcic lithic), 9) известковые мощные (calcic pachic), 10) намытые (cumulic), 11) плотные (duric), 12) энтовые (entic), 13) энтовые ультовые (entic ultic), 14) флювентные (fluventic), 15) маломощные (lithic), 16) маломощные ультовые (lithic ultic), 17) мощные (pachic), 18) мощные ультовые (pachic ultic), 19) ультовые (ultic), 20) перерытые (vermic) и 21) трещиноватые (vertic) гаплоксероллы.

486. ГАПЛОКСЕРУЛЬТ // haploxerult // haploxerult // Haploxerult (от греч. haplous - простой, греч. xeros - сухой и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ксерультов (см.), которые: 1) не имеют фраджипэна[x)], 2) не имеют сплошного плинтита[x)] в пределах 1,25 м от поверхности; 3) имеют желтую окраску профиля; 4) обнаруживают уменьшение содержания глины более чем на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, а слой, в котором имеет место уменьшение содержания глины, не имеет признаков элювиирования глины; 5) имеют аргилловый[x)] горизонт с содержанием способных к выветриванию минералов более 10% во фракции 20-200 μ в верхней метровой толще. В пределах этой большой почвенной группы выделяются три подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic) и 3) маломощные (lithic) гаплоксерульты.

487. ГАПЛОРТОД // haplorthod // haplorthod // Haplorthod (от греч. haplous - простой, греч. orthos - настоящий и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-

70) для большой группы ортодов (см.), которые имеют температуру почвы выше, чем криортоды (см.), а разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см более 5°С; не имеют фраджипэна[x] и не имеют слоеватого горизонта над или в сподовом горизонте. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 11 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) альфовые (alfic), 3) аквальфовые (aqualfic), 4) гидроморфные (aquic), 5) аквентовые (aquentic), 6) плотные (duric), 7) энтовые (entic), 8) энтовые маломощные (entic lithic), 9) гумусовые (humic), 10) маломощные (lithic) и 11) ультовые (ultic) гаплортоды.

488. ГАПЛОРТОКС //haplorthox // haplorthox // Haplorthox (от греч. haplous - простой, греч. orthos - настоящий и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортоксов (см.), которые: 1) имеют емкость катионного поглощения (по NH_4Cl) более 1 мэкв на 100 г глины (или имеют более 1 мэкв обменных оснований плюс обменный алюминий на 100 г глины) во всех подгоризонтах окисного[x] горизонта; 2) не имеют прослоев гиббсита или агрегатов размера гравия сцементированных гиббситом в пределах 1,25 м от поверхности; 3) имеют светлый[x] гумусовый горизонт и менее 1% органического углерода в каком-либо подгоризонте в пределах 75 см от поверхности; 4) имеют насыщенность основаниями менее 35% в каком-либо подгоризонте окисного горизонта в пределах 1,25 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 5 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) плинтитовые (plinthic), 4) псамментовые (psamentic) и 5) тропептовые (tropeptic) гаплортоксы.

489. ГАПЛУДАЛЬФ //hapludalf //hapludalf //Hapludalf (от греч. haplous - простой, лат. udus - влажный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удальфов (см.), которые: 1) не имеют белёсого или иного элювиального горизонта, заходящего языками в аргиллювый[x] горизонт; 2) имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см более 5°С; 3) не имеют фраджипэна[x], натриевого[x] или антропового[x] горизонта; 4) имеют аргиллювый горизонт с таким распределением глины, что содержание глины уменьшается более, чем на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, если окраска почвы в этом горизонте

с красноватым, оттенком. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 23 подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) белесные гидроморфные (albaquic), 3) вулканические (andic), 4) вулканические языковатые северные (andic glossoboric), 5) вулканические моллевые (andic mollic), 6) вулканические моллевые языковатые северные (andic mollic glossoboric), 7) гидроморфные (aquic), 8) гидроморфные песчаные (aquic arenic), 9) гидроморфные маломощные (aquic lithic), 10) акволлевые (aquollic), 11) песчаные (arenic), 12) языковатые гидроморфные (glossaquic), 13) языковатые северные (glossoboric), 14) маломощные (lithic), 15) маломощные моллевые (lithic mollic), 16) моллевые (mollic), 17) натриевые гидроморфные (natraquic), 18) натриевые северные (natraboric), 19) натрибороллевые (natriborollic), 20) псамментовые (psammentic), 21) ультовые (ultic), 22) умбраквультовые (umbraquultic) и 23) трещиноватые (vertic) гаплудальфы.

490. ГА́ПЛУДО́ЛЛЬ //hapludoll //hapludoll //Hapludoll (от греч. haplous - простой, лат. udus - влажный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удоллей (см.), которые: 1) не имеют аргиллового[x)] горизонта, 2) имеют переход между моллевым[x)] и подстилающим его горизонтом, имеющий менее 25% по объему ходов червей, капролитов или кротовин. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 9 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) гидроморфные флювентные (aquic fluventic), 4) намытые (cumulic), 5) энтовые (entic), 6) флювентные (fluventic), 7) маломощные (lithic), 8) перерытые (vermic) и 9) трещиноватые (vertic) гаплудолли.

491. ГА́ПЛУДУ́ЛЬТ //hapludult //hapludult //Hapludult (от греч. haplous - простой, лат. udus - влажный и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удультов (см.), которые: 1) не имеют фраджипэна[x)]; 2) не имеют сплошного плинтита[x)] в пределах 1,25 м от поверхности; 3) имеют желтую окраску профиля; 4) имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с породой, если он ближе, более 5°С; 5) имеют один или оба следующие признака: а) содержание глины уменьшается более чем на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, а слой, в котором происходит это уменьшение, не обнаруживает признаков элювиирования глины; б) аргиллювый горизонт

содержит более 10% способных к выветриванию минералов во фракции 20-200 μ в пределах верхнего метра. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 9 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) вулканические (andic), 3) гидроморфные (aquic), 4) песчаные (arenic), 5) гумусовые (humic), 6) маломощные (lithic), 7) охрептовые (ochreptic), 8) псаммептовые (psammentic) и 9) трещиноватые (vertic) гаплудульты.

492. ГАПЛУМБРЕПТ // haplumbrept // haplumbrept // Haplumbrept (от греч. haplous - простой, лат. umbra - темная тень и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы умбрептов (см.), которые 1) имеют темный[x)] или моллевый[x)] верхний горизонт; 2) имеют почвенную температуру теплее, чем криумбрепты (см.); 3) не имеют фраджипэна[x)]; 4) никогда не пересыхают либо не пересыхают на столь много, как два месяца подряд более 7 лет из 10 во всей толще между 18 и 50 см или до контакта с плотной породой, если она ближе 50 см. В пределах этой группы выделяются 11 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) вулканические (andic), 3) гидроморфные флювентные (aquic fluventic) 4) псаммаквентовые (psammaquentic), 5) намытые (cumulic), 6) плотные (duric), 7) энтовые (entic), 8) флювентные (fluventic), 9) маломощные (lithic), 10) мощные (pachic) и 11) кварцпсаммептовые (quartzipsammentic) гаплумбрепты.

493. ГАПЛУСТАЛЬФ // haplustalf // haplustalf // Haplustalf (от греч. haplous - простой, лат. ustus - обожженный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устальфов (см.), которые: 1) имеют аргиллювый[x)] горизонт, но не имеют натриевого[x)] горизонта, 2) не имеют дурипэна[x)] в пределах 1 м от поверхности, 3) не имеют петрокальциевого[x)] горизонта с верхней границей в пределах 1,5 м от поверхности; 4) не имеют сплошного плинтита в пределах 125 см от поверхности; 5) имеют красную окраску аргиллового горизонта; 6) имеют такой аргиллювый горизонт, который: а) имеет такое распределение глины, что ее содержание уменьшается более чем на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, если окраска его ярко красная, б) песчаный или суглинистый состав в верхней части или увеличение менее чем на 20% глины в пределах 7,5 см или на 15% в пределах 2,5 см на верхней границе. В пределах этой большой почвенной группы вы-

деляются 10 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) аквультовые (aquultic), 4) песчаные (arenic), 5) маломощные (lithic), 6) маломощные ультовые (lithic ultic), 7) окисные (oxic), 8) псамментовые (psammentic), 9) влажные (udic) и 10) ультовые (ultic) гаплустальфы.

494. ГАПЛУСТО́КС // haplustox // haplustox // Haplustox (от греч. haplous - простой, лат. ustus - обожженный и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устоксов (см.), которые: 1) имеют емкость катионного поглощения (по NH_4Cl) более 1 мэкв на 100 г глины (или более 1 мэкв обменных оснований плюс обменный алюминий на 100 г глины) во всех подгоризонтах окисного[x] горизонта; 2) не имеют моллевого[x] гумусового горизонта, или такой моллевый горизонт, который лишь немного темнее окисного горизонта; 3) имеют насыщенность основаниями менее 50% в какой-либо части окисного горизонта при глинистом мех.составе и менее 35% при суглинистом. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 6 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) плинтитовые (plinthic), 4) псамментовые (psammentic), 5) каменисто-маломощные (ruptic-lithic) и 6) тропептовые (troperptic) гаплустоксы.

495. ГАПЛУСТО́ЛЛЬ // haplustoll // haplustoll // Haplustoll (от греч. haplous - простой, лат. ustus - обожженный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устоллей (см.), которые: 1) не имеют аргиллового[x] или натриевого[x] горизонта, если только он не погребенный; 2) не имеют дурипэна[x] с верхней границей в пределах 1 м от поверхности; 3) не имеют кальциевого[x] или гипсового[x] горизонта с верхней границей в пределах 1 м от поверхности, если только какая-либо часть любого горизонта, перекрывающего кальциевый или гипсовый, не свободна от карбонатов после перемешивания верхних 18 см и имеет мех.состав тяжелее пылеватой супеси; 4) имеют переход между моллевым[x] и подстилающим его горизонтом содержащий менее 25% объема ходов червей, капролитов или кротовин; 5) не имеют петрокальциевого[x] горизонта с верхней границей в пределах 1,5 м от поверхности. В пределах этой большой группы выделяются 17 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) гидроморфные флювентные (aquic fluventic), 4) намытые (cumulic), 5) плотные (duric), 6) энтовые (entic), 7) энтовые перерытые (entic vermic),

8) флювентные (fluventic), 9) маломощные (lithic), 10) маломощно-трещиноватые (lithic-vertic), 11) мощные (pachic), 12) салортидные (salorthidic), 13) удертовые (udertic), 14) влажные (udic), 15) удортентные (udorthentic), 16) перерытые (vermic) и 17) трещиноватые (vertic) гаплустоллы.

496. ГАПЛУСТУЛЬТ // haplustult // haplustult // Haplustult (от греч. haplous - простой, лат. ustus - обожженный и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устультов (см.), которые: 1) не имеют фраджипэна[x]; 2) не имеют сплошного плинтита[x] в пределах 1,25 м от поверхности; 3) имеют желтую окраску профиля; 4) имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с породой, если он ближе, более 5°С; 5) имеют уменьшение содержания глины более чем на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, а в слое, в котором имеет место, уменьшение глины, не наблюдаются признаки элювиирования глины; 6) имеют аргилловый[x] горизонт, содержащий более 10% способных к выветриванию минералов во фракции 20-200 μ в верхней метровой его части. В пределах этой большой почвенной группы выделяются две подгруппы почв: 1) типичные (typic) и 2) каменисто-маломощные (ruptic-lithic) гаплустульты.

497. ГИББСИАКВОКС // gibbsiaquox // gibbsiaquox // Gibbsiaquox (от gibbsite - название минерала гиббсита (водная окись алюминия), лат. aqua - вода и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквоксов (см.), которые имеют цементированные прослои, содержащие более 30% гиббсита либо более 20% по объему агрегатов размером гравия, содержащих более 30% гиббсита, в пределах 1 м от поверхности, но которые не имеют плинтита[x], образующего сплошной слой в пределах 30 см от поверхности.

498. ГИББСИГУМОКС // gibbsihumox // gibbsihumox // Gibbsihumox (от gibbsite - название минерала гиббсита (водная окись алюминия), лат. humus - гумус и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (1960-70) для большой группы гумоксов (см.), которые: 1) имеют в пределах 1 м от поверхности цементированные прослои или подгоризонт, содержащие более 20% объема агрегаты размером гравия, содержащие более 30% гиббсита; 2) не имеют различимой структуры в окисном[x] горизонте либо имеют лишь слабую глыбистую или призмовидную структуру.

499. ГИ́ББСИОРТОКС //gibbsiorthox //gibbsiorthox // Gibbsiorthox (от gibbsite - название минерала гиббсита (водная окись алюминия), греч. orthos - настоящий и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортоксов (см.), которые имеют в пределах 1,25 м от поверхности прослои, содержащие более 30% гиббсита или подгоризонт с более 20% по объему агрегатов размера гравия, содержащих более 30% гиббсита.

500. ГИ́ДРАКВЕ́НТ // hydraquent // hydraquent // Hydraquent (от греч. hýdor - вода, лат. aqua - вода и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквентов (см.), которые: 1) имеют среднегодовую температуру почвы выше 0°С; 2) имеют величину N более 0,5 и по крайней мере 8% глины и 3% органического вещества во всех подгоризонтах между 20 и 50 см; имеют мех.состав тяжелее супеси в горизонтах ниже пахотного или 25 см (что ниже), но выше 1 м или контакта с плотной породой (что глубже).

501. ГИ́ДРАНДЕ́ПТ // hydrandept // hydrandept // Hydrandept (от греч. hydor - вода, яп. an - темный, яп. do - почва и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы андептов (см.), которые: 1) имеют глины, переходящие при дегидратации необратимо в агрегаты размера гравия; 2) имеют температуру почвы теплее, чем криандепты (см.). В пределах этой группы выделяются 2 подгруппы почв: 1) типичные гидрандепты (typic) и 2) маломощные гидрандепты (lithic).

502. ГИДРОГЕ́ННАЯ ПО́ЧВА // hydrogenic soil //sol hydromorphe // hydromorpher Boden (от греч. hydor - вода и génos - рождение) - См. Гидроморфная п.

503. ГИ́ДРОЛА́ТОСО́ЛЬ ВЫСОКОГУ́МУСОВАЯ // high humic hydrolatosol // hydrolatosol riche en humus // humusreich Hydrolatosol - термин амер.шк. для ферралитизованных сильногумусированных кислых почв высокогорных лесов тропического и субтропического поясов, имеющих избыточное внутрипочвенное увлажнение; син.: латосоль гумусовая влажная.

504. ГИДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА // hydromorphic soil // sol hydromorphe // hydromorpher Boden (от греч. hýdor - вода и morphé - форма) - 1) термин для почв, формирующихся в условиях аккумулятивных

ландшафтов при непосредственном влиянии грунтовых вод на почвообразование. Син.: полусухопутная, грунтовая п.
2) термин франц.шк. (1966,1967) для класса почв, формирующихся при постоянном или периодическом воздействии восходящих грунтовых вод на весь профиль либо какую-то его часть.

505. ГИДРОМО́РФНАЯ ГИ́ПСОВАЯ ПО́ЧВА // gypsic hydromorphic soil // sol hydromorphe à accumulation du gypse // gips-hydromorpher Boden - термин франц.шк. (1967) для группы гидроморфных минеральных почв (см.), имеющих в профиле горизонт аккумуляции гипса; в пределах группы выделяются подгруппы почв с гипсовой корой и с гипсовыми конкрециями (друзами).

506. ГИДРОМО́РФНАЯ ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ПО́ЧВА // ferrugenious hydromorphic soil // sol hydromorphe à accumulation de fer // eisen-hydromorpher Boden - термин франц.шк. (1967) для группы гидроморфных минеральных почв (см.), имеющих в профиле горизонт аккумуляции железа в виде панцыря или коры.

507. ГИДРОМО́РФНАЯ ИЗВЕСТКО́ВАЯ ПО́ЧВА // calcareous hydromorphic soil // sol hydromorphe à redistribution du calcaire // kalkarischer hydromorpher Boden - термин франц.шк. (1967) для группы гидроморфных минеральных почв (см.), имеющих в профиле горизонт аккумуляции извести; в пределах этой группы выделяются подгруппы почв с известковой корой и с известковыми конкрециями.

508. ГИДРОМО́РФНАЯ МИНЕРА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // mineral hydromorphic soil // sol hydromorphe minerale ou peu humifère // mineralischer hydromorpher Boden - термин франц.шк. (1967) для подкласса гидроморфных почв (см.), содержащих в среднем менее 8% гумуса в слое 20 см или больше 8% в меньшем слое, но преимущественно менее 4,5%.

509. ГИДРОМО́РФНАЯ ОРГАНИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА // organic hydromorphic soil // sol hydromorphe organique // organischer hydromorpher Boden - термин франц.шк. (1966,1967) для подкласса гидроморфных почв (см.), характеризующихся постоянным общим гидроморфизмом, создающим условия анаэробиозиса, имеющих органическое вещество типа торфа, содержащих органического вещества более 30% в верхнем 40 см слое при глинистом субстрате и более 20% при песчаном; в пределах этого подкласса выделяются три группы почв: 1) Фибрист (Fibrist) - с волокнистым торфом (волок-

на составляют 2/3 массы), 2) Ленист (Lenist) - с полуволокнистым торфом (волокна составляют от 1/3 до 2/3 массы) и 3) Саприст (Saprist) - с разложенным торфом (волокна составляют до 1/3 массы); в пределах каждой группы выделяются подгруппы олиготорфных (с pH < 5,5) и мезотрофные или эутрофные (с pH > 5,5) почв.

510. ГИДРОМО́РФНАЯ СЛА́БО ГУМУСИ́РОВАННАЯ А́МФИГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //amphigleyed slightly humusified hydromorphic soil //sol hydromorphe peu humifère à amphigley //Amphigley Humus hydromorpher Boden - термин франц.шк. (1967) для группы гидроморфных минеральных почв (см.), имеющих в профиле псевдоглеевый горизонт в верхней части и глеевый - в нижней; в пределах этой группы выделяются две подгруппы почв: 1) имеющие в профиле верховодку и постоянный уровень грунтовых вод и 2) имеющие большую амплитуду сезонных колебаний уровня грунтовых вод.

511. ГИДРОМО́РФНАЯ СЛА́БО ГУМУСИ́РОВАННАЯ ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //gleyed slightly humusified hydromorphic soil //sol hydromorphe peu humifère à gley //Gley Humus hydromorpher Boden - термин франц.шк. (1967) для группы гидроморфных минеральных почв (см.), имеющих глеевый горизонт не глубже 100 см и постоянный (или осциллирующий) уровень грунтовых вод; в пределах этой группы выделяются подгруппы почв: 1) мелкоглеевых (< 80 см), 2) глубокоглеевых (>80 см), 3) глеевых засоленных и 4) глеевых лессивированных.

512. ГИДРОМО́РФНАЯ СЛА́БО ГУМУСИ́РОВАННАЯ ПСЕ́ВДОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //pseudogleyed slightly humusified hydromorphic soil // sol hydromorphe peu humifère à pseudogley // Pseudogley Humus hydromorpher Boden - термин франц.шк. (1967) для группы гидроморфных минеральных почв (см.), характеризующихся временным или частичным гидроморфизмом в связи с наличием непроницаемых прослоев в профиле, задерживающих инфильтрацию атмосферных осадков; в пределах этой группы выделяются две подгруппы почв: 1) поверхностно-псевдоглеевые и 2) подвешенно-псевдоглеевые.

513. ГИДРОМО́РФНАЯ СЛА́БО ГУМУСИ́РОВАННАЯ СТА́ГНОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //stagnogleyed slightly humusified hydromorphic soil //sol hydromorphe peu humifère à stagnogley //Stagnogley Humus hydromorpher Boden - термин франц.шк. (1967) для группы гидроморфных минеральных почв (см.), характеризующихся квази-постоянным

гидроморфизмом вследствие поверхностного переувлажнения атмосферными осадками в гумидном климате.

514. ГИДРОМО́РФНАЯ УМЕ́РЕННО-ОРГАНИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА // moderately organic hydromorphic soil // sol hydromorphe moyennement organique // mittel organischer hydromorpher Boden - термин франц.шк. (1967) для подкласса гидроморфных почв (см.), имеющих органическое вещество типа анмоор с отношением C:N < 20 или гидромор и содержащих 8-20% гумуса в среднем в верхнем 20-см слое; гидроморфизм сплошной, но с поверхности периодический; в пределах этого подкласса выделяются две группы почв: 1) гумусово-глеевые почвы с подгруппами а) засоленных, б) перегнойных кислых, в) перегнойных карбонатных и г) торфянистых почв и 2) гумусово-стагноглеевые почвы.

515. ГИЛЬГА́И // gilgai // gilgai, butte, mamelon (tertre) // Gilgai, Erdhaufen, kleiner Hügel - 1) термин австралийской школы для темных слитых трещиноватых глинистых почв (вертисолей), характеризующихся монтмориллонитовой глиной и большой набухаемостью при увлажнении. Син.: вертисоль; 2) термин австралийской школы для специфического типа микрорельефа ландшафтов, характеризующихся сплошным покровом трещиноватых глинистых почв гильгаи.

516. ГИ́ПСИОРТИ́Д // gypsiorthid // gypsiorthid // Gipsiorthid (от греч. gýpsos - гипс, греч. orthos - настоящий и порядкового корня id для аридисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортидов (см.), которые содержат гипсовый[x)] или петрогипсовый[x)] горизонт в пределах 1 м от поверхности, выше которого они могут иметь камбиевый[x)] или кальциевый[x)] горизонт; обычно они очень светло окрашены и содержат очень мало гумуса; в пределах данной большой почвенной группы выделяются подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) кальциевые (calcic), 3) камбиевые (cambic) и 4) петрогипсовые (petrogypsic) гипсиортиды.

517. ГИ́ПСОВАЯ ПО́ЧВА // gypsic soil // sol gypsique, sol gypseuse // Gipsboden (от гр. gýpsos - гипс) - 1) термин нем.шк. для сборной группы почв, развитых на гипсоносных породах; 2) термин франц.шк. (1967) для подкласса почв, входящего в класс кальцемагнезиальных почв, имеющих в профиле гипсовый горизонт и характеризующихся светлосерой или палевой окраской и мелкокомковатой структурой; 3) термин амер. и международной (ФАО/ЮНЕСКО) систем для почв, имеющих горизонт вторичной аккумуляции гипса,

мощностью более 15 см, с содержанием гипса минимум на 5% выше, чем в горизонте С; 4) общеупотребительный термин для почв, имеющих в профиле выраженный морфологически горизонт вторичной аккумуляции гипса.

518. ГИ́ПСОВАЯ ПУСТЫ́ННАЯ КОРА́ // gypsic desert crust // croûte gypsique de désert // Wüstengipskruste - термин для одного из типов пустынных кор, плотных или с кавернами, твердых в сухом состоянии, сцементированных гипсом или гипсом в смеси с карбонатами; распространены в пустынях различных районов мира в качестве поверхностных или внутрипочвенных образований.

519. ГИ́ПСОВАЯ РЕНДЗИ́НОВИ́ДНАЯ ПО́ЧВА // rendzina-like gypsic soil // sol gypseuse rendziniforme // rendzinartiger Gipsboden - термин франц.шк. (1967) для группы гипсовых почв с маломощным (до 50 см) профилем AR или ACR.

520. ГИ́СТОСО́ЛЬ // histosol // histosol // Histosol (от греч. histos - ткань и лат. solum - почва) - 1) термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для порядка почв, имеющих с поверхности торфяный[x)] горизонт; 2) термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, богатых неразложившимся или частично разложившимся органическим веществом, то-есть для торфяных почв.

521. ГИ́СТОСО́ЛЬ БЕ́ДНАЯ // dystric histosol // histosol dystrique // dystrischer Histosol (от греч. dystrophic - бесплодный) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, имеющих торфяный[x)] горизонт мощностью более 30 см и pH (KCl) менее 4,2 в верхней 50-см толще почвы.

522. ГИ́СТОСО́ЛЬ БОГА́ТАЯ // eutric histosol // histosol eutrique // eutrischer Histosol (от греч. eutrophic - плодородный) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, имеющих торфяный[x)] горизонт мощностью более 30 см и pH (KCl) более 4,2 по крайней мере в части верхнего 50-см слоя почвы.

523. ГИ́ТТИЯ // gyttja // gyttja // Gyttja (от шведск. gyttja - ил) - термин, часто употребляемый в западно-европейской литературе для богатых органическим веществом подводных илистых почв серого или черного цвета, формирующихся в анаэробных условиях прибрежных территорий; термин используется также и для донных озерных илов. Син.: сапропель.

524. ГИ́ТТИЯ ВО́ДОРОСЛЕВАЯ // algae gyttja // gyttja algueque // Algen-Gyttja - термин немецкой школы для подводных почв прибреж-

ных территорий, в формировании органического вещества которых основную роль играют водные водоросли.

525. ГИ́ТТИЯ ГРУ́БОДЕТРИ́ТОВАЯ // coarse detritus gyttja // gyttja grossier detritique // Grobdetritusgyttja - термин немецкой школы для подводных почв прибрежных территорий, органическая часть которых представлена в значительной степени грубым растительным детритом не потерявших форму растительных остатков.

526. ГИ́ТТИЯ ДИАТО́МОВАЯ // diatomea gyttja // gyttja diatomeique // Diatomeen-Gyttja - термин немецкой школы для подводных иловатых почв прибрежных территорий, в формировании которых большую роль играют диатомовые водоросли.

527. ГИ́ТТИЯ КАРБОНА́ТНАЯ // calcareous gyttja // gyttja calcaire // Kalkgyttja - термин немецкой школы для подводных иловатых почв прибрежных территорий, обогащенных карбонатом кальция.

528. ГИ́ТТИЯ ЛИ́СТВЕННАЯ // leaf gyttja // gyttja de feuillage // Laubgyttja - термин немецкой школы для подводных иловатых почв прибрежных территорий, органическая часть которых формируется за счет листового материала растительности.

529. ГИ́ТТИЯ ОЗЕРНАЯ // limnic gyttja // gyttja lacustre // limnischer Gyttja - термин немецкой школы для подводных иловатых почв прибрежных территорий озёр.

530. ГИ́ТТИЯ ПЛАНКТО́ННАЯ // plancton gyttja // gyttja planctonique // Plankton-Gyttja - термин немецкой школы для подводных иловатых почв прибрежных территорий, в формировании которых основную роль играют планктонные организмы.

531. ГИ́ТТИЯ ПРИБРЕ́ЖНАЯ // foreshore gyttja // gyttja de plage // Wattgyttja - термин немецкой школы для подводных иловатых почв прибрежных территорий.

532. ГИ́ТТИЯ ТО́НКОДЕТРИ́ТОВАЯ // fine detritus gyttja // gyttja fin detritique // Feindetritusgyttja - термин немецкой школы для подводных иловатых почв прибрежных территорий, органическая часть которых представлена тонким растительным детритом.

533. ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА // gleyic soil // sol gleyique // gleyischer Boden (от русск. глей) - общеупотребительный термин для почв, имеющих в профиле морфологические признаки слабого постоянного или сезонного переувлажнения в виде отдельных сизых и ржавых пятен.

534. ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //gley soil // sol à gley // Gleyboden, Gley (от русск. глей) - 1) термин русск.шк. для почв, имеющих в той или иной части профиля сплошной сизый со ржавыми пятнами горизонт, формирующийся в результате длительного переувлажнения; 2) общеупотребительный термин для почв, оглеенных во всем профиле с поверхности.

535. ГЛЕ́ЕВАЯ МА́ЛОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА // low humic gley soil // sol à gley peu humifère // humusarmer Gleyboden - термин западноевропейских школ для дерново-глеевых слабо гумусированных почв.

536. ГЛЕ́ЕВАЯ МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА // deep gley soil // sol à gley profond // Boden mit tiefem Gley-Horizont - термин западноевропейских школ, не имеющий строгого содержания, для почв, имеющих в нижней части профиля очень мощный глеевый горизонт.

537. ГЛЕЕВИ́ДНАЯ ПО́ЧВА // gley-like soil // sol gleyiforme, sol analogue au gley, sol à simili-gley, sol à faux-gley // gleyartiger Boden (от русск. глей) - термин западно-европейских школ для поверхностно переувлажненных почв с осветленным мраморовидным горизонтом в верхней части профиля (с поверхности или под горизонтом А). Син.: псевдоглей.

538. ГЛЕ́ЕВО-БОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА // gley swamp soil // sol gley marécageux //Moorgleyboden - общеупотребительный термин для почв, имеющих в профиле под перегнойным или торфяным горизонтом глеевый горизонт.

539. ГЛЕ́ЕВО-МЕРЗЛО́ТНО-ТАЕ́ЖНАЯ ПО́ЧВА //gley cryomorphic taiga soil //cryosol gley de taiga //Frostgleyboden der Taiga - термин для полугидроморфных почв Сибири, имеющих под маломощной лесной подстилкой серо-сизый оглеенный горизонт, постепенно переходящий в слой многолетней мерзлоты; почвы не оподзолены или слабо оподзолены и имеют кислую реакцию; характерны криотурбации в профиле; син.: мерзлотно-таёжная глеевая п.

540. ГЛЕ́ЕВО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА // gley-podzolic soil // sol gley-podzolique // gleypodsolierter Boden - термин для подзолистых почв, формирующихся при поверхностном избыточном увлажнении в северной подзоне тайги; профиль почвы состоит из поверхностного торфянистого горизонта (5-10 см), подзолистого горизонта с признаками оглеения (5-15 см), иллювиального горизонта также с признаками оглеения и переходного к породе неоглеенного горизонта ВС; максимальное оглеение характерно в подзолистом горизонте.

541. ГЛЕЕ-МЕРЗЛОТНО-ТАЕЖНАЯ ПОЧВА - См. Глеево-мерзлотно-таёжная п.

542. ГЛЕЕ-ПОДЗОЛ // gley-podzol // gley-podzol // Gley-Podsol - термин русск.шк. для вида глееподзолистых почв, в профиле которых, в соответствии с очень сильной степенью подзолистости, имеется сплошной оглеенный подзолистый горизонт A_2G, бесструктурный и мучнистый, а горизонт В сильно уплотнен, ясно прослеживается и разделяется на подгоризонты, причем обычно имеется переходный горизонт A_2B.

543. ГЛЕЕ-ПОДЗОЛИСТАЯ ПОЧВА // gley-podzolic soil // sol gley-podzolique // Gleypodsolboden (от русск. глей и подзол) - термин русск.шк. для подтипа подзолистых почв (см.) северной тайги, в верхней части профиля которых формируется оглеенный горизонт за счет поверхностного атмосферного переувлажнения при больших осадках и малом испарении; в целинном состоянии профиль почвы имеет строение A_0-A_2G-B-C; нижняя часть профиля остается неоглеенной, но в некоторых случаях имеет место сочетание поверхностного атмосферного и грунтового оглеения.

544. ГЛЕЕ-ПОДЗОЛИСТАЯ КАРЛИКОВАЯ ПОЧВА // dwarf gley-podzolic soil // sol gley-podzolique nain // Zwerggleypodsol-boden - термин русск.шк. для глееподзолистых почв западноевропейской провинции, имеющих малую мощность всех генетических горизонтов и почвенного профиля в целом, мощность которого составляет 50-70 см и менее.

545. ГЛЕЕ-СИЛЬНОПОДЗОЛИСТАЯ ПОЧВА // gley-strongly podzolic soil // sol gley-podzolique forte // Gleystarkpodsolboden - термин русск.шк. для вида глееподзолистых почв, в профиле которых, в соответствии с сильной степенью подзолистости, имеется сплошной оглеенный подзолистый горизонт A_2G рассыпчато-листоватой или чешуйчатой структуры, а иллювиальный горизонт В ясно выражен и разделяется на подгоризонты.

546. ГЛЕЕ-СЛАБОПОДЗОЛИСТАЯ ПОЧВА // gley-slightly podzolic soil // sol gley-podzolique faible // Gleyschwachpodsolboden - термин русск.шк. для вида глееподзолистых почв, в профиле которых оглеенный подзолистый горизонт A_2G выражен отдельными пятнами, а иллювиальный горизонт В слабо прослеживается в результате слабой степени подзолистости почвы.

547. ГЛЕЕ-СРЕДНЕПОДЗОЛИСТАЯ ПОЧВА // gley-moderately podzolic soil // sol gley-podzolique modérée // Gleymässigpodsolboden - термин

русск.шк. для вида глееподзолистых почв, в профиле которых, в соответствии со средней степенью подзолистости, имеется сплошной оглеенный подзолистый горизонт A_2G плитчатой или плитчато-комковатой структуры, а иллювиальный горизонт В уплотнен и четко прослеживается.

548. ГЛЕ́Й // gley // gley // Gley (от русск. глей) - 1) термин русской школы для обозначения восстановленных сизых горизонтов почвы, связанных с переувлажнением почвенной массы, введенный в науку Г.Н.Высоцким (1905); 2) термин, использующийся в западно-европейских, особенно в немецкой, школах для обозначения избыточно увлажненных грунтовыми водами почв с морфологически выраженным глеевым горизонтом; включает старые немецкие названия Bruchboden, Wiesenboden, mineralischer Naßboden, американские - humic gley soil, groundwater podzol, groundwater laterite, half bog soil, частично planosol, русские - дерново-глеевая п., лугово-глеевая п. и т.п.

549. ГЛЕ́Й-ПОДЗО́Л //gley-podzol // gley-podsol //Gley-Podsol - термин немецкой школы для почв, переходных между глеем и подзолом, т.е. для полуболотных почв.

550. ГЛЕ́Й СКЛО́НОВЫЙ //slope gley // gley de pente // Hanggley - термин немецко-австрийск.шк. для глеевых почв, образовавшихся на склонах в местах приближения к поверхности грунтовых вод.

551. ГЛЕ́ЙСО́ЛЬ //gleysol //gleysol //Gleysol (от русск.глей и лат. solum - почва) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, характеризующихся наличием сплошного глеевого[x)] горизонта непосредственно под горизонтом А в условиях избыточного увлажнения.

552. ГЛЕ́ЙСО́ЛЬ //gleysol //gleysol //Gleysol (от русск. глей и лат. solum - почва) - термин канадской школы (1968) для большой группы почв, входящей в порядок глейсольных почв (см.), которые в естественном состоянии либо не имеют гумусового горизонта A_1, либо он мощностью менее 7,5 см, а в пахотном состоянии имеют горизонт $A_{пах.}$ с содержанием гумуса менее 3% и светлосерой окраской; с поверхности они могут иметь торфяной горизонт как определено для глейсольных почв.

553. ГЛЕ́ЙСО́ЛЬ БЕ́ДНАЯ //dystric gleysol //gleysol dystrique // dystrischer Gleysol (от греч. dystrophé - отсутствие пищи) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для

почв, характеризующихся наличием двух диагностических горизонтов - светлого[x)] горизонта А и глеевого[x)] - и имеющих pH (KCl) менее 4,2 в верхней 50-см толще.

554. ГЛЕ́ЙСОЛЬ БОГА́ТАЯ //eutric gleysol //gleysol eutrique //eutrischer Gleysol (от греч. eutrophé - хорошая пища) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, характеризующихся наличием двух диагностических горизонтов - светлого[x)] горизонта А и глеевого[x)] - и имеющих pH (KCl) 4,2 или выше в верхней 50-см толще.

555. ГЛЕ́ЙСОЛЬ ГУ́МУСОВАЯ //humic gleysol //gleysol humique //humusischer Gleysol (от лат. humus - гумус, перегной) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, характеризующихся наличием двух диагностических горизонтов - темного[x)] горизонта А и глеевого[x)].

556. ГЛЕ́ЙСОЛЬ ГУ́МУСОВАЯ //humic gleysol //gleysol humique //Humus Gleysol - термин канадской школы (1968) для большой группы почв, входящих в порядок глейсольных почв (см.), у которых в естественном состоянии имеется гумусовый горизонт A_1 мощностью не менее 7,5 см, а в пахотном состоянии пахотный горизонт $A_{пах.}$[c] содержанием гумуса более 3% и темносерой окраской; почвы эти могут иметь кроме того и торфяной горизонт с поверхности мощностью, как определено для глейсольных почв.

557. ГЛЕ́ЙСОЛЬ ГУ́МУСОВАЯ ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ //fera humic gleysol //gleysol humique ferà //fera Humus Gleysol (от лат. ferrum - железо) - термин канадской школы (1968) для гумусовых глейсолей (см.) с невскипающим от 1-н HCl горизонтом A_1 или $A_{пах.}$, имеющих горизонт В с обилием ярких охристых пятен и аккумуляцией железа (содержание дитионит-экстрагируемого железа в В больше на 1%, чем в С, а алюминия в В больше менее, чем на 0,5%, чем в С).

558. ГЛЕ́ЙСОЛЬ ГУ́МУСОВАЯ ЗАСОЛЁННАЯ //saline humic gleysol //gleysol humique saline //salzhaltiger Humus Gleysol - термин канадской школы (1968) для гумусовых глейсолей (см.), имеющих в профиле солевой горизонт в пределах 60-120 см от поверхности.

559. ГЛЕ́ЙСОЛЬ ГУ́МУСОВАЯ КРИОГЕ́ННАЯ //cryic humic gleysol //gleysol humique cryique //kryischer Humus Gleysol (от гр. cryos - холод) - термин канадской школы (1968) для гумусовых глейсолей (см.), имеющих слои многолетней мерзлоты в пределах 100 см от минеральной поверхности.

560. ГЛЕЙСО́ЛЬ ГУ́МУСОВАЯ ОКАРБОНА́ЧЕННАЯ //carbonated humic gleysol //gleysol humique calcique //kalkischer Humus Gleysol - термин канадской школы (1968) для гумусовых глейсолей (см.) с вскипающим от 1-н HCl горизонтом A_1 или $A_{пах}$ (различия между остаточными и вторичными карбонатами при этом не делается, т.к. в этих условиях вторичные карбонаты всегда будут присутствовать).

561. ГЛЕЙСО́ЛЬ ГУ́МУСОВАЯ РЕ́ГОВАЯ //rego humic gleysol //gleysol humique rego //rego Humus Gleysol (от гр. rhegos - покров) - термин канадской школы (1968) для гумусовых глейсолей (см.) с невскипающим от 1-н HCl горизонтом A_1 или $A_{пах.}$, не имеющих горизонта B.

562. ГЛЕЙСО́ЛЬ ГУ́МУСОВАЯ СКА́ЛЬНАЯ //lithic humic gleysol //gleysol humique lithique //lithischer Humus Gleysol (от гр. lithos - камень) - термин канадской школы (1968) для гумусовых глейсолей (см.), имеющих плотную породу в пределах от 10 до 50 см от минеральной поверхности.

563. ГЛЕЙСО́ЛЬ ГУ́МУСОВАЯ ТИПИ́ЧНАЯ //orthic humic gleysol //gleysol humique orthique //orthischer Humus Gleysol (от гр. orthos - настоящий) - термин канадской школы (1968) для гумусовых глейсолей (см.) с невскипающим от 1-н HCl гумусовым горизонтом A_1 или $A_{пах.}$ и оглеенным горизонтом B.

564. ГЛЕЙСО́ЛЬ ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ //fera gleysol //gleysol feràe //fera Gleysol (от лат. ferrum - железо) - термин канадской школы (1968) для глейсолей (см.), имеющих в горизонте B обильные яркие охристые пятна и аккумуляцию железа (содержание дитионит-экстрагируемого железа в B на 1% больше, чем в C, а алюминия - менее чем на 0,5%, чем в C).

565: ГЛЕЙСО́ЛЬ ЗАСОЛЁННАЯ //saline gleysol //gleysol saline //salzhaltiger Gleysol - термин канадской школы (1968) для глейсолей (см), имеющих в профиле солевой горизонт в пределах от 60 до 120 см от поверхности.

566. ГЛЕЙСО́ЛЬ КАРБОНА́ТНАЯ //calcaric gleysol //gleysol calcaire //kalkarischer Gleysol - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, характеризующихся наличием двух диагностических горизонтов - светлого[x)] горизонта A и глеевого[x)], - имеющих pH (KCl) 4,2 или выше в верхней 50-см толще и содержащих достаточное количество карбонатов в той же толще для видимого вскипания при действии 10% HCl.

567. ГЛЕЙСОЛЬ КРИОГЕННАЯ //cryic gleysol //gleysol cryique // kryischer Gleysol (от греч. cryos - холод и génos - род) - 1) термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих глеевый[x)] горизонт под гумусово-аккумулятивным горизонтом или непосредственно с поверхности и слой многолетней мерзлоты в пределах верхней 100-см толщи; 2) термин канадской шк. (1968) для глейсолей (см.), имеющих слой многолетней мерзлоты в пределах 100 см от минеральной поверхности.

568. ГЛЕЙСОЛЬ МОЛЛЕВАЯ //mollic gleysol //gleysol mollique // mollischer Gleysol (от лат. mollis - мягкий) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО для почв, характеризующихся наличием двух диагностических горизонтов - моллевого[x)] горизонта А и глеевого[x)]

569. ГЛЕЙСОЛЬ ОКАРБОНАЧЕННАЯ //carbonated gleysol //gleysol calcique //kalkischer Gleysol - термин канадской школы (1968) для глейсолей (см.) с вскипающим от 1-н HCl поверхностным горизонтом.

570. ГЛЕЙСОЛЬ ПЛИНТИТОВАЯ //plinthic gleysol //gleysol plinthique //plinthischer Gleysol (от греч. plinthos - кирпич) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, характеризующихся наличием двух диагностических горизонтов в пределах верхней 125-см толщи - глеевого[x)] и плинтитового[x)] (при этом могут присутствовать и другие почвенные горизонты, например разного типа гумусово-аккумулятивные).

571. ГЛЕЙСОЛЬ РЕГОВАЯ //rego gleysol //gleysol rego //rego Gleysol (от гр. rhegos - покров) - термин канадской школы (1968) для глейсолей (см.), не имеющих горизонта В.

572. ГЛЕЙСОЛЬ СКАЛЬНАЯ //lithic gleysol //gleysol lithique // lithischer Gleysol (от греч. lithos - камень) - термин канадской школы (1968) для глейсолей (см.), имеющих плотную породу в пределах от 10 до 50 см от минеральной поверхности.

573. ГЛЕЙСОЛЬ ТИПИЧНАЯ //orthic gleysol //gleysol orthique // orthischer Gleysol (от греч. orthos - настоящий) - термин канадской школы (1968) для глейсолей (см.), имеющих оглеенный горизонт В.

574. ГЛЕЙСОЛЬ ЭЛЮВИИРОВАННАЯ //eluviated gleysol //gleysol éluvial //Eluvialgleysol (от лат. eluo - вымываю) - термин канадской школы (1968) для большой группы почв, входящей в порядок глей-

сольных почв (см.), имеющих в профиле осветленный горизонт A_2 и глинисто-аккумулятивный (аргилловый)[x] оглеенный горизонт B; все почвы этой группы могут иметь с поверхности гумусовый горизонт A_1 или торфяной слой как определено для глейсольных почв.

575. ГЛЕ́ЙСО́ЛЬ ЭЛЮВИ́РОВАННАЯ ГУ́МУСОВАЯ //humic eluviated gleysol //gleysol éluvial humique //Humus Eluvialgleysol - термин канадской школы (1968) для элювиированных глейсолей (см.), имеющих гумусовый горизонт A_1 более 7,5 см (в пахотном состоянии Ap имеет более 3% гумуса и темносерую окраску).

576. ГЛЕ́ЙСО́ЛЬ ЭЛЮВИ́РОВАННАЯ ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ //fera eluviated gleysol //gleysol éluvial ferá //fera Eluvialgleysol - термин канадской школы (1968) для элювиированных глейсолей (см.), имеющих обилие ярких охристых пятен в горизонте B и аккумуляцию железа (содержание дитионит-экстрагируемого железа в B должно быть на 1% больше, чем в C, а алюминия - менее чем на 0,5% больше, чем в C).

577. ГЛЕ́ЙСО́ЛЬ ЭЛЮВИ́РОВАННАЯ МА́ЛОГУ́МУСНАЯ //low humic eluviated gleysol //gleysol éluvial peu humique //humusarmer Eluvialgleysol - термин канадской школы (1968) для элювиированных глейсолей (см.), не имеющих гумусового горизонта A_1 или имеющих A_1 менее 7,5 см (в пахотном состоянии A_1 имеет менее 3% гумуса и светло-серую окраску).

578. ГЛЕ́ЙСО́ЛЬ ЭЛЮВИ́РОВАННАЯ СКА́ЛЬНАЯ //lithic eluviated gleysol //gleysol éluvial lithique //lithischer Eluvialgleysol (от гр. lithos - камень) - термин канадской школы (1968) для элювиированных глейсолей (см.), имеющих плотную породу в пределах от 10 до 50 см от минеральной поверхности.

579. ГЛЕ́ЙСО́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //gleysolic soil //sol gleysolique //gleysolischer Boden (от русск. глей и лат. solum - почва) - термин канадской школы (1968) для порядка почв, насыщенных водой и находящихся в восстановительных условиях постоянно или какую-то часть года, если только не осушены искусственно; они имеют в пределах 50 см от поверхности минеральной почвы глеевый горизонт мощностью не менее 10 см, характеризующийся сизой окраской, или яркой пятнистостью от окисления железа; они могут иметь торфяной горизонт с поверхности мощностью до 40 см или торфяно-моховой горизонт мощностью до 60 см, а также могут иметь горизонты A и B.

580. ГЛИ́НИСТАЯ ПО́ЧВА //clay soil //sol argileux //Tonboden - 1) общеупотребительный термин для почв, глинистых по механическому составу; 2) термин немецкой школы для лесных почв, формирующихся на структурных глинах; в настоящее время не употребляется. Син.: пелосоль.

581. ГЛИ́НИСТАЯ ПУСТЫ́НЯ //clay desert //desert argileux //Tonwüste - термин для пустынь, развитых на морских, озёрных, речных и пролювиальных глинистых отложениях; на засоленных глинах здесь характерны солончаки, а на пресноводных - такыры.

582. ГЛИ́НИСТО-ПЕСЧА́НИСТАЯ ПО́ЧВА //argillaceous sand soil //sol argileux-sableux //Lettenboden - устаревший термин немецкой школы. См. Пелосоль.

583. ГЛО́ССАКВА́ЛЬФ //glossaqualf //glossaqualf //Glossaqualf (от греч. glossa - язык, лат. aqua - вода и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквальфов (см.), которые: 1) не имеют фраджипэна[x)], дурипэна[x)] или натриевого[x)] горизонта, но имеют белёсый горизонт, заходящий языками в аргиллювый[x)]; 2) имеют разницу между среднелетними и среднезимними температурами на 50 см более 5°С. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 4 подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) аэральные (aeric), 3) песчаные (arenic) и 4) моллевые (mollic) глоссаквальфы.

584. ГЛО́ССОБОРА́ЛЬФ //glossoboralf //glossoboralf //Glossoboralf (от греч. glossa - язык, греч. boreas - северный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы боральфов (см.), которые: 1) имеют температуры выше криоборальфов (см.); 2) либо а) никогда не пересыхают в каком-либо горизонте большинство лет, либо б) имеют насыщенность основаниями (по сумме катионов) менее 60% в каком-либо подгоризонте аргиллового[x)] горизонта; 3) не имеют фраджипэна[x)] или натриевого[x)] горизонта; 4) имеют аргиллювый горизонт с верхней границей в пределах 60 см от минеральной поверхности, если только мех.состав не легче супеси во всех подгоризонтах выше аргиллового горизонта. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 6 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) богатые (eutric), 4) гаплудовые (hapludic), 5) маломощные (lithic) и 6) моллевые (mollic) глоссоборальфы.

585. ГЛО́ССУДА́ЛЬФ //glossudalf //glossudalf //Glossudalf (от гр. glossa - язык, лат. udus - влажный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удальфов (см.), которые: 1) имеют белёсый горизонт (либо иной элювиальный горизонт с ясными пылеватыми или песчаными скелетными частицами на гранях структурных отдельностей), заходящий языками в аргилловый[x)] горизонт; 2) не имеют отдельных конкреций размером от 2,5 до 30 см в аргилловом горизонте; 3) имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с породой, если он ближе, более 5°С; 4) не имеют натриевого[x)] или антропового[x)] горизонта или фраджипэна[x)]. В пределах этой большой почвенной группы выделяются две подгруппы почв: 1) типичные (typic) и 2) гидроморфные (aquic) глоссудальфы.

586. ГЛУБОКО́ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //deep gleyic soil //sol gleyique profond //tiefer gleyischer Boden - см. Грунтово-глееватая п.

587. ГЛУБОКО́ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //deep gley soil //sol à gley profond //tiefer Gleyboden - см. Грунтово-глеевая п.

588. ГЛУБОКООГЛЕ́ЕННАЯ ПО́ЧВА //deep gleyed soil //sol gleyifié profond //tiefer vergleyter Boden- см. Грунтово-оглеенная п.

589. ГЛУБОКО́ПАХОТНАЯ ПО́ЧВА //deep plough soil //sol arable profond //tiefer Ackerboden - термин для почв, имеющих мощность пахотного слоя более 30 см.

590. ГЛУБОКО́ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //deep podzolic soil //sol podzolique profond //tiefer Podsolboden - термин русск.шк. для вида подзолистых почв, мощность подзолистого горизонта которых более 30 см.

591. ГОЛЬЦО́ВАЯ ПО́ЧВА //goletz soil //sol de goletz //Goletzboden - термин для горно-тундровых почв Сибири, распространенных на вершинах гор (гольцов) выше верхней границы леса в условиях холодного климата.

592. ГО́РНАЯ ПО́ЧВА //mountain soil //sol de montagne //Gebirgsboden - общеупотребительный термин для почв, формирующихся в условиях горных склонов на различных высотах; для горных почв в целом характерен укороченный профиль, щебнистость всей почвы или ее нижней части, специфический горно-эрозионный тип баланса веществ в условиях склонового процесса. Син.: орогенная п.

593. ГО́РНАЯ ГУ́МУСНО-ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ ПО́ЧВА //humus-ferrallitic mountainous soil //sol humus-ferrallitique de montagne // humus-ferrallitischer Gebirgsboden - термин русск.шк. для почв тропических высокогорных лесов, характеризующихся высокой гумусированностью (12-15% в верхнем горизонте), слабой ферраллитизацией, высокой кислотностью, слабой насыщенностью основаниями.

594. ГО́РНАЯ ДЕРНО́ВО-КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА // humic carbonated mountainous soil // sol carbonaté humique de montagne // Gebirgshumuskarbonatboden - термин русск.шк. для дерново-карбонатных почв, образующихся в условиях горного рельефа под лесной растительностью на богатых известью породах и отличающихся от равнинных аналогов щебнистостью и маломощностью.

595. ГО́РНАЯ ДЕРНО́ВО-ТАЁЖНАЯ ПО́ЧВА // mountain sod-taiga soil // sol gazonné de taiga de montagne // Gebirgsrasentaigaboden - термин русск.шк. для горно-таёжных почв светлохвойной тайги, отличающихся наличием дернового горизонта с поверхности, хорошо разложенным гумусом, близкой к нейтральной реакцией и высокой степенью насыщенности основаниями в верхней части профиля.

596. ГО́РНАЯ КИ́СЛАЯ НЕОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА // non-podzolized acid mountainous soil //sol acid non-podzolisé de montagne //nichtpodsolierter saure Gebirgsboden - термин русск.шк. для типа почв хвойных лесов северной и средней тайги со слабодифференцированным профилем А-В-С, сильно-кислой реакцией по всему профилю и высокой ненасыщенностью основаниями (80-90%).

597. ГО́РНАЯ ЛЁСО-ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА //mountain meadow-forest soil // sol de pré forestier de montagne //Gebirgswaldweideboden - термин С.А.Захарова для почв парковых лесов высокогорий на верхней границе лесного пояса, имеющих профиль АС и характеризующихся большой мощностью гумусового горизонта (80-120 см), рыхлостью, малой гумусированностью, значительным увлажнением, слабокислой реакцией, малой насыщенностью основаниями.

598. ГО́РНАЯ ЛУ́ГОВО-СТЕПНА́Я ПО́ЧВА - 1) см.: Горно-луговая черноземовидная п.; 2) термин для почв лугово-степного пояса высокогорий, формирующихся в относительно засушливых условиях и отличающихся нейтральной или близкой к ней реакцией, высокой насыщенностью основаниями, имеющих профиль АС без остаточной аккумуляции карбонатов в нижней части профиля.

599. ГО́РНАЯ МЕРЗЛО́ТНО-ТАЁЖНАЯ ПО́ЧВА //cryomorphic mountain taiga soil //cryosol de taiga de montagne //Gebirgstaigafrostboden - термин русск.шк. для длительно-сезонно мерзлых горно-таежных суглинистых почв, имеющих в профиле следы криотурбации.

600. ГО́РНАЯ МЕРЗЛО́ТНО-ТАЁЖНАЯ НАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА //base saturated cryomorphic mountain taiga soil //cryosol saturé de taiga de montagne //basengesättigter Gebirgstaigafrostboden - термин для горно-таежных почв легкого механического состава, характерных для светлохвойной тайги, имеющих почти нейтральную реакцию и высокую насыщенность основаниями в верхней части профиля при менее грубом характере гумуса, чем это свойственно горно-таежным почвам в целом.

601. ГО́РНАЯ ТОРФЯ́НИСТО-МЕРЗЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА //peaty cryomorphic mountain taiga soil //cryosol tourbeuse de taiga de montagne // Gebirgsmoorfrostboden - термин для длительно-сезонно мёрзлых горно-таёжных суглинистых почв, имеющих в профиле следы криотурбации и торфянистый горизонт с поверхности.

602. ГО́РНО-КАШТА́НОВАЯ ПО́ЧВА //mountainous chestnut soil //sol châtain de montagne // kastanienfarbiger Gebirgsboden - термин русск.шк. для типа горных почв, аналогичных каштановым почвам равнин, формирующихся под горными сухими степями и имеющих такой же профиль, как и равнинные почвы, но отличающихся щебнистостью и малой мощностью.

603. ГО́РНО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ПО́ЧВА //mountainous cinnamon soil //sol cinnamome de montagne //zimtfarbener Gebirgsboden - термин русск. шк. для типа горных почв, аналогичных равнинным коричневым почвам сухих лесов и кустарников, но отличающихся щебнистостью, малой мощностью профиля и слабо дифференцированностью на горизонты.

604. ГО́РНО-КУСТА́РНИКОВАЯ СЕ́РАЯ ПО́ЧВА //grey mountain shrub soil // sol gris de touffe de montagne//grauer Gebirgsstruchboden - термин В.М.Фридланда (1950) для темноокрашенных почв с профилем АС, формирующихся под кустарниковой растительностью высокогорий и характеризующихся отсутствием аккумуляции карбонатов в профиле, нейтральной реакцией и высокой насыщенностью основаниями.

605. ГО́РНО-ЛАТЕРИ́ТНАЯ ПО́ЧВА //mountainous lateritic soil// sol lateritique de montagne //Gebirgslateritboden - устаревший термин для горных ферраллитных почв.

606. ГО́РНО-ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //mountain forest soil //sol forestier de montagne //Gebirgswaldboden - общеупотребительный термин, не имеющий строгого содержания, обычно используемый в качестве приложения к какому-либо типовому наименованию почвы, напр. бурая горно-лесная и т.п.; иногда используется в более широком понимании для обобщенного описания почв лесного пояса горных территорий.

607. ГО́РНО-ЛЕСНА́Я БУ́РАЯ ПО́ЧВА - см. Бурая горно-лесная п.

608. ГО́РНО-ЛЕСНА́Я ПРИМИТИ́ВНАЯ ПО́ЧВА //primitive mountainous forest soil //sol primitif forestier de montagne //neuntstandener Gebirgswaldboden - термин для горных почв лесного пояса, формирующихся на плотных породах и имеющих лишь один щебнистый гумусированный маломощный горизонт мелкозёма, лежащий на скальной породе.

609. ГО́РНО-ЛЕСНА́Я ПРИМИТИ́ВНО-АККУМУЛЯТИ́ВНАЯ ПО́ЧВА - см. Горно-лесная примитивная п.

610. ГО́РНО-ЛЕСНА́Я ЧЁРНО-БУ́РАЯ ПО́ЧВА //black-brown mountainous forest soil //sol noir-brun forestier de montagne //schwarzbraune Gebirgswaldboden - термин И.П.Герасимова и Ю.А.Ливеровского для типа почв, образующихся под разреженными ореховыми лесами с высокотравьем в Киргизии в условиях горного рельефа и умеренно-тёплого климата с чередованием длительного сухого и короткого влажного сезонов на карбонатных лессовидных суглинках; почвы имеют темно-серую до черной с бурым оттенком окраску, мощный гумусовый горизонт, содержание гумуса у поверхности 8-18% и до 2,5% на глубине около 1 м; мицелярно-карбонатный горизонт в нижней части профиля, прочную зернистую структуру; син.: темно-бурая п.

611. ГО́РНО-ЛЕ́СО-ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА //mountainous meadow-forest soil //sol forestier-gazonné de montagne //Gebirgsweidewaldboden - термин русск.шк. для высокогорных темноокрашенных почв с профилем A(B)C, формирующихся в субальпийском поясе под парковыми лесами и высокотравьем на границе лесной и луговой вертикальных зон.

612. ГО́РНО-ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА //mountain meadow soil //sol de pré de montagne //Gebirgsweideboden, Bergweideboden - термин Н.А.Богословского (1897) для почв высокогорных лугов альпийского или субальпийского пояса, особенно характерных в горах с влажным

климатом; они характеризуются различной мощностью (25-100 см) профиля типа АС, высокой гумусностью (10-25%), сильно битуминозным гуматно-фульватным гумусом, сильной щебнистостью, кислой реакцией среды.

613. ГО́РНО-ЛУГОВА́Я АЛЬПИ́ЙСКАЯ ПО́ЧВА //alpine mountain meadow soil //sol alpine de pré de montagne //alpiner Gebirgsweideboden - термин для горно-луговых почв альпийского пояса, обычно маломощных и с грубым гумусом, вверху полуторфянистым или торфянистым.

614. ГО́РНО-ЛУГОВА́Я АНДИ́ЙСКАЯ ПО́ЧВА //andic mountain-meadow soil // sol andique de pré de montagne//andischer Gebirgsweideboden - термин для горно-луговых почв высокогорий Южной Америки; син.: Андийская горно-луговая п., Парамосоль.

615. ГО́РНО-ЛУГОВА́Я ВТОРИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //secondary mountain meadow soil //sol secondaire de pré de montagne// Sekundärgebirgsweideboden - термин С.А.Захарова (1935) для высокогорных сильно гумусированных и щебнистых почв с профилем АС, образующихся в результате эволюции обезлесенных горно-лесных почв.

616. ГО́РНО-ЛУГОВА́Я ДЕРНО́ВАЯ ПО́ЧВА //sod mountain meadow soil //sol gazonné de pré de montagne //Rasengebirgsweideboden - термин для горно-луговых мощных почв субальпийского пояса, с небольшой щебнистостью в верхней части профиля и однородным гумусовым горизонтом. Син.: горно-луговая субальпийская п.

617. ГО́РНО-ЛУГОВА́Я КОРИ́ЧНЕВАЯ ПО́ЧВА //cinnamonic mountain meadow soil //sol cinnamome de pré de montagne //zimtfarbener Gebirgsweideboden - термин А.А.Завалишина (1931) для высокогорных сильно гумусированных и щебнистых почв с профилем АС, имеющих буровато-черную окраску, высокую насыщенность основаниями и слабую кислотность, распространенных в относительно засушливых высокогорьях (в бассейне оз.Севан).

618. ГО́РНО-ЛУГОВА́Я ПРИМИТИ́ВНАЯ ПО́ЧВА //primitive mountain meadow soil //sol primitif de pré de montagne // neuntstandener Gebirgsweideboden - термин М.Н.Сабашвили (1955) для горно-луговых почв (см.), имеющих профиль (А)С и отличающихся крайне малой мощностью и высокой щебнистостью, у которых горизонт (А) представляет щебенку породы с небольшим содержанием сильно гумусированного мелкозёма.

619. ГО́РНО-ЛУГОВА́Я СУ́БАЛЬПИ́ЙСКАЯ ПО́ЧВА //subalpine mountain meadow soil //sol subalpine de pré de montagne //subalpiner Gebirgsweideboden - термин для горно-луговых мощных почв субальпийского пояса с небольшой щебнистостью в верхней части профиля, однородным гумусовым горизонтом под мощной дерниной. Син.: горно-луговая дерновая п.

620. ГО́РНО-ЛУГОВА́Я ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical mountain meadow soil // sol typique de pré de montagne //typischer Gebirgsweideboden - термин для горно-луговых почв субальпийского пояса, не имеющих оторфенения с поверхности и отличающихся мощным гумусовым горизонтом.

621. ГО́РНО-ЛУГОВА́Я ТОРФЯ́НИСТАЯ ПО́ЧВА //peaty mountain meadow soil //sol tourbeuse de pré de montagne //Anmoorgebirgsweideboden - термин для горно-луговых почв альпийского пояса, обычно маломощных и сильно щебнистых, с торфянистым гумусом в поверхностном слое.

622. ГО́РНО-ЛУГОВА́Я ЧЕРНОЗЁМОВИ́ДНАЯ ПО́ЧВА //chernozem-like mountain meadow soil //sol chernozémiforme (chernozémique) de pré de montagne //tschernosemartiger Gebirgsweideboden - термин Н.А. Богословского (1897) для субальпийских высокогорных сильно гумусированных и слабо щебнистых почв с профилем АС или А(В)С, формирующихся в относительно сухих условиях на известняках и других карбонатных или богатых кальцием горных породах и имеющих нейтральную или близкую к ней реакцию, высокую насыщенность основаниями, зернистую структуру мощного гумусового горизонта, остаточную аккумуляцию карбонатов в нижней части профиля, слабо выраженный переходный горизонт (В) между гумусовым горизонтом и породой. Син.: горно-лугово-степная п., горная лугово-степная п., горно-степная п.

623. ГО́РНО-ЛУ́ГОВО-СТЕПНА́Я ПО́ЧВА //mountain meadow-steppe soil // sol de prairie de montagne//Gebirgsprairieboden - 1) термин для почв горных луговых степей, обычно формирующихся в континентальных горных спектрах высотной поясности выше пояса горных степей; имеют сравнительно небольшую мощность (30-70 см), среднее содержание гумуса (6-15%), слабокислую и нейтральную реакцию, высокую щебнистость, слабо дифференцированный профиль с переходным горизонтом между гумусовым и породой; 2) см.: Горно-луговая чернозёмовидная почва.

624. ГО́РНО-ПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //mountainous desert soil //sol désertique de montagne, sol de désert de montagne //Gebirgswüstenboden - термин русск.шк. для почв пустынь высокогорных районов.

625. ГО́РНО-СТЕПНА́Я ПО́ЧВА //mountain steppe soil //sol de steppe de montagne, sol steppique de montagne //Gebirgssteppenboden - 1) сборный термин для ряда почв, формирующихся в условиях горных степей, включая горные чернозёмы, горные каштановые и др. почвы; 2) см.: Горно-луговая черноземовидная п.

626. ГО́РНО-ТАЁЖНАЯ ПО́ЧВА //mountain taiga soil// sol de taiga de montagne //Gebirgstaigaboden - термин для группы почв, формирующихся под горно-таёжными лесами и не имеющих признаков оподзоливания (в понимании классической русской школы); они характеризуются торфянистым фульватным гумусом потёчного типа, кислой реакцией, глубоким проникновением гумуса, часто глееватые, несут следы криотурбации.

627. ГО́РНО-ТАЁЖНАЯ МЕРЗЛО́ТНАЯ ОЖЕЛЕЗНЁННАЯ ПО́ЧВА //ferrimorphic mountain taiga pergelisol //pergélisol ferrugineux de taiga de montagne //eisenhaltiger Gebirgstaigapermafrostboden - термин русск.шк. для типа почв, формирующихся под осветленной лиственной тайгой с кустарничковым и мохово-кустарничковым покровом в условиях экстраконтинентального климата при наличии многолетней мерзлоты; почва отличается охристо-бурым или ржаво-бурым цветом благодаря криогенному накоплению окислов железа.

628. ГО́РНО-ТАЁЖНАЯ ОЖЕЛЕЗНЁННАЯ ПО́ЧВА //ferrimorphic mountain taiga soil //sol ferrugineux de taiga de montagne //eisenhaltiger Gebirgstaigaboden - термин для горно-таежных легких почв светлохвойной тайги, имеющих в дополнение к признакам горно-таёжных почв (кислая реакция, грубогумусность, потечность гумуса, отсутствие морфологической оподзоленности) значительную аккумуляцию подвижных соединений железа в профиле и выделение железа в виде охристых пятен и конкреций.

629. ГО́РНО-ТАЁЖНАЯ ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //podzolized mountain taiga soil //sol podzolisé de taiga de montagne //podsolierter Gebirgstaigaboden - термин для горно-таежных почв светлохвойной тайги, формирующихся на легких породах и имеющих в дополнение к признакам горно-таёжных почв выявляемые анализом признаки оподзоленности в грубогумусном горизонте с формированием иллювиального горизонта.

630. ГО́РНО-ТОРФЯ́НИСТАЯ ПО́ЧВА //mountain peaty soil //sol tourbeux de montagne //Gebirgstorfboden - термин С.А.Захарова (1913) для высокогорных почв с профилем ТАС, формирующихся под рододендровыми зарослями и имеющих слой торфа с поверхности, кислую реакцию, небольшую гумусированность горизонта А под торфом.

631. ГО́РНО-ТУ́НДРОВАЯ ПО́ЧВА //mountain tundra soil //sol de toundra de montagne //Gebirgstundraboden - термин для почв нивального пояса горных систем, имеющих высокогорные тундровые ландшафты; легкие горно-тундровые почвы имеют кислую реакцию, достаточную разложенность органического вещества; потёчный гумус, слабо дифференцированный профиль при отсутствии оподзоленности, оглеения и криотурбации; суглинистые почвы отличаются оглеением, наличием торфянисто-перегнойного вещества, криотурбацией.

632. ГО́РНО-ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ ПО́ЧВА //mountainous ferrallitic soil // sol ferrallitique de montagne //ferrallitischer Gebirgsboden - термин русск.шк. для группы ферраллитных почв, образующихся в условиях горного рельефа и отличающихся от равнинных аналогов щебнистостью, меньшей мощностью, большей гумусированностью, меньшей степенью ферраллитизации.

633. ГО́РНЫЙ ЖЕЛТОЗЁМ //mountainous zheltozem //jeltozem de montagne //Gebirgsjeltosem - термин русск.шк. для желтозёмов, формирующихся в условиях горного рельефа и отличающихся щебнистостью, высокой гумусностью, маломощностью.

634. ГО́РНЫЙ КРАСНОЗЁМ //mountainous krasnozem, mountainous red earth //krasnozem de montagne, sol rouge de montagne //Gebirgskrasnosem, Gebirgsroterde - термин русск.шк. для красноземов, формирующихся в условиях горного рельефа и отличающихся щебнистостью, высокой гумусностью, маломощностью.

635. ГО́РНЫЙ СЕРОЗЁМ //mountainous sierozem //sierozem de montagne //Gebirgssierosem - термин русск.шк. для серозёмов, образующихся в условиях горного рельефа и отличающихся от равнинных аналогов скелетностью и меньшей мощностью.

636. ГО́РНЫЙ ЧЕРНОЗЁМ //mountainous chernozem //chernozem de montagne //Gebirgsschwarzerde, Gebirgstschernosem - общеупотребительный термин для черноземов, формирующихся в условиях горных степей и имеющих укороченный по сравнению с почвами равнин профиль.

637. ГРАВИ́ЙНАЯ ПО́ЧВА //gravelly soil //sol graveleux, cailloutis // kiesiger Boden, Kiesboden (от фр.gravier - гравий) - 1) в русской школе - почва, содержащая в поверхностном горизонте окатанные обломки минералов или горных пород размером от 2 до 20 мм; 2) по терминологии ФАО/ЮНЕСКО (1968) - почва, содержащая в поверхностном горизонте обломки горных пород размером до 75 мм.

638. ГРАВИНИ́ГРА //gravinigra soil //sol gravinigra //Gravinigra Boden - термин, предложенный для темных слитых трещиноватых глинистых почв Анголы, в настоящее время вышедший из употребления и замененный термином "вертисоль".

639. ГРУ́БАЯ ЗАСУ́ШЛИВАЯ НЕУПОРЯ́ДОЧЕННАЯ ПО́ЧВА //non-organized rough xeric soil //sol brut xérique inorganisé //nicht-organisierter Xerogrobboden - термин франц.шк. (1967) для группы грубых минеральных почв жарких пустынь (см.), имеющих покрытую смешанным (глинистым, каменистым, песчаным) материалом поверхность. Син.: фех-фех.

640. ГРУ́БАЯ ЗАСУ́ШЛИВАЯ НЕУПОРЯ́ДОЧЕННАЯ НАНО́СНАЯ ПО́ЧВА //non organized transported rough xeric soil //sol brut xérique inorganisé d'apport //nicht-organisierter Allochtonsxero-grobboden - термин франц.шк. (1967) для группы грубых минеральных почв жарких пустынь (см.), сформированных на подвижных песчаных дюнах. Син.: эрг.

641. ГРУ́БАЯ ЗАСУ́ШЛИВАЯ УПОРЯ́ДОЧЕННАЯ АБЛЯЦИО́ННАЯ ПО́ЧВА //organized rough xeric ablation soil //sol brut xérique organise d'ablation //organisierter Ablationxerogrobboden - термин франц.шк. (1967) для группы грубых минеральных почв жарких пустынь (см.), имеющих обработанную ветром каменистую поверхность. Син.: рег.

642. ГРУ́БАЯ ЗАСУ́ШЛИВАЯ УПОРЯ́ДОЧЕННАЯ НАНО́СНАЯ ПО́ЧВА //organized transported rough xeric soil //sol brut xérique organisé d'apport //organisierter Allochtonsxerogrobboden - термин франц. шк. (1967) для группы грубых минеральных почв жарких пустынь (см.), сформированных в депрессиях на глинистых наносах, и имеющий плотную глинистую полигональную корку, подстилаемую солевым горизонтом. Син.: такыр.

643. ГРУ́БАЯ МИНЕРА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //rough mineral soil //sol minéral brut //mineralischer Grobboden - термин франц.шк. (1965,1967) для класса неразвитых минеральных почв на молодых наносах или

эрозионных поверхностях, характеризующихся профилем (A)C, (A)R, C или R, в котором верхняя 20 см толща горизонта (A) содержит лишь следы гумуса или не более 1,5% гумуса в верхнем 2-3 см слое.

644. ГРУ́БАЯ МИНЕРА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА КЛИМАТИ́ЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕ́НИЯ //rough mineral soil of climatic origin //sol minéral brut d'origine climatique //mineralischer Grobboden der Klimagenese - термин франц.шк. (1965) для подкласса грубых минеральных почв (см.), связанных в своем генезисе с влиянием климатических факторов; включает почвы двух групп: почвы холодных стран и почвы пустынь.

645. ГРУ́БАЯ МИНЕРА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА НЕКЛИМАТИ́ЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕ́НИЯ // rough mineral soil of non-climatic origin //sol minéral brut d'origine non climatique //mineralischer Grobboden der Nichtklimagenese - термин франц.шк. (1965) для подкласса грубых минеральных почв (см.), не связанных в своем распространении с воздействием климатических факторов.

646. ГРУ́БАЯ МИНЕРА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА ПУ́СТЫНЬ // rough mineral desert soil // sol minéral brut des déserts // mineralischer Grobwüstenboden - термин франц.шк. (1965) для группы грубых минеральных почв климатического происхождения (см.), формирующихся в пустынях и связанных в своём генезисе преимущественно с физическим выветриванием.

647. ГРУ́БАЯ МИНЕРА́ЛЬНАЯ АНТРОПОГЕ́ННАЯ ПО́ЧВА //anthropic rough mineral soil //sol minéral brut anthropique //anthropogener mineralischer Grobboden - термин франц.шк. (1967) для группы почв, входящих в подкласс грубых минеральных неклиматических почв (см.), формирующихся на антропогенных открытых поверхностях (выработки, карьеры, каналы, насыпи и т.п.) и имеющих профиль (A)C, (A)R, C или R.

648. ГРУ́БАЯ МИНЕРА́ЛЬНАЯ КЛИМАТИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА ЖА́РКИХ (ЗАСУ́ШЛИВЫХ) ПУСТЫ́НЬ //climatic rough mineral soil of hot (xeric) deserts //sol minéral brut climatique des deserts chauds (xériques)// klimatischer mineralischer Grobboden der Warmwüste - термин франц.шк. (1967) для подкласса грубых минеральных почв (см.), распространенных в жарких пустынях низких широт, имеющих профиль (A)C,(A)R, C или R, содержащих лишь следы гумуса в 20-см слое или до 1-1,5% в поверхностном 2-3-см слое.

649. ГРУ́БАЯ МИНЕРА́ЛЬНАЯ КЛИМАТИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА ХОЛО́ДНЫХ ПУСТЫ́НЬ // climatic rough mineral soil of cold deserts //sol minéral brut climatique des déserts froids //klimatischer mineralischer Grobboden der Kaltwüste - термин франц.шк. (1967) для подкласса почв, входящих в класс Грубых минеральных почв (см.), распространенных в перигляциальных районах высоких широт или высокогорий, имеющих профиль (A)C, (A)R, C или R, содержащих лишь следы гумуса в 20-см слое или до 1-1,5% гумуса в поверхностном 2-3-см слое, имеющих в профиле многолетнюю мерзлоту или лёд и признаки криотурбации. Син.: Криосоль грубая.

650. ГРУ́БАЯ МИНЕРА́ЛЬНАЯ НАНО́СНАЯ АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //alluvial transported rough mineral soil //sol minéral brut d'apport alluvial //alluvial mineralischer Allochtonsgrobboden - термин франц.шк. (1967) для группы почв, входящих в подкласс Грубых минеральных неклиматических почв (см.), формирующихся на молодых аллювиальных отложениях и имеющих профиль (A)C или C.

651. ГРУ́БАЯ МИНЕРА́ЛЬНАЯ НАНО́СНАЯ ВУЛКАНИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА // volcanic transported rough mineral soil //sol minéral brut d'apport volcanique //vulkanischer mineralischer Allochtonsgrobboden - термин франц.шк. (1967) для группы почв, входящих в подкласс Грубых минеральных неклиматических почв (см.), формирующихся на молодых вулканических отложениях и имеющих профиль (A)C, (A)R, C или R.

652. ГРУ́БАЯ МИНЕРА́ЛЬНАЯ НАНО́СНАЯ КОЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // colluvial transported rough mineral soil //sol minéral brut d'apport colluvial //kolluvial mineralischer Allochtonsgrobboden - термин франц.шк. (1965,1967) для группы почв, входящих в подкласс Грубых минеральных неклиматических почв (см.), формирующихся на молодых коллювиальных отложениях и имеющих профиль (A)C или C.

653. ГРУ́БАЯ МИНЕРА́ЛЬНАЯ НАНО́СНАЯ ЭО́ЛОВАЯ ПО́ЧВА //aeolian transported rough mineral soil //sol minéral brut d'apport éolien //äolischer mineralischer Allochtonsgrobboden - термин франц. шк. (1965,1967) для группы почв, входящих в подкласс Грубых минеральных неклиматических почв (см.), формирующихся на молодых эоловых отложениях и имеющих профиль (A)C или C.

654. ГРУ́БАЯ МИНЕРА́ЛЬНАЯ НЕКЛИМАТИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА // non-climatic rough mineral soil //sol mineral brut non climatique//nicht-klimati-

scher mineralischer Grobboden - термин франц.шк. (1967) для подкласса Грубых минеральных почв (см.), формирующихся однозначно независимо от климатических условий в силу своей молодости или особых условий почвообразования и имеющих профиль (A)C, (A)R, C или R.

655. ГРУ́БАЯ МИНЕРА́ЛЬНАЯ ЭРОЗИО́ННАЯ ПО́ЧВА //erosion rough mineral soil //sol minéral brut d'érosion //mineralischer Erosionsgrobboden - термин франц.шк. (1967) для группы почв, входящих в подкласс Грубых минеральных неклиматических почв (см.), формирующихся на молодых обнаженных эрозией поверхностях и имеющих профиль (A)C, (A)R, C или R.

656. ГРУ́БАЯ НАНО́СНАЯ ПО́ЧВА //rough transported soil //sol brut d'apport //Allochtonsgrobboden - термин франц.шк. (1965) для группы грубых минеральных почв неклиматического происхождения (см.), формирующихся на молодых наносах различного происхождения.

657. ГРУ́БАЯ НАНО́СНАЯ КОНТИНЕНТА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //rough transported continental soil //sol brut d'apport continental //kontinentalischer Allochtonsgrobboden - термин франц.шк. (1965) для подгруппы грубых наносных почв (см.), формирующихся на свежих коллювиальных отложениях. Син.: грубая наносная коллювиальная п.

658. ГРУ́БАЯ НАНО́СНАЯ МОРСКА́Я ПО́ЧВА //rough transported marine soil //sol brut d'apport marin //Seeallochtonsgrobboden - термин франц.шк. (1965) для подгруппы грубых наносных почв (см.), формирующихся на свежих морских отложениях.

659. ГРУ́БАЯ НАНО́СНАЯ ФЛЮВИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //rough transported fluviatile soil //sol brut d'apport fluviatile //fluvialischer Allochtonsgrobboden - термин франц.шк. (1965) для подгруппы грубых наносных почв (см.), формирующихся на молодых аллювиальных наносах.

660. ГРУ́БАЯ СКА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //raw hard rock soil //sol brut rocheux //Gesteinsrohboden - термин австрийск.шк. для примитивных слабо развитых почв на плотных коренных скальных породах.

661. ГРУ́БАЯ ЭРОЗИО́ННАЯ ПО́ЧВА //erosion rough soil //sol brut d'érosion //Erosionsgrobboden - термин франц.шк. (1965) для группы грубых минеральных почв неклиматического происхождения (см.), формирующихся на молодых обнаженных эрозией поверхно-

стях; включает литосоли на скальных и регосоли на рыхлых породах.

662. ГРУ́БОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА - см. Грубогумусовая п.

663. ГРУ́БОГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //raw-humus soil, rough-humus soil //sol à humus brut, sol à humus grossier //rohhumusischer Boden, grobhumusischer Boden - термин для почв, содержащих в верхнем горизонте слабо разложившийся полуторфянистый кислый гумус типа моор или модер.

664. ГРУ́МУСО́ЛЬ //grumusol //grumusol //Grumusol (от лат. grumus - комковатый и лат. solum - почва) - термин Окса и Торпа (1951), предложенный для сборной группы темных слитых трещиноватых глинистых почв, впоследствии замененный термином "вертисоль".

665. ГРУ́НТ //ground //terrain //Grund (от нем, Grund - почва, основание) - горная порода, залегающая под почвой.

666. ГРУНТО́ВО-ВО́ДНАЯ ПО́ЧВА //ground water soil //sol à eau de fond //Grundwasserboden - термин немецкой школы для почв грунтового увлажнения, преимущественно болотных. Син.: гидроморфная п., полусухопутная п., п.грунтового увлажнения.

667. ГРУНТО́ВО-ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //ground water gleyic soil //sol gleyique à eau de fond //gleyischer Grundwasserboden - термин русск.шк. для почв, в нижней части профиля которых имеется выраженный отдельными сизыми и ржавыми пятнами оглеенный горизонт, формирующийся в результате переувлажнения грунтовыми водами.

668. ГРУНТО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //ground water gley soil //sol gley à eau de fond //Grundwassergleyboden - термин русск.шк. для почв, в нижней части профиля которых имеется сплошной сизый со ржавыми пятнами глеевый горизонт, формирующийся в результате переувлажнения грунтовыми водами.

669. ГРУНТО́ВО-ОГЛЕ́ЕННАЯ ПО́ЧВА //ground water gleyed soil //sol gleyifié à eau de fond //vergleyter Grundwasserboden - термин русск.шк. для почв, имеющих в нижней части профиля в разной степени выраженный глеевый горизонт, сформированный в результате переувлажнения грунтовыми водами.

670. ГРЭЙЗЁМ //greyzem //greyzem //Greysem (от англ. gray - серый и русск. земля) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для серых лесных почв лесо-степи умеренного пояса.

671. ГРЭЙЗЁМ ГЛЕ́ЕВЫЙ //gleyic greyzem //greyzem gleyique //gleyischer Greysem - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для серых лесных почв, оглеенных или имеющих глеевый[x)] горизонт в нижней части профиля.

672. ГРЭЙЗЁМ МО́ЛЛЕВЫЙ //mollic greyzem //greyzem mollique //mollischer Greysem - термин ФАО/ЮНЕСКО для серых лесных почв, имеющих с поверхности моллевый[x)] гумусовый горизонт и соответствующих переходным к черноземам темно-серым лесным почвам.

673. ГРЭЙЗЁМ ТИПИ́ЧНЫЙ //orthic greyzem //greyzem orthique //orthischer Greysem - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для среднего подтипа серых лесных почв, имеющих гумусовый горизонт с характеристиками по мощности, гумусированности или цвету не достаточными для моллевого[x)] горизонта.

674. ГУ́МАКВЕ́ПТ //humaquept //humaquept //Humaquept (от лат. humus - гумус, лат. aqua - вода и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквептов (см.), которые: 1) имеют почвенные температуры теплее, чем криаквепты (см.) и разницу между среднелетней и среднезимней температурой на глубине 50 см более 5°С; 2) имеют темный[x)], моллевый[x)] или торфяный[x)] верхний горизонт; 3) имеют преобладание в поглощающем комплексе кристаллических алюмосиликатных глинистых минералов и менее 60% стекловатого вулканического пепла или иного пирокластического материала во фракциях пыли, песка и гравия; 4) имеют величину N менее 0,5 в каком-либо слое между 20 и 50 см; 5) имеют менее 15% обменного натрия в верхних 50 см либо постоянное или увеличивающееся с глубиной ниже 50 см содержание обменного натрия; 6) не имеют фраджипэна[x)]; 7) не имеют сплошного или составляющего более половины матрицы плинтита[x)] в пределах 125 см от поверхности. В пределах этой группы выделяются 5 подгрупп: 1) типичные (typic), 2) аэральные (aeric), 3) намытые (cumulic), 4) флювентные (fluventic) и 5) торфянистые (histic).

675. ГУ́МИСО́ЛЬ //humisol //humisol //Humisol (от лат. humus - гумус, перегной и лат. solum - почва) - термин канадской школы (1968) для большой группы почв, входящей в порядок органических почв (см.), имеющих преимущественно гумифицированную среднюю треть (60-120 см) профиля, либо гумифицированные верхнюю (0-60) и среднюю (60-120) трети, если в пределах средней трети есть землистый слой, вода, скальная порода или многолетняя мерзлота.

676. ГУ́МИСО́ЛЬ ВО́ДНАЯ //hydric humisol //humisol hydrique //hydrischer Humisol (от греч. hydor - вода) - термин канадской шк. (1968) для гумисолей (см.), имеющих слой воды ниже 40 см вплоть до 160 см и глубже.

677. ГУ́МИСО́ЛЬ ЗЕМЛИ́СТАЯ // terric humisol//humisol terrique //terrischer Humisol (от лат. terrae - земля) - термин канадской школы (1968) для гумисолей (см.), имеющих землистый слой (с содержанием органического в-ва до 30%) в пределах от 60 до 160 см от поверхности.

678. ГУ́МИСО́ЛЬ КРИОГЕ́ННАЯ // cryic humisol //humisol cryique //kryischer Humisol (от греч. cryos - холод) - термин канадской школы (1968) для гумисолей (см.), имеющих слой многолетней мерзлоты в пределах 160 см от поверхности.

679. ГУ́МИСО́ЛЬ КУМУЛЯ́ТИВНАЯ // cumulo humisol //humisol cumulique //kumulischer Humisol (от лат. accumulatio - накопление) - термин канадской школы (1968) для гумисолей (см.), имеющих наносный (аллювиальный) землистый слой или несколько прослоек общей мощностью от 5 до 30 см в пределах от 60 до 160 см от поверхности.

680. ГУ́МИСО́ЛЬ ОЗЁРНАЯ // limno humisol //humisol limnique //limnischer Humisol (от греч. limnē - озеро) - термин канадской школы (1968) для гумисолей (см.), имеющих слой озёрного торфа в пределах от 60 до 160 см от поверхности.

681. ГУ́МИСО́ЛЬ ПЕРЕХО́ДНАЯ //mesic humisol //humisol mesique //mesischer Humisol (от греч. mésos - средний) - термин канадской школы (1968) для гумисолей (см.), имеющих полуторфянистый слой в нижней трети (120-160 см) профиля.

682. ГУ́МИСО́ЛЬ СКА́ЛЬНАЯ //lithic humisol //humisol lithique //lithischer Humisol (от греч. lithos - камень) - термин канадской школы (1968) для гумисолей (см.), имеющих плотную породу в пределах от 10 до 160 см от поверхности.

683. ГУ́МИСО́ЛЬ ТИПИ́ЧНАЯ // typic humisol //humisol typique // typischer Humisol (от греч. týpos - образец) - термин канадской школы (1968) для гумисолей (см.), имеющих преимущественно гумифицированный материал в пределах средней (60-120) и нижней (120-160) третей профиля и не имеющих других диагностических слоев до глубины 160 см.

684. ГУМИСО́ЛЬ ФИ́БРОВАЯ //fibric humisol //humisol fibrique //fibrischer Humisol (от греч. fibra - ткань) - термин канадской школы (1968) для гумисолей (см.), имеющих преимущественно гумусированную среднюю треть (60-120 см) и торфяной слой в нижней части профиля.

685. ГУ́МИТРОПЕ́ПТ //humitropept //humitropept //Humitropept (от лат. humus - гумус, греч. tropikos - круг поворота и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы тропептов (см.), которые имеют среднегодовую температуру почвы ниже 22°С и насыщенность основаниями менее 50% в какой-либо части верхнего или камбиевого[x)] горизонта. В пределах этой группы выделяются 5 подгрупп: 1) типичные (typic), 2) вулканические (andic), 3) гидроморфные маломощные (aquic lithic), 4) маломощные (lithic) и 5) окисные (oxic) гумитропепты.

686. ГУМО́Д //humod //humod //Humod (от лат. humus - гумус и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка сподосолей (см.), которые: 1) никогда не насыщены водой или не имеют признаков переувлажнения, описанных для акводов (см.); 2) имеют один или оба следующих признака: а) более чем в половине каждого профиля сподовый[x)] горизонт с подгоризонтом, содержащим диспергированное органическое вещество и алюминий при недостаточном для покраснения после прокаливания содержания железа (менее 0,5% свободного Fe в мелкозёме); б) темный серый горизонт $A_{пах}$, лежащий на сподовом горизонте, который имеет подгоризонт или языки в верхней части, имеющие диспергированное органическое вещество, темную серую окраску и менее 0,7% свободного Fe. В пределах этого подпорядка выделяются 5 больших почвенных групп: 1) криогумоды, 2) фраджигумоды, 3) гаплогумоды, 4) плакогумоды и 5) тропогумоды (см.).

687. ГУМО́КС //humox// humox// Humox (от лат. humus - гумус и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка оксисолей (см.), которые: 1) всегда влажные или не имеют периода, когда почва сухая в каком-либо горизонте ниже 18 см от поверхности более двух месяцев подряд большинство лет; 2) имеют более 20 кг/м^2 органического углерода в верхней метровой толще, исключая подстилку; 3) имеют среднегодовую температуру почвы менее 22°С; 4) имеют

насыщенность основаниями менее 35% в окисном[x)] горизонте. В пределах этого подпорядка выделяются 4 большие почвенные группы: 1) акрогумоксы, 2) гиббсигумоксы, 3) гаплогумоксы и 4) сомбригумоксы.

688. ГУМУ́ЛЬТ //humult //humult //Humult (от лат. humus - гумус и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка ультисолей (см.), которые никогда не насыщены водой и имеют более красную и яркую окраску, чем аквульты (см.) и либо 1) имеют 1,5% и более органического в-ва в верхних 15 см аргиллового[x)] горизонта, либо 2) имеют более 20 кг/м^2 органического в-ва в слое 1 м ниже основания A_0, либо и то, и другое. В пределах этого подпорядка выделяются три большие почвенные группы: 1) гаплогумульты, 2) палегумульты и 3) тропогумульты.

689. ГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //humic soil //sol humifére //Humusboden - устаревший термин для почв и образований, очень богатых органическим веществом, включая торф, лесную подстилку, ил и т.п. Син.: органическая п.

690. ГУ́МУСОВАЯ АЛЛОФА́НОВАЯ ПО́ЧВА //humic allophane soil //sol humique à allophane //Humusallophanboden - термин американской школы для богатых аллофанами и вулканическим стеклом почв на молодых вулканических породах (туфах, лавах и пеплах); сейчас практически не применяется. Син.: андосоль.

691. ГУ́МУСОВАЯ КИ́СЛАЯ ПО́ЧВА //acid humic soil //sol humique acide //saurer Humusboden - термин амер.шк. для кислых неоподзоленных многогумусовых почв верхнего пояса горных хвойных лесов; син.: темно-бурая горно-лесная п., темно-бурая кислая горно-лесная п., темно-бурая неоподзоленная горно-лесная п.

692. ГУ́МУСОВАЯ ЛИ́ТОКА́ЛЬЦИЕВАЯ ПО́ЧВА //humic lithocalcic soil //sol humifère lithocalcique //Humus Lithokalkboden (от лат. humus - гумус, перегной, греч. lithos - камень и лат. calcium - кальций) - термин фр.шк. (1967) для группы слаборазвитых гумусовых почв (см.), формирующихся на богатых основаниями породах; фрагменты породы обычно встречаются в горизонте A; pH почвы немного ниже 6,8.

693. ГУ́МУСО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //humic gley soil //sol à gley humique //Gley, Gleyboden, Wiesenboden - термин американской школы для болотных почв с профилем A-G, то-есть имеющих глеевый гори-

зонт под гумусовым. Син.: перегнойно-глеевая п., дерново-глеевая п., лугово-глеевая п. (русск.шк.); глей (зап.-евр.шк.).

694. ГУ́МУСО-КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА // humus carbonate soil, humic carbonated soil // sol calcaire humique, sol humique carbonaté, sol carbonaté humique // Humuskarbonatboden - 1) термин Палльмана для сильно скелетных и сильно гумусированных рендзин горных склонов, формирующихся на плотных известняках и имеющих слабо дифференцированный профиль A-C; содержание гумуса в них достигает 20% и более, но мало содержится глины. Син.: перегнойно-карбонатная почва, рендзина горная черная; 2) термин франц.шк. (1967) для группы почв, входящей в подкласс насыщенных почв класса кальцемагнезиальных почв, имеющих нейтральную реакцию с pH около 7,0 и содержание гумуса более 20%, имеющих карбонатную щебенку в профиле и формирующихся на плотных сильно карбонатных породах.

695. ГУ́МУСО-ПЕ́ПЕЛЬНАЯ ПО́ЧВА // humus-ash soil // sol humu-cendreux // Humusaschenboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы подзолов (см.) с профилем $A_0A_1A_2C$, формирующихся на склонах в условиях, когда боковой вынос продуктов подзолообразования препятствует их аккумуляции в профиле и формированию горизонта B.

696. ГУ́МУСО-СИЛИКА́ТНАЯ ПО́ЧВА // humic silicate soil // sol silicaté humique // Humussilikatboden - термин Палльмана для грубогумусных высокогорных тундровых почв типа альпийских ранкеров. Син.: ранкер тундровый (высокогорный).

697. ГУ́МУСОВО-ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ПО́ЧВА // humus-ferruginous soil // sol humus-ferrugineuse // Humuseisenboden - термин русск.шк. для торфяно-глеевых почв верховых болот, формирующихся на песках и характеризующихся наличием под торфяным горизонтом коричневого или ржаво-коричневого обогащенного железом горизонта, ниже которого идёт глеевый горизонт.

698. ДЕГРАДИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // degraded soil // sol dégradé // degradierter Boden (от лат. degradatio - снижение) - термин, не имеющий строгого содержания, но широко применяемый для разных почв с ухудшенными свойствами по сравнению с окружающими или типичными, причем постепенное ухудшение свойств явилось результатом изменения условий почвообразования или хозяйственной деятельности человека; термин часто употребляется в смысле упрощения или разрушения почвенного профиля или составляющих его элементов.

699. ДЕГРАДИ́РОВАННАЯ НА́ТРИЕВАЯ ПО́ЧВА //degraded sodium soil//sol sodique dégradé //degradierter Natriumboden - термин немецкой школы для осолоделых солонцов, осолоделых почв в целом и солодей. Син.: осолоделая п., солодь.

700. ДЕГРАДИ́РОВАННАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //degraded alkali soil // sol alcaline dégradé//degradierter Alkaliboden - термин американской школы для осолоделых солонцеватых почв и солонцов. Син.: осолоделый солонец, солодь.

701. ДЕКАЛЬЦИФИЦИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //decalcified soil //sol décalcifié //entkalkter Boden (от лат. de - приставка, означающая удаление и лат. calx - известь) - термин для почв, лишенных карбоната кальция в результате выщелачивания.

702. ДЕЛЮВИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //deluvial soil //sol déluvial //Deluvialboden (от лат. deluo - смываю) - термин для сборной группы почв, формирующихся на делювиальных отложениях нижних частей склонов.

703. ДЕНУДИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА - см. Смытая почва.

704. ДЕРНО́ВАЯ ПО́ЧВА //sod soil //sol gazonné //Rasenboden (от русск. дёрн, дернина) - 1) термин, не имеющий строгого определения, но часто применяющийся для почв со слабо дифференцированным профилем AC или ABC, имеющим с поверхности дерновый горизонт, формирующихся в автоморфных условиях питания и увлажнения; 2) термин для пойменных почв с профилем AC или ABC, имеющих в меженный период лишь атмосферное увлажнение; см.Пойменная дерновая п.; 3) термин русск.шк. для типа литогенных хорошо дренированных почв бореального пояса, формирующихся под хвойным или лиственным лесом с кустарничково-травяным покровом на элювии коренных пород, состав и свойства которых мешают проявлению подзолистого процесса.

705. ДЕРНО́ВАЯ ПО́ЧВА (ЦЕНТРА́ЛЬНОЙ ПО́ЙМЫ) - см. Пойменная дерновая п. (центральной поймы).

706. ДЕРНО́ВАЯ ГРУБОГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //raw-humus sod soil //sol gazonné à humus brut //rohhumusischer Rasenboden - термин русск.шк. для типа почв субполярных лугов влажных океанических областей северного и южного полушарий; почвы входят в семейство кислых дерновых почв.

707. ДЕРНО́ВАЯ КА́ЛЬЦИЙ-ГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //calce-humic sod soil //sol gazonné calce-humique //kalkhumischer Rasenboden - термин

М.А.Глазовской (1972) для семейства почв луговых степей и высокотравных прерий, включающих бруниземы, выщелоченные черноземы, черные и красновато-черные почвы субтропических прерий, горные черноземовидные луговые почвы.

708. ДЕРНО́ВАЯ КИ́СЛАЯ ПО́ЧВА //acid sod soil //sol gazonné acid // saurer Rasenboden - термин русск.шк. для подтипа дерновых (литогенных) почв, формирующихся на породах с невысоким содержанием щелочноземельных катионов; горизонт A_1 маломощный и содержит 2-4% гумуса; степень насыщенности основаниями и кислотность этих почв варьируют в широких пределах.

709. ДЕРНО́ВАЯ МА́ЛОГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //low-humus sod soil //sol gazonné peu humifère //humusarmer Rasenboden - термин русск.шк. для вида дерновых (литогенных) почв, содержащих менее 3% гумуса в горизонте A_1.

710. ДЕРНО́ВАЯ МА́ЛОМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //shallow sod soil //sol gazonné mince //dünner Rasenboden - термин русск.шк. для вида дерновых (литогенных) почв, имеющих горизонт A_1 мощностью менее 15 см.

711. ДЕРНО́ВАЯ МНО́ГОГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //high-humus sod soil //sol gazonné riche en humus //humusreich Rasenboden - термин русск. шк. для вида дерновых (литогенных) почв, содержащих более 5% гумуса в горизонте A_1.

712. ДЕРНО́ВАЯ МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //deep sod soil //sol gazonné profond // tiefer Rasenboden - термин русск.шк. для вида дерновых (литогенных) почв, имеющих горизонт A_1 мощностью более 30 см.

713. ДЕРНО́ВАЯ НАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА //saturated sod soil //sol gazonné saturé //gesättigter Rasenboden - термин русск.шк. для подтипа дерновых (литогенных) почв, формирующихся на породах, богатых силикатами кальция и магния, под хвойными и смешанными лесами с мохо-травяным и травяным покровом; почвы имеют близкую к нейтральной реакцию и высокую насыщенность основаниями; горизонт A_1 имеет мощность 10-15 см и содержит 6-9% гумуса.

714. ДЕРНО́ВАЯ ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //podzolized sod soil //sol gazonné podzolisé //podsolierter Rasenboden - термин русск.шк. для подтипа дерновых (литогенных) почв, у которых в профиле заметны признаки оподзоленности, проявляющиеся в осветлении нижней части гумусового горизонта; иногда оподзоленность не заметна морфологически, но вскрывается аналитически (обеднение верхне-

го горизонта илом и полуторными окислами).

715. ДЕРНО́ВАЯ ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА (ВЫСО́КОЙ ПО́ЙМЫ) - см. Пойменная дерновая оподзоленная п. (высокой поймы).

716. ДЕРНО́ВАЯ СРЕ́ДНЕГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА // medium humic sod soil // sol gazonné moderée èn humus // mässig-humus Rasenboden - термин русск.шк. для вида дерновых (литогенных) почв, содержащих 3-5% гумуса в горизонте A_1.

717. ДЕРНО́ВАЯ СРЕ́ДНЕМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА // semi-deep sod soil // sol gazonné semi-profond //halbtiefer Rasenboden - термин русск.шк. для вида дерновых (литогенных) почв, имеющих горизонт A_1 мощностью 15-30 см.

718. ДЕРНО́ВАЯ СУ́БАРКТИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА //sod subarctic soil //sol gazonné subarctique //subarktischer Rasenboden - термин для специфических почв Камчатки, Аляски и островов северного и южного полушарий, формирующихся под разреженными травянистыми лесами, обычно березовыми, и характеризующихся значительным накоплением гумуса, слабо дифференцированным профилем типа ABC, близкой к нейтральной реакцией среды.

719. ДЕРНО́ВАЯ ТЕМНОЦВЕ́ТНАЯ ПО́ЧВА //dark-coloured sod soil //sol gazonné foncé //dunkler Rasenboden - термин для дерновых почв с профилем A_1-Bg-Cg, формирующихся при участии жестких грунтовых вод и имеющих мощный темный гумусовый горизонт.

720. ДЕРНО́ВО-БУРОЗЁМНАЯ ПО́ЧВА //derno-brownearth //sol derno-brunique // Derno-Braunerde - термин В.В.Пономаревой (1971), введенный по аналогии с термином "дерново-подзолистая почва" для почв Сахалина, формирующихся под крупнотравьем и характеризующихся темно-серым дерновым черноземовидным горизонтом A, сменяющимся бурым глинистым горизонтом B, т.е. для почв, в которых сочетается буроземный процесс с дерновым. По номенклатуре сахалинских почвоведов это лугово-дерновая почва.

721. ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // sod-gley soil//sol gley gazonné // Rasengleyboden - 1) термин для почв с профилем AG, формирующихся в гидроморфных условиях депрессий; син.: перегнойно-глеевая п., гумусо-глеевая п., лугово-глеевая п., глей;
2) термин русск.шк. (1967) для типа почв с профилем A-B-C, формирующихся на слабодренированных равнинах и пониженных элементах рельефа на карбонатных породах под хвойными и смешанными лесами с мохово-травяным и травяным покровом; это оглеенные варианты дерновых (литогенных) почв.

722. ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА С ОСВЕТЛЕННЫМ ГОРИЗО́НТОМ //sod-gley soil with bleached horizon //sol gley gazonné à horizon décoloré // Rasengleyboden mit Bleichhorisont - термин Д.Ф.Маймусова (1972) для заболоченных почв склонов низин Смоленской области, имеющих в профиле осветленный горизонт, сформированный в результате временного поверхностного переувлажнения верховодной, в пределах сильно дифференцированного по механическому составу профиля. Син.: подбел луговый, подбел пойменный, дерново-глеевая псевдооподзоленная п., псевдоглей.

723. ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //calcáreous sod-gley soil //sol gley gazonné calcaire //Kalkrasengleyboden - термин русск.шк. (1967) для рода дерново-глеевых почв, вскипающих от HCl с поверхности.

724. ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ МА́ЛОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //low-humus sod-gley soil //sol gley gazonné peu humifère //humusarmer Rasengleyboden - термин русск.шк. (1967) для вида дерново-глеевых почв, содержащих менее 3% гумуса в горизонте A_1.

725. ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ МНО́ГОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //high-humus sod-gley soil //sol gley gazonné riche en humus //humusreich Rasengleyboden - термин русск.шк. (1967) для вида дерново-глеевых почв, содержащих 5-12% гумуса в горизонте A_1.

726. ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ НАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА //saturated sod-gley soil // sol gley gazonné saturé //gesättigter Rasengleyboden - термин русск.шк. (1967) для рода дерново-глеевых почв, вскипающих от HCl под гумусовым горизонтом, имеющим в гумусовом горизонте pH 5,5-6,5 и насыщенность основаниями около 90%.

727. ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //podzolized sod-gley soil //sol gley gazonné podzolisé //podsolierter Rasengleyboden - термин русск.шк. (1967) для рода дерново-глеевых почв, имеющих слабые признаки оподзоленности в виде белесых пятен в нижней части гумусового горизонта при аналитически выявляемой дифференциации профиля по илу и R_2O_3.

728. ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПСЕ́ВДООПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //pseudopodzolized sod-gley soil //sol gley gazonné pseudopodzolisé //pseudopodsolierter Rasengleyboden - термин Ю.А.Ливеровского (1967) для заболоченных почв депрессий южной тайги, имеющих в профиле осветленный горизонт на контакте с подстилающей породой или в пределах сильно дифференцированного по механическому составу

профиля, сформированный в результате временного переувлажнения верховодкой. Син.: псевдоглей, подбел луговый, подбел пойменный, дерново-глеевая почва с осветленным горизонтом.

729. ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ СРЕ́ДНЕГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА // medium humic sod-gley soil // sol gley gazonné moderée én humus // mässig-humus Rasengleyboden - термин русск.шк. (1967) для вида дерново-глеевых почв, содержащих 3-5% гумуса в горизонте A_1.

730. ДЕРНО́ВО-ГРУ́БОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА // raw-humic sod soil // sol gazonné à humus brut // Rohhumusrasenboden - термин для дерновых почв субполярных травянистых лесов, характеризующихся малой мощностью, высокой гумусированностью и грубым слабо разложившимся фульфатным органическим веществом.

731. ДЕРНО́ВО-ГРУНТО́ВО-ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА // ground water gleyic sod soil // sol gazonné gleyique à eau de fond // grundwassergleyischer Rasenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа дерново-глеевых почв, имеющих признаки оглеения в нижней части профиля в результате грунтового заболачивания, что дает профиль A-B*g*-C*g*.

732. ДЕРНО́ВО-КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА // sod carbonate soil, humic carbonated soil // sol carbonaté humique // Humuskarbonatboden - термин русск.шк. (1967) для типа почв с профилем AC или A(B)C, формирующихся на карбонатных породах в лесной зоне умеренного пояса; почвы имеют хорошо развитый гумусовый горизонт, нейтральную или слабо кислую реакцию в верхней части профиля, иногда под горизонтом A слабо выраженный переходный к породе горизонт B бурого цвета.

733. ДЕРНО́ВО-КАРБОНА́ТНАЯ ВЫ́ЩЕЛОЧЕННАЯ ПО́ЧВА // leached humic carbonated soil // sol carbonaté humique lévigé // ausgelaugter Humuskarbonatboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа дерново-карбонатных почв на выветрелом мощном элюво-делювии карбонатных пород; профиль ABC достигает мощности 60-100 см; горизонт A сильно гумусирован, мощностью 20-30 см; горизонт B бурый, уплотнен, оглинен; вскипание от HCl в горизонте B; реакция в гумусовом горизонте слабокислая (pH 5,5-6,5).

734. ДЕРНО́ВО-КАРБОНА́ТНАЯ МА́ЛОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА // low-humus humic carbonated soil // sol carbonaté humique peu humifère // humusarmer Humuskarbonatboden - термин русск.шк. (1967) для вида дерново-карбонатных почв, содержащих менее 3% гумуса в горизонте A_1.

735. ДЕРНО́ВО-КАРБОНА́ТНАЯ МА́ЛОМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //shallow humic carbonated soil //sol carbonaté humique mince // dünner Humuskarbonatboden - термин русск.шк. (1967) для вида дерново-карбонатных почв, имеющих мощность гумусового горизонта менее 15 см.

736. ДЕРНО́ВО-КАРБОНА́ТНАЯ МНО́ГОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА // high-humus' humic carbonated soil //sol carbonaté humique riche en humus // humusreich Humuskarbonatboden - термин русск.шк. (1967) для вида дерново-карбонатных почв, содержащих 5-12% гумуса в горизонте A_1.

737. ДЕРНО́ВО-КАРБОНА́ТНАЯ МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //deep humic carbonated soil //sol carbonaté humique profond // tiefer Humuskarbonatboden - термин русск.шк. (1967) для вида дерново-карбонатных почв, имеющих мощность гумусового горизонта более 30 см.

738. ДЕРНО́ВО-КАРБОНА́ТНАЯ ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА // podzolized humic carbonated soil //sol carbonaté humique podzolisé // podsolierter Humuskarbonatboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа дерново-карбонатных почв, имеющих признаки оподзоленности, морфологически проявляющиеся в осветлении нижней части гумусового горизонта, присутствии белесой присыпки, большой распыленности гумусового горизонта, отчетливом уплотнении верхней части горизонта В; аналитически оподзоленность выявляется в обеднении верхней части профиля илом и полуторными окислами.

739. ДЕРНО́ВО-КАРБОНА́ТНАЯ ПЕРЕГНО́ЙНАЯ ПО́ЧВА // muck humic carbonated soil // sol carbonaté humique de muck // Muckhumuskarbonatboden - термин русск.шк. (1967) для вида дерново-карбонатных почв, содержащих бо́лее 12% гумуса в горизонте A_1.

740. ДЕРНО́ВО-КАРБОНА́ТНАЯ СРЕ́ДНЕГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА // medium-humus humic carbonated soil //sol carbonaté humique moderée en humus // mässig-humus Humuskarbonatboden - термин русск.шк. (1967) для вида дерново-карбонатных почв, содержащих 3-5% гумуса в горизонте A_1.

741. ДЕРНО́ВО-КАРБОНА́ТНАЯ СРЕ́ДНЕМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА // semi-deep humic carbonated soil //sol carbonaté humique semi-profond// halbtiefer Humuskarbonatboden - термин русск.шк. (1967) для вида дерново-карбонатных почв, имеющих мощность гумусового горизонта 15-30 см.

742. ДЕРНО́ВО-КАРБОНА́ТНАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // typic humic carbonated soil //sol carbonaté humique typique // typischer Humuskarbo-

natboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа дерново-карбонатных почв на слабо выветрелом маломощном элювии известковистых пород; профиль АС слабо развит, маломощный (30-50 см), щебнистый; вскипание от HCl с поверхности или в пределах горизонта А; емкость поглощения 40-55 мэкв/100 г, реакция нейтральная (pH 6,5-7,5).

743. ДЕРНО́ВО-ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА - см. Пойменная дерново-луговая п.

744. ДЕРНО́ВО-ПА́ЛЕВОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА // straw-yellow derno-podzolic soil // sol paille derno-podzolique // strohgelbfarbener dernopodsoliger Boden - термин русск.шк. для дерново-подзолистых почв разной степени оподзоленности, характерных для западных районов СССР, отличающихся буроватой окраской горизонта A_1 или $A_п$ и буроватой или палевой окраской верхней части подзолистого горизонта A_2.

745. ДЕРНО́ВО-ПОВЕ́РХНОСТНО-ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА // sod-surface-gleyic soil, surface gleyic sod soil //sol gazonné gleyique superficiel //oberflachen gleyischer Rasenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа дерново-глеевых почв, имеющих признаки оглеения в верхнем гумусовом горизонте в результате периодического поверхностного переувлажнения, что дает профиль A_g-B-C.

746. ДЕРНО́ВО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //derno-podzolic soil, sod-podzolic soil //sol derno-podzolique //derno-podsoliger Boden, Dernopodsol - 1) термин Н.М.Сибирцева (1895) для подзолистых почв, имеющих гумусоаккумулятивный горизонт A_1 над подзолистым горизонтом A_2; 2) термин русск.шк. для подтипа подзолистых почв, имеющих профиль (A_0)-A_1-A_2-B-C или в случае пахотных почв $A_п$-A_2-B-C; 3) термин франц.шк. (1967) для группы брюнифицированных континентально-умеренных почв, имеющих мюлль-модеровый богатый гумусом горизонт A_1, ясно выраженный серый горизонт A_2, не глубоко проникающий в текстурный горизонт B.

747. ДЕРНО́ВО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ВЫСОКОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА // high-humus derno-podzolic soil // sol derno-podzolique riche en humus // humusreich derno-podsoliger Boden - термин русск.шк. для вида дерново-подзолистых почв, содержащих более 5% гумуса на целине и более 4% на пашне в горизонте A_1 или $A_п$.

748. ДЕРНО́ВО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ГРУНТО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // ground water gley derno-podzolic soil // sol derno-podzolique gley à eau de fond // grundwassergley dernopodsoliger Boden - термин русск.шк.

(1967) для подтипа болотно-подзолистых почв с профилем A_0-A_1-A_2-B_g-C_g, сильно оглеенных в нижней части профиля в результате грунтового заболачивания.

749. ДЕРНО́ВО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПА́ЛЕВАЯ ПО́ЧВА - см. Дерново-палевоподзолистая п.

750. ДЕРНО́ВО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПОВЕ́РХНОСТНО-ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //surface gleyic derno-podzolic soil//sol derno-podzolique gleyique superficiel//oberflachen gleyischer derno-podsoliger Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа болотно-подзолистых почв с профилем A_0-A_{1g}-A_{2g}-B_g-C, оглеенных в верхней части профиля в результате поверхностного заболачивания.

751. ДЕРНО́ВО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ СЛА́БОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА // low-humus derno-podzolic soil//sol derno-podzolique peu humifère//humusarmer derno-podsoliger Boden - термин русск.шк. для вида дерново-подзолистых почв, содержащих менее 3% гумуса на целине и менее 2% на пашне в горизонте A_1 или $A_П$.

752. ДЕРНО́ВО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ СРЕ́ДНЕГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА // medium-humus derno-podzolic soil//sol derno-podzolique moderée en humus//mässig-humus derno-podsoliger Boden - термин русск.шк. для вида дерново-подзолистых почв, содержащих 3-5% гумуса на целине и 2-4% на пашне в горизонте A_1 или $A_П$.

753. ДЕРНО́ВО-ПОДЗО́ЛИСТО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // derno-podzolic gleyed soil //sol derno-podzolique en gley // derno-podsoliger gleyartiger Boden - термин для почв с профилем A_1-A_2-G-C или A_1-A_2-B-G-C, относящихся к группе подзолисто-болотных почв и представляющих собой первую стадию грунтового заболачивания дерново-подзолистых почв.

754. ДЕРНО́ВО-СИ́ЛЬНОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА // derno-strongly-podzolic soil //sol derno-podzolique forte//stark podsoliger Dernopodsol - термин русск.шк. для вида дерново-подзолистых почв, подзолистый горизонт A_2 которых превышает по мощности гумусоаккумулятивный горизонт A_1; в пахотных почвах подзолистый горизонт может иметь меньшую мощность, но его нижняя граница должна быть глубже 30 см.

755. ДЕРНО́ВО-СКРЫ́ТОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА // derno-cryptopodzolic soil// sol derno-cryptopodzolique // Dernokryptopodsol - термин русск.шк. для вида дерново-подзолистых почв, не имеющих в профиле морфологически выраженного подзолистого горизонта A_2 под гори-

зонтом A_1, но аналитически характеризующихся дифференциацией глины и R_2O_3 по типу подзолистого профиля.

756. ДЕРНО́ВО-СЛА́БОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА // derno-slightly-podzolic soil // sol derno-podzolique faible // schwach podsoliger Dernopodsol - термин русск.шк. для вида дерново-подзолистых почв, подзолистый горизонт которых A_2 выражен отдельными пятнами под горизонтом A_1; в случае пахотных почв подзолистый горизонт отсутствует полностью, но в пахотном горизонте присутствуют мелкие белёсые редко разбросанные пятна остатка A_2.

757. ДЕРНО́ВО-СРЕ́ДНЕПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА // derno-moderately-podzolic soil // sol derno-podzolique modérée // mässig podsoliger Dernopodsol - термин русск.шк. для вида дерново-подзолистых почв, у которых мощность сплошного горизонта A_2 меньше мощности горизонта A_1; в пахотных почвах горизонт A_2 может быть не сплошной, а представлен отдельными пятнами, но его нижняя граница должна быть выше 30 см.

758. ДЕТРИ́Т ПУСТЫ́ННЫЙ - см. Пустынный детрит.

759. ДИЛЮВИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // diluvial soil // dépôt du diluvium // Diluvialboden, Diluvialablagerung (от лат. diluvium - потоп) - термин, иногда употребляемый для обозначения сборной группы почв на дилювиальных (устаревшее название для плейстоценовых (нижнечетвертичных) отложений) почвообразующих породах.

760. ДИ́СТРАНДЕ́ПТ //dystrandept // dystrandept // Dystrandept (от греч. dystrophic - бесплодный, яп. an - темный, яп. do - почва и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы андептов (см.), которые: 1) имеют темный[x)] или светлый[x)] верхний горизонт и тиксотропны в каком-либо горизонте либо имеют влагоемкость более 20% при 15 барах в среднем для почвы между 25 и 100 см; 2) имеют температуру почвы теплее, чем криандепты (см.); 3) не имеют глин, переходящих при дегидратации необратимо в агрегаты размера гравия; 4) не имеют дуripзна[x)]. В пределах этой группы выделяются 5 подгрупп почв: 1) типичные дистрандепты (typic), 2) энтовые дистрандепты (entic), 3) водные дистрандепты (hydric), 4) водные маломощные дистрандепты (hydric lithic) и 5) окисные дистрандепты (oxic).

761. ДИ́СТРОПЕ́ПТ //dystropept // dystropept // Dystropept (от греч. dystrophic - бесплодный, греч. tropikos - круг поворота и по-

рядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы тропептов (см), которые имеют среднегодовую температуру выше 22°С и насыщенность основаниями менее 50% в какой-либо части верхнего или камбиевого[x)] горизонтов. В пределах этой группы выделяются 8 подгрупп: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные маломощные (aquic lithic), 3) энтовые (entic), 4) фловентовые (fluventic), 5) фловентовые окисные (fluventic oxic), 6) маломощные (lithic), 7) окисные (oxic) и 8) трещиноватые (vertic) дистропепты.

762. ДИСТРОХРЕПТ // dystrochrept // dystrochrept // Dystrochrept (от греч. dystrophic - бесплодный, греч. ochros - светлый и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы охрептов (см.), которые: 1) не имеют карбонатов в камбиевом[x)] или С горизонте профиля; 2) имеют насыщенность основаниями менее 60% во всех подгоризонтах в пределах 75 см от поверхности; 3) не пересыхают на столь долго как 3 кумулятивных месяца в большинство лет в каком-либо подгоризонте между 18 и 50 см или выше контакте с плотной породой, если он выше 50 см, и не пересыхают на столь долго как 2 последовательных месяца в 7 из 10 лет на этой глубине; 4) не имеют фраджипэна[x)] и дурипэна[x)] в пределах 1 м от поверхности; 5) имеют среднегодовую температуру почвы выше 8°С или среднелетнюю температуру на глубине 50 см или на контакте с плотной породой выше 15°С, если распаханы или не имеют горизонта A_O, или выше 8°С, если имеют A_O. В пределах этой группы выделяются 14 подгрупп: 1) типичные (typic), 2) вулканические (andic), 3) вулканические гидроморфные (andic aquic), 4) вулканические темные (andic umbric), 5) гидроморфные (aquic), 6) гидроморфные фловентные (aquic fluventic), 7) фловентные (fluventic), 8) фловентные темные (fluventic umbric), 9) маломощные (lithic), 10) маломощные комплексно-альфовые (lithic ruptic-alfic), 11) маломощные комплексно-ультовые (lithic ruptic-ultic), 12) комплексно-альфовые (ruptic-alfic), 13) комплексно-ультовые (ruptic-ultic) и 14) темные (umbric).

763. ДРЕНИРОВАННАЯ ПОЧВА // drained soil // sol asséché, sol drainé // trockengelegter Boden (от французск. drainage - отвод избыточных вод) - 1) термин для почв, искусственно дренированных, осушенных с помощью инженерных дренажных сооружений; син.: осушенная почва; 2) термин для почв, естественно формирующихся в условиях свободного оттока воды вследствие хорошей водопро-

нищаемости почвенно-грунтовой толщи и отсутствия избыточного прихода воды.

764. ДУРАКВАЛЬФ //duraqualf //duraqualf //Duraqualf (от лат. durus - твердый, лат. aqua - вода и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквальфов (см.), которые имеют дурипэн[x)] ниже аргиллового горизонта.

765. ДУРАКВОД //duraquod //duraquod //Duraquod (от лат. durus - твердый, лат. aqua - вода и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы акводов (см.), которые имеют белёсый горизонт, который по крайней мере в каком-либо подгоризонте достаточно сильно сцементирован или уплотнен, так что сухой фрагмент его не распадается при погружении в воду; почвенная температура у них выше, чем у криакводов (см.).

766. ДУРАКВОЛЛЬ //duraquoll //duraquoll //Duraquoll (от лат. durus - твердый, лат. aqua - вода и порядкового корня oll для молисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы акволлей (см.), которые имеют дурипэн[x)] в пределах 1 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются три подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) глинисто-иллювиальные (argic) и 3) натриевые (natric) дуракволли.

767. ДУРАНДЕПТ //durandept //durandept //Durandept (от лат. durus - твердый, яп. an - темный, яп. do - почва и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы андертов (см.), которые: 1) имеют дурипэн[x)] в пределах 1 м от поверхности, 2) имеют температуру почвы теплее, чем криандепты (см.), 3) не имеют глин, переходящих при дегидратации необратимо в агрегаты размера гравия.

768. ДУРАРГИД //durargid //durargid //Durargid (от лат. durus - твердый, лат. argilla - белая глина и порядкового корня id для аридисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аргидов (см.), которые 1) имеют дурипэн[x)] ниже аргиллового[x)] горизонта либо ниже призматического или глыбистого натриевого[x)] горизонта, а верхняя граница дурипэна в пределах 1 м от поверхности; 2) не имеют петрокальциевого[x)] горизонта в пределах 1 м от поверхности. Среди почв этой группы выделяются 6 почвенных подгрупп: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) нормальные (haplic), 4) нормальные мол-

левые (haplic mollic), 5) моллевые (mollic) и 6) моллевые древние (mollic paleic) дураргиды.

769. ДУ́РИКСЕРА́ЛЬФ //durixeralf //durixeralf //Durixeralf (от лат. durus - твердый, греч. xeros - сухой и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ксеральфов (см.), которые: 1) имеют дурипэн[x)] под аргиллювым[x)] или натриевым[x)] горизонтом, но в пределах 1 м от поверхности; 2) не имеют сплошного плинтита[x)] в пределах 1,25 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 9 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) резко дифференцированные (abruptic), 3) резко дифференцированные гидроморфные (abruptic aquic), 4) резко дифференцированные нормальные (abruptic haplic), 5) гидроморфные (aquic), 6) гидроморфные нормальные (aquic haplic), 7) нормальные (haplic), 8) натриевые (natric) и 9) трещиноватые (vertic) дуриксеральфы.

770. ДУ́РИКСЕРО́ЛЛЬ //durixeroll //durixeroll //Durixeroll (от лат. durus - твердый, греч. xeros - сухой и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ксероллей (см.), которые имеют дурипэн[x)] в пределах 1 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 6 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2)резко дифференцированные (abruptic), 3) гидроморфные (aquic), 4) глинисто-иллювиальные, 5) энтовые (entic) и 6) нормальные (haplic) дуриксероллъ.

771. ДУ́РИПЭН //duripan //duripan //Duripan (от лат. durus - твердый и англ. pan - твердая прослойка) - термин американской школы для внутрипочвенных прослоев, сцементированных до такой степени, что сухие фрагменты не распадаются в воде; кремневые натёки, нерастворимые в кислоте, но растворимые в концентрированной щелочи или при чередовании кислотной и щелочной обработки, присутствуют в некоторых порах или на гранях структурных отдельностей, либо около 20% объема слоя составляют кремневые конкреции (durinodes); цементация не разрушается при погружении в кислоту для более чем половины присутствующих натёков или иных новообразований слоя, но полностью разрушается концентрированной натриевой щелочью либо при попеременной щелочно-кислотной обработке.

772. ДУРИПЭНОВАЯ ПО́ЧВА //duric soil //sol durique //durischer Boden (от лат. durus - твердый и англ. pan - твердая прослойка) -

термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, содержащих в профиле слой дурипэна[x] (см.) в пределах 100 см от поверхности.

773. ДУ́РОРТИД //durorthid //durorthid //Durorthid (от лат. durus - твердый, греч. orthos - настоящий и порядкового корня id для аридисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортидов (см.), которые: 1) имеют дурипэн[x] с верхней границей в пределах 1 м от поверхности и либо с, либо без камбиевого[x] горизонта; 2) не имеют петрокальциевого[x] горизонта в пределах 1 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 10 подгрупп: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) аквентовые (aquentic), 4) дуриксероллевые (durixerollic), 5) дурустоллевые (durustollic), 6) энтовые (entic), 7) энтовые моллевые (entic mollic), 8) гаплоксероллевые (haploxerollic), 9) гаплустоллевые (haplustollic) и 10) моллевые (mollic) дурортиды.

774. ДУ́РОХРЕ́ПТ //durochrept //durochrept// Durochrept (от лат. durus - твердый, греч. ochros - светлый и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы охрептов (см.), которые: 1) имеют дурипэн[x] в пределах 1 м от поверхности и 2) не имеют фраджипэна[x]. В пределах этой группы выделяются две подгруппы: 1) типичные дурохрепты (typic) и нормальные дурохрепты (haplic).

775. ДУ́РУСТА́ЛЬФ //durustalf //durustalf //Durustalf (от лат. durus - твердый, лат. ustus - обожженный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устальфов (см.), которые имеют дурипэн[x] в пределах 1 м от поверхности; в пределах этой большой почвенной группы выделяются три подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) нормальные (haplic) и 3) натриевые (natric) дурустальфы.

776. ДУ́РУСТО́ЛЛЬ //durustoll //durustoll //Durustoll (от лат. durus - твердый, лат, ustus - обожженный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устоллей (см.), которые имеют дурипэн[x] в пределах 1 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 5 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) глинисто-иллювиальные (argic), 4) энтовые (entic) и 5) нормальные (haplic) дурустоллы.

777. ДЮ́ННАЯ ПО́ЧВА //dune soil// sol dunaire // Dünenboden (от нем. Düne) - термин для почв, формирующихся на песчаных холмах,

нанесенных ветром (дюнах, барханах); почвы первых стадий формирования, ещё не имеющие развитого профиля.

778. ДЮННЫЙ ПЕСОК //dune sand //sable dunaire //Dünensand (от нем. Düne) - песчаные холмы, нанесенные ветром, образующиеся на поверхности пустынь, побережий морей, рек, озер, покрытой незакрепленными растительностью массами песка. Син.: барханный песок (в русск.литературе только для пустынных образований).

779. ДЫЙ //dy //dy //Dy (от шведск.dy - болотный ил) - термин немецкой школы для богатых органическим веществом бурых подводных почв болотного происхождения, обычно при зарастании берегов озер.

780. ЕРМА //yerma //yerma //Yerma (от исп. yermo - пустыня) - термин Кубиены для пустынных почв, не имеющих развитого профиля. Син.: пустынная п.

781. ЕРМОСОЛЬ //yermosol //yermosol //Yermosol (от исп. yermo - пустыня и лат. solum - почва) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для пустынных почв, характеризующихся наличием слабо развитого светлого[x] горизонта А, при одновременном, возможно, присутствии очень слабо выраженных иных горизонтов в профиле.

782. ЕРМОСОЛЬ ГИПСОВАЯ //gypsic yermosol //yermosol gypsique //gipsischer Yermosol (от исп. yermo - пустыня, лат. solum - почва и лат. gypsum - гипс) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв пустынь, имеющих, если вообще, только слабо развитый светлый[x] горизонт А, гипсовый[x] горизонт в пределах 100 см от поверхности и, возможно, камбиевый[x] горизонт В, проводимость насыщенного экстракта при 25°С в каком-либо горизонте более 2 mmhos /см (но менее 16) и/или обнаруживающих увеличение с глубиной содержания обменных Na и K в пределах 125 см от поверхности.

783. ЕРМОСОЛЬ ИЗВЕСТКОВАЯ //calcic yermosol //yermosol calcique //kalkischer Yermosol (от исп. yermo - пустыня, лат. solum - почва и лат. calx - известь) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв пустынь, имеющих, если вообще, только слабо развитый светлый[x] горизонт А, кальциевый[x] горизонт в пределах 100 см от поверхности и, возможно, камбиевый[x] горизонт В, проводимость насыщенного экстракта при 25°С в каком-либо горизонте более 2 mmhos /см (но менее 16) и/или

обнаруживающих увеличение с глубиной содержания обменных Na и K в пределах 125 см от поверхности; обычно эти почвы карбонатны по всему профилю.

784. ЕРМОСОЛЬ ЛЮВИКОВАЯ // luvic yermosol // yermosol luvique // luvischer Yermosol (от исп. yermo - пустыня, лат. solum - почва и лат. luo - вымывать) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв пустынь, имеющих слабо развитый светлый[x)] горизонт A, не твердеющий при высыхании, и аргиллювый[x)] горизонт B, а также в каком-либо горизонте проводимость насыщенного экстракта при 25°C более 2 mmhos /см (но менее 16) и/или обнаруживающих увеличение с глубиной содержания обменных Na и K в пределах 125 см от поверхности.

785. ЕРМОСОЛЬ НОРМАЛЬНАЯ //haplic yermosol //yermosol haplique // haplischer Yermosol (от исп. yermo - пустыня, лат. solum - почва и греч. haplous - простой) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв пустынь, имеющих, если вообще, только слабо развитый светлый[x)] горизонт A и, возможно, камбиевый[x)] горизонт; имеющих в каком-либо горизонте проводимость насыщенного экстракта при 25°C более 2 mmhos /см (но менее 16) и/или обнаруживающих увеличение с глубиной содержания обменных Na и K в пределах 125 см от поверхности.

786. ЕРМОСОЛЬ ТАКЫРОВАЯ // takyric yermosol //yermosol takyrique // takyrischer Yermosol (от исп. yermo - пустыня, лат. solum - почва и тюрк. такыр) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв пустынь, имеющих полигонально растрескавшуюся отслаивающуюся корочку в поверхностной части очень слабо развитого светлого[x)] горизонта A и, возможно, камбиевый[x)] горизонт B, имеющих проводимость насыщенного экстракта при 25°C в каком-либо из горизонтов более 2 mmhos /см (но менее 16) и/или обнаруживающих увеличение обменных Na и K с глубиной в пределах 125 см от поверхности.

787. ЖЕЛЕЗИСТАЯ КИРАСА //ferruginous quirasse // cuirasse ferrugineuse //eisenhaltiger Kruste, Eisenkruste - см. Железистая кора.

788. ЖЕЛЕЗИСТАЯ КОРА // ferruginous crust // croûte ferrugineuse // eisenhaltiger Kruste, Eisenkruste - термин для внутрипочвенных образований, состоящих преимущественно из окислов железа (сцементированные конкреции или прослои), залегающих либо на поверхности почвы или на небольшой глубине и имеющих мощность

до нескольких метров; большей частью это обнаженный эрозией латерит. Син.: железистый панцырь, железистая кираса, кираса.

789. ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА //ferruginous tropical soil // sol ferrugineuse tropicale //Troppeneisenboden - термин французск.шк. (1965,1967) для подкласса почв, входящих в класс почв с полутораокисями железа, характеризующихся выделением гидроокислов железа с образованием яркой окраски почвы, отсутствием гиббсита, отношением $SiO_2:Al_2O_3$ выше 2, профилем A(B)C, ABC или AB_gC, красноватой окраской горизонта B или (B), массивной структурой горизонтов A и B, средней ненасыщенностью глинистого комплекса в горизонте B (степень насыщенности 50-65%), каолинитово-иллитовым составом ила, слабой гумусированностью.

790. ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //lessive ferruginous tropical soil //sol ferrugineuse tropicale lessivé // Lessive Troppeneisenboden - термин франц.шк. (1967) для группы железистых тропических почв, в профиле которых выделяется лессивированный осветленный горизонт, глинисто-иллювиальный горизонт с аккумуляцией железа, причем абсолютная разница в содержании ила между горизонтами A и B более 5%, соответствующая индексу лессивирования менее 1,4; горизонт A более 15 см или более 1/3 всего профиля.

791. ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ КОНКРЕЦИО́ННАЯ ПО́ЧВА // concretionary lessive ferruginous tropical soil // sol ferrugineuse tropicale lessivé à concrétions // Lessive Troppeneisenboden mit Konkretionen - термин франц.шк. (1967) для подгруппы железистых тропических лессивированных почв, имеющих в профиле горизонт железистых конкреций.

792. ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ПСЕ́ВДОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // pseudogleyic lessive ferruginous tropical soil //sol ferrugineuse tropicale lessivé à pseudogley//Pseudogley-Lessive Troppeneisenboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы железистых тропических лессивированных почв (см.), имеющих в профиле псевдоглеевый горизонт.

793. ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // typical lessive ferruginous tropical soil //sol ferrugineuse tropicale lessivé modal // typischer Lessive Troppeneisenboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы железистых тропических лессивированных почв (см.), не имеющих в профиле конкреционно-

го, цементированного или псевдоглеевого горизонта.

794. ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ЦЕМЕНТИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //indurated lessive ferruginous tropical soil //sol ferrugineuse tropicale lessivé induré //verhärter Lessive Troppeneisenboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы железистых тропических лессивированных почв (см.), имеющих в профиле цементированный железом горизонт.

795. ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ОБЕДНЁННАЯ ПО́ЧВА //impoverished ferruginous tropical soil //sol ferrugineuse tropicale appauvri //ausgemagerter Troppeneisenboden - термин франц.шк. (1967) для группы железистых тропических почв, имеющих такое же различие в содержании ила между А и В как и между В и С при отсутствии глинистых корочек в В.

796. ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ОБЕДНЁННАЯ ПСЕ́ВДОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //pseudogleyic impoverished ferruginous tropical soil //sol ferrugineuse tropicale appauvri à pseudogley //ausgemagerter Pseudogley-Troppeneisenboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы железистых тропических обедненных почв (см.), имеющих в профиле псевдоглеевый горизонт.

797. ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ОБЕДНЁННАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical impoverished ferruginous tropical soil //sol ferrugineuse tropicale appauvri modal //typischer ausgemagerter Troppeneisenboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы железистых тропических обедненных почв (см.), не имеющих в профиле псевдоглеевого горизонта.

798. ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ СЛА́БО ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //weakly lessivied ferruginous tropical soil //sol ferrugineuse tropicale peu lessivé //schwach lessivierter Troppeneisenboden - термин франц.шк. (1965,1967) для группы железистых тропических почв, у которых горизонт А менее 15 см и/или менее 1/3 всего профиля, а абсолютная разница в содержании ила между горизонтами А и В менее 5%; индекс лессивированности равен 1,4.

799. ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ СЛА́БО ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ НАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА //saturated weakly lessivied ferruginous tropical soil //sol ferrugineuse tropicale peu lessivé à complexe saturé //gesättigter schwache lessivierter Troppeneisenboden - термин французск.шк. (1967) для подгруппы железистых тропических слабо лессивированных почв (см.), формирующихся на песках (7-8% глины), бедных органическим веществом и почти насыщенных.

800. ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ СЛА́БО ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ПСЕ́ВДОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //pseudogleyic weakly lessivied ferruginous tropical soil //sol ferrugineuse tropicale peu lessivé à pseudogley // schwach lessivierter Pseudogley-Troppeneisenboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы железистых тропических слабо лессивированных почв (см.), имеющих псевдоглеевый горизонт в профиле.

801. ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ СЛА́БО ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical weakly lessivied ferruginous tropical soil //sol ferrugineuse tropicale peu lessivé modal //typischer schwach lessivierter Troppeneisenboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы железистых тропических слабо лессивированных почв (см.), формирующихся не на песках, не имеющих псевдоглея и не трещиноватых.

802. ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ СЛА́БО ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ТРЕЩИНОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //vertic wekly lessivied ferruginous tropical soil //sol ferrugineuse tropicale peu lessivé vertique //vertischer schwach lessivierter Troppeneisenboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы железистых тропических слабо лессивированных почв (см.), имеющих крупную структуру в нижней части профиля.

803. ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ ПА́НЦЫРЬ //ferruginous quirasse, ironstone //cuirasse ferrugineuse //Eisenpanzer - см. Железистая кора.

804. ЖЕ́ЛТО-БУ́РАЯ ПО́ЧВА //yellow-brown soil //sol jaune-brun //gelbbrauner Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа бурых лесных почв Западно-закавказской и Карпатской провинций, переходных по свойствам от бурых лесных почв к желтозёмам; термин предложен И.П.Герасимовым и Ма Юн-чжи (1958) для типа почв, переходных между бурозёмами и желтозёмами в горах Китая.

805. ЖЕ́ЛТО-БУ́РЫЙ СУ́ГЛИНОК //yellow-brown loam //limon jaune-brun //gelbbrauner Lehm - устаревший термин ново-зеландских почвоведов для вулканических пепловых почв (см.).

806. ЖЕЛТОЗЁМ //yellow earth, yellow soil, yellow ground, zheltozem //sol jaune, jeltozem, terre jaune //Gelberde, Gelbboden, Sheltosem, Dscheltosem - термин для лесных почв влажных субтропиков, формирующихся в условиях несколько меньшей дренированности по сравнению с краснозёмами и на более низких уровнях рельефа, преимущественно в нижних частях склонов и на древних террасах; почвы кислые и малогумусные, обладают хорошо диффе-

ренцированным по глине и R_2O_3 профилем, бедны питательными веществами; характерна желтая окраска; в систематике русск.шк. (1967) эти почвы выделяются на правах типа.

807. ЖЕЛТОЗЁМ ВТОРИ́ЧНО-НАСЫ́ЩЕННЫЙ //secondary saturated zheltozem //jeltozem saturé secondaire //sekundär gesättigter Sheltosem - термин для желтозёмов имеющих полную насыщенность основаниями в результате длительного применения удобрений.

808. ЖЕЛТОЗЁМ ГА́ЛЕЧНИКОВЫЙ //shinglic zheltozem //jeltozem galetique //Geröllsheltosem - термин русск.шк. (1967) для рода каменистых (галечниковых) маломощных желтозёмов, формирующихся на древнеаллювиальных галечниковых отложениях.

809. ЖЕЛТОЗЁМ ГЛЕЕВА́ТЫЙ //gleyic zheltozem //jeltozem gleyique //gleyischer Sheltosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа желтозёмов глеевых, имеющих слабое оглеение в нижней части профиля.

810. ЖЕЛТОЗЁМ ГЛЕ́ЕВЫЙ //gley zheltozem //jeltozem à gley //Gleysheltosem - 1) термин русск.шк. (1967) для типа субтропических гидроморфных почв, имеющих профиль и свойства желтозёма, но при наличии глеевого горизонта в той или иной части профиля; 2) термин русск.шк. (1967) для подтипа желтозёмов глеевых, имеющих сильно оглеенный горизонт в нижней части профиля и слабое оглеение в средней и верхней частях.

811. ЖЕЛТОЗЁМ ГЛЕ́ЕВЫЙ ГА́ЛЕЧНИКОВЫЙ //shinglic gley zheltozem //jeltozem galetique à gley //Geröllgleysheltosem - термин русск.шк. (1967) для рода желтозёмов глеевых, имеющих в подгумусовом горизонте галечниковый слой.

812. ЖЕЛТОЗЁМ ГЛЕ́ЕВЫЙ ОБЫ́ЧНЫЙ //ordinary gley zheltozem //jeltozem ordinaire à gley //gewöhnlicher Gleysheltosem - термин русск.шк. (1967) для рода желтозёмов глеевых, формирующихся на мелкоземистых некарбонатных и негалечниковых породах.

813. ЖЕЛТОЗЁМ ГЛЕ́ЕВЫЙ ОПОДЗО́ЛЕННЫЙ //podzolized gley zheltozem //jeltozem podzolisé à gley //podsolierter Gleysheltosem - термин русск.шк. (1967) для желтозёмов глеевых, верхние горизонты которых обеднены илом и R_2O_3.

814. ЖЕЛТОЗЁМ ГЛЕ́ЕВЫЙ ОСТА́ТОЧНО-КАРБОНА́ТНЫЙ //residually calcaric gley zheltozem //jeltozem calcaire residuel à gley //restkalkischer Gleysheltosem - термин русск.шк. (1967) для рода желтозёмов глеевых, формирующихся на карбонатных породах и отли-

чающихся нейтральной реакцией нижних горизонтов и насыщенностью основаниями.

815. ЖЕЛТОЗЁМ ГЛЕЕВЫЙ СЛАБООПОДЗОЛЕННЫЙ //slightly podzolized gley zheltozem //jeltozem peu podzolisé à gley //schwach podsolierter Gleysheltosem - термин русск.шк. (1967) для вида желтозёмов, осветленный оподзоленный горизонт в верхней части которых выражен лишь отдельными пятнами.

816. ЖЕЛТОЗЁМ ГЛЕЕВЫЙ СРЕДНЕОПОДЗОЛЕННЫЙ //moderately podzolized gley zheltozem //jeltozem podzolisé moderée à gley //mässig-podsolierter Gleysheltosem - термин русск.шк. (1967) для вида желтозёмов глеевых, имеющих в верхней части профиля сплошной осветленный оподзоленный горизонт.

817. ЖЕЛТОЗЁМ КОРИЧНЕВЫЙ //cinnamonic yellow earth, cinnamonic zheltozem //sol jaune cinnamomique, jeltozem cinnamomique // zimtfarbener Gelberde, zimtfarbener Sheltosem - термин Акимцева (1926) для желтозёмов Азербайджана, имеющих переходный характер между типичными желтозёмами влажных субтропиков и коричневыми почвами сухих субтропиков.

818. ЖЕЛТОЗЁМ НЕНАСЫЩЕННЫЙ //unsaturated zheltozem //jeltozem non-saturé //ungesättigter Sheltosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа желтозёмов, имеющих степень насыщенности основаниями менее 80% при отсутствии или слабой дифференциации ила по профилю (коэффициент дифференциации ила менее 1,2), высокую емкость катионного обмена (25-35 мэкв/100 г почвы) и кислую реакцию ($pH_{водн}$ менее 5).

819. ЖЕЛТОЗЁМ НЕНАСЫЩЕННЫЙ ОПОДЗОЛЕННЫЙ //podzolized unsaturated zheltozem //jeltozem non-saturé podzolisé//podsolierter ungesättigter Sheltosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа желтозёмов, имеющих степень насыщенности основаниями менее 80%, осветленный слоеватый горизонт в верхней части профиля, уплотненный иллювиальный горизонт, коэффициент дифференциации ила по профилю 1,2-2,0, обеднение илом и R_2O_3 верхней части профиля.

820. ЖЕЛТОЗЁМ НЕПОЛНОРАЗВИТЫЙ //non-complete zheltozem//jeltozem non-complet //nichtgeschlossener Sheltosem - термин русск.шк. (1967) для рода щебнистых маломощных желтозёмов, формирующихся на элювии плотных пород.

821. ЖЕЛТОЗЁМ ОБЫ́ЧНЫЙ //ordinary zheltozem //jeltozem ordinaire // gewöhnlicher Sheltosem - термин русск.шк. (1967) для рода желтозёмов, формирующихся на мощных делювиальных и элювиальных корах выветривания с малой щебнистостью профиля.

822. ЖЕЛТОЗЁМ ОСТА́ТОЧНО-КАРБОНА́ТНЫЙ //residually calcaric zheltozem //jeltozem calcaire residuelle //restkalkarischer Sheltosem - термин русск.шк. (1967) для рода желтозёмов, формирующихся на карбонатных породах и имеющих в нижних горизонтах нейтральную реакцию, полную насыщенность основаниями и повышенную емкость катионного обмена.

823. ЖЕЛТОЗЁМ ПОВЕ́РХНОСТНО-ГЛЕЕВА́ТЫЙ //surfacely gleyic zheltozem //jeltozem gleyique superficiel //oberflachen gleyischer Sheltosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа желтозёмов глеевых, имеющих следы оглеения в верхней части профиля.

824. ЖЕЛТОЗЁМ СЛА́БОНЕНАСЫ́ЩЕННЫЙ //slightly unsaturated zheltozem // jeltozem peu non-saturé //schwach ungesättigter Sheltosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа желтозёмов, имеющих степень насыщенности основаниями более 80, но менее 100%, слабокислую реакцию ($pH_{водн}$ 5-6,5), слабую дифференциацию ила по профилю (коэффициент дифференциации ила менее 1,2).

825. ЖЕЛТОЗЁМ СЛА́БОНЕНАСЫ́ЩЕННЫЙ ОПОДЗО́ЛЕННЫЙ //podzolized slightly unsaturated zheltozem //jeltozem peu non-saturé podzolisé // podsolierter schwach ungesättigter Sheltosem - термин русск. шк. (1967) для подтипа желтозёмов, имеющих степень насыщенности основаниями более 80%, но менее 100%, коэффициент дифференциации ила 1,2-2,0, слабокислую реакцию ($pH_{водн}$ 5-6,5), осветленный и облегченный верхний горизонт, обедненный илом и R_2O_3.

826. ЖЕЛТОЗЁМ СЛА́БООПОДЗО́ЛЕННЫЙ //slightly podzolized zheltozem // jeltozem peu podzolisé //schwach podsolierter Sheltosem - термин русск.шк. (1967) для вида ненасыщенных и слабоненасыщенных оподзоленных желтозёмов, в профиле которых оподзоленный горизонт A_1A_2 выражен отдельными осветленными пятнами.

827. ЖЕЛТОЗЁМ СРЕ́ДНЕОПОДЗО́ЛЕННЫЙ //moderately podzolized zheltozem //jeltozem podzolisé moderée //mässig-podsolierter Sheltosem - термин русск.шк. (1967) для вида ненасыщенных и слабоненасыщенных оподзоленных желтозёмов, в профиле которых оподзоленный горизонт A_1A_2 выражен сплошным осветленным и облегченным по механическому составу подгоризонтом.

828. ЖЕЛТОЗЁМНО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //zheltozem-podzolic soil //sol jeltozem-podzolique //Sheltosem-Podsolboden - устаревший термин А.А.Завалишина (Р.В.Ковалёва) для подзолисто-желтозёмных почв (см.) СССР.

829. ЖЕЛТОЗЁМНО-ПОДЗО́ЛИСТО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //zheltozem-podzolic-gley soil //sol jeltozemique-podzolique à gley //Sheltosempodsolgleyboden - термин Л.И.Прасолова, И.Н.Антипова-Каратаева, А.А.Завалишина, Р.В.Ковалева для подзолисто-желтозёмно-глеевых почв (см.).

830. ЖЕ́ЛТО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СУ́БТРОПИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА //yellow-cinnamonic subtropical soil //sol jaune-cinnamom subtropical //subtropischer gelbzimtfarbener Boden - термин для лесных почв районов полувлажного субтропического климата, переходных от желтозёмов к коричневым почвам; характеризуются желто-коричневой окраской постепенно светлеющей книзу, тяжелым механическим составом вследствие сильной выветрелости породы, средней гумусированностью (4-6%), слабокислой реакцией в верхней части профиля и нейтральной в нижней , отсутствием карбонатного горизонта; описаны в Китае в междуречье Хуанхэ и Янцзы.

831. ЖЕ́ЛТО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //yellow podzolic soil //sol jaune podzolique //Gelbpodsolboden - 1) термин Краснока для подзолистых почв, имеющих под горизонтом В второй осветленный горизонт, сформированный на контакте с подстилающей более плотной и менее водопроницаемой породой; почва в этом случае имеет сложный профиль A_0-(A_1)-A_2-B-A_2'(G^k)-B^d-D; 2) устаревший термин С.А.Захарова (Л.И.Прасолова, И.Н.Антипова-Каратаева) для подзолисто-желтозёмных почв (см.) субтропических районов СССР.

832. ЖЕ́ЛТО-СЕ́РАЯ ПО́ЧВА //yellow-gray soil //sol jaune-gris //gelbgrauer Boden - термин новозеландск.шк. для дерновых кислых почв влажных субтропических прерий, имеющих в профиле следы предшествующего выщелачивания илистой фракции и поверхностного оглеения, т.е. являющихся вторично-псевдоглеевыми почвами полигенетического характера.

833. ЗАБОЛО́ЧЕННАЯ ПО́ЧВА //wet soil //sol humide //nasser Boden - общеупотребительный термин для разнообразных почв, испытывающих периодическое или постоянное переувлажнение, грунтовое или поверхностное, но не дошедших до стадии болотных почв.

834. ЗАБОЛО́ЧЕННАЯ ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //wet forest soil //sol humide fore-

stiere //nasser Waldboden - устаревший термин немецкой школы для поверхностно переувлажненных почв с мраморовидным горизонтом. Син.: псевдоглей.

835. ЗАБРО́ШЕННАЯ ПО́ЧВА //abandoned soil, abandoned land //terrain abandonné, sol abandonné //verlassener Grund, verlassener Gelände - общеупотребительный термин для почв, долгое время не обрабатываемых вследствие истощения или социальных причин.

836. ЗАВАЛУ́НЕННАЯ ПО́ЧВА //bouldery soil //sol à blocaux erratiques, sol à blocaux //Geschiebeboden, Grobsteinboden (от русск.валун) - почва, содержащая округлые обломки горных пород размером более 10 см (в западно-европейских школах более 7,5 см), окатанные ледниковой деятельностью.

837. ЗА́ЛЕЖНАЯ ПО́ЧВА //brise soil //sol friche //Bracheboden - термин для пахотных почв, долгое время находящихся под перелогом или заброшенных и невозделываемых.

838. ЗАПАДИ́ННАЯ ПО́ЧВА //caving soil //sol de zone d'eboulement //Bruchboden - устаревший термин немецкой школы для сборной группы почв понижений рельефа, имеющих глеевый горизонт. Син.: глей.

839. ЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА //saline soil //sol salin //Salzboden - термин для группы почв, профиль которых в настоящее время формируется под влиянием воднорастворимых солей; включает солончаковатые почвы, солончаки, такыры, солонцы в наиболее широком понимании этого термина; в более узком понимании термин включает только солончаковатые почвы и солончаки; наиболее узкое понимание термина включает только солончаковатые почвы.

840. ЗАСОЛЁННАЯ НА́ТРИЕВАЯ ПО́ЧВА //saline-alkaline soil //sol salin-alcaline //Salznatriumboden - термин немецкой школы для почв, в формировании которых одновременно играют роль засоление и солонцовый процесс. Син.: солончаковато-солонцеватая п., солонец-солончак.

841. ЗАСОЛЁННАЯ ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //salt earth podzol //sol salin podzolisé //Salzpodsolboden - устаревший термин западно-европейских школ. См. Солодь.

842. ЗАСОЛЁННЫЙ ПОДЗО́Л //salt earth podzol, steppe bleached earth //sol salin podzolisé //ausgelaugter Alkaliboden - устаревший термин западно-европейских школ для степных солодей. Син.: Солодь.

843. ЗАСТО́ЙНО-ВЛА́ЖНАЯ ПО́ЧВА //water-logged soil //sol à eau stagnante //Staunässeboden - термин Кубиены (1953) для заболоченных оглеенных почв, делящихся на два типа: псевдоглей и стагноглей.

844. ЗАСУ́ШЛИВАЯ ПО́ЧВА //arid soil //sol aride //Trockenboden - общеупотребительный термин для почв засушливых степных, полупустынных и пустынных районов, характеризующихся недостаточным увлажнением (особенно в вегетационный период), то есть значительным преобладанием испаряемости над осадками.

845. ЗАТОПЛЯ́ЕМАЯ ПО́ЧВА //overflowed soil //sol submergé //Überflutungsboden - термин немецкой школы для сборной группы гидроморфных болотных почв. Син.: гидроморфная п., грунтоводная п., полусухопутная п.

846. ЗАЩИ́ТНАЯ КО́РКА //protective crust //croûte protecteur //schützender Krust - тонкая (от 0,5 до 5 мм) черно-бурая или черная плёнка или корочка на поверхности горных пород (скал, обломков, гальки и т.п.) в пустынях; состоит из окисных соединений железа и марганца, выпадающих из раствора, который поднимается по капиллярам на поверхность при резком изменении температуры породы в течение суток. Син.: пустынный загар.

847. ЗЕМЛЯ́ //earth //terre //Erde - общеупотребительный термин для обозначения почвенного покрова суши земного шара.

848. ЗОНА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //zonal soil //sol zonal //zonaler Boden (гр. zónē - зона, пояс) - термин Н.М.Сибирцева (1895) для типов почв, в которых почвообразовательный процесс и генетические свойства наиболее соответствуют комплексу физико-географических условий определенных природных зон, причем зональные почвы развиваются на равнинных элементах рельефа, в автоморфных условиях, под типичной зональной растительностью и каждой зоне соответствует определенный зональный тип почв.

849. ЗРЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА //mature soil //sol évolué, sol développé //Reifenboden - общеупотребительный термин без точного содержания, относящийся к почвам с полно развитым профилем и находящимся в равновесии с существующей природной растительностью и климатом.

850. ИЗВЕСТКО́ВАЯ КОРА́ //calcareous crust //croûte calcaire //Kalkkruste (от лат. calx - известь) - термин для мощных внутрипочвенных или поверхностных (при разрушении и сносе покровных

слоев) плотных известковых прослоев конкреционного либо массивного строения, введенный в науку немецким геологом О.Фраасом (1867), описавшим их в Сирии и Палестине. Син.: Карбонатная кора, Известковая пустынная кора.

851. ИЗВЕСТНЯКО́ВАЯ ПО́ЧВА // limestone soil//sol calcaire //Kalksteinboden - термин для обозначения сборной группы почв, сформировавшихся на известняках.

852. ИЗОГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //isohumic soil //sol isohumique //Isohumusboden (от гр.isos - равный и лат.humus - гумус, перегной) - термин франц.шк. (1965,1967) для класса почв с профилем A(B)C или ABC, содержащих большое количество сильно гумифицированного органического вещества, прогрессивно уменьшающееся ниже 30 см; горизонт B обычно структурный, но может быть и несколько более глинистым, чем A.

853. ИЗОГУ́МУСОВАЯ НАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА //saturated isohumic soil //sol isohumique à complexe saturé //gesättigter Isohumusboden - термин франц.шк. (1965) для подкласса изогумусовых почв, характеризующихся холодным климатом в зимний период года и повышенной гумусированностью при высокой активности почвенной фауны.

854. ИЗОГУ́МУСОВАЯ ЧАСТИ́ЧНО НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА //partly unsaturated isohumic soil //sol isohumique à complexe partiellement désaturé //mässig ungesättigter Isohumusboden - термин франц.шк. (1965) для подкласса изогумусовых почв, имеющих мелкую полиэдрическую структуру в поверхностном горизонте.

855. И́Л //mud, silt, sludge //vase, boue, bourbe, fange, limon //Mudden, Schlamm, Schlick (от русск. ил) - общеупотребительный термин для богатых органическим веществом и тонкодисперсным минеральным материалом подводных отложений мелководий.

856. ИЛЛИМЕРИЗО́ВАННАЯ ПО́ЧВА //illimerisated soil //sol illimerisé //illimerisierter Boden (от лат. illimo - забрасывать илом) - термин В.М.Фридланда (1958) для почв, дифференциация профиля которых на элювиальную и иллювиальную части явилась результатом нисходящего перемещения илистых частиц без их разрушения; син.: лессивированная п., псевдооподзоленная п.

857. ИЛЛЮВИА́ЛЬНО-ГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //humus-illuvial soil //sol humique illuvial //Humusilluvialboden (от лат. illuo - вымываю и humus - гумус) - термин для почв, в профиле которых имеет место иллювиальная аккумуляция гумуса, вымываемого из верхней

части профиля, в виде темноокрашенного слоя или корочек и потеков.

858. ИЛЛЮВИА́ЛЬНО-ЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ПО́ЧВА //iron-illuvial soil //sol ferrugineux illuvial //Eisenilluvialboden - термин для почв, в профиле которых имеет место иллювиальная аккумуляция окислов железа, вымываемого из верхней части профиля, в виде конкреций, корочек, прослоек, цементированных слоев.

859. ИЛОВА́ТО-БОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА - см. Пойменная иловато-глеевая п.

860. ИЛОВА́ТО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА - см. Пойменная иловато-глеевая п.

861. ИЛОВА́ТО-ТОРФЯ́НАЯ ПО́ЧВА - см. Пойменная иловато-торфяная п.

862. ИЛОВА́ТО-ТОРФЯ́НО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА - см. Пойменная иловато-торфяно-глеевая п.

863. И́ЛОВКА //ylovka //ilovca //Ilovka (от русск. ил) - русский народный термин, введённый в науку Н.М.Сибирцевым (1900) для почв, испытывающих временное поверхностное переувлажнение, которые "при естественном притоке влаги, например весной, должны принимать консистенцию вязкой, илистой, "холодной" массы ("холодные земли"), и при высыхании либо твердеют, либо рассыпаются в порошок, если в них много мелкозернистого песка".

864. ИНСЕ́ПТИСО́ЛЬ //inceptisol //inceptisol //Inceptisol (от лат. inceptum - начало и лат. solum - почва) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для порядка почв, которые не имеют сподового[x)], натриевого[x)] или окисного[x)] горизонтов, если они не погребенные, не имеют сплошного плинтита[x)] в пределах 30 см от поверхности и либо: 1) обычно влажные между 18 и 50 см или выше контакта с плотной породой, которая лежит выше 50 см; не имеют солевого[x)] или гипсового[x)] горизонта в пределах 1 м от поверхности; имеют один или несколько из следующих признаков: а) электропроводность насыщенного экстракта при 25°С менее 2 mmho /см до той границы, которая ниже: контакт с плотной породой или 125 см при песчаном, 90 см - при суглинистом, 75 см - при глинистом мех.составе; и, если нет фраджипэна[x)], с увеличением глубины в горизонте С, но выше глубин, показанных для разного мех.состава, либо обнаруживают отсутствие возрастания насыщенности Na+K либо наличие обменной кислотности, большей, чем Na+K, имеют один или несколько из следующих признаков: (1) камбиевый[x)] или кальциевый горизонт, или оба, (2) фраджипэн[x)], не имеющий глинистых пленок толщиной 1 мм, (3) дури-

пэн[x]) с верхней границей в пределах 1 м от поверхности; б) искусственный дренаж или насыщение водой в какой-либо период года когда не мерзлая почва и либо: (1) торфяный[x]) или темный[x]) горизонт и на глубине менее 50 см или непосредственно под ними горизонт с преобладанием сизых тонов окраски, или (2) светлый[x]) горизонт, подстилаемый не глубже 50 см камбиевым[x]) горизонтом с преобладанием сизой окраски; в) насыщение натрием более 50% в какой-либо части верхнего 50-см слоя, которое падает с глубиной ниже 50 см, а почва насыщена водой в пределах 1 м в какой-то период, либо 2) имеют темный[x]), торфяный[x]) или пахотный[x]) горизонт; либо моллевый[x]) горизонт в сочетании с одним или несколькими из следующих признаков: а) объемный вес мелкозёма менее 0,85 в верхнем или камбиевом[x]) горизонте, или в обоих, а в обменном комплексе преобладает аморфный материал; б) подстилающий камбиевый[x]) горизонт со степенью насыщенности менее 50% на глубине 180 см; в) разница между среднелетней и среднезимней температурами на глубине 50 см или на контакте с породой менее 5°С и: (1) 35% или более глины монтмориллонитового типа, а верхний горизонт лежит на материале с содержанием $CaCO_3$ менее 40%, (2) окраска моллевого горизонта не темнее подстилающих. Этот порядок включает в себя 6 подпорядков: 1) андепты, 2) аквепты, 3) охрепты, 4) плаггепты, 5) тропепты и 6) умбрепты (см.).

865. ИНТРАЗОНА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //intrazonal soil //sol intrazonal //intrazonaler Boden (от лат. intra - внутри и греч. zónē - зона) - термин Н.М.Сибирцева (1895) для почв, образующихся под влиянием общезональных условий, но в специфической местной обстановке (напр. на песчаных, карбонатных или засоленных породах, в условиях избыточного увлажнения и т.п.), обусловливающей их отличие от зональных почв; такие почвы специфичны для каждой зоны.

866. ИСКОПА́ЕМАЯ ПО́ЧВА //fossil soil //sol fossile //fossiler Boden - общеупотребительный термин для древних почв, обычно погребенных более поздними наносами или вышедших на поверхность в результате эрозии; иногда термин употребляется и для почв существующих на поверхности в настоящее время, но сформировавшихся в иных, существовавших в более ранние эпохи условиях и законсервированных в своей эволюции. Син.: палеопочва, палеосоль.

867. ИСКУ́ССТВЕННАЯ ПО́ЧВА //bogus soil, artificial soil //sol artificiel //künstlicher Boden - термин, применяемый для непочвенных сред, использующихся при выращивании растений, напр. гидропоника и т.п.

868. ИСТОЩЁННАЯ ПО́ЧВА - см. Выпаханная п.

869. КАА́МБА, КАХА́МБА //kahamba //kahamba //Kahamba - местное название тёмных слитых трещиноватых глинистых почв типа вертисолей, распространенное в Конго.

870. КАВИ́Р //kawir //kawir //Kawir (от перс. kawir - плоская глинистая трещиноватая поверхность) - термин, принятый немецкой школой от народного иранского названия для такыров и такыровидных почв. Син.: такыр.

871. КАЛИШЕ́ //caliche //caliche //Caliche (от распространенного в Перу и Чили местного названия) - мощные горизонты вторичной аккумуляции извести в пустынных почвах, имеющие сплошной мучнистый рассыпчатый характер.

872. КА́ЛЬЦЕМАГНЕЗИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //calcimagnesial soil //sol calcimagnésique //Kalkmagnesiaboden (лат. calcium - кальций и magnesia - окись магния) - термин франц.шк. (1967) для класса почв с профилем AC, A(B)C, AR или A(B)R, не имеющих развитого горизонта B, формирование свойств гумусового горизонта которых определяется присутствием щелочноземельных катионов; формируются почвы на карбонатных либо ультраосновных породах либо в условиях бокового притока щелочных земель; характерно наличие глины типа 2:1; насыщенность не менее 90%, а pH выше 6,8; структура зернистая или комковатая в гумусовом горизонте; гумус образует устойчивые комплексы с минеральной частью.

873. КА́ЛЬЦЕМАГНЕ́ЗИМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //calcomagnesimorphic soil //sol calcomagnésimorphé //kalkmagnesimorpher Boden (от лат. calcium - кальций, magnesia - окись магния и греч. morphé - форма) - термин франц.шк. (1965) для класса почв, в которых большое количество карбоната кальция, или кальция и магния, либо сульфата кальция определяет развитие почвенного профиля.

874. КАЛЬЦЕМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //calcemorphic soil //sol calcemorphé //kalkmorpher Boden (от лат calcium- кальций и греч. morphé - форма) - термин, особенно широко распространенный в западноевропейских школах для почв, формирующихся на карбонатных почвообразующих породах или в условиях притока карбоната кальция.

875. КА́ЛЬЦИАКВО́ЛЛЬ //calciaquoll //calciaquoll //Kalkiaquoll (от лат. calcium - кальций, лат. aqua - вода и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы акволлей (см.), которые: 1) имеют кальциевый[x)] горизонт с верхней границей в пределах 40 см от поверхности; 2) имеют среднегодовую температуру почвы выше 8°С либо среднелетнюю температуру на 50 см выше 15°С; 3) не имеют натриевого[x)] или аргиллового[x)] горизонта или дурипэна[x)], если они не погребенные. В пределах этой большой группы почв выделяются три подгруппы: 1) типичные (typic), 2) аэральные (aeric) и 3) нормальные (haplic) кальциакволли.

876. КА́ЛЬЦИБОРО́ЛЛЬ //calciboroll //calciboroll //Kalkiboroll (от лат. calcium - кальций, греч. boreas - северный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы бороллей (см.), которые: 1) имеют кальциевый[x)] или гипсовый[x)] горизонт с верхней границей в пределах 1 м от поверхности и карбонатные во всех частях всех горизонтов выше кальциевого или гипсового после перемешивания верхних 18 см, если только мех.состав не легче пылеватой супеси; 2) имеют почвенные температуры выше, чем криоборолли (см.); 3) не имеют аргиллового[x)] или натриевого[x)] горизонта, если только они не лежат под кальциевым или гипсовым. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 5 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) нормальные (haplic), 4) маломощные (lithic) и 5) трещиноватые (vertic) кальциборолли.

877. КА́ЛЬЦИЕВАЯ МЕЛАНИЗИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //melanized calcic soil // sol calcique mélanisé //melanisierter Kalkboden (от лат. calcium - кальций и греч. melanos - мягкий) - термин франц.шк. (1967) для группы почв, входящей в подкласс насыщенных почв класса кальциемагнезиальных почв, имеющих маломощный профиль A(B)R или AC_kR и характеризующихся структурой горизонта A, напоминающей структуру самомульчирующихся вертисолей, и грубой структурой в переходном горизонте (B).

878. КА́ЛЬЦИЕВАЯ МЕЛАНИЗИ́РОВАННАЯ КО́РОВАЯ ПО́ЧВА //crust melanized calcic soil //sol calcique mélanisé à encroutement calcaire // melanisierter Krustkalkboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы кальциевых меланизированных почв, имеющих профиль AC_kR, т.е. имеющих между горизонтом A и плотной породой R це-

ментированный горизонт вторичной аккумуляции карбоната кальция.

879. КА́ЛЬЦИЕВАЯ МЕЛАНИЗИ́РОВАННАЯ РЕНДЗИ́НОВИ́ДНАЯ ПО́ЧВА //rendzina-like melanized calcic soil //sol calcique mélanisé rendziniforme //rendzinartiger melanisierter Kalkboden - термин французск.шк. (1967) для подгруппы кальциевых меланизированных почв (см.), имеющих профиль AR

880. КА́ЛЬЦИКСЕРО́ЛЛЬ //calcixeroll //calcixeroll //Kalkixeroll (от лат. calcium - кальций, греч. xeros - сухой и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ксероллей (см.), которые: 1) имеют кальциевый[x], петрокальциевый[x] или гипсовый[x] горизонт с верхней границей в пределах 1,5 м от поверхности; 2) карбонатные с поверхности, если только не легче пылеватой супеси; 3) не имеют натриевого[x] горизонта в пределах 1 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 8 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) намытые (cumulic), 4) флювентные (fluventic), 5) нормальные (haplic), 6) маломощные (lithic), 7) мощные (pachic) и 8) петрокальциевые (petrocalcic) кальциксероллы.

881. КАЛЬЦИНИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //calcinated soil //sol calcifié//kalzinierter Boden - см. Окарбоначенная п.

882. КА́ЛЬЦИОРТИ́Д //calciorthid //calciorthid //Kalkiorthid (от лат. calcium - кальций, греч. orthos - настоящий и порядкового корня id для аридисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортидов (см.), которые: 1) имеют либо кальциевый[x], либо гипсовый[x] горизонт с его верхней границей в пределах 1 м от поверхности; 2) карбонатные во всех частях выше кальциевого горизонта после перемешивания верхних 18 см, если только мех.состав не легче супеси; 3) не имеют дурипэна[x] в пределах 1 м от поверхности; 4) не имеют солевого[x] горизонта выше кальциевого или гипсового; 5) не имеют петрокальциевого[x] горизонта с его верхней границей в пределах 1 м от поверхности. В пределах этой почвенной группы выделяются 8 подгрупп: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) гидроморфные плотные (aquic duric), 4) маломощные (lithic), 5) маломощные моллевые (lithic mollic), 6) моллевые (mollic), 7) устоллевые (ustollic) и 8) ксероллевые (xerollic) кальциортиды.

883. КА́ЛЬЦИУСТО́ЛЛЬ //calciustoll //calciustoll //Kalkiustoll (от лат. calcium - кальций, лат. ustus - обожженный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устоллей (см.), которые: 1) имеют кальциевый[x)] или гипсовый[x)] горизонт с верхней границей в пределах 1 м от поверхности или петрокальциевый[x)] горизонт с верхней границей в пределах 1,5 м от поверхности и карбонатные с поверхности выше кальциевого, гипсового или петрокальциевого горизонта, если только мех. состав не легче пылеватой супеси; 2) не имеют аргиллового[x)] или натриевого[x)] горизонта или дурипэна[x)] в пределах 1 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 9 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) нормальные (haplic), 4) маломощные (lithic), 5) мощные (pachic), 6) петрокальциевые (petrocalcic), 7) петрокальциевые трещиноватые (petrocalcic vertic), 8) салортидные (salorthidic) и 9) трещиноватые (vertic) кальциустолли.

884. КАЛЬЦИФИЦИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //calcificated soil //sol calcifié //kalzinierter Boden - см. Окарбоначенная п.

885. КА́МБИСО́ЛЬ //cambisol //cambisol //Kambisol (от лат. cambiare - изменение и лат. solum - почва) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, имеющих в профиле камбиевый[x)] горизонт В, то-есть глиноаккумулятивный горизонт, сформированный путём оглинивания почвенной массы на месте без существенного перемещения глины по профилю.

886. КА́МБИСО́ЛЬ БЕ́ДНАЯ //dystric cambisol //cambisol dystrique //dystrischer Kambisol - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих светлый[x)] горизонт А с поверхности, подстилаемый камбиевым[x)] горизонтом В, степень насыщенности основаниями в котором менее 50%; карбонаты отсутствуют в горизонте В, но могут присутствовать в горизонте С.

887. КА́МБИСО́ЛЬ БОГА́ТАЯ //eutric cambisol //cambisol eutrique //eutrischer Kambisol - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, имеющих светлый[x)] или темный[x)] горизонт А с поверхности, подстилаемый камбиевым[x)] горизонтом В, степень насыщенности основаниями в котором превышает 50%; карбонаты отсутствуют в горизонте В, но могут присутствовать в горизонте С; нет кальциевого или гипсового горизонтов в пределах 100 см от поверхности.

888. КА́МБИСО́ЛЬ ГЛЕ́ЕВАЯ //gleyic cambisol //cambisol gleyique // gleyischer Kambisol - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих с поверхности светлый[x)] или темный[x)] горизонт А, ниже которого следует камбиевый[x)] горизонт В, подстилаемый глеевым горизонтом.

889. КА́МБИСО́ЛЬ ГУ́МУСОВАЯ //humic cambisol // cambisol humique // humischer Kambisol - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, имеющих с поверхности темный[x)] горизонт А, подстилаемый камбиевым[x)] горизонтом В со степенью насыщенности основаниями менее 50%.

890. КА́МБИСО́ЛЬ ИЗВЕСТКО́ВАЯ // calcic cambisol // cambisol calcique // kalkischer Kambisol - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, имеющих светлый[x)] или темный[x)] горизонт А с поверхности, камбиевый[x)] горизонт В, карбонаты в горизонте В и/или кальциевый[x)] или гипсовый[x)] горизонт вторичной аккумуляции кальция в пределах 100 см от поверхности; эти почвы обычно карбонатны с поверхности, но могут быть и выщелоченными до некоторой глубины.

891. КА́МБИСО́ЛЬ КАРБОНА́ТНАЯ // calcaric cambisol // cambisol calcaire // kalkarischer Kambisol - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих с поверхности светлый[x)] или темный[x)] горизонт А, подстилаемый камбиевым[x)] горизонтом В со степенью насыщенности основаниями более 50%; остаточные карбонаты присутствуют в горизонтах В и С, не образуя сплошного горизонта вторичной аккумуляции.

892. КА́МБИСО́ЛЬ КРИОГЕ́ННАЯ // cryic cambisol // cambisol cryique // kryischer Kambisol - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для камбисолей, имеющих в пределах почвенного профиля многолетнюю мерзлоту и морфологические признаки криотурбации.

893. КА́МБИСО́ЛЬ ОКРА́ШЕННАЯ // chromic cambisol // cambisol chromique // chromischer Kambisol - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих с поверхности светлый[x)] или темный[x)] горизонт А, подстилаемый камбиевым[x)] горизонтом В со степенью насыщенности основаниями более 50%, и характеризующихся яркой коричневой окраской всего профиля.

894. КА́МБИСОЛЬ СЛИТА́Я // vertic cambisol // cambisol vertique // vertischer Kambisol - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв тяжелого механического состава (30% и более ила в среднем в верхнем 50-см слое), имеющих в профиле камбиевый[x)] горизонт В и имеющих в

течение определенного периода года (если не орошаются) сильную трещиноватость до глубины порядка 50 см.

895. КАМБИСО́ЛЬ СПО́ДОВАЯ //spodic cambisol //cambisol spodique // spodischer Kambisol - термин ФАО/ЮНЕСКО для почв, имеющих с поверхности светлый[x)] или тёмный[x)] горизонт А, подстилаемый камбиевым[x)] горизонтом В со степенью насыщенности основаниями менее 50%, и имеющих ниже камбиевого горизонта или совмещенный с ним сподовый[x)] горизонт В, то-есть горизонт аккумуляции аморфных веществ (гумус и полуторные окислы).

896. КАМБОРТИ́Д //camborthid //camborthid //Kamborthid (от лат. cambiare - изменять, греч. orthos - настоящий и порядкового корня id для аридисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортидов (см.), которые: 1) имеют камбиевый[x)] горизонт; 2) не имеют дуripэна[x)] в пределах 1 м от поверхности; 3) не имеют солевого[x)] горизонта в пределах 75 см от поверхности, если насыщены водой (т.е. в пределах капиллярной каймы) в пределах 1 м от поверхности; 4) не имеют кальциевого[x)] или гипсового[x)] горизонта в пределах 1 м от поверхности, если только, после перемешивания верхних 18 см, какой-либо подгоризонт выше кальциевого горизонта не свободен от карбонатов при супесчаном или песчаном мех.составе; 5) не имеют петрокальциевого[x)] горизонта в пределах 1 м от поверхности. В пределах этой большой группы почв выделяются 15 подгрупп: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) гидроморфные плотные (aquic duric), 4) плотные (duric), 5) плотные маломощные (duric lithic), 6) плотные моллевые (duric mollic), 7) дурустоллевые (durustollic), 8) маломощные (lithic), 9) маломощные моллевые (lithic mollic), 10) моллевые (mollic), 11) торрертовые (torrertic), 12) устертовые (ustertic), 13) устоллевые (ustollic), 14) ксерертовые (xererticc) и 15) ксероллевые (xerollic) камбортиды.

897. КАМЕНИ́СТАЯ ПО́ЧВА //stony soil //sol pierreux //Steinboden - 1) общеупотребительный термин для почв, содержащих разнообразные по величине обломки горных пород или валуны; син.: щебнистая п.; 2) по терминологии ФАО/ЮНЕСКО (1968) - почва, содержащая в поверхностном горизонте обломки горных пород или валуны размером крупнее 75 мм.

898. КАМЕНИ́СТАЯ ПУСТЫ́НЯ //stony desert //désert de pierre //steiniger Wüste - общеупотребительный термин для пустынных ландшаф-

тов, развитых на слабо выветривающихся коренных породах и имеющих щебнистую или гравийную поверхность, практически лишенную растительного покрова. Син.: гамада.

899. КАНКА́Р, КАНХА́Р //kankar, kanhar //kankar, kânhâr //Kankar, Kanhar - 1) местное название темных слитых трещиноватых глинистых почв типа вертисолей со слоем карбонатных конкреций ("карбонатный латерит") в нижней части профиля, распространенное в некоторых районах Индии; 2) плотный слой сцементированных округлых конкреций карбоната кальция, встречающийся в темных слитых и красно-бурых саванных почвах, получивший свое название от индийского местного термина для соответствующих почв.

900. КАОЛИНИ́ТОВАЯ ПО́ЧВА //kaolinitic soil //sol kaolinitique //kaolinithaltiger Boden (от китайск.каолин - белая глина) - термин для ферраллитизованных почв, содержащих значительное количество каолинита в своей массе.

901. КАО́ЛИСО́ЛЬ //kaolisol //kaolisol //Kaolisol (от китайск. каолин - белая глина и лат.solum - почва) - термин Меньена (1970) для богатых каолинитом ферраллитизованных почв; син.: ферраллитная п.

902. КА́ПЕЛЬНАЯ ПО́ЧВА //drop soil //sol goutte //Tropfenboden - термин немецкой школы для арктических и субарктических криотурбированных почв, в которых микроморфологический анализ обнаруживает каплевидные натёки глинистого вещества.

903. КАРА́ЙЛ //karail //karail //Karail - местное название темных слитых трещиноватых глинистых почв, распространенное в некоторых районах Индии и отражающее черную окраску почвы.

904. КАРБОНА́ТНАЯ КОРА́ - см. Известковая кора.

905. КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //carbonate soil //sol carbonaté //kalkhaltiger Boden - 1) общеупотребительный термин без строгого содержания для почв, содержащих видимые скопления карбоната кальция или вскипающих при действии соляной кислоты с поверхности или близ поверхности; 2) термин франц.шк. (1967) для подкласса почв, входящего в класс кальцемагнезиальных почв (см.), имеющих более чем следы карбонатов в мелкозёме горизонта А, зернистую или комковатую структуру и pH менее 7,0.

906. КА́РЛИКОВАЯ ПО́ЧВА //dwarf soil //sol nain //Zwergboden - общеупотребительный термин для почв, имеющих укороченные горизонты.

907. КАРМА́ННАЯ ПО́ЧВА //pocket-like soil //sol en forme de poche // Taschenboden - термин немецкой школы для арктических и субарктических криотурбированных почв, в которых микроморфологический анализ обнаруживает кармановидные затеки глинистого и органического вещества.

908. КАШТА́НОВАЯ ПО́ЧВА //chestnut soil, chestnut earth, chestnut-coloured soil //sol châtain //kastanienfarbener Boden, kastanienfarbiger Boden, kastanienfarbige Erde (от лат. castaneo - каштан) - 1) термин В.В.Докучаева для почв сухих злаковых и полынно-злаковых степей умеренно засушливого пояса с профилем А-В-С, имеющих каштановый цвет верхних горизонтов при невысокой гумусированности (2,5-4,5%), карбонатный горизонт с глубины 40-50 см и гипсовый с глубины 110-150 см; син.: каштанозем; 2) термин франц.шк. (1965,1967) для группы насыщенных изогумусовых почв, формирующихся в районах с климатом с холодной зимой, содержащих 3-6% гумуса в верхнем 20-см слое, имеющих комковатую или ореховатую структуру в верхнем горизонте и призмовидную глубже, лишенных карбонатов до 60 см; 3) термин русск. шк. (1967) для типа почв сухих степей континентальных областей суббореального пояса; 4) термин русск.шк. (1967) для подтипа каштановых почв, содержащих 2,5-3,5% гумуса в верхнем 15-см слое в глинистых и суглинистых разновидностях и 2,0-2,5% в супесчаных; 5) термин русск.шк. (1967) для подтипа каштановых почв умеренной восточноевропейской и казахстанской фаций.

909. КАШТА́НОВАЯ БЕСКАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //non-calcareous chestnut soil //sol châtain non-calcaire //nichtkalkischer kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода каштановых почв, развитых на бедных кальциевыми минералами породах и характеризующихся отсутствием вскипания и выделений карбонатов.

910. КАШТА́НОВАЯ ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //gleyic chestnut soil //sol châtain à gley //gleyischer kastanienfarbiger Boden - термин франц. шк. (1965) для подгруппы каштановых почв, имеющих признаки оглеения (пятнистость, железистые конкреции) в нижней части профиля.

911. КАШТА́НОВАЯ ГЛУБИ́ННО-ХОЛО́ДНАЯ МУЧНИ́СТО-КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //meal-carbonated deep-cold chestnut soil //sol châtain calcaire en gruau en froid profond //tieferkalt mehlkalkischer kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа каштановых почв глубинно-холодной восточносибирской фации, харак-

теризующихся малой мощностью горизонтов (A+B_1 до 25 см), повышенным содержанием фульвокислот в составе гумуса, близким к поверхности обособлением карбонатного горизонта с мучнистой формой карбонатных выделений, отсутствием выделений гипса и солей.

912. КАШТА́НОВАЯ ГЛУБОКО́ВСКИПА́ЮЩАЯ ПО́ЧВА // deep effervescing chestnut soil // sol châtain effervescente profond // tiefer aufbrausender kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода каштановых почв легкого механического состава и пониженной гумусности, в профиле которых имеется большой разрыв между гумусовым и карбонатным горизонтами.

913. КАШТА́НОВАЯ ГЛУБОКО́СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //deep solonetzic chestnut soil //sol châtain solonetzoïde profond //tiefer solonetzartiger kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода каштановых почв, выделяемого в пределах какого-либо подтипа, имеющих в нижней части профиля уплотненный грубоструктурный горизонт с содержанием обменного натрия более 5% от емкости поглощения.

914. КАШТА́НОВАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //calcaric chestnut soil, calcareous chestnut soil //sol châtain calcaire //kalkarischer kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода каштановых почв, характеризующихся наличием карбонатов, определяемых по вскипанию, во всем почвенном профиле вследствие особенностей породы, перерытости землероями либо иных причин.

915. КАШТА́НОВАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПЕРЕРЫ́ТАЯ ПО́ЧВА //broken-up calcaric chestnut soil //sol châtain calcaire défoncé, sol châtain calcaire brisé //umgebrochen kalkarischer kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода каштановых почв, характеризующихся высоким, часто поверхностным вскипанием в результате активной деятельности роющих животных.

916. КАШТА́НОВАЯ КОНТА́КТНО-ЛУГОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //contactly-meadowish chestnut soil //sol châtain en gley contact //Berührunggley kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода каштановых почв, развитых на двучленных и слоистых породах, обусловливающих появление устойчивого сезонного переувлажнения на контакте пород.

917. КАШТА́НОВАЯ КО́РОВАЯ ПО́ЧВА //crust chestnut soil //sol châtain encroûte //kastanienfarbiger Krustboden - термин франц.шк.

(1965,1967) для подгруппы каштановых почв, имеющих карбонатную кору в нижней части профиля.

918. КАШТА́НОВАЯ МА́ЛОМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //shallow chestnut soil //sol châtain mincé //dünner kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для вида каштановых почв, имеющих мощность горизонтов A_1+B_1 менее 30 см.

919. КАШТА́НОВАЯ МИЦЕЛЯ́РНО-КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //carbonate-mycelial chestnut soil //sol châtain calcaire de mycelium //Myzel-Kalk kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. для группы подтипов каштановых почв предкавказской тёплой и влажной провинции, характеризующихся растянутостью гумусового горизонта, вскипанием обычно с поверхностности, выделением карбонатов в виде плесени в нижней части горизонта А, наличием белоглазки глубже 150 см.

920. КАШТА́НОВАЯ МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //deep chestnut soil //sol châtain profond //tiefer kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для вида каштановых почв, имеющих мощность горизонтов $A+B_1$ более 50 см.

921. КАШТА́НОВАЯ МУЧНИ́СТО-КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //meal-carbonated chestnut soil //sol châtain calcaire en gruau //mehlkalkischer kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. для группы подтипов каштановых почв восточно-сибирской провинции, характеризующихся малой мощностью бескарбонатного гумусового горизонта, под которым резко обособлен горизонт аккумуляции карбонатов в форме мучнистых выделений.

922. КАШТА́НОВАЯ НЕПО́ЛНОРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА //non-complete chestnut soil //sol châtain non-complet //nichtgeschlossener kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода каштановых почв, выделяемого в пределах какого-либо подтипа, развитых на плотных породах и характеризующихся маломощным профилем с неполным набором генетических горизонтов, часто фрагментарного характера, и сильной щебнистостью.

923. КАШТА́НОВАЯ ОСОЛОДЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА //solodic chestnut soil, solodized chestnut soil //sol châtain solodofde, sol châtain solodisé, sol châtain solodique //solodartiger kastanienfarbiger Boden, solodierter kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк.(1967) для рода каштановых почв, выделяемого в пределах какого-либо подтипа, имеющих белёсую присыпку в гумусовом горизонте, по-

тёчность гумуса, дифференцированный по илу и R_2O_3 профиль, относительно высокое вскипание, щелочную реакцию.

924. КАШТА́НОВАЯ ОСТА́ТОЧНО-ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА // residually meadow chestnut soil // sol châtain à gley résiduel, sol châtain humide résiduel // restgleyischer kastanienfarbiger Boden, Restwiesen kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода каштановых почв, выделяемого в пределах какого-либо подтипа, формирующихся на древних высоких террасах, обнаруживающих признаки древнего большего увлажнения в виде повышенной гумусированности, большей мощности гумусового горизонта, более темной окраски нижних горизонтов, отдельных мелких железистых конкреций.

925. КАШТА́НОВАЯ ОСТА́ТОЧНО-СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА // residually solonetzic chestnut soil // sol châtain solonetzoïde résiduel // restsolonetzartiger kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода каштановых почв, выделяемого в пределах какого-либо подтипа, имеющих морфологические и физические признаки солонцеватых почв в каком-либо горизонте, но не содержащих в нем обменного натрия либо содержащих его менее 5% от емкости поглощения.

926. КАШТА́НОВАЯ ПСЕ́ВДОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // pseudogleyic chestnut soil // sol châtain à pseudogley // pseudogleyischer kastanienfarbiger Boden - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы каштановых почв, имеющих псевдоглеевый горизонт в профиле и характеризующихся временным поверхностным переувлажнением (пятнистость, железистые конкреции).

927. КАШТА́НОВАЯ СЛА́БОДИФФЕРЕНЦИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // weakly differentiated chestnut soil // sol châtain peu differentié // schwach differentierter kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода каштановых почв песчаного или супесчаного состава, характеризующихся отсутствием вскипания и карбонатного горизонта.

928. КАШТА́НОВАЯ СЛА́БОЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА // slightly saline chestnut soil // sol châtain faiblement salé // schwach salzhaltiger kastanienfarbiger Boden - 1) термин русск.шк. для вида каштановых засолённых почв, имеющих слабое засоление в какой-либо части профиля; 2) термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы каштановых почв, имеющих слабое засоление в нижней части профиля.

929. КАШТА́НОВАЯ СЛА́БОСОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //slightly alkaline chestnut soil //sol châtain faiblement alcalisé //schwach alkalischer kastanienfarbiger Boden - 1) термин русск.шк. для вида каштановых солонцеватых почв, имеющих 5-10% обменного натрия в верхней части профиля; 2) термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы каштановых почв, имеющих несколько повышенное содержание (до 10% от емкости поглощения) обменного натрия в средней или нижней части профиля.

930. КАШТА́НОВАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //solonetzic chestnut soil, alkalized chestnut soil, solonetz-like chestnut soil //sol châtain à alcalis, sol châtain solonetzoïde, sol châtain solonetzique //solonetzartiger kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода каштановых почв, выделяемого в пределах какого-либо подтипа, имеющих в гумусовом горизонте уплотненный грубоструктурный подгоризонт с содержанием обменного натрия более 5% от ёмкости поглощения.

931. КАШТА́НОВАЯ СОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //saline chestnut soil, saliniferous chestnut soil //sol châtain salinisé //salzhaltig kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода каштановых почв, содержащих водорастворимые соли в какой-либо части профиля, что приводит к периодическому подъему их к поверхности.

932. КАШТА́НОВАЯ СРЕ́ДНЕМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //medium deep chestnut soil //sol châtain semi-profond //halbtiefer kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для вида каштановых почв, имеющих мощность горизонтов $A+B_1$ 30-50 см.

933. КАШТА́НОВАЯ СУБТРОПИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА //subtropical chestnut soil //sol châtain subtropical //subtropischer kastanienfarbiger Boden - термин франц.шк. (1965) для группы изогумусовых насыщенных почв районов с прохладным периодом во время дождей, характеризующихся слабой гумусированностью (в естественных условиях более 1,8% гумуса в верхнем 20-см слое), существенной оглиненностью в нижней части профиля, комковатой или ореховатой структурой в поверхностном горизонте и призмовидной - в нижнем, бескарбонатным верхним горизонтом. Син.: коричнево-каштановая п. (фр.шк., 1967).

934. КАШТА́НОВАЯ СУБТРОПИ́ЧЕСКАЯ ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //gleyic subtropical chestnut soil //sol châtain subtropical à gley //gleyischer

subtropischer kastanienfarbiger Boden - термин франц.шк. (1965). См. Коричнево-каштановая псевдоглеевая п.

935. КАШТА́НОВАЯ СУБТРОПИ́ЧЕСКАЯ КО́РОВАЯ ПО́ЧВА // crust subtropical chestnut soil // sol chatain subtropical encroûte // subtropischer kastanienfarbiger Krustboden - термин франц.шк. (1965). См. Коричнево-каштановая коровая п.

936. КАШТА́НОВАЯ СУБТРОПИ́ЧЕСКАЯ КРАСНОВА́ТАЯ ПО́ЧВА // subtropical red-chestnut soil // sol châtain-rouge subtropical // subtropischer rotkastanienfarbiger Boden - термин франц.шк. (1965). См. Коричнево-каштановая рубефицированная п.

937. КАШТА́НОВАЯ СУБТРОПИ́ЧЕСКАЯ ПСЕ́ВДОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // pseudogleyic subtropical chestnut soil // sol châtain subtropical à pseudogley // pseudogleyischer subtropischer kastanienfarbiger Boden - термин франц.шк. (1965). См. Коричнево-каштановая псевдоглеевая п.

938. КАШТА́НОВАЯ СУБТРОПИ́ЧЕСКАЯ СЛА́БОЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА // slightly saline subtropical chestnut soil // sol châtain subtropical faiblement salé // schwach salzhaltiger subtropischer kastanienfarbiger Boden - термин франц.шк. (1965). См. Коричнево-каштановая слабозасоленная п.

939. КАШТА́НОВАЯ СУБТРОПИ́ЧЕСКАЯ СЛА́БОСОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА // slightly alkaline subtropical chestnut soil // sol châtain subtropical faiblement alcalisé // schwach alkalischer subtropischer kastanienfarbiger Boden - термин франц.шк. (1965). См. Коричнево-каштановая слабосолонцеватая п.

940. КАШТА́НОВАЯ СУБТРОПИ́ЧЕСКАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // typical subtropical chestnut soil // sol châtain subtropical modal // typischer subtropischer kastanienfarbiger Boden - термин франц.шк. (1965). См. Коричнево-каштановая типичная п.

941. КАШТА́НОВАЯ СУБТРОПИ́ЧЕСКАЯ ТРЕЩИНОВА́ТАЯ ПО́ЧВА // vertic subtropical chestnut soil // sol châtain subtropical vertique // vertischer subtropischer kastanienfarbiger Boden - термин франц. шк. (1965). См. Коричнево-каштановая трещиноватая п.

942. КАШТА́НОВАЯ ТЁПЛАЯ МИЦЕЛЯ́РНО-КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА // carbonate-mycelial warm chestnut soil // sol châtain chaude calcaire de mycelium // warm Myzel-Kalk kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа каштановых почв тёплой южноевропейской фации, содержащих 2,5-3,5% гумуса в горизонте A_1, име-

ющих мощность горизонтов $A+B_1$ 40–50 см, характеризующихся выделением карбонатов в виде плесени в верхней части профиля и в виде белоглазки – в нижней:

943. КАШТА́НОВАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // typical chestnut soil// sol châtain modal // typischer kastanienfarbiger Boden – термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы каштановых почв, не имеющих в профиле трещиноватости, засоления или осолонцевания, псевдоглея и корообразования.

944. КАШТА́НОВАЯ ТРЕЩИНОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //vertic chestnut soil //sol châtain vertique //vertischer kastanienfarbiger Boden – термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы каштановых почв, имеющих крупную призмовидную структуру в горизонте В с трещинами между структурными отдельностями.

945. КАШТА́НОВАЯ ЩЕ́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // crevasced chestnut soil// sol châtain crevassé //spaltiger kastanienfarbiger Boden – термин русск.шк. (1967) для рода каштановых почв, выделяемого в пределах какого-либо подтипа, формирующихся в холодном климате на иловато-глинистых загипсованных или закарбоначенных породах очень плотного слитого сложения и характеризующихся образованием глубоких трещин и засыпанием в них мелкозёма из гумусовых горизонтов, вскипающих с поверхности или в пределах гумусового горизонта, имеющих выделение гипса на глубине до 100 см.

946. КАШТА́НОВО-КРА́СНАЯ ПО́ЧВА //red-chestnut soil //sol châtain-rouge //rot-kastanienfarbiger Boden – термин франц.шк. (1965) для подгруппы каштановых почв, характеризующихся красноватой окраской вследствие повышенного содержания свободного железа.

947. КАШТА́НОЗЁМ //kastanozem //kastanozem //Kastanosem (от лат. castaneo – каштан и русск. земля) – термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для степных почв, богатых органическим веществом и имеющих буроватые, коричневатые, каштановые тона окраски с поверхности.

948. КАШТА́НОЗЁМ ИЗВЕСТКО́ВЫЙ //calcic kastanozem //kastanozem calcique //kalkischer Kastanosem (от лат. castaneo – каштан, русск. земля и лат. calcium – кальций) – термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для каштаноземов (см.), имеющих кальциевый[x)] горизонт в пределах 100 см от поверхности.

949. КАШТА́НОЗЁМ ЛО́ВИКОВЫЙ //luvic kastanozem //kastanozem luvique //luvischer Kastanosem (от лат. castaneo – каштан, русск.

земля и лат. luo - вымывать) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для каштанозёмов (см.), имеющих аргиллювый[x] горизонт В в профиле, обычно сопровождающийся также кальциевым[x] и гипсовым[x] горизонтами.

950. КАШТА́НОЗЁМ НОРМА́ЛЬНЫЙ // haplic kastanozem // kastanozem haplique // haplischer Kastanosem (от лат. castaneo - каштан, русск. земля и греч. haplous - простой) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для каштанозёмов (см.), в профиле которых нет ни аргиллового[x], ни кальциевого[x] горизонтов, но имеющих под моллевым[x] горизонтом А возможно камбиевый[x] горизонт и обычно горизонт вторичной аккумуляции извести в порошковидной форме.

951. КВА́РЦПСАММЕ́НТ // quartzpsamment // quartzpsamment // Quarzpsamment (от нем. quarz - кварц, греч. psammos - песок и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы псамментов (см.), которые: 1) имеют почвенную температуру выше, чем криопсаммент (см.); 2) имеют в составе песчаной фракции более 95% кварца, циркона, турмалина, рутила или других слабо выветриваемых минералов, не дающих при выветривании железо или алюминий. Данная группа включает 7 подгрупп: 1) типичные кварцпсаммент (typic), 2) гидроморфные кварцпсаммент (aquic), 3) акводовые кварцпсаммент (aquodic), 4) маломощные кварцпсаммент (lithic), 5) маломощные подзолистые кварцпсаммент (lithic spodic), 6) окисные кварцпсаммент (oxic) и 7) подзолистые кварцпсаммент (spodic).

952. КЕВИ́Р - см. Кавир.

953. КЕМПЫРТА́Ш // campyrtash // cémpyrtach // Kempyrtasch (от народного киргизск.) - местное название мощных (1-3 м) карбонатных кор в профиле почв, распространенное в Киргизии.

954. КЕ́РШ // cersh // cérch // Kersch (от народного казахск.) - местное название мощных (1-3 м) карбонатных кор в профиле почв, распространенное в южных районах Казахстана.

955. КИРА́СА - см. Железистая кора.

956. КИ́СЛАЯ ПО́ЧВА // acid soil // sol acide // saure Boden - общеупотребительный термин для почв, имеющих низкую насыщенность основаниями и кислую реакцию среды (pH менее 6,0).

957. КИ́СЛАЯ ГИДРОГЕ́ННО-ОЖЕЛЕЗНЁННАЯ ПО́ЧВА // acid hydrogenic ferrimorphic soil // sol acide ferrugineux hydromorphe// hydromorpher eisenhaltiger saurer Boden - термин М.А.Глазовской (1972) для семейства почв, входящего в генерацию кислых гидрогенно-ожелезненных почв ассоциации кислых супераквальных почв, обогащенных окислами железа за счет их приноса грунтовыми водами; семейство включает почвы с латеритом.

958. КИ́СЛАЯ ГЛЕ́ЕВАЯ КВАСЦО́ВАЯ ПО́ЧВА // acid gley ferrous soil// sol acide ferreux à gley //ferroeisenhaltiger saurer Gleyboden - термин М.А.Глазовской (1972) для семейства почв, богатых сульфидами-сульфатами железа; син.: Кислая тионовая п.

959. КИ́СЛАЯ ГРУНТО́ВО-ГЛЕ́ЕВО-ЭЛЮВИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //ground gley-eluvial acid soil //sol acide gley-eluvial à eau de fond //grundwassergleyeluvialer saurer Boden - термин М.А.Глазовской (1972) для семейства почв, входящих в генерацию кислых глеево-элювиальных почв ассоциации кислых супераквальных почв и характеризующихся наличием глеево-элювиального процесса в верхних горизонтах при периодическом колебании близких грунтовых вод; сюда относятся подбелы.

960. КИ́СЛАЯ ГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //humic acid soil //sol acide humique //saurer Humusboden - 1) термин М.А.Глазовской (1972) для генерации почв, входящих в ассоциацию субаэральных кислых ульматно-фульватных почв, характеризующихся кислой реакцией по всему профилю, ульматно-фульватным ненасыщенным гумусом, отсутствием грунтового увлажнения и значительным накоплением гумуса; генерация включает семейства: кислых дерновых, альфегумусовых и аллофаново-гумусовых пеплово-вулканических почв; 2) см. Гумусовая кислая п.

961. КИ́СЛАЯ ДЕРНО́ВАЯ ПО́ЧВА // sod acid soil // sol acide gazonné // saurer Rasenboden - термин М.А.Глазовской (1972) для семейства почв, входящих в генерацию кислых гумусовых почв (см.) и характеризующихся профилем A_{dfu}-A_{fu}-B_{mhAl}-B_{mhFe}-C_{sial}, где A_{dfu} - дерновый фульватно-ульматный горизонт мощностью 5-15 см; A_{fu} - гумусовый фульватно-ульматный горизонт мощностью 10-50 см серобурого цвета и комковато-зернистой структуры; B_{mhAl} - иллювиальногумусово-метаморфический алюминиевый; B_{mhFe} - иллювиальногумусово-метаморфический железистый и C_{sial} - бескарбонатная материнская сиаллитная порода; семейство включает следующие типы почв: 1) арктические дерново-ко-

ричневые почвы, 2) дерновые грубогумусные почвы субполярных лугов, 3) альпийские горно-луговые почвы, 4) субальпийские горно-луговые почвы, 5) андийские горно-луговые почвы, 6) кислые пойменные почвы умеренных широт и 7) желто-серые почвы влажных субтропических прерий.

962. КИ́СЛАЯ ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // acid sod-gley soil // sol gazonné acide à gley // saurer Rasengleyboden - термин М.А.Глазовской (1972) для семейства почв, входящих в генерацию кислых гумусовых глеевых почв ассоциации кислых супераквальных почв и формирующихся в поймах рек бореального пояса при близком уровне кислых грунтовых вод.

963. КИ́СЛАЯ КОЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // acid colluvial soil // sol colluvial acide // Saurekolluvialboden - см. Ранкер коллювиальный.

964. КИ́СЛАЯ ОГЛИ́НЕННАЯ ПО́ЧВА // clayed acid soil // sol acide argileux // saurer Tonboden - термин М.А.Глазовской (1972) для генерации почв, входящих в ассоциацию субаэральных кислых ульматно-фульватных почв и характеризующихся кислой реакцией по всему профилю, ульматно-фульватным ненасыщенным гумусом, отсутствием грунтового увлажнения и интенсивным вторичным оглиниванием профиля; генерация включает семейства бурозёмов и фульвоферраллитов.

965. КИ́СЛАЯ ПОВЕ́РХНОСТНО-ГЛЕ́ЕВО-ЭЛЮВИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // surface gley-eluvial acid soil // sol acide gley-eluvial superficiel // oberflachen gley-eluvialer saurer Boden - термин М.А.Глазовской (1972) для семейства почв, входящих в генерацию кислых глеево-элювиальных почв ассоциации кислых супераквальных почв и характеризующихся периодическим поверхностным переувлажнением верхней части профиля с последующим выносом продуктов разрушения минеральной части; в семейство входят следующие почвы: 1) глееподзолистые, 2) контактно-глееватые подзолистые, 3) бурые поверхностно-глеевые, 4) желтозёмы и краснозёмы поверхностно-глеевые, 5) ферраллитные оподзоленные поверхностно-глеевые.

966. КИ́СЛАЯ ПО́ЙМЕННАЯ ПО́ЧВА // alluvial acid soil // sol acide alluvial // saurer Alluvialboden, saurer Auenboden, saurer Aueboden - термин М.А.Глазовской (1972) для типа пойменных дерновых кислых почв умеренных широт.

967. КИ́СЛАЯ СУЛЬФА́ТНАЯ ПО́ЧВА // acid sulphate soil // sol acide à sulfates // Sulfatsaureboden - термин для дренированных окисленных почв приморских маршей, имеющих высокую кислотность и токсичность в результате окисления сульфидов, характеризующихся темно-серой окраской с обилием соломенножелтых пятен сульфата железа (ярозита) в пределах 50 см от поверхности; син.: кошачья глина.

968. КИ́СЛАЯ ТАЁЖНАЯ ПО́ЧВА // acid taiga soil // sol acide de taiga // saurer Taigaboden - термин для ожелезненных кислых неоподзоленных потечногумусовых почв светлохвойной тайги, не имеющих осветленного оподзоленного горизонта; син.: подбур таежный.

969. КИ́СЛАЯ ТАЁЖНАЯ НЕОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА // non-podzolized acid taiga soil // sol acide non-podzolisé de taiga // nichtpodsolierter saurer Taigaboden - см. Кислая таёжная п.

970. КИ́СЛАЯ ТИО́НОВАЯ ПО́ЧВА // acid tionic soil // sol acide tionique // saurer Tionboden (от греч. theion - сера) - термин для сульфидно-сульфатных кислых почв приморских низменностей.

971. КИ́СЛАЯ ЭЛЮВИА́ЛЬНО-ИЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // eluvial-illuvial acid soil // sol acide éluvial-illuvial // eluvial-illuvialischer saurer Boden - термин М.А.Глазовской (1972) для генерации почв, входящих в ассоциацию субаэральных кислых ульматно-фульватных почв и характеризующихся кислой реакцией по всему профилю, ульматно-фульватным ненасыщенным гумусом, отсутствием грунтового увлажнения и элювиально-иллювиальной дифференциацией профиля; генерация включает семейства альфегумусовых подзолов и элювиземно-подзолистых почв.

972. КЛЕ́ЙПЭН // claypan // claypan // Klaypan (от англ. clay - глина и pan - твердая прослойка) - термин амер.шк. для внутрипочвенных плотных обогащенных илом прослоек разного облика и происхождения.

973. КЛИ́МАКСНАЯ ПО́ЧВА // climax soil // sol cimaxique // Klimaxboden (от лат. climax - вершина) - распространенный в западно-европейских странах термин для полностью сформированных почв, находящихся в равновесии с климатом и растительностью, при условии, что и сама растительность является климаксной, то-есть соответствует климатическим условиям и не изменена человеком (Дюшофур, 1965); в определенном смысле соответствует понятию "зональная почва".

974. КЛИМАТИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА // climatic soil // sol de type climatique // klimatischer Boden (от греч. klima - наклон) - термин французской школы для почв, формирующихся под влиянием общезональных условий той или иной природной зоны; син.: зональная п., климаксная п.

975. КЛИ́НОСО́ЛЬ // clinosol // clinosol // Klinosol (от греч. klino - наклоняю и лат. solum - почва) - термин для криотурбированных почв, редко используемый в литературе.

976. КОВАРВА́ННАЯ ПО́ЧВА // kovárvány soil // sol kovârvânique // kovarvanischer Boden - термин венгерской шк. для лёгких почв, имеющих в нижней части профиля извилистые тонкие прослойки, обогащенные и цементированные железом и гумусом. Син.: псевдофибровая п., ортзандовая п.

977. КОЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА // colluvial soil // sol colluvial // Kolluvialboden (от лат. colluvio - скопление, беспорядочная груда) - общеупотребительный термин для слабо развитых почв, сформированных на коллювиальном наносе, т.е. на обломочном материале, накопившемся на склонах гор или у их подножий вследствие перемещения с расположенных выше участков под влиянием гл.обр. силы тяжести (материал обвалов, оползней и др.).

978. КОЛЬМАТИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // colmataged soil // sol de colmatage // Aufschwämmungsboden (франц. colmatage от итал. colmata - наполнение) - термин для почв, поры которых заполнены мелкими илистыми или глинистыми частицами, вносимыми фильтрующейся через почву водой, а также для почв, поверхность которых тем же процессом (методом) кольматажа повышена за счет наиления.

979. КОНКРЕЦИО́ННАЯ ПО́ЧВА // concretionary soil // sol à concrétions // Konkretionsboden (от лат. concretio - срастание) - 1) термин для почв разных типов, содержащих в одном из горизонтов железистые или карбонатные конкреции, разбросанные в массе почвы; 2) см. Петриковая п.

980. КОНКРЕЦИО́ННЫЙ СЛО́Й // concretionary horizon // horizon de concrétions // Konkretionshorizont (от лат. concretio - срастание) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для внутрипочвенных прослоев, состоящих на 60% или более по объёму из окисных (железистых) конкреций или желваков или из затвердевшего плинтита (см.), мощностью не менее 25 см.

981. КОНТА́КТНО-ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА // contactly gleyic soil // sol gleyique contact // Berührungschwachgleyboden (от лат. contactus - прикосновение и русск. глей) - термин русск.шк. для контактно-оглеенных почв на двучленных породах, глеевый горизонт в профиле которых выражен отдельными белёсыми, сизыми и ржавыми пятнами на контакте пород.

982. КОНТА́КТНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // contactly gley soil // sol gley contact // Berührunggleyboden (от лат. contactus - прикосновение и русск. глей) - термин русск.шк. для контактно-оглеенных почв на двучленных породах, глеевый горизонт в профиле которых выражен сплошным сизовато-белёсым слоем с отдельными ржавыми пятнами.

983. КОНТА́КТНО-ГЛЕ́ЕОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА - см. Контактно-оподзоленная п.

984. КОНТА́КТНО-ЛУ́ГОВАЯ ПО́ЧВА - см. Контактно-оглеенная п.

985. КОНТА́КТНО-ОГЛЕ́ЕННАЯ ПО́ЧВА // contactly gleyed coil // sol én gley attache, sol én gley contact // Berührunggleyboden (от лат. contactus - прикосновение и русск. глей) - термин Б.Г.Розанова (1955) для почв, формирующихся на двучленных почвообразующих породах, в профиле которых на контакте пород в результате периодического переувлажнения образуется в разной степени оглеенный горизонт, часто белёсый или мраморовидный; термин имеет широкий смысл и может быть отнесен к разным типам почв, включая дерново-подзолистые, бурые лесные, дерновые и т.д., сформированным на двучленных или многочленных породах.

986. КОНТА́КТНО-ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА // contactly podzolized soil // sol en podzol attache, sol én podzol contact // Berührungpodsolboden - термин для подзолистых почв на двучленных породах, имеющих осветленный горизонт на контакте пород; син.: желтоподзолистая п., контактно-подзолистая п., контактно-оглеенная п., почва со вторым подзолистым горизонтом.

987. КОНТА́КТНО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА - см. Контактно-оподзоленная п.

988. КОРА́ //crust //croûte // Kruste - термин, широко используемый для внутрипочвенных или внепочвенных образований, относительно или абсолютно обогащенных теми или иными веществами, например железом, известью, гипсом или легкорастворимыми солями, имеющих форму ограниченного слоя, твердого либо твердеющего при подсыхании.

989. КОРА́ ВЫВЕ́ТРИВАНИЯ //crust of weathering //croûte d'altération, produit d'altération //Verwitterungskruste, Verwitterungsprodukt - слой земной поверхности, состоящий из рыхлых продуктов изменения горных пород, образующихся под совместным воздействием воздуха, воды и организмов, и отличающихся от коренных пород рыхлой структурой и химическим составом.

990. КОРА́ СОЛЕВА́Я //salt crust //croûte de sel //Salzkruste - термин для обозначения сплошных плотных скоплений легкорастворимых солей на поверхности или в толще почвенного профиля или осадочных пород.

991. КОРИ́ЧНЕВАЯ ПО́ЧВА //cinnamonic soil, cinnamon soil //sol cinnamome //zimtfarbener Boden - термин С.А.Захарова для почв сухих кустарниковых зарослей средиземноморского климата, характеризующихся сильно оглиненным и оструктуренным профилем А-В-С, обычно с карбонатным горизонтом в нижней части; в современной системе русск.шк. (1967) эти почвы выделяются на правах типа. Син.: сухолесная п., хамра.

992. КОРИ́ЧНЕВАЯ ВЫ́ЩЕЛОЧЕННАЯ ПО́ЧВА // leached cinnamon soil // sol cinnamome lévigé // ausgelaugter zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа коричневых почв, характеризующихся вскипанием глубже 100 см, слабо кислой реакцией в верхних горизонтах, несколько пониженной емкостью обмена.

993. КОРИ́ЧНЕВАЯ ГЛУБОКОСОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //deep saliniferous cinnamon soil //sol cinnamom salifére profond // tiefer salzhaltig zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для вида коричневых почв, содержащих легкорастворимые соли на глубине более 80 см.

994. КОРИ́ЧНЕВАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //calcaric cinnamon soil //sol cinnamome calcaire //kalkischer zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа коричневых почв, вскипающих с поверхности или в пределах гумусового горизонта, имеющих слабощелочную реакцию в верхних горизонтах, слабую оглиненность в метаморфическом горизонте и равномерное распределение ила по профилю.

995. КОРИ́ЧНЕВАЯ МА́ЛОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА // low humic cinnamon soil // sol cinnamome peu humique // humusarmer zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для вида коричневых почв, содержащих 4-6% гумуса в верхнем горизонте.

996. КОРИ́ЧНЕВАЯ НЕПО́ЛНОРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА //non-complete cinnamon soil //sol cinnamome non-complet //nichtgeschlossener zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для рода коричневых почв, формирующихся на плотных породах и характеризующихся щебнистостью, малой мощностью, слабой дифференциацией и оглиненностью.

997. КОРИ́ЧНЕВАЯ ОБЫ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // ordinary cinnamon soil // sol cinnamome ordinaire // gewöhnlicher zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для рода коричневых почв, развитых на рыхлых мелкозёмистых породах и не имеющих солонцеватости или солончаковатости в профиле.

998. КОРИ́ЧНЕВАЯ ОСТЕПНЁННАЯ ПО́ЧВА // heathed cinnamon soil // sol cinnamome bruyéreforme // heidischer zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для рода коричневых почв, характеризующихся растянутостью гумусового профиля, уменьшением гумусности в верхнем и увеличением в нижнем горизонте, потемнением окраски, комковато-зернистой структурой.

999. КОРИ́ЧНЕВАЯ СВЕ́ТЛАЯ ПО́ЧВА // light cinnamon soil // sol cinnamome clair // hellzimtfarbener Boden - термин для вида коричневых почв, содержащих до 6% гумуса в верхнем горизонте (включая слабогумусированные и малогумусные коричневые почвы).

1000. КОРИ́ЧНЕВАЯ СИ́ЛЬНОСОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА // strongly solonetzic cinnamon soil // sol cinnamome solonetzique forte // starksolonetzartiger zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для вида коричневых почв, имеющих призмовидно-столбчатый метаморфический горизонт с содержанием обменного натрия более 10% от ёмкости поглощения.

1001. КОРИ́ЧНЕВАЯ СЛА́БОГУМУСИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // weakly humusified cinnamon soil // sol cinnamome peu humifére // schwach humusierter zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для вида коричневых почв, содержащих менее 4% гумуса в верхнем горизонте.

1002. КОРИ́ЧНЕВАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА // solonetzic cinnamon soil // sol cinnamome solonetzique // solonetzartiger zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для рода и вида коричневых почв, имеющих призмовидно-столбчатый метаморфический горизонт с содержанием обменного натрия от 5% до 10% от емкости поглощения.

1003. КОРИ́ЧНЕВАЯ СОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА // saliniferous cinnamon soil // sol cinnamomesalifére // salzhaltig zimtfarbener Boden - 1) термин русск.шк. (1967) для рода коричневых почв, содержащих легкорастворимые соли в профиле; 2) термин для вида тех же почв, содержащих легкорастворимые соли на глубине 30-80см.

1004. КОРИ́ЧНЕВАЯ СРЕ́ДНЕГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА // moderate humic cinnamon soil // sol cinnamome humique moderée // mässig-humus zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для вида коричневых почв, содержащих более 6% гумуса в верхнем горизонте.

1005. КОРИ́ЧНЕВАЯ ТЁМНАЯ ПО́ЧВА // dark cinnamon soil // sol cinnamome foncé // dunkelzimtfarbener Boden - термин для вида коричневых почв, содержащих более 6% гумуса в верхнем горизонте; соответствует виду среднегумусных коричневых почв.

1006. КОРИ́ЧНЕВАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // typic cinnamon soil // sol cinnamome typique // typischer zimtfarbener Boden - термин русск. шк. (1967) для подтипа коричневых почв, характеризующихся вскипанием в метаморфическом горизонте с глубины 20-35 см, слабо-щелочной реакцией верхних горизонтов, высокой ёмкостью обмена.

1007. КОРИ́ЧНЕВО-КРА́СНАЯ ПО́ЧВА // cinnamon-red soil // sol cinnamomé-rouge // zimtrotfarbiger Boden - термин для почв тропических сухих лесов и кустарников сезонно-влажного климата, имеющих ферраллитную минералогическую основу, гуматно-фульватный гумусовый горизонт с содержанием гумуса около 2%, слабокислую реакцию, насыщенность основаниями более 50%, небольшую емкость поглощения, склонность к ожелезнению поверхности.

1008. КОРИ́ЧНЕВО-СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА // cinnamon-gray forest soil // sol cinnamome-gris forestier // zimtfarbener-grauer Waldboden - местное название рода серых лесных почв, формирующихся на пермских красноцветных глинах.

1009. КОРИ́ЧНЕВО-КАШТА́НОВАЯ ПО́ЧВА // chestnut-brown soil // sol marron // kastanienbraun Boden - термин франц.шк. (1967) для группы изогумусовых насыщенных почв районов с прохладным периодом во время дождей, характеризующихся слабой гумусированностью но существенной оглиненностью в нижней части профиля, имеющих с поверхности комковатую или ореховатую структуру и призмовидную структуру на глубине, бескарбонатных или слабо карбонатных с поверхности. Термин предложен вместо ранее (1965) упо-

треблявшегося термина Каштановая субтропическая почва.

1010. КОРИ́ЧНЕВО-КАШТА́НОВАЯ КО́РОВАЯ ПО́ЧВА // crust chestnut-brown soil // sol marron encroûté // kastanienbraun Krustboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы коричнево-каштановых почв, имеющих карбонатную кору в нижней части профиля.

1011. КОРИ́ЧНЕВО-КАШТА́НОВАЯ ПСЕ́ВДОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА // pseudogleyic chestnut-brown soil // sol marron à pseudogley // pseudogleyischer kastanienbraun Boden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы коричнево-каштановых почв, имеющих псевдоглеевый горизонт в профиле (пятнистость или железистые конкреции).

1012. КОРИ́ЧНЕВО-КАШТА́НОВАЯ РУБЕФИЦИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // rubefied chestnut-brown soil // sol marron rubéfié // rubefizierter kastanienbraun Boden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы коричнево-каштановых почв, характеризующихся красноватой окраской при относительно большом содержании свободного железа.

1013. КОРИ́ЧНЕВО-КАШТА́НОВАЯ СЛА́БО ЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА // slightly saline chestnut-brown soil // sol marron faiblement salé // schwach salzhaltiger kastanienbraun Boden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы коричнево-каштановых почв, имеющих слабое засоление в нижней части профиля.

1014. КОРИ́ЧНЕВО-КАШТА́НОВАЯ СЛА́БО СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА // slightly alkaline chestnut-brown soil // sol marron faiblement alcalisé // schwach alkalischer kastanienbraun Boden - термин франц. шк. (1967) для подгруппы коричнево-каштановых почв, имеющих повышенное содержание (до 10% от емкости поглощения) поглощенного натрия в средней части профиля.

1015. КОРИ́ЧНЕВО-КАШТА́НОВАЯ ТЕКСТУ́РНАЯ ПО́ЧВА // textural chestnut-brown soil // sol marron à B textural // kastanienbraun Texturboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы коричнево-каштановых почв, имеющих иллювиальную глину в горизонте В.

1016. КОРИ́ЧНЕВО-КАШТА́НОВАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // typical chestnut-brown soil // sol marron modal // typischer kastanienbraun Boden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы коричнево-каштановых почв, не имеющих признаков, характерных для других подгрупп этой группы.

1017. КОРИ́ЧНЕВО-КАШТА́НОВАЯ ТРЕЩИНОВА́ТАЯ ПО́ЧВА // vertic chestnut-brown soil // sol marron vertique // vertischer kastanienbraun Boden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы коричнево-каш-

тановых почв, имеющих крупно-призмовидную структуру в горизонте В с трещинами между структурными отдельностями.

1018. КОРУХА́ //korucha //coruha //Korucha (от азерб.) - местное азербайджанское название высокоплодородных почв приусадебных участков, сильно измененных длительным влиянием поливного земледелия при обильном удобрении.

1019. КОША́ЧЬЯ ГЛИ́НА //cat clay //argile chateuse, argile à chats //Katzenton, Pulvererde - термин для дренированных окисленных тяжелых почв приморских маршей, характеризующихся темно-серой окраской с соломенножелтыми пятнами сульфата железа (ярозита), высокой кислотностью и токсичностью в результате окисления сульфидов; син.: кислая сульфатная п.

1020. КРА́СНАЯ ПО́ЧВА // red soil // latérite // Laterit - 1) см. Латеритная п.; 2) сборный термин для различных красно-окрашенных почв тропиков и субтропиков.

1021. КРА́СНАЯ ПО́ЧВА ПЕРЕМЕ́ННО-ВЛА́ЖНЫХ ТРОПИ́ЧЕСКИХ ЛЕСО́В И ВЫСОКОТРА́ВНЫХ САВА́НН - см. Красная ферраллитная п.

1022. КРА́СНАЯ БАЗА́ЛЬТОВАЯ ПО́ЧВА // red basaltic soil // sol rouge basaltique // roter Basaltboden - термин западноевропейских школ для сильновыветрелых лесных почв, имеющих красноватую окраску и формирующихся на элювии базальтов Центральной Европы.

1023. КРА́СНАЯ ЛАТЕРИ́ТНАЯ ПО́ЧВА // red lateritic soil // sol rouge lateritique // Rotlateritboden - см. Красная ферраллитная п.

1024. КРА́СНАЯ ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА // red podzolic soil // sol rouge podzolique //roter podsoliger Boden - термин амер.шк. для мощных красноцветных почв субтропиков и тропиков, имеющих обедненный глиной и полуторными окислами горизонт в верхней части профиля.

1025. КРА́СНАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //red desert soil //sol désertique rouge //rote Wüstenboden - общеупотребительный термин для краснокрашенных почв пустынь (тропических), не имеющих развитого профиля.

1026. КРА́СНАЯ САВА́ННАЯ ПО́ЧВА // red savanne soil // sol rouge de savane // Rotsavannenboden - термин для почв высокотравных тропических саванн вторичного происхождения, во всех отношениях сходных с красно-желтыми ферраллитными почвами, но преимуще-

ственно красного цвета; они кислые, сильно гумусированы (6-8% гумуса), часто содержат железистые конкреции или плотные слои латерита.

1027. КРА́СНАЯ СИАЛЛИ́ТНО-ФЕРРИ́ТНАЯ ПО́ЧВА //siallitic-ferritic red soil //sol rouge siallit-ferritique //siallit-ferritischer Rotboden - термин русск.шк. для ожелезнённых с дифференцированным профилем почв саванн и сухих тропических редколесий; син.: Феррозём, Элювизёмная ожелезнённая п., Красная саванная п., Железистая тропическая п.

1028. КРА́СНАЯ СРЕДИЗЕ́МНОМО́РСКАЯ ПО́ЧВА //red mediterranean soil // sol rouge méditerranéen //Mediterranroterde, Mediterranrotboden, rote Mediterranboden - термин западно-европейских школ для красных почв с профилем АВС, образующихся на карбонатных или бескарбонатных породах в условиях субтропического средиземноморского климата, имеющих иллювиальную глину в горизонте В в виде глинистых корочек и потеков на гранях структурных отдельностях, выщелоченные от карбонатов горизонты А и большую часть В, степень насыщенности основаниями в горизонте В более 35%. Для карбонатных почв этого типа, или почв, формирующихся на известняках в Зап.Европе существуют синонимы (нем.шк.) - терра росса, красный карбонатный суглинок. В настоящее время термин подвергся резкой критике и нуждается в замене.

1029. КРА́СНАЯ ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ ПО́ЧВА //red ferrallitic soil //sol rouge ferrallitique // Rotferrallitboden - термин для краснокрашенных сильно ферраллитизованных почв влажных тропических лесов и высокотравных саванн.

1030. КРА́СНО-БУ́РАЯ ПО́ЧВА - см. Красно-бурая саванная п.

1031. КРА́СНО-БУ́РАЯ ПО́ЧВА СУХИ́Х САВА́НН //red-brown soil of dry savanne //sol rouge-brun de savanne sèche // rotbrauner Trockensavannenboden - термин русск.шк. для типа почв сухих тропиков, образующихся под низкотравными саваннами и характеризующихся слабой ферраллитизацией, выражающейся преимущественно в ожелезнении продуктов выветривания, обусловливающей красноватые тона окраски; син.: красно-бурая саванная п.

1032. КРА́СНО-БУ́РАЯ САВА́ННАЯ ПО́ЧВА //red-brown savanne soil //sol rouge-brun de savanne //rotbrauner Savannenboden - термин для ярко окрашенных в красно-бурые тона (оранжево-кирпичные)

почв тропических остепненных саванн, в которых красноватые тона связаны, вероятно, с дегидратацией образующихся в жаркое время при почвообразовании гидратов окислов железа; почвы содержат мало гумуса (1,5-3%), имеют оглинение в средней части профиля и карбонатно-аккумулятивный горизонт в нижней части, нейтральную реакцию во всем профиле; син.: красно-бурая почва сухих саванн.

1033. КРАСНОВА́ТАЯ ПО́ЧВА ПРЕ́РИЙ //reddish prairie soil //sol rouge de prairie //rötlicher Prärieboden - термин западноевропейских школ для черноземовидных почв субтропических прерий, имеющих красноватые тона в окраске профиля.

1034. КРАСНОВА́ТО-БУ́РАЯ ПО́ЧВА //reddish-brown (steppe) soil //sol brun-roux (de steppe) //rotbrauner (Steppen-) Boden - термин американской школы для почв опустыненных степей. Син.: красновато-бурая полупустынная п.

1035. КРАСНОВА́ТО-БУ́РАЯ ПО́ЧВА ОПУСТЫ́НЕННЫХ САВА́НН //reddish-brown soil of desertic savanne //sol brun-roux de savanne désertique //rotlichbrauner Boden der Wüstensavanne - термин для почв, образующихся в зоне перехода от саванн к тропическим пустыням; почва слабо дифференцирована на горизонты, содержит в верхнем слое 1-1,5% гумуса, карбонатна по всему профилю, часто засолена в нижней части профиля.

1036. КРАСНОВА́ТО-БУ́РАЯ ЛАТЕРИ́ТНАЯ ПО́ЧВА //reddish-brown lateritic soil //sol latéritique brun-roux //rötlichbrauner Laterit-boden - термин амер.шк. для латеритных почв (латосолей), не имеющих в профиле оподзоленного или обедненного глиной горизонта. Син.: красновато-бурый латерит.

1037. КРАСНОВА́ТО-БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //reddish-brown forest soil //sol brun-roux de forét //rotlichbrauner Waldboden - термин западно-европейских школ для почв, переходных между бурозёмами центральной Европы и краснозёмами Средиземноморья. Син.: бурозём средиземноморский.

1038. КРАСНОВА́ТО-БУ́РАЯ ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //reddish-brown semidesert soil //sol brun-roux semi-désertique //rotlichbrauner Boden der Halbwüste - термин немецкой школы для почв опустыненных степей и полупустынь. Син.: красновато-бурая почва.

1039. КРАСНОВА́ТО-БУ́РАЯ СРЕДИЗЕ́МНОМО́РСКАЯ ПО́ЧВА //reddish-brown mediterranean soil //sol rouge-brun méditerranéen//Mediterran-rotbraunboden - см. Красная средиземноморская почва.

1040. КРАСНОВА́ТО-БУ́РАЯ СТЕПНА́Я ПО́ЧВА //reddish-brown steppe soil // sol brun-roux de steppe //rotbrauner Steppenboden - термин западноевропейских школ для черноземовидных почв сухих степей и опустыненных степей, имеющих красноватые тона в окраске профиля.

1041. КРАСНОВА́ТО-БУ́РЫЙ ЛАТЕРИ́Т //reddish-brown laterite //latérite brun-roux //rötlichbrauner Laterit - термин амер.шк. для латеритных почв (латосолей), не имеющих в профиле оподзоленного или обедненного глиной горизонта. Син.: красновато-бурая латеритная п.

1042. КРАСНОВА́ТО-КАШТА́НОВАЯ ПО́ЧВА //reddish chestnut soil //sol châtain-rougeâtre //rötlich-kastanienfarbiger Boden - 1) термин западноевропейских школ для почв опустыненных степей субтропиков, имеющих свойства каштановых почв, но отличающихся наличием красноватых тонов в окраске; 2) термин амер. шк. для почв южной части плато прерий, имеющих относительно высокую гумусированность, оглиненность, насыщенность кальцием и аналогичных коричневым почвам.

1043. КРАСНОВА́ТО-ЧЁРНАЯ ПО́ЧВА СУБТРОПИ́ЧЕСКИХ ПРЕ́РИЙ //reddish-black soil of subtropical prairie //sol noir-roux de prairie subtropical //rotlichschwarzer Boden der subtropischer Prärie - термин для почв, развитых под мощной травянистой растительностью в районах с полувлажным субтропическим климатом, характеризующихся комковато-зернистым гумусовым горизонтом мощностью 20-40 см с гумусированностью 2-5%, кислой реакцией, оглиненным горизонтом В с комковато-призмовидной структурой, постепенно переходящим в породу.

1044. КРА́СНО-ЖЁЛТАЯ ПО́ЧВА //red-yellow soil //sol rouge-jaune // rotgelbfarbiger Boden - термин амер.шк. для краснозёмов и желтозёмов субтропиков, включаемых в одну группу почв.

1045. КРА́СНО-ЖЁЛТАЯ ЛАТЕРИ́ТНАЯ ПО́ЧВА //red-yellow lateritic soil // sol rouge-jaune lateritique //rotgelbfarbiger Lateritboden - см. Красно-желтая ферраллитная п.

1046. КРА́СНО-ЖЁЛТАЯ ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //red-yellow podzolic soil // sol podzolique rouge-jaune //rot-gelber podsolierter Boden - термин американской школы для красных и желтых ферраллитных почв, имеющих облегченный по механическому составу горизонт в верхней части профиля.

1047. КРА́СНО-ЖЁЛТАЯ СРЕДИЗЕ́МНОМО́РСКАЯ ПО́ЧВА //red-yellow mediterranean soil //sol rouge-jaune méditerranéen //Mediterranrotgelbboden - см. Красная средиземноморская п.

1048. КРА́СНО-ЖЁЛТАЯ ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ ПО́ЧВА //red-yellow ferrallitic soil //sol ferrallitique rouge-jaune //rot-gelber ferrallitischer Boden - термин для почв тропического пояса (красных, бурых, желтых), формирующихся на ферраллитных корах выветривания и характеризующихся значительной оглиненностью, выветрелостью исходной породы, накоплением каолинита и гидратов окислов железа и алюминия в глинистой фракции, значительной гумусированностью в естественном состоянии под лесом, кислой реакцией среды, дифференцированностью профиля по глине и R_2O_3. Син.: латеритная п., ферральсоль, оксисоль.

1049. КРАСНОЗЁМ //red earth, krasnozem //terre rouge, krasnozem, sol rouge //Roterde, Krashnozem, rote Erde, Krasnosem - термин русской школы для краснокрашенных сильновыветрелых и оглиненных кислых лесных почв влажных субтропиков, хорошо дренированных и обогащенных полуторными окислами за счет выноса оснований и кремнезёма.

1050. КРАСНОЗЁМ ГЛЕЕВА́ТЫЙ //gleyic krasnozem //krasnozem gleyique //gleyischer Krasnosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа краснозёмов глеевых, не имеющих обеднения верхних горизонтов илом и R_2O_3.

1051. КРАСНОЗЁМ ГЛЕ́ЕВЫЙ //gley krasnozem //krasnozem à gley //Gleykrasnosem - термин русск.шк. (1967) для гидроморфных почв, формирующихся в условиях избыточного увлажнения среди краснозёмов и имеющих оглеенный горизонт в нижней части профиля.

1052. КРАСНОЗЁМ ГЛЕ́ЕВЫЙ ОПОДЗО́ЛЕННЫЙ //podzolized gley krasnozem //krasnozem podzolisé à gley //podsolierter Gleykrasnosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа краснозёмов глеевых, характеризующихся обеднением верхнего горизонта илом и R_2O_3, наличием уплотненного иллювиального горизонта в средней части профиля и глеевого - в нижней.

1053. КРАСНОЗЁМ ЛАТЕРИТИЗО́ВАННЫЙ - см. Краснозём латеритный.

1054. КРАСНОЗЁМ ЛАТЕРИ́ТНЫЙ //lateritic red earth //terre rouge lateritique //lateritischer Roterde - устаревший термин амер.шк. для красных и красно-желтых ферраллитных почв тропиков и субтропиков, имеющих в профиле слой железистых конкреций (лате-

ритный слой).

1055. КРАСНОЗЁМ ОПОДЗО́ЛЕННЫЙ //podzolized krasnozem //krasnozem podzolisé //podsolierter Krasnosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа краснозёмов, верхние горизонты которых обеднены илом и R_2O_3, а в средней части профиля имеется уплотненный иллювиальный горизонт.

1056. КРАСНОЗЁМ СЛА́БООПОДЗО́ЛЕННЫЙ //slightly podzolized krasnozem //krasnozem peu podzolisé //schwach podsolierter Krasnosem - термин русск.шк. (1967) для вида оподзоленных краснозёмов, у которых осветленный оподзоленный горизонт выражен отдельными пятнами.

1057. КРАСНОЗЁМ СРЕ́ДНЕОПОДЗО́ЛЕННЫЙ //modepately podzolized krasnozem //krasnozem podzolisé moderée //mässig-podsolierter Krasnosem - термин русск.шк. (1967) для вида оподзоленных краснозёмов, у которых имеется сплошной осветленный оподзоленный горизонт.

1058. КРАСНОЗЁМ ТИПИ́ЧНЫЙ //typic krasnozem //krasnozem typique //typischer Krasnosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа краснозёмов, в верхней части которых нет морфологического или аналитического обеднения илом и R_2O_3.

1059. КРАСНОЗЁМНО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА - см. Краснозём оподзоленный.

1060. КРА́СНО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ПО́ЧВА //red-cinnamonic soil //sol cinnamome-rouge //rotzimtfarbener Boden - термин для почв тропиков, формирующихся под сухими листопадными лесами и кустарниками и характеризующихся дифференцированным по глине профилем, некоторой солонцеватостью, наличием карбонатно-аккумулятивного горизонта в нижней части профиля, средней гумусностью (3-5%), относительно лёгким механическим составом и нейтральной реакцией.

1061. КРА́СНЫЙ ЛАТЕРИ́ТНЫЙ СУ́ГЛИНОК //red lateritic loam //sol latéritique //Lateritboden - см. Латеритная п.

1062. КРА́СНЫЙ СУ́ГЛИНОК //red loam //limon rouge //Rotlehm, roter lehm - термин немецкой школы для красных сиаллитных суглинистых почв тропиков и субтропиков. Син.: пластосоль красная.

1063. КРА́СНЫЙ СУ́ГЛИНОК КАРБОНА́ТНЫЙ //red calcareous loam //limon rouge carbonaté //Kalkstein-Rotlehm - термин немецкой школы для красных известняковых почв средиземноморских районов. Син.: красная средиземноморская почва, терра росса.

1064. КРЕМНЕВАЯ КОРА́ //silica crust, silica pan //croûte siliceux, horizon dur de silice //kieselartiger Kruste, harter Silikathorizont - термин для уплотненных сцементированных вторичным кремнезёмом внутрипочвенных или поверхностных слоёв различной мощности, формирующихся преимущественно в пустынях; один из типов пустынных кор. Син.: окремнелая кора, дурипэн.

1065. КРИАКВЕ́НТ //cryaquent //cryaquent //Kryaquent (от греч. cryos - холод, лат. aqua - вода и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквентов (см.), которые: 1) имеют среднегодовую температуру почвы менее 8°С и среднюю летнюю температуру почвы на глубине 50 см или на контакте с плотной породой менее 15°С, если они дренированы и либо не имеют горизонта A_O, либо распаханы; либо если они дренированы и имеют горизонт A_O, то имеют среднюю летнюю температуру почвы на глубине 50 см менее 8°С; либо если они не дренированы и имеют горизонт A_O, то имеют среднюю летнюю температуру менее 6°С; 2) имеют величину N 0,5 или менее в каком-либо подгоризонте между 20 и 50 см или среднюю годовую температуру почвы 0°С или менее. Большая группа Криаквентов включает 4 подгруппы: 1) типичные криаквенты (typic), 2) вулканические криаквенты (andic), 3) мерзлотные криаквенты (pergelic) и 4) трещиноватые криаквенты (vertic).

1066. КРИАКВЕ́ПТ //cryaquept //cryaquept //Kryaquept (от греч. cryos - холод, лат. aqua - вода и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-69) для большой группы аквептов (см.), которые: 1) имеют среднегодовую температуру почвы ниже 8°С, а среднелетнюю температуру на глубине 50 см или на контакте с плотной породой менее 15°С, если они дренированы и распаханы или не имеют горизонта A_O, или менее 8°С, если он дренированы и имеют горизонт A_O или торфяной слой, или менее 6°С, если они не дренированы и имеют горизонт A_O или торфяной слой; 2) имеют величину N менее 0,5 в каком-либо горизонте между 20 и 50 см, либо среднегодовую температуру почвы 0°С или менее. В пределах этой группы выделяются 11 подгрупп: 1) типичные криаквепты (typic), 2) аэральные криаквепты (aeric), 3) аэральные гумусовые криаквепты (aeric humic), 4) вулканические криаквепты (andic), 5) вулканические торфянистые криаквепты (andic histic), 6) торфянис-

тые криаквепты (histic), 7) торфянистые маломощные мерзлотные криаквепты (histic lithic pergelic), 8) торфянистые мерзлотные криаквепты (histic pergelic), 9) гумусовые криаквепты (humic), 10) маломощные мерзлотные криаквепты (lithic pergelic) и 11) мерзлотные криаквепты (pergelic).

1067. КРИАКВОД //cryaquod //cryaquod //Kryaquod (от греч. cryos - холод, лат. aqua - вода и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы акводов (см.), которые не имеют слоеватого горизонта или фраджипэна[x)], но имеют среднегодовую температуру почвы ниже 8°С и среднелетнюю температуру на 50 см или на контакте с плотной породой (что выше) ниже 15°С, если дренированы и не имеют A_0, ниже 8°С, если дренированы и имеют A_0 и ниже 6°С, если не дренированы и имеют A_0 или торфянистый горизонт с поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 4 подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) маломощные (lithic), 3) мерзлотные (pergelic) и 4) железистые (sideric) криакводы.

1068. КРИАКВОЛЛЬ //cryaquoll //cryaquoll //Kryaquoll (от греч. cryos - холод, лат. aqua - вода и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы акволлей (см.), которые имеют среднегодовую температуру почвы ниже 8°С и среднелетнюю температуру на 50 см или на контакте с плотной породой (что ближе) менее 15°С, если почва дренирована и не имеет торфяного[x)] поверхностного горизонта или A_0, менее 8°С, если почва дренирована и имеет горизонт A_0 и менее 6°С, если почва не дренирована и имеет A_0 или торфянистый поверхностный горизонт. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 8 подгрупп: 1) типичные (typic), 2) вулканические (andic), 3) глинисто-иллювиальные (argic), 4) известковые (calcic), 5) намытые (cumulic), 6) торфянистые (histic), 7) мерзлотные (pergelic) и 8) трещиноватые (vertic) криакволли.

1069. КРИАНДЕПТ //cryandept //cryandept //Kryandept (от греч. cryos - холод, яп. an - тёмный, яп. do - почва и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы андептов (см.), которые имеют среднегодовую температуру почвы менее 8°С и среднелетнюю температуру на глубине 50 см или на контакте с плотной породой,

если она ближе, менее 15°С, если почва распахана или не имеет горизонта A_0, или менее 8°С, если есть горизонт A_0. В пределах этой группы выделяются 5 подгрупп почв: 1) типичные криандепты (typic), 2) гидроморфные криандепты (aquic), 3) бедные криандепты (dystric), 4) бедные маломощные криандепты (dystric lithic) и 5) маломощные криандепты (lithic).

1070. КРИОБОРА́ЛЬФ //cryoboralf //cryoboralf //Kryoboralf (от греч. cryos - холод, греч. boreas - северный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы боральфов (см.), которые: 1) имеют среднелетнюю температуру на 50 см или на контакте с породой, если он выше, ниже 15°С для пахотных или не имеющих подстилки почв и ниже 8°С для почв с подстилкой; 2) не имеют аргиллового[x)] горизонта с верхней границей глубже 60 см от минеральной поверхности, если только мех.состав не легче супеси во всех подгоризонтах выше аргиллового горизонта; 3) не имеют фраджипэна[x)] или натриевого[x)] горизонта. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 6 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) вулканические (andic), 3) языковатые (glossic), 4) маломощные (lithic), 5) моллевые (mollic) и 6) мерзлотные (pergelic) криоборальфы.

1071. КРИОБОРО́ЛЛЬ //cryoboroll //cryoboroll //Kryoboroll (от греч. cryos - холод, греч. boreas - северный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы бороллей (см.), которые: 1) имеют среднелетнюю температуру на 50 см или на контакте с плотной породой (что выше) менее 15°С если нет A_0 или менее 8°С, если есть A_0; 2) не имеют аргиллового[x)] горизонта с верхней границей ниже 60 см от поверхности, если только мех.состав не легче пылеватой супеси во всех горизонтах выше аргиллового. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 19 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) резко дифференцированные (abruptic), 3) вулканические (andic), 4) вулканические глинисто-иллювиальные (andic argic), 5) гидроморфные (aquic), 6) глинисто-иллювиальные гидроморфные (argiaquic), 7) глинисто-иллювиальные (argic), 8) глинисто-иллювиальные маломощные (argic lithic), 9) глинисто-иллювиальные мощные (argic pachic), 10) глинисто-иллювиальные трещиноватые (argic vertic), 11) боральфовые (boralfic), 12) боральфовые маломощные (boralfic lithic), 13) известковые (calcic), 14) известковые

мощные (calcic pachic), 15) маломощные (lithic), 16) натриевые (natric), 17) мощные (pachic), 18) мерзлотные (pergelic) и 19) трещиноватые (vertic) криоборолли.

1072. КРИОГЕ́ННАЯ ПО́ЧВА //cryogenic soil //cryosol //Frostboden, Frosterde, Frostmusterboden - термин для сборной группы почв, в генезисе которых существенную роль играют криотурбационные процессы, связанные с присутствием на некоторой глубине многолетней мерзлоты. Син.: криоморфная п.

1073. КРИ́ОГУМО́Д //cryohumod //cryohumod //Kryohumod (от греч. cryos - холод, лат. humus - гумус и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы гумодов (см.), которые имеют среднегодовую температуру менее 8°С, а среднелетнюю температуру на 50 см либо менее 15°С если распаханы или не имеют A_O, либо менее 8°С, если с A_O, и не имеют фраджипэна[x)] в профиле.

1074. КРИОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //cryomorphic soil //sol cryomorphé //cryomorpher Boden - термин для сборной группы почв, связанных в своем генезисе с наличием на некоторой глубине слоя вечной мерзлоты. Син.: криогенная п.

1075. КРИ́ОПСАММЕ́НТ //cryopsamment //cryopsamment //Kryopsamment (от греч. cryos - холод, греч. psammos - песок и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы псаментов (см.), которые имеют среднегодовую температуру почвы ниже 8°С и среднелетнюю температуру на глубине 50 см или на контакте с плотной породой, если она ближе 50 см, либо менее 15°С если почва распахивается или не имеет горизонта A_O, либо менее 8°С, если почва имеет горизонт A_O. В пределах этой группы выделяются 5 подгрупп: 1) типичные криопсаменты (typic), 2) альфовые криопсаменты (alfic), 3) гидроморфные криопсаменты (aquic), 4) гидроморфные мерзлотные криопсаменты (aquic pergelic) и 5) маломощные криопсаменты (lithic).

1076. КРИ́ОРТЕНТ //cryorthent //cryorthent //Kryorthent (от греч. cryos - холод, греч. orthos - настоящий и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортентов (см.), которые имеют среднегодовую почвенную температуру менее 8°С и среднелетнюю температуру на глубине 50 см или на контакте с плотной породой (что ближе) либо менее 15°С, если распаханы или не имеют горизонта

A_0, либо менее 8°С, если не имеют горизонта A_0. Эта большая группа включает подгруппы: 1) типичные криортенты (typic), 2) вулканические криортенты (andic), 3) вулканические гидроморфные криортенты (andic aquic), 4) гидроморфные криортенты (aquic), 5) маломощные криортенты (lithic), 6) мерзлотные криортенты (pergelic) и 7) трещиноватые криортенты (vertic).

1077. КРИОРТОД' //cryorthod //cryorthod //Kryorthod (от греч. cryos - холод, греч. orthos - настоящий и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортодов (см.), которые: 1) имеют среднегодовую температуру почвы ниже 8°С и среднелетнюю температуру на 50 см или на контакте с плотной породой (что ближе) ниже 15°С, если почва распахана или не имеет A_0 и ниже 8°С, если есть A_0; 2) не имеют фраджипэна[x]; 3) не имеют слоеватого горизонта над сподовым[x] горизонтом. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 9 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) боральфовые (boralfic), 3) энтовые (entic), 4) гумусовые (humic), 5) гумусовые маломощные (humic lithic), 6) гумусовые мерзлотные (humic pergelic), 7) маломощные (lithic), 8) маломощные мерзлотные (lithic pergelic) и 9) мерзлотные (pergelic) криортоды.

1078. КРИОСАПРИСТ //cryosaprist //cryosaprist //Kryosaprist (от греч. cryos - холод, греч. sapros - гнилой и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы сапристов (см.), имеющих в профиле мерзлоту в течение двух летних месяцев либо никогда не промерзающих ниже 5 см, но имеющих среднегодовую температуру ниже 8°С; в пределах этой большой почвенной группы выделяются 5 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) скальные (lithic), 3) флюваквентные (fluvaquentic), 4) мерзлотные (pergelic), 5) землистые (terric) криосапристы.

1079. КРИОСОЛЬ //cryosol //cryosol //Kryosol (от греч. cryos - холод и лат. solum - почва) - термин франц.шк. (1967) для группы слаборазвитых мерзлотных почв (см.), имеющих в профиле льдистые сегрегированные включения, сетчатое строение, многолетнюю мерзлоту с поверхности или близко от нее и имеющих обычно на поверхности каменистый материал.

1080. КРИОСОЛЬ ГРУБАЯ //rough cryosol //cryosol brut //Grobkryosol (от греч. cryos - холод и лат. solum - почва) - см. Грубая ми-

неральная климатическая почва холодных пустынь. Термин франц. шк. (1967), употребляемый в качестве синонима для подкласса почв, входящих в класс Грубых минеральных почв (см.) и распространенных в перигляциальных районах высоких широт или высокогорий; почвы имеют профиль (A)C, (A)R, C или R, с ничтожной гумусированностью, с наличием многолетней мерзлоты или льда в профиле, с признаками криотурбации.

1081. КРИОСОЛЬ ГРУБАЯ ИЗБОРОЖДЁННАЯ //rough streak cryosol //cryosol brut strié //Streifengrobkryosol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы упорядоченных грубых криосолей (см.), на поверхности которых камни располагаются в виде вытянутых линий или борозд.

1082. КРИОСОЛЬ ГРУБАЯ МИКРОРЕЛЬЕФНАЯ //rough cryosol with microrelief //cryosol brut à microrelief //Mikroreliefgrobkryosol - термин франц.шк. (1967) для почв подгруппы неупорядоченных грубых криосолей (см.), имеющих на поверхности выраженный микрорельеф (солифлюкционные валики и подушки под склонами, скульптуры сегрегации льда или подвижек минеральной массы).

1083. КРИОСОЛЬ ГРУБАЯ НЕУПОРЯДОЧЕННАЯ //non-organized rough cryosol //cryosol brut inorganisé //nicht organisierter Grobkryosol - термин франц.шк. (1967) для группы грубых криосолей (см.), у которых криогенные процессы не привели к геометрическому перераспределению минерального материала.

1084. КРИОСОЛЬ ГРУБАЯ РОВНАЯ //flat rough cryosol //cryosol brut plan uni //Flachgrobkryosol - термин франц.шк. (1967) для почв подгруппы неупорядоченных грубых криосолей (см.), имеющих ровную плоскую поверхность.

1085. КРИОСОЛЬ ГРУБАЯ С ГРЯЗЕВЫМИ КРАТЕРАМИ //rough cryosol with mud craters //cryosol brut à pustules de boue //Grobkryosol-mit Schlammkrater - термин франц.шк. (1967) для подгруппы упорядоченных грубых криосолей (см.), по голой поверхности которых между камней разбросаны мелкие грязевые кратеры.

1086. КРИОСОЛЬ ГРУБАЯ С ЗЕМЛЯНЫМИ ПОЛИГОНАМИ //rough cryosol with earth polygons //cryosol brut à "polygones de terre" //Grobkryosol mit Erdenpolygonen - термин франц.шк. (1967) для подгруппы упорядоченных грубых криосолей (см.), у которых мелкоземистый минеральный материал разбит на мелкие регулярные полигоны, разделенные неглубокими, но часто широкими трещинами.

1087. КРИОСОЛЬ ГРУБАЯ С КАМЕННЫМИ ПОЛИГОНАМИ //rough cryosol with stony polygons //cryosol brut à polygones de pierres //Grobkryosol mit Steinpolygonen - термин франц.шк. (1967) для подгруппы упорядоченных грубых криосолей (см.), имеющих на поверхности правильные каменные полигоны или кольца ("каменные розы").

1088. КРИОСОЛЬ ГРУБАЯ С СЕТЬЮ УГЛОВЫХ ТРЕЩИН //rough cryosol with angular cracking net //cryosol brut à réseaux de fentes en coin //Grobkryosol mit der eckiger Trocken - термин франц. шк. (1967) для подгруппы упорядоченных грубых криосолей (см.) с широкой сетью трещин, не связанных с болотной растительностью; трещины часто заполнены эоловым песком.

1089. КРИОСОЛЬ ГРУБАЯ УПОРЯДОЧЕННАЯ //organized rough cryosol //cryosol brut organisé //organisierter Grobkryosol - термин франц.шк. (1967) для группы грубых криосолей (см.), у которых криогенные процессы привели к перераспределению минеральных фрагментов по геометрическим фигурам различных форм и размеров или к появлению сети трещин, разбивающих массу на различной формы и размеров клетки.

1090. КРИОСОЛЬ ИЗВОРОЖДЁННАЯ //streak cryosol //cryosol strié //Streifenkryosol - см. Криосоль сетчато-параллельная.

1091. КРИОСОЛЬ КОЧКОВАТАЯ //mound cryosol //cryosol à buttes //Hügelkryosol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы слаборазвитых мерзлотных почв (см.), у которых поверхностные средних размеров кочки разделены широкими, но не глубокими трещинами.

1092. КРИОСОЛЬ КРУПНОЛИНЗОВАЯ //great lentils cryosol //cryosol à grandes lentilles //Grosslinsekryosol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы слаборазвитых мерзлотных почв (см.), имеющих в профиле крупные линзы многолетнего льда, располагающиеся хаотически.

1093. КРИОСОЛЬ ЛЬДИСТО-КОЧКОВАТАЯ //ice mound cryosol //cryosol à buttes à noyau //Kernhügelkryosol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы слаборазвитых мерзлотных почв (см.), поверхность которых представлена микрокочками с льдистыми ядрами.

1094. КРИОСОЛЬ МЕЛКОЛИНЗОВАЯ //small lentils cryosol //cryosol à petites lentilles //Kleinlinsekryosol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы слаборазвитых мерзлотных почв (см.),

имеющих в профиле мелкие линзы многолетнего льда, располагающиеся хаотически.

1095. КРИОСОЛЬ С ГРЯЗЕВЫМИ КРАТЕРАМИ //cryosol with mud craters // cryosol à pustules de boue //Schlammkraterkryosol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы слаборазвитых мерзлотных почв (см.), по поверхности которых разбросаны мелкие грязевые кратеры.

1096. КРИОСОЛЬ СЕТЧАТО-ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ //net-parallel cryosol //cryosol à réseaux parallèles //Netzparallelkryosol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы слаборазвитых мерзлотных почв (см.), на поверхности которых камни располагаются в виде вытянутых линий или борозд. Син.: криосоль изборожденная.

1097. КРИОСОЛЬ СЕТЧАТО-ПОЛИГОНАЛЬНАЯ //net-polygonal cryosol // cryosol à réseau polygonal //Netzpolygonalkryosol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы слаборазвитых мерзлотных почв (см.), в которых полигональная сеть трещин заполнена льдом.

1098. КРИОСОЛЬ СЕТЧАТО-ПОЛИГОНАЛЬНАЯ КАМЕНИСТАЯ //stony net-polygonal cryosol //cryosol à réseaux polygonaux à pierres //Steinnetzpolygonalkryosol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы слаборазвитых мерзлотных почв (см.), имеющих на поверхности каменные полигоны или окружности.

1099. КРИОТУРБИРОВАННАЯ ПОЧВА //cryoturbated soil //sol cryoturbé //kryoturbierter Boden - термин для почв, в профиле которых видны следы криотурбационных явлений.

1100. КРИОТУРБАЦИОННАЯ ПОЧВА //cryoturbation soil //sol de cryoturbation //Kryoturbationboden (от греч. cryos - холод и лат. turbe - поворачивать) - термин для почв, связанных в своем происхождении с криотурбационными явлениями, которые могут быть и не видны в настоящее время в почвенном профиле, но определили ряд почвенных свойств, как например, в щельных почвах Восточной Сибири.

1101. КРИОФИБРИСТ //cryofibrist //cryofibrist //Kryofibrist (от греч. cryos - холод, лат. fibra - ткань и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы фибристов (см.), имеющих среднегодовую температуру почвы ниже 8°с и содержащих в торфе менее трех четвертей сфагновых остатков; в пределах этой большой почвенной группы выделяются 6 подгрупп почв: 1) типичные (typic),

2) фловаквентные (fluvaquentic), 3) скальные (lithic), 4) мерзлотные (pergelic), 5) сфагновые (sphagnic), 6) землистые (terric) криофибристы.

1102. КРИОФЛЮВЕНТ //cryofluvent //cryofluvent //Kryofluvent (от греч. cryos - холод, лат. fluveus - река и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы флювентов (см.), которые имеют среднегодовую температуру почвы ниже 8°С, а среднелетнюю температуру на глубине 50 см либо менее 15°С, если распахиваются или без горизонта A_0, либо менее 8°С, если имеют горизонт A_0. В пределах этой большой группы выделяют 3 подгруппы почв: 1) типичные криофлювенты (typic), 2) вулканические криофлювенты (andic) и 3) гидроморфные криофлювенты (aquic).

1103. КРИОФОЛИСТ //cryofolist //cryofolist //Kryofolist (от греч. cryos - холод, лат. folia - листва и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы фолистов (см.), имеющих мерзлотный тепловой режим.

1104. КРИОХЕМИСТ //cryohemist //cryohemist //Kryohemist (от греч. cryos - холод, греч. hemi - половина и порядкового корня для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы хемистов (см.), имеющих в профиле слой мерзлоты в течение двух летних месяцев либо не промерзающих ниже 5 см, но имеющих среднегодовую температуру ниже 8°С; не имеющих аккумуляции сульфидов или сульфатов в профиле; в пределах этой большой почвенной группы выделяются 5 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) скальные (lithic), 3) фловаквентные (fluvaquentic), 4) мерзлотные (pergelic) и 5) землистые (terric) криохемисты.

1105. КРИОХРЕПТ //cryochrept //cryochrept //Kryochrept (от греч. cryos - холод, греч. ochros - светлый и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы охрептов (см.), которые: 1) имеют среднегодовую температуру почвы менее 8°С, а среднелетнюю почвенную температуру на глубине 50 см или на контакте с плотной породой менее 15°С, если распаханы или не имеют горизонта A_0 или менее 0°С, если имеют горизонт A_0; 2) не имеют фраджипэна[x)] и дурипэна[x)] в пределах 1 м от поверхности. В пределах этой группы выделяются 3 подгруппы: 1) типичные

криохрепты (typic), 2) вулканические криохрепты (andic) и 3) маломощные криохрепты (lithic).

1106. КРИУМБРЕ́ПТ //cryumbrept //cryumbrept //Kryumbrept (от греч. cryos - холод, лат. umbra - темная тень и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы умбрептов (см.), которые: 1) имеют среднегодовую температуру почвы ниже 8^{o}C, а среднелетнюю температуру на 50 см или на контакте с породой ниже 15^{o}C, если распаханы или не имеют A_{o}, либо ниже 8^{o}C, если есть A_{o}; 2) не имеют фраджипэна[x)] и антропового[x)] горизонта. В пределах этой группы выделяются 6 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) вулканические (andic), 3) энтовые (entic), 4) маломощные (lithic), 5) маломощные мерзлотные (lithic pergelic) и 6) мерзлотные (pergelic) криумбрепты.

1107. КРИ́ПТОПОДЗО́Л //cryptopodzol, latent podzol //podzol caché // verborgener Podsol (от греч. kryptos - скрытый и русск. подзол) - термин западно-европейских школ для лесных почв, не имеющих морфологических признаков оподзоленности, у которых анализ показывает перемещение аморфных веществ из верхнего горизонта в среднюю часть профиля.

1108. КРИ́ПТОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //cryptopodzolic soil //sol cryptopodzolique //Kriptopodsolboden, verborgener Podsolboden - 1) термин франц.шк. (1965,1967) для группы почв, входящей в подкласс оподзоленных почв умеренного климата, не имеющих подзолистого горизонта A_{2}, имеющих горизонт B тусклой буро-красной или серо-черной окраски, не имеющих морфологических признаков оподзоленности, которая выявляется химически (повышенное содержание гумуса в горизонте B, повышенное отношение C:N, преобладание фульвокислой над гуминовыми, преобладание среди гуминовых бурых кислот) и по наличию плёнок в горизонте B; 2) см. Скрыто-подзолистая п.

1109. КРИ́ПТОПОДЗО́ЛИСТАЯ БУ́РАЯ ПО́ЧВА //cryptopodzolic brown soil // sol cryptopodzolique brun // brauner Kriptopodsolboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы криптоподзолистых почв, имеющих профиль ABC, в котором горизонт B имеет бурую окраску, большое содержание гумуса (более 2%); почвы сильно ненасыщенные, богаты фульвокислотами, причем их содержание в горизонте A вдвое больше, чем в горизонте B; характерны плёнки на микроагрегатах горизонта B; содержание свободного Al имеет мак-

симум в горизонте В, а кривая распределения по профилю свободного железа не имеет такого "живота" в горизонте В.

1110. КРИ́ПТОПОДЗО́ЛИСТАЯ ГУМУСИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // humusified cryptopodzolic soil // sol crypto-podzolique humifére // humusischer Kriptopodsolboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы криптоподзолистых почв, имеющих профиль $A_1(B)C$, у которых черный мощный (30-60 см) горизонт A_1 содержит более 10% гумуса со степенью гумификации более 50% и отношением C:N около 15-18; нижележащий горизонт В плохо различается морфологически, содержит много свободного алюминия; это почвы невысоких гор или атлантических территорий. Син.: ранкер криптоподзолистый, ранкер псевдо-альпийский.

1111. КРИ́ПТОРЕНДЗИ́НА // cryptorendzina // cryptorendzine // Kryptorendzina (от гр. cryptós - скрытый и польск. - рендзина) - термин франц.шк. (1967) для группы почв, входящей в подкласс карбонатных почв класса кальцемагнезиальных почв, содержащих карбонат магния, вскипающих с подогретой HCl, содержащих щебенку доломита, имеющих профиль AC или A(B)C, pH менее 7,0 и формирующихся на доломитах.

1112. КСЕРА́ЛЬФ // xeralf // xeralf // Xeralf (от греч. xeros - сухой и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка альфисолей (см.), которые: 1) имеют среднегодовую почвенную температуру между 8 и 22°C, а разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см более 5°C; 2) сухие два и более месяцев подряд 7 из 10 лет во всех частях почвы между 18 и 50 см или контактом с породой, если он ближе 50 см, или непосредственно в подгоризонте над контактом с породой, если он ближе 18 см; 3) не насыщены водой в какой-либо период или не имеют признаков переувлажнения, описанных для аквальфов (см.). В пределах этого подпорядка выделяются 6 больших почвенных групп: 1) дуриксеральфы, 2) гаплоксеральфы, 3) натриксеральфы, 4) палексеральфы, 5) плинтоксеральфы и 6) родоксеральфы.

1113. КСЕРЕ́РТ // xerert // xerert // Xerert (от греч. xeros - сухой и порядкового корня ert для вертисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка вертисолей (см.), которые имеют трещины, открывающиеся и закрывающиеся раз в году и остающиеся открытыми не менее двух последовательных месяцев более чем в 7 лет из 10, имеют среднегодовую температуру поч-

вы ниже 22°С, а разницу между среднелетней и среднезимней температурами на глубине 50 см более 5°С. В пределах этого подпорядка выделяются две большие группы почв: 1) хромоксереры и 2) пеллоксереры.

1114. КСЕРО́ЛЛ //xeroll //xeroll //Xeroll (от греч. xeros - сухой и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка моллисолей (см.), которые: 1) имеют либо среднегодовую температуру выше 8°С, либо яркую окраску в какой-то части верхних 15 см моллевого[x)] горизонта и среднелетнюю температуру на 50 см или на контакте с плотной породой более 15°С, если нет A_0 и более 8°С, если есть A_0; 2) не имеют белесого горизонта с признаками переувлажнения (пятна, конкреции); 3) не насыщены водой в любой период или не имеют признаков переувлажнения, описанных для акволлей (см.); 4) не имеют карбонатного горизонта в или непосредственно под моллевым горизонтом на глубинах менее 50 см, который содержал бы более 40% $CaCO_3$, если это только не кальциевый[x)] горизонт; 5) пересыхают минимум на два месяца подряд более 7 лет из 10 во всей толще между 18 и 50 см или над контактом с плотной породой, если он ближе 50 см. В пределах этого подпорядка выделяются 6 больших почвенных групп: 1) аргиксероллы, 2) кальциксероллы, 3) дуриксероллы, 4) гаплоксероллы, 5) натриксероллы и 6) палексероллы (см.).

1115. КСЕРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //xeromorphic soil //sol xeromorphe //xeromorpher Boden (от греч. xeros - сухой и morphe - форма) - термин для почв, формирующихся в условиях пониженного по сравнению с автономными почвами увлажнения за счет неполного усвоения влаги атмосферных осадков (повышенный поверхностный сток), малой влагоемкости почвы (пески) или повышенной испаряемости (южные склоны).

1116. КСЕ́РОПСАММЕ́НТ //xeropsamment //xeropsamment //Xeropsamment (от греч. xeros - сухой, греч. psammos - песок и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы псамментов (см.), которые: 1) имеют среднегодовую температуру почвы выше 8°С, но ниже 22°С, либо ниже 8°С, если среднелетняя температура на глубине 50 см выше 15°С, и имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на глубине 50 см более 5°С; 2) обычно влажные, но пересыхают на два последовательных месяца или более в 7

из 10 лет во всех подгоризонтах между 18 и 50 см или до контакта с плотной породой, если она выше 50 см; 3) имеют в песчаной фракции менее 95% кварца, циркона, турмалина, рутила или других трудно выветриваемых минералов, не освобождающих при выветривании железо и алюминий. В пределах этой группы выделяются три подгруппы: 1) типичные ксероптаменты (typic), 2) альфовые ксероптаменты (alfic) и 3) гидроморфные ксероптаменты (aquic).

1117. КСЕРОРАНКЕР //xeroranker //xeroranker //Xeroranker (от греч. xēros - сухой и австр. rank - покров) - 1) термин Франца (1956) для степных почв семиаридных зон Центральной Европы или средиземноморских районов, характеризующихся слабо дифференцированным профилем A-C, нейтральных или слабокислых, с гумусом типа мюлль или песчаный модер, формирующихся на кислых кремнеземистых породах; 2) термин франц.шк. (1967) для группы почв, входящих в подкласс слаборазвитых засушливых почв (см.), характеризующихся профилем AC с содержанием гумуса в горизонте A 1-2%, распространенных в районах с сухим летом.

1118. КСЕРОРЕНДЗИНА //xerorendzina //xerorendzine //Xerorendzina - термин франц.шк. (1967) для подгруппы рендзин, содержащих мало гумуса в горизонте A и распространенных в районах с сухим летом.

1119. КСЕРОРТЕНТ //xerorthent //xerorthent //Xerorthent (от греч. xeros - сухой, греч. orthos - настоящий и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортентов (см.), которые: 1) имеют среднегодовую почвенную температуру 8°C или более, но менее 22°C, либо менее 8°C, если среднелетняя температура на глубине 50 см 15°C или выше; и имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на глубине 50 см 5°C или выше; 2)обычно влажные, но пересыхают на два последовательных месяца или более (не менее) семи лет из десяти во всех подгоризонтах между 18 и 50 см или до контакта с плотной породой, если он ближе 50 см. В пределах этой группы выделяются 5 подгрупп: 1) типичные ксерортенты (typic), 2) гидроморфные ксерортенты (aquic), 3) гидроморфные дурипэновые ксерортенты (aquic durorthidic), 4) маломощные ксерортенты (lithic) и 5) трещиноватые ксерортенты (vertic).

1120. КСЕРОСОЛЬ // xerosol // xerosol // Xerosol (от греч. xeros - сухой и лат. solum - почва) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв полупустынных районов, имеющих хорошо развитый светлый[x)] горизонт А и, возможно, камбиевый[x)] горизонт В, характеризующихся проводимостью насыщенного экстракта при 25°С в каком-либо из горизонтов более 2 mmhos /см (но менее 16) и/или обнаруживающих увеличение с глубиной обменных Na и K в пределах 125 см от поверхности.

1121. КСЕРОСОЛЬ ГИПСОВАЯ // gypsic xerosol // xerosol gypsique // gipsischer Xerosol (от греч. xeros - сухой, лат. solum - почва и лат. gypsum - гипс) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для ксеросолей (см.), имеющих наряду с хорошо развитым светлым[x)] горизонтом А и, возможно, камбиевым[x)] горизонтом В гипсовый[x)] горизонт в пределах 100 см от поверхности.

1122. КСЕРОСОЛЬ ИЗВЕСТКОВАЯ // calcic xerosol // xerosol calcique // kalkischer Xerosol (от греч. xeros - сухой, лат. solum - почва и лат. calcium - кальций) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для ксеросолеи (см.), имеющих наряду с хорошо развитым светлым[x)] горизонтом А и, возможно, камбиевым[x)] горизонтом В кальциевый[x)] горизонт в пределах 100 см от поверхности.

1123. КСЕРОСОЛЬ ЛЮВИКОВАЯ // luvic xerosol // xerosol luvique // luvischer Xerosol (от греч. xeros - сухой, лат. solum - почва и лат. luo - вымывать) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для ксеросолей (см.), имеющих наряду с хорошо развитым светлым[x)] горизонтом А, не твердеющим в сухом состоянии, аргилловый[x)] горизонт В.

1124. КСЕРОСОЛЬ НОРМАЛЬНАЯ // haplic xerosol // xerosol haplique // haplischer Xerosol (от греч. xeros - сухой, лат. solum - почва и греч. haplous - простой) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для ксеросолей (см.), имеющих нормальное строение профиля и не содержащих в профиле ни кальциевого[x)], ни гипсового[x)], ни аргиллового[x)], ни солевого[x)] горизонтов.

1125. КСЕРОФЛЮВЕНТ // xerofluvent // xerofluvent // Xerofluvent (от греч. xeros - сухой, лат. fluvius - река и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70)

для большой группы флювентов (см.), которые: 1) имеют среднегодовую почвенную температуру более 8°С, но менее 22°С, или менее 8°С, если среднелетняя температура на глубине 50 см более 15°С, и имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурой на глубине 50 см более 5°С. В пределах этой группы выделяются 5 подгрупп: 1) типичные ксерофлювенты (typic), 2) гидроморфные ксерофлювенты (aquic), 3) гидроморфные дурипэновые ксерофлювенты (aquic durorthidic), 4) дурипэновые ксерофлювенты (durorthidic) и 5) трещиноватые ксерофлювенты (vertic).

1126. КСЕРОХРЕПТ //xerochrept //xerochrept //Xerochrept (от греч. xeros - сухой, греч. ochros - светлый и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы охрептов (см.), которые: 1) пересыхают на 2 месяца подряд более 7 лет из 10 во всем слое почвы между 18 и 50 см или выше контакта с плотной породой; 2) имеют среднегодовую температуру почвы выше 8°С, но менее 22°С, либо ниже 8°С, если среднелетняя температура выше 15°С и нет горизонта A_O, а разница между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с плотной породой более 5°С; 3) не имеют фраджипэна[x)] или дурипэна[x)] в пределах 1 м от поверхности. В пределах э ий группы выделяются 10 подгрупп: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) гидроморфные бедные (aquic dystric), 4) бедные (dystric), 5) бедные флювентные (dystric fluventic), 6) бедные маломощные (dystric lithic),7) маломощные (lithic), 8) маломощно-трещиноватые (lithic-vertic), 9) комплексно-маломощные (ruptic-lithic) и 10) трещиноватые (vertic) ксерохрепты.

1127. КСЕРУЛЬТ //xerult //xerult //Xerult (от греч. xeros - сухой и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка ультисолей (см.), которые: 1) имеют среднегодовую температуру почвы менее 22°С, а разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с породой, если он ближе, более 5°С; 2) пересыхают на более, чем два месяца подряд 7 из 10 лет во всех частях почвы между 18 и 50 см или контактом с породой, если он ближе 50 см; 3) имеют менее 1,5% органического в-ва в верхних 15 см аргиллового[x)] горизонта, исключая пахотный слой; 4) имеют менее 20 кг/м^2 органического в-ва в метровой толще ниже горизонта A_O; 5) никогда не насыщены водой или не

имеют более красную и яркую окраску, чем аквульты (см.). В пределах этого подпорядка выделяются две большие почвенные группы: 1) гаплоксерульты и 2) палексерульты.

1128. КСЕ́РУМБРЕ́ПТ //xerumbrept //xerumbrept //Xerumbrept (от греч. xeros - сухой, лат. umbra - темная тень и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы умбрептов (см.), которые: 1) пересыхают минимум на два месяца подряд более 7 лет из 10 во всей толще между 18 и 50 см или выше контакта с плотной породой, если она выше 50 см; 2) имеют среднегодовую температуру почвы выше 8°С, но ниже 22°С, либо ниже 8°С, если среднелетняя температура выше 15°С и нет горизонта A_O, и разницу между среднелетней и среднезимней температурами на глубине 50 см или на контакте с плотной породой выше 5°С; 3) не имеют антропового[x)] горизонта или фраджипэна[x)]. В пределах этой группы выделяются 7 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) намытые (cumulic), 4) энтовые (entic), 5) флювентные (fluventic), 6) маломощные (lithic) и 7) мощные (pachic) ксерумбрепты.

1129. КУЛЬТУ́РНАЯ ПО́ЧВА //cultured soil //sol culturé //kulturboden - общеупотребительный термин для почв, созданных или сильно измененных человеком. Син.: антропогенная почва.

1130. КУЛЬТУ́РНО-ПОЛИВНА́Я ПО́ЧВА //irrigated soil //sol irrigué //Bewässerungsboden - термин для почв, длительное время используемых при орошении, в результате чего верхняя часть почвы состоит из ирригационного наноса, а профиль в целом довольно однородный, слабогумусированный. Син.: орошаемая п., оазисная п.

1131. КУ́МУЛОСО́ЛЬ //cumulosol //cumulosol, sol tourbeux //Kumulosol, Torfboden (от лат. accumulatio - накопление и лат. solum - почва) - термин зап.европейских школ для торфяных почв. Син.: торфяная почва.

1132. КУРОБО́КУ //kuroboku //courobocu //kuroboku (от яп. народн. названия) - устаревший термин японских почвоведов для вулканических пепловых почв (см.).

1133. КУРОТСЮШИ //kurotsushi //courotsuchi //kurotsuschi (от яп. народн. названия) - устаревший термин японских почвоведов для вулканических пепловых почв (см.).

1134. ЛАТЕРИЗО́ВАННАЯ ПО́ЧВА //laterized soil //sol laterisé //lateri-erter Boden (от лат. later - кирпич) - 1) термин для почв, в профиле которых идёт образование ожелезнённых прослоев конкреционного или панцырного строения различной структуры и с разными соотношениями Fe, Al и Si путём аллохтонного накопления Fe из грунтовых или почвенных вод при их боковом склоновом передвижении; 2) устаревший термин для почв тропиков и субтропиков, характеризующихся остаточной аккумуляцией R_2O_3 в профиле; 3) термин В.М.Фридланда для почв тропиков и субтропиков, характеризующихся остаточной аккумуляцией R_2O_3 в профиле без образования латеритных прослоев.

1135. ЛАТЕРИ́Т //laterite //latérite //Laterit (от лат. later - кирпич) - термин Ф.Бьюкенена (1807), который ввёл его в научный обиход, описав на Малабарском побережье Индии "довольно плотную, но сравнительно легко разрабатываемую, пеструю по окраске, землистую массу ячеистого строения, обогащенную гидроокисями железа и алюминия, относительно быстро твердеющую на воздухе, после чего она может быть использована как довольно прочный строительный материал". В современном понимании, латерит - это специфическое внутрипочвенное образование, связанное с аккумуляцией железа. Сейчас принято определение Бьюкенена с уточнением Дю Пре (1949), согласно которому "латерит - это характерные для тропиков скопления железа, а иногда и алюминия и марганца, встречающиеся в почвах в виде плотных, пористых, ячеистых или конкреционных масс, принимающих форму панцыря, глыб или отдельных конкреций и относительно быстро твердеющих на воздухе". Прослои латерита могут встречаться в различных почвах, обычно в нижних частях склонов, где обеспечен постоянный приток веществ и их аккумуляция из грунтовых вод. В результате поднятий и эрозии латерит может оказаться на высоких поверхностях, образуя железистые панцыри. Мощность латеритных прослоев варьирует от нескольких сантиметров до нескольких метров в разных условиях и районах мира.

1136. ЛАТЕРИ́Т ВЕРМИКУЛЯ́РНЫЙ //vermicular laterite //latérite vermiculaire //vermikularischer Laterit (от лат. later - кирпич и лат. verma - червь) - лате́рит ячеистого строения, при котором красная плотная и твердая матрица заполнена белёсым менее плотным каолинитовым землистым веществом.

1137. ЛАТЕРИ́Т ГОРО́ХОВЫЙ - см. Латерит пизолитный.

1138. ЛАТЕРИ́Т ГРУНТО́ВОВО́ДНЫЙ //ground water laterite //latérite à eau de fond //Grundwasserlaterit - термин Марбута для почв тропиков и субтропиков, имеющих ясно выраженный глеевый горизонт под слоем латерита, причем генезис последнего связан с аккумуляцией железа из грунтовых вод в гидроморфном аккумулятивном ландшафте.

1139. ЛАТЕРИ́Т КОНКРЕЦИО́ННЫЙ - см. Латерит пизолитный.

1140. ЛАТЕРИ́Т КРЕМНИ́СТЫЙ //siliceous laterit //latérite siliceuse //kieseligei Laterit - термин для латеритных панцырей, в котором железом плотно сцементированы кремневые отдельности гравия или гальки.

1141. ЛАТЕРИ́Т МЕЛКООБЛО́МОЧНЫЙ //flaggy laterit //latérite scoriacée //schlackenartiger Laterit - термин для обнаженных эрозией и разрушенных или переотложенных латеритных конкреционных образований, имеющих форму шлака на почвенной поверхности.

1142. ЛАТЕРИ́Т ПИЗОЛИ́ТНЫЙ, ЛАТЕРИ́Т ПИЗОЛИ́ТОВЫЙ //pisolitic laterite //latérite pisolitique //pisolitischer Laterit (от лат. later - кирпич и лат. pisa - горох) - латерит гороховатого строения, при котором отдельные округлые железистые конкреции сцементированы в плотную массу с пустотами между ними, заполненными каолинитовым мелкозёмом; на более ранних стадиях формирования многочисленные конкреции не сцементированы в железистый панцырь, а рыхло разбросаны в почвенной массе, образуя конкреционный слой.

1143. ЛАТЕРИ́Т ЯЧЕ́ИСТЫЙ //cellular laterite //latérite cellulaire, latérite alvéolaire //Zellenlaterit - см. Латерит вермикулярный.

1144. ЛАТЕРИТИЗО́ВАННАЯ ПО́ЧВА //lateritized soil //sol lateritisé //lateritisierter Boden - 1) см. Латеризованная п.; 2) термин В.М.Фридланда для латеризованных почв с латеритными прослоями в профиле.

1145. ЛАТЕРИ́ТНАЯ ПО́ЧВА //lateritic soil //sol lateritique //lateritische Boden - общеупотребительный термин, многократно менявший своё содержание на протяжении истории почвоведения и в настоящее время всё менее используемый из-за различий его толкования. В наиболее широком понимании термин включает все

красные и желтые богатые полуторными окислами почвы тропического пояса. По Марбуту - это относительно обогащенные полуторными окислами тропические почвы, не имеющие в профиле слоя латерита грунтоводного генезиса. Согласно другим авторам, это почв, имеющие в профиле слой латерита.

1146. ЛАТЕРИ́ТНАЯ ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //gley lateritic soil //sol gley lateritique, sol lateritique à gley //Lateritgleyboden - см. Ферраллитная глеевая п.

1147. ЛА́ТОСО́ЛЬ //latosol //latosol //Latosol (от лат. later - кирпич и лат. solum - почва) - термин Келлога (1949) для красных и желтых почв тропического пояса, обогащенных полуторными окислами во всей массе и не имеющих в профиле слоя латерита; син.: ферраллитная п.

1148. ЛА́ТОСО́ЛЬ БУ́РАЯ //brown latosol //latosol brun //brauner Latosol - термин амер.шк. для буроокрашенных латосолей, обогащенных гумусом и с относительно ослабленной ферраллитизацией материала.

1149. ЛА́ТОСО́ЛЬ ВЫСОКОГУ́МУСНАЯ //high humic latosol //latosol riche en humus //humusreich Latosol - термин амер.шк. для ферраллитизованных сильногумусированных кислых почв высокогорных лесов тропического и субтропического поясов.

1150. ЛА́ТОСО́ЛЬ ГЛЕ́ЕВАЯ //gleyic latosol //latosol à gley //Gleylatosol - термин амер.шк. для ферраллитных почв с оглеенным горизонтом в нижней части профиля.

1151. ЛА́ТОСО́ЛЬ ГУ́МУСОВАЯ ВЛА́ЖНАЯ //hydrol humic latosol //latosol humique hydromorphé //hydrischer Humuslatosol - термин амер.шк. для ферраллитизованных сильногумусированных кислых почв высокогорных лесов тропического и субтропического поясов, имеющих избыточное внутрипочвенное увлажнение; син.: Гидролатосоль высокогумусовая.

1152. ЛА́ТОСО́ЛЬ ЖЁЛТАЯ //yellow latosol //latosol jaune //Gelblatosol, (Gelberde) - термин амер.шк. для желтоокрашенных почв тропического пояса, обогащенных полуторными окислами во всей массе и не имеющих в профиле слоя латерита.

1153. ЛА́ТОСО́ЛЬ КРА́СНАЯ //red latosol //latosol rouge //Rotlatosol, (Roterde) - термин амер.шк. для краснооокрашенных почв тропического пояса, обогащенных полуторными окислами во всей массе и не имеющих в профиле слоя латерита.

1154. ЛАТОСОЛЬ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ //red-yellow latosol //latosol rouge-jaune //Rotgelblatosol - термин амер.шк. для объединения в одну группу красных и желтых латосолей.

1155. ЛАТОСОЛЬ ТЕМНО-КРАСНАЯ //dark red latosol //latosol rouge foncé //dunkel Rotlatosol - термин амер.шк. для темноокрашенных латосолей на богатых ферромагнезиальными минералами породах.

1156. ЛЕДЯНАЯ ТРЕЩИНОВАТАЯ ПОЧВА //ice-wedge soil //sol en coin de glace //Eiskeilboden - термин немецкой школы для арктических и субарктических примитивных почв с полигональной трещиноватостью с поверхности вследствие образования ледяных клиньев.

1157. ЛЕСНАЯ ПОДСТИЛКА - см. Подстилка лесная.

1158. ЛЕСОЛУГОВАЯ ПОЧВА - см. Пойменная лесолуговая п.

1159. ЛЕСОЛУГОВАЯ СЛОИСТАЯ ПОЧВА - см. Пойменная лесолуговая слоистая п.

1160. ЛЁСС //loess //loess //Löss (от немецкого) - общеупотребительный термин для желтоватых, тонкозернистых, сильно пористых пород, содержащих кроме глинистых минералов, зерна кварца, слюды, полевого шпата, кальцита и окислов железа; характерно наличие стяжений карбонатов и остатков почвенных образований; мощность лёссов колеблется в широких пределах от нескольких см до нескольких сот метров; характерен однородный механический состав при большом участии крупнопылеватой фракции; происхождение лёссов остаётся дискуссионным, но наиболее распространены гипотезы эолового и водноаккумулятивного генезиса.

1161. ЛЕССИВЕ //lessive //lessivé, sol lessivé //Lessive (от фран. lessiver - вымывать, выщелачивать) - термин Дюшофура (1951) для буроокрашенных почв Центр.Европы, близких к бурозёмам, но имеющих в профиле осветленный тусклый горизонт, сформированный, в отличие от подзолистого, в процессе обезиливания (лессивирования, лессиважа), т.е. нисходящего перемещения глинистого вещества без его разрушения в форме водных суспензий при слабо кислой реакции среды. См.: Лессивированная п. Син.: podzol secundar (Чернеску, 1934); иллимеризованная почва (Фридланд, 1957); Fahlerde (Эвальд, 1958); псевдоподзол, псевдоподзолистая почва (Герасимов, 1960); Parabraunerde (Мюккенхаузен, 1962), luvisol (Дюдаль, 1967).

1162. ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //lessive soil // sol lessivé //Lessiveboden (от фр.lessiver - вымывать, выщелачивать) - термин франц.шк. (1965,1967) для группы почв, входящей в подкласс бронифицированных (мюллевых) гумидно-умеренных почв, характеризующихся профилем АВС с текстурным (арджилликовым[x]) горизонтом В и имеющих ясно выраженный горизонт A_2, имеющий палевую или серую, но не пепельную, окраску; индекс лессивирования более 1,4; глина не меняет обычно своего состава при вымывании; степень гумусированности незначительная; иногда присутствует заметное количество окислов железа.

1163. ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ БОРЕА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //boreal lessive soil //sol lessive boreal //borealischer Lessiveboden - термин франц. шк. (1967), применяемый в качестве синонима для канадских серых древесных почв, имеющих грубогумусную лесную подстилку A_0, не имеющих горизонта A_1, имеющих четко выраженный глинистый белесый горизонт A_2 и сильно оглиненный текстурный горизонт В при значительной насыщенности основаниями.

1164. ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ГИ́ДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //hydromorphic lessive soil //sol lessivé hydromorphique //hydromorpher Lessiveboden - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы лессивированных почв (см.), имеющих псевдоглеевые (редко глеевые) пятна или конкреции в горизонте В или в нижней части горизонта A_2.

1165. ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ КИ́СЛАЯ ПО́ЧВА //acid lessive soil //sol lessive acide //saure Lessiveboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы лессивированных почв (см.), имеющих ясно выраженный палевый горизонт A_2, индекс лессивированности менее 2,0, pH в горизонте В менее 5,5, переходный тип гумуса типа мюлль-модер.

1166. ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ СЛА́БО ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //slightly podzolic lessive soil //sol lessivé faiblement podzolique //schwach podsolierter Lessiveboden - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы лессивированных почв (см.), имеющих белёсый горизонт A_2, гумус типа модер в горизонте A_1, четко выраженный текстурный горизонт В, но без аккумуляции гумуса, индекс лессивированности от 2,0 до 3,0, индекс выноса железа достаточно высокий, но ниже 4,0.

1167. ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical lessive soil //sol lessivé modal //typischer Lessiveboden - термин франц.шк.

(1965,1967) для подгруппы лессивированных почв (см.), имеющих ясно выраженный палевый горизонт A_2, индекс лессивированности менее 2,0, pH в горизонте B более 5,5.

1168. ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ЯЗЫКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //glossic lessive soil // sol lessivé glossique //glossischer Lessiveboden (от греч. glossos - язык) - термин франц.шк. (1967) для подгруппы лессивированных почв (см.), характеризующихся сильным языковатым проникновением горизонта A_2 в горизонт B.

1169. ЛЁССОВАЯ ПО́ЧВА //loess soil, loessial soil //sol de loess, sol loessoïde //Lössboden, lössoider Boden - общеупотребительный термин для почв, сформированных на лёссовой породе, однако строгого определения термин не имеет.

1170. ЛИМА́ННАЯ ПО́ЧВА //basin soil, basinal soil //sol de bassin // Beckenboden - см. Луговая п.

1171. ЛИТОГЕ́ННАЯ ПО́ЧВА //lithogenic soil //sol lithogené //lithogener Boden (от греч. lithos - камень и греч. genos - происхождение) - 1) устаревший термин для почв, в генезисе которых почвообразующая порода играет особенно подчеркнутую роль и определяет формирование того или иного почвенного типа, напр. почвы на известняках, на засолённых породах и т.п.; 2) см. Литосоль.

1172. ЛИ́ТОМАРЖ //lithomarge //lithomarge //Lithomarg (от гр. lithos - камень и лат. margo - край, окраина, поле, краевая часть) - термин Гарасовитца для нижней, наиболее активной зоны коры выветривания или зоны разложения, выделяемой в мощных аллитизированных корах выветривания тропиков и субтропиков, которая характеризуется наличием большого количества невыветрелых и выветривающихся минералов исходной горной породы наряду с вторичными глинными минералами.

1173. ЛИ́ТОСО́ЛЬ //lithosol //lithosol //Lithosol (от греч. lithos - камень и лат. solum - почва) - 1) термин американской школы для слабо развитых сильно скелетных маломощных почв с профилем A-C, формирующихся на плотных горных породах; син.: скелетная п., примитивно-щебнистая п.; 2) термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, формирующихся на плотных породах, мощность скелетного профиля которых не превышает 25 см.

1174. ЛИТОСО́ЛЬ // lithosol // lithosol // Lithosol - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы почв, входящих в группу Грубых минеральных эрозионных почв (см.), формирующихся на плотных скальных породах и имеющих профиль (A)R или R.

1175. ЛИТОСО́ЛЬ ЖА́РКИХ ПУСТЫ́НЬ // lithosol of hot deserts // lithosol des déserts chauds // Warmwüstenlithosol, Lithosol der Warmwüste - термин франц.шк. (1967) для группы грубых минеральных почв жарких пустынь (см.), имеющих профиль (A)R или R и характеризующихся пленкой металлических окислов на поверхности камней. Син.: пустынный загар.

1176. ЛИТОСО́ЛЬ ХОЛО́ДНЫХ ПУСТЫ́НЬ // lithosol of cold deserts // lithosol des déserts froids // Lithosol der Kaltwüste, Kaltwüstenlithosol - термин франц.шк. (1967) для группы почв, входящих в подкласс грубых криосолей (см.), представляющих собой каменистые поверхности, не перекрытые рыхлым криогенным материалом.

1177. ЛУГОВА́ТАЯ ОСТЕПНЯ́ЮЩАЯСЯ ПО́ЧВА - см. Пойменная луговатая остепняющаяся почва.

1178. ЛУГОВА́ТО-БУ́РАЯ ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА // meadowish-brown semidesert soil // sol brun subaride à nappe phréatique semi profond // schwach Wiesen-brauner Halbwüstenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-бурых полупустынных почв с грунтовыми водами на глубине 4-6 м и следами оглеения со 120-150 см.

1179. ЛУГОВА́ТО-КАШТА́НОВАЯ ПО́ЧВА // meadowish-chestnut soil // sol châtain à nappe phréatique profond // schwach Wiesen-kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-каштановых почв, формирующихся при уровне грунтовых вод 4-7 м и характеризующихся слабыми признаками переувлажнения в нижней части профиля и несколько повышенной гумусированностью.

1180. ЛУГОВА́ТО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ПО́ЧВА // meadowish-cinnamon soil // sol cinnamomeä nappe phréatique // zimtfarbener Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-коричневых почв, формирующихся при уровне грунтовых вод 3-5 м и характеризующихся слабым оглеением в нижней части профиля.

1181. ЛУГОВА́ТО-ПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА // meadowish-desert soil // sol désertique à nappe phréatique profond // schwach Wiesen-Wüstenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-пустынных почв

с грунтовыми водами на глубине 5-7 м, характеризующихся повышенной гумусностью и наличием оглеения в профиле; син.: Остаточно-луговая темноцветная п.

1182. ЛУГОВА́ТО-СЕРОЗЁМНАЯ ПО́ЧВА // meadowish sierozem // sierozem à nappe phréatique profond // schwach Wiesenartiger Sierosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-серозёмных почв, формирующихся при уровне грунтовых вод 3,5-5 м.

1183. ЛУГОВА́ТО-СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ПО́ЧВА // meadowish-gray-cinnamon soil // sol gris-cinnamom à nappe phréatique profond // gleyischer grauer zimtfarbiger Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-серо-коричневых почв, формирующихся при уровне грунтовых вод 3-5 м и характеризующихся слабым оглеением нижней части профиля.

1184. ЛУГОВА́ТО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ ПО́ЧВА // meadowish-chernozemic soil // sol chernozemique à nappe phréatique profond // schwachwiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-чернозёмных почв, формирующихся при уровне грунтовых вод 4-7 м и характеризующихся признаками слабого оглеения в нижней части профиля, комковатой структурой гумусового горизонта, повышенной гумусированностью и мицеллярной формой карбонатных выделений (отсутствие белоглазки).

1185. ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА // meadow soil, wiesenboden // sol de prairie à nappe phréatique // Wiesenboden - 1) общеупотребительный термин для темноокрашенных сильногумусированных почв влажных пойменных лугов различного строения; 2) см. Пойменная луговая п.; 3) термин русск.шк. (1967) для типа почв степной зоны с преобладающим развитием дернового и глеевого процессов в результате повышенного поверхностного обводнения и постоянной связи с грунтовыми водами, стоящими на глубине 1-3 м; почвы распространены по понижениям рельефа на недренированных равнинах и характеризуются наличием глеевого горизонта в нижней части профиля; син.: подовая почва, лиманная почва; 4) термин русск.шк. (1967) для подтипа луговых почв степной зоны, формирующихся при уровне грунтовых вод 1,5-3 м и имеющих оглеение в нижней части профиля.

1186. ЛУГОВА́Я ВЫ́ЩЕЛОЧЕННАЯ ПО́ЧВА //leached meadow soil //sol lévigé de prairie à nappe phréatique //ausgelaugter Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода луговых почв степей, имеющих

большой разрыв между гумусовым и карбонатным горизонтами.

1187. ЛУГОВА́Я ЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА //saliniferous meadow soil //sol salifére de prairie a nappe phréatique //salzhaltig Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода луговых почв степей, имеющих в профиле горизонт аккумуляции легкорастворимых солей.

1188. ЛУГОВА́Я КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //calcaric meadow soil //sol calcaire de prairie à nappe phréatique //kalkarischer Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода луговых почв степей, вскипающих с поверхности или в верхней части гумусового горизонта при содержании CO_2 по профилю менее 10%.

1189. ЛУГОВА́Я МА́ЛОМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //shallow meadow soil //sol mincé de prairie à nappe phréatique //dünner Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида луговых почв степей с мощностью гумусового горизонта менее 40 см (в украинской школе менее 30 см).

1190. ЛУГОВА́Я МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //deep meadow soil //sol profond de prairie à nappe phréatique //tiefer Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида луговых почв степей с мощностью гумусового горизонта 80-120 см (в украинской школе 50-70 см).

1191. ЛУГОВА́Я ОМЕРГЕЛЁВАННАЯ ПО́ЧВА //marly meadow soil //sol marneuse de prairie à nappe phréatique //mergeliger Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода луговых почв степей, содержащих в карбонатном горизонте более 10% CO_2 в виде обильной белой пропитки или примазок.

1192. ЛУГОВА́Я ОСОЛОДЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА //solodized meadow soil //sol solodisé de prairie à nappe phréatique //solodierter Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода луговых почв степей, имеющих белёсый осолоделый горизонт A_2 или белёсую присыпку в горизонте A_1 при дифференциации профиля по илу, R_2O_3 и реакции среды.

1192а. ЛУГОВА́Я ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //meadow semi-desert soil //sol subaride à nappe phréatique //Wiesenhalbwüstenboden - 1) термин русск.шк. (1967) для типа гидроморфных почв полупустынных лиманов, испытывающих паводковое затопление, низких террас озёр и рек при грунтовых водах ближе 3 м; 2) термин русск.шк. (1967) для подтипа луговых полупустынных почв, формирующихся при уровне грунтовых вод 2-3 м в лиманах, депрессиях и лощинах и характеризующихся оглеенностью и повышенной гумусностью.

1193. ЛУГОВА́Я ПРОМЫ́ТАЯ ПО́ЧВА //leached out meadow soil //sol lessivé de prairie à nappe phréatique //ausgewaschener Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода луговых почв степей, характеризующихся полным отсутствием легкорастворимых солей в почвенном профиле до грунтовых вод.

1194. ЛУГОВА́Я СВЕ́РХМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //super-deep meadow soil //sol super-profond de prairie à nappe phréatique //super-tiefer Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида луговых почв степей с мощностью гумусового горизонта более 120 см (в украинской школе более 70 см).

1195. ЛУГОВА́Я СЛИТА́Я ПО́ЧВА //compact meadow soil //sol compact de prairie à nappe phréatique //kompakter Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода луговых почв степей, формирующихся на тяжелых иловато-глинистых породах и характеризующихся высокой твердостью и трещиноватостью в сухом состоянии.

1196. ЛУГОВА́Я СЛОЙСТАЯ ПО́ЧВА - см. Пойменная луговая слоистая п.

1197. ЛУГОВА́Я СЛОЙСТАЯ СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА - см.: Пойменная луговая слоистая слаборазвитая п.

1198. ЛУГОВА́Я СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //solonetzic meadow soil //sol solonetzoïde de prairie à nappe phréatique //solonetzartiger Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода луговых почв степей, характеризующихся присутствием ореховатого или ореховато-призматического горизонта, содержащего обменного натрия более 5% от емкости поглощения.

1199. ЛУГОВА́Я СРЕ́ДНЕМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //medium deep meadow soil //sol semi-profond de prairie à nappe phréatique //halbtiefer Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида луговых почв степей с мощностью гумусового горизонта 40-80 см (в украинской школе 30-50 см).

1200. ЛУГОВА́Я ТЕМНОЦВЕ́ТНАЯ ПО́ЧВА - 1) см. Пойменная луговая темноцветная п.; 2) устаревший термин Костюченко (1964) для пустынных почв недавних пойменных разливов под пустынной растительностью с элементами тугая и испытывающих современное опустынивание; см. Такыровидная пустынная остаточно-гумусная (остаточно-луговая) п.

1201. ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА //meadow-swamp soil //sol gley de prairie humide //Wiesengleyboden - 1) см.: Пойменная лугово-

болотная п.; 2) термин русск.шк. (1967) для типа почв длительного грунтового увлажнения с практически постоянной капиллярной каймой на их поверхности и ежегодным затоплением более 1 месяца; почвы распространены в глубоких понижениях на плоских равнинах и по террасам рек степной зоны с грунтовыми водами ближе 1,5 м; они характеризуются присутствием по всему профилю оглеения, профилем A_0-A_1-G, в котором верхняя часть органогенного слоя торфянистая либо перегнойная; в сухие годы возможно выпадение болотной растительности и замена ее на луговую, появление засоления, солонцеватости, осолодения.

1202. ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ ВЫ́ЩЕЛОЧЕННАЯ ПО́ЧВА // leached meadow-swamp soil //sol gley levigé de prearie humide // ausgelaugter Wiesengleyboden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-болотных почв степей, не имеющих карбонатов (по вскипанию) до уровня грунтовых вод.

1203. ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ ЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА //saliniferous meadow-swamp soil //sol gley salifére de prairie humide //salzhaltig Wiesengleyboden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-болотных почв степей, имеющих выцветы легкорастворимых солей на поверхности или в гумусовом горизонте.

1204. ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ ИЛОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //silty meadow-swamp soil // sol gley limoneux de prairie humide //Wiesensumpfgleyboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-болотных почв степей, характеризующихся длительным затоплением, развитием тростниковых зарослей, слабым развитием перегнойного горизонта и обильным накоплением ила с поверхности.

1205. ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //calcaric meadow-swamp soil //sol gley calcaire de prairie humide //kalkarischer Wiesengleyboden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-болотных почв степей, вскипающих с поверхности или в пределах органогенного горизонта.

1206. ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ МА́ЛОМОЩНАЯ ПО́ЧВА //shallow meadow-swamp soil //sol gley mincé de prairie humide //dünner Wiesengleyboden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-болотных почв степей, имеющих мощность органогенного слоя (A_0+A_1) менее 35 см.

1207. ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //deep meadow-swamp soil //sol gley profond de prairie humide // tiefer Wiesengleyboden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-болотных почв степей,

имеющих мощность органогенного слоя (A_0+A_1) более 70 см.

1208. ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ ОМЕРГЕЛЁВАННАЯ ПО́ЧВА //marly meadow-swamp soil //sol gley marneuse de prairie humide //mergeliger Wiesengleyboden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-болотных почв степей, имеющих горизонт обильного скопления карбонатов в виде пропитки, причем содержание CO_2 карбонатов превышает 10%.

1209. ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ ОСОЛОДЁЛАЯ ПО́ЧВА //solodized meadow-swamp soil //sol gley solodisé de prairie humide //solodierter Wiesengleyboden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-болотных почв степей, имеющих белёсую присыпку в гумусовом горизонте и перераспределение ила по профилю.

1210. ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ ПЕРЕГНО́ЙНАЯ ПО́ЧВА //muck meadow-swamp soil // sol muck gley de prairie humide //Wiesenmuckgleyboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-болотных почв степей, относительно мало застойных, характеризующихся наличием перегнойного горизонта с поверхности под разнотравно-луговой растительностью.

1211. ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ ПРОМЫ́ТАЯ ПО́ЧВА //leached out meadow-swamp soil //sol gley lessivé de prairie humide //ausgewaschener Wiesengleyboden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-болотных почв степей, не имеющих в профиле легкорастворимых солей.

1212. ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //solonetzic meadow-swamp soil //sol gley solonetzoïde de prairie humide //solonetzartiger Wiesengleyboden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-болотных почв степей, имеющих в нижней части гумусового горизонта уплотнение и призматическую структуру, щелочную реакцию и более 5% обменного натрия от емкости поглощения.

1213. ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ СРЕ́ДНЕМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //medium deep meadow-swamp soil //sol gley semi-profond de prairie humide //halbtiefer Wiesengleyboden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-болотных почв степей, имеющих мощность органогенного слоя (A_0+A_1) 35-70 см.

1214. ЛУ́ГОВО-БУ́РАЯ ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //meadow-brown semi-desert soil //sol brun subaride à nappe phréatique //Wiesen-brauner Halbwüstenboden - 1) термин русск.шк. (1967) для типа полупустынных почв избыточного грунтового, поверхностного или

смешанного увлажнения при грунтовых водах ближе 6 м, характеризующихся повышенной гумусностью, наличием оглеения, наличием солонцеватости или осолодения, выщелоченностью от солей; 2) термин для подтипа лугово-бурых полупустынных почв с грунтовыми водами на глубине 2-4 м, лишенных солей до 80-150 см.

1215. ЛУ́ГОВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА - см. Пойменная лугово-болотная п.

1216. ЛУ́ГОВО-ИЛОВА́ТО-БОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА //meadow-silty-swamp soil // sol limoneux de prairie marécageux // Wiesensumpfmoorboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных болотных почв степей, характеризующихся слабым развитием перегнойного горизонта и обильным накоплением ила, развитием под тростниковыми зарослями.

1217. ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВАЯ ПО́ЧВА //chestnut-like meadow soil, meadow-chestnut soil //sol châtain de prairie, sol châtain à nappe phréatique //kastanienartiger Wiesenboden, wiesen-kastanienfarbiger Boden - 1) термин для почв зоны сухих степей, образующихся среди каштановых почв в условиях грунтового увлажнения, в связи с чем они более гумусированы, более глубоко карбонатны, часто солонцеватые и засоленные, в нижней части профиля с незначительными следами оглеения; в системе русск. шк. (1967) эти почвы выделяются на правах типа; 2) термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-каштановых почв, формирующихся на верхних пойменных террасах и в депрессиях рельефа каштановой зоны на тяжелых породах при уровне грунтовых вод 2,5-4 м.

1218. ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВАЯ ВЫ́ЩЕЛОЧЕННАЯ ПО́ЧВА //leached meadow-chestnut soil //sol châtain lévigé à nappe phréatique //ausgelaugter wiesen-kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-каштановых почв, имеющих разрыв более 10 см между гумусовым и карбонатным горизонтами.

1219. ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВАЯ ГА́ЛЕЧНИКОВАЯ ПО́ЧВА //shinglic meadow-chestnut soil //sol châtain galetique à nappe phréatique //geröller wiesen-kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк.(1967) для рода лугово-каштановых почв, подстилаемых на глубине 1,5-2 м галечниковыми отложениями, что приводит к ослаблению влияния грунтовых вод на почву и укорачиванию мощности генетических горизонтов.

1220. ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВАЯ ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //gleyic meadow-chestnut

soil //sol châtain gleyique à nappe phréatique //gleyischer wiesen-kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-каштановых почв, формирующихся на тяжелых слабопроницаемых глинах в подах, и характеризующихся оглеением в иллювиальном горизонте при отсутствии легкорастворимых солей.

1221. ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВАЯ ГЛУБОКОСОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //deep solonetzic meadow-chestnut soil //sol châtain solonetzique profond à nappe phréatique //tiefer solonetzartiger wiesen-kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-каштановых почв, имеющих ниже гумусового горизонта какой-либо подгоризонт с признаками солонцеватости и содержанием обменного натрия более 5% от емкости поглощения.

1222. ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //calcaric meadow-chestnut soil //sol châtain calcaire à nappe phréatique //kalkarischer wiesen-kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-каштановых почв, вскипающих с поверхности или в верхней части гумусового горизонта.

1223. ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВАЯ МА́ЛОМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //shallow meadow-chestnut soil //sol châtain mincé à nappe phréatique //dünner wiesen-kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-каштановых почв, имеющих мощность гумусового горизонта $A+B_1$ менее 30 см.

1224. ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВАЯ МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //deep meadow-chestnut soil //sol châtain profond à nappe phréatique //tiefer wiesen-kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-каштановых почв с мощностью гумусового горизонта $A+B_1$ более 50 см.

1225. ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВАЯ ОСОЛОДЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА //solodized meadow-chestnut soil //sol châtain solodisé à nappe phréatique //solodierter wiesen-kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-каштановых почв, имеющих светло-серый горизонт А комковатой структуры или осолоделый сероватый горизонт АВ в нижней части гумусового горизонта и остаточную морфолбгическую солонцеватость (уплотнение, призматическая структура) в горизонте B_1 при отсутствии обменного натрия.

1226. ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВАЯ СВЕ́ТЛАЯ ПО́ЧВА //leight meadow-chestnut soil //sol châtain clair à nappe phréatique //wiesen-hellkastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-

каштановых почв, содержащих менее 4% гумуса в верхнем горизонте.

1227. ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВАЯ СЛИТА́Я ПО́ЧВА //compact meadow-chestnut soil //sol châtain compact à nappe phréatique //kompakter wiesen-kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-каштановых почв, формирующихся на плотных иловатых глинах и характеризующихся высокой твердостью и трещиноватостью в сухом состоянии.

1228. ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //solonetzic meadow-chestnut soil //sol châtain solonetzique à nappe phréatique //solonetzartiger wiesen-kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-каштановых почв, имеющих в горизонте B_1 высокую плотность, призматическую структуру и содержание обменного натрия более 5% от емкости поглощения.

1229. ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВАЯ СОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //saliniferous meadow-chestnut soil //sol châtain salifére à nappe phréatique //salzhaltig wiesen-kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-каштановых почв, имеющих горизонт аккумуляции легкорастворимых солей ближе 150 см.

1230. ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВАЯ СРЕ́ДНЕМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //medium deep meadow-chestnut soil //sol châtain semi-profond à nappe phréatique //halbtiefer wiesen-kastanienfarbiger Boden - термин русск. шк. (1967) для вида лугово-каштановых почв с мощностью гумусового горизонта $A+B_1$ 30-50 см.

1231. ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВАЯ ТЁМНАЯ ПО́ЧВА //dark meadow-chestnut soil //sol châtain foncé à nappe phréatique //wiesen-dunklerkastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-каштановых почв, содержащих более 4% гумуса в верхнем горизонте.

1232. ЛУ́ГОВО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ПО́ЧВА //meadow-cinnamon soil //sol cinnamome à nappe phréatique //zimtfarbener Wiesenboden - 1) термин русск.шк. (1967) для типа почв избыточного грунтового или поверхностного увлажнения, формирующихся среди коричневых почв субтропических сухих лесов и кустарников и характеризующихся мощным гумусовым профилем, оглеением, высокой оглиненностью, отсутствием четкого карбонатно-аккумулятивного горизонта при общей карбонатности профиля, серо-коричневой окраской;
2) термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-коричневых почв,

формирующихся при относительно близких (2-3 м и ближе) грунтовых водах и характеризующихся сильным оглеением нижней части профиля и слабым - верхней.

1233. ЛУ́ГОВО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ГЛУБОКОСОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //deep saliferous meadow-cinnamon soil //sol cinnamome salifére profond à nappe phréatique //tiefer salzhaltig zimtfarbener Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-коричневых солончаковатых почв, содержащих легкорастворимые соли на глубине 80-150 см.

1234. ЛУ́ГОВО-КОРИ́ЧНЕВАЯ МА́ЛОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //low humic meadow-cinnamon soil //sol cinnamome peu humifére à nappe phréatique// humusarmer zimtfarbener Wiesenboden - термин русск.шк.(1967) для вида лугово-коричневых почв с содержанием гумуса 4-6% в верхнем горизонте.

1235. ЛУ́ГОВО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ОБЫ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //ordinary meadow-cinnamon soil //sol cinnamome ordinaire à nappe phréatique//gewöhnlicher zimtfarbener Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-коричневых почв на незасоленных породах и пресных водах без признаков солонцеватости и слитости.

1236. ЛУ́ГОВО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СИ́ЛЬНОСОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //strongly solonetzic meadow-cinnamon soil //sol cinnamome solonetzoïde forte à nappe phréatique //stark solonetzischer zimtfarbener Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-коричневых солонцеватых почв, содержащих 10-20% обменного натрия от емкости поглощения в солонцеватом горизонте.

1237. ЛУ́ГОВО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СЛА́БОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //slightly humusified meadow-cinnamon soil //sol cinnamome plus peu humifére à nappe phréatique //schwach humushaltig zimtfarbener Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-коричневых почв с содержанием гумуса в верхнем горизонте менее 4%.

1238. ЛУ́ГОВО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СЛИТА́Я ПО́ЧВА //compact meadow-cinnamon soil //sol cinnamome compact à nappe phréatique //kompakter zimtfarbener Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-каштановых почв тяжелого механического состава, характеризующихся слитостью верхних горизонтов.

1239. ЛУ́ГОВО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //solonetzic meadow-cinnamon soil //sol cinnamome solonetzoïde à nappe phréatique //solonetzischer zimtfarbener Wiesenboden - 1) термин русск.

шк. (1967) для рода лугово-коричневых почв, имеющих столбчато-призмовидный уплотненный подгоризонт в нижней части гумусового и верхней части метаморфического горизонта, содержащий более 5% обменного натрия от емкости поглощения; 2) термин той же школы для вида лугово-коричневых солонцеватых почв с содержанием обменного натрия 5-10% от емкости поглощения.

1240. ЛУ́ГОВО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //saliniferous meadow-cinnamon soil //sol cinnamomesalifére à nappe phréatique// salzhaltig zimtfarbener Wiesenboden - 1) термин русск.шк. (1967) для рода лугово-коричневых почв, содержащих легкорастворимые соли в профиле не глубже 150 см; 2) термин той же школы для вида лугово-коричневых солончаковатых почв, содержащих соли на глубине 30-80 см.

1241. ЛУ́ГОВО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СРЕ́ДНЕГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //moderately humic cinnamon soil //sol cinnamomehumifére moderée à nappe phréatique //mässig-humus zimtfarbener Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-коричневых почв, содержащих более 6% гумуса в верхнем горизонте.

1242. ЛУ́ГОВО-ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //meadow-forest soil //sol de forêt à pré //Wiesenwaldboden - термин русск.шк., не имеющий строгого содержания, но часто применяемый в номенклатуре почв, формирующихся под разреженными лиственными лесами с пышным травостоем.

1243. ЛУ́ГОВО-ЛЕСНА́Я СЕ́РАЯ ПО́ЧВА //meadow-forest gray soil //sol gris forestier à nappe phréatique //grauer Wiesenwaldboden - термин русск.шк. для луговых почв зоны коричневых и серо-коричневых почв, формирующихся под низинными лесами при близком уровне грунтовых вод, обычно проточных, и характеризующихся мощным гумусовым горизонтом при очень резком варьировании содержания гумуса и постепенном убывании его содержания с глубиной, оглеением во всём профиле.

1244. ЛУ́ГОВО-ПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //meadow-desert soil //sol désertique à nappe phréatique //Wiesen-Wüstenboden - 1) термин русск. шк. (1967) для типа пустынных почв с близким грунтовым или поверхностным избыточным увлажнением; 2) термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-пустынных почв с грунтовыми водами на 3-5 м и признаками оглеения во втором метре профиля; син.: Лугово-такырная п.

1245. ЛУ́ГОВО-СЕРОЗЁМНАЯ ПО́ЧВА //sierozem-like meadow soil, meadow sierozem //sierozem de prairie, sierozem à nappe phréatique //sierozemartiger Wiesenboden - 1) термин для почв зоны полупустынь, образующихся среди серозёмов в условиях грунтового увлажнения, в связи с чем они более гумусированы, в нижней части профиля с незначительными следами оглеения; в русск.шк. (1967) эти почвы выделяются на правах типа; 2) термин русск. шк. (1967) для подтипа лугово-серозёмных почв, формирующихся при уровне грунтовых вод на глубине 2,5-3,5 м.

1246. ЛУ́ГОВО-СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ПО́ЧВА //meadow-gray-cinnamon soil // sol gris-cinnamome à nappe phréatique //grauer zimtfarbener Wiesenboden - 1) термин русск.шк. (1967) для типа гидроморфных почв, формирующихся под влиянием избыточных поверхностных или грунтовых вод среди серо-коричневых почв и характеризующихся большей, чем у серо-коричневых почв, мощностью профиля, более или менее сильным оглеением, высокой оглиненностью, глубокой гумусированностью при относительно невысоком содержании гумуса, полной насыщенностью основаниями, равномерным валовым составом профиля, слабощелочной реакцией, однородной карбонатностью профиля; 2) термин той же школы для подтипа лугово-серо-коричневых почв, формирующихся при грунтовых водах ближе 2-3 м и характеризующихся сильной оглеенностью нижней части профиля и слабой - верхней.

1247. ЛУ́ГОВО-СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ГЛУБОКОСОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //deep saliniferous meadow-gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamome salifére profond à nappe phréatique //tiefer salzhaltig grauer zimtfarbiger Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-серо-коричневых солончаковатых почв, содержащих соли на глубине 80-150 см.

1248. ЛУ́ГОВО-СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ОБЫ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //ordinary meadow-gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamome ordinaire à nappe phréatique //gewöhnlicher grauer zimtfarbiger Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-серо-коричневых почв, не имеющих солонцеватости и засоления в профиле.

1249. ЛУ́ГОВО-СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СВЕ́ТЛАЯ ПО́ЧВА //light meadow-gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamome clair à nappe phréatique // hellgrauer zimtfarbiger Wiesenboden - термин русск.шк.(1967) для вида лугово-серо-коричневых почв, содержащих менее 5% на целине и менее 4% на пашне гумуса в верхнем горизонте.

1250. ЛУ́ГОВО-СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СИ́ЛЬНОСОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //strongly solonetzic meadow-gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamomesolonetzoïde forte à nappe phréatique //stark solonetzartiger grauer zimtfarbiger Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-серо-коричневых почв с содержанием в солонцеватом горизонте обменного натрия 10-20% от емкости поглощения.

1251. ЛУ́ГОВО-СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //solonetzic meadow-gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamomesolonetzoïde à nappe phréatique //solonetzischer grauer zimtfarbiger Wiesenboden - 1) термин русск.шк. (1967) для рода лугово-серо-коричневых почв, имеющих в профиле уплотненный призмовидный горизонт в нижней части гумусового и в верхней части метаморфического горизонта с содержанием обменного натрия более 5% от емкости поглощения; 2) термин той же школы для вида лугово-серо-коричневых солонцеватых почв с содержанием обменного натрия 5-10% от емкости поглощения.

1252. ЛУ́ГОВО-СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //saliniferous meadow-gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamomesalifére à nappe phreatique //salzhaltig grauer zimtfarbiger Wiesenboden - 1) термин русск.шк. (1967) для рода лугово-серо-коричневых почв, содержащих в профиле легкорастворимые соли выше 150 см; 2) термин той же школы для вида лугово-серо-коричневых солончаковатых почв, содержащих соли на глубине 30-80 см.

1253. ЛУ́ГОВО-СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СОЛОНЧАКО́ВАЯ ПО́ЧВА //saline meadow-gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamomesaline à nappe phréatique //grauer zimtfarbiger Wiesensolonchakboden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-серо-коричневых солончаковатых почв, содержащих соли на глубине 5-30 см от поверхности.

1254. ЛУ́ГОВО-СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ТЁМНАЯ ПО́ЧВА //dark meadow-gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamomefoncé à nappe phréatique // dunkel-grauer zimtfarbiger Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-серо-коричневых почв, содержащих более 5% на целине и более 4% на пашне гумуса в верхнем горизонте.

1255. ЛУ́ГОВО-СТЕ́ПНАЯ БУ́РАЯ ПО́ЧВА //brown meadow-steppe soil //sol brun subarid à nappe phréatique //brauner Wiesensteppenboden - термин для почв зоны полупустыни среди бурых полупустынных почв в условиях грунтового увлажнения, в связи с чем они сла-

бо оглеены в нижней части, часто солонцеваты и солончаковаты, карбонатны по всему профилю и несколько более гумусированы.

1256. ЛУ́ГОВО-ТАКЫ́РНАЯ ПО́ЧВА //meadow-takyric soil //sol takyrique à nappe phréatique //wiesentakyrischer Boden - термин узбекск.шк. для пустынных почв с грунтовыми водами на глубине 3-5 м и признаками оглеения во втором метре профиля; син.: Лугово-пустынная п.

1257. ЛУ́ГОВО-ТОРФЯ́НО-ИЛОВА́ТО-БОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА //meadow-peat-silty-swamp soil //sol limoneux turbeuse de prairie marécageux //Wiesentorfsumpfmoorboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных болотных почв степей, характеризующихся слабым развитием перегнойного горизонта, наличием наряду с перегнойным торфяного горизонта, обилием накопления ила.

1258. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ ПО́ЧВА //chernozem-like meadow soil, meadow-chernozemic soil, meadow chernozem //sol chernozemique à nappe phréatique //wiesentschernozemischer Boden - 1) термин для почв черноземной зоны, формирующихся в условиях грунтового увлажнения, в связи с чем они имеют признаки оглеения в нижней части профиля, более растянутый гумусовый горизонт, большую гумусированность; часто они солонцеватые, солончаковатые и осолоделые; в системе русск.шк. (1967) эти почвы выделяются на правах типа; 2) термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-чернозёмных почв, формирующихся при уровне грунтовых вод 2,5-4 м и характеризующихся постоянным переувлажнением нижней части профиля, высокой гумусированностью (до 17% с поверхности), зернисто-творожистой структурой гумусового горизонта, постепенностью перехода между гумусовым и карбонатным горизонтами, пятнами оглеения в нижней части профиля.

1259. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ ВЫ́ЩЕЛОЧЕННАЯ ПО́ЧВА //leached meadow-chernozemic soil //sol chernozemique lévigé à nappe phréatique //ausgelaugter wiesentschernosemischer Boden - термин русск. шк. (1967) для рода лугово-чернозёмных почв, имеющих большой разрыв между гумусовым и карбонатным горизонтами.

1260. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ ЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА //saliniferous meadow-chernozemic soil //sol chernozemique salifére à nappe phréatique //salzhaltig wiesentschernosemischer Boden - термин русск. шк. (1967) для рода лугово-чернозёмных почв, имеющих в профиле горизонт аккумуляции легкорастворимых солей.

1261. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //calcaric meadow-chernozemic soil //sol chernozemique calcaire à nappe phréatique //kalkarischer wiesentschernosemischer Boden - термин русск. шк. (1967) для рода лугово-черноземных почв, вскипающих с поверхности вследствие особенностей почвообразующей породы, перерытости землероями или иных причин.

1262. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ МА́ЛОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //low-humus meadow-chernozemic soil //sol chernozemique peu humifére à nappe phréatique //humusarmer wiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-черноземных почв, содержащих 4-6% гумуса в верхнем горизонте.

1263. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ МА́ЛОМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //shallow meadow-chernozemic soil //sol chernozemique peu profond à nappe phréatique //dünner wiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-черноземных почв с мощностью гумусового горизонта A+AB менее 40 см.

1264. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ МА́ЛОМО́ЩНАЯ КАРМА́НИСТАЯ ПО́ЧВА //pocken-like schallow meadow-chernozemic soil //sol chernozemique peu profond en forme de poche à nappe phréatique //taschenartiger dünner wiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк.(1967) для вида маломощных лугово-черноземных почв с чередованием широких полос гумусовой окраски и безгумусного материала на нижней границе гумусного горизонта.

1265. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ МА́ЛОМО́ЩНАЯ ЯЗЫКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //glossic shallow meadow-chernozemic soil //sol chernozemique peu profond glossique à nappe phréatique //glossischer dünner wiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк. (1967) для вида маломощных лугово-черноземных почв, имеющих узкие длинные затёки гумуса на нижней границе гумусового горизонта.

1266. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //deep meadow-chernozemic soil //sol chernozemique profond à nappe phréatique //tiefer wiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-черноземных почв с мощностью гумусового горизонта A+AB 80-120 см.

1267. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //podzolized meadow-chernozemic soil //sol chernozemique podzolisé à nappe phréatique //podsolierter wiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-чернозёмных почв, имеющих

белёсую кремнеземистую присыпку в гумусовом горизонте и дифференциацию профиля по илу и R_2O_3 при слабокислой реакции среды.

1268. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ ОСОЛОДЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА //solodized meadow-chernozemic soil //sol chernozemique solodisé à nappe phréatique //solodierter wiesentschernosemischer Boden - термин русск. шк. (1967) для рода лугово-чернозёмных почв, имеющих белёсую кремнезёмистую присыпку в верхней части гумусового горизонта, дифференциацию профиля по илу и R_2O_3 при щелочной реакции среды.

1269. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ ОСТА́ТОЧНО-СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //residually solonetzic meadow-chernozemic soil //sol chernozemique solonetzoïde résiduel à nappe phréatique //restsolonetzartiger wiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-чернозёмных почв, имеющих в каком-либо подгоризонте морфологические и физические признаки солонцеватости, но содержащих менее 5% от емкости поглощения обменного натрия.

1270. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ СВЕ́РХМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //super-deep meadow-chernozemic soil //sol chernozemique super-profond à nappe phréatique //super-tiefer wiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-чернозёмных почв с мощностью гумусового горизонта A+AB более 120 см.

1271. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ СЛА́БОГУМУСИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //slightly humucified meadow-chernozemic soil //sol chernozemique plus peu humifère à nappe phréatique //schwach humusierter wiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-чернозёмных почв, содержащих менее 4% гумуса в верхнем горизонте.

1272. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ СЛИТА́Я ПО́ЧВА //compact meadow-chernozemic soil //sol chernozemique compact à nappe phréatique //kompakter wiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-чернозёмных почв тёплой фации на иловато-глинистых породах, характеризующихся большой плотностью и трещиноватостью.

1273. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //solonetzic meadow-chernozemic soil //sol chernozemique solonetzoïde à nappe phréatique //solonetzartiger wiesentschernosemischer Boden -

термин русск.шк. (1967) для рода лугово-чернозёмных почв, имеющих в гумусовом горизонте подгоризонт с сильным уплотнением и грубой структурой, содержащий более 5% от емкости поглощения обменного натрия.

1274. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ СОЛОНЦЕВА́ТО-ЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА //solonetzic-saliniferous meadow-chernozemic soil //sol chernozemique solonetzoïde-salifére à nappe phréatique //solonetzartiger salzhaltig wiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-чернозёмных почв, имеющих признаки солонцеватости в верхней части профиля и содержащих легкорастворимые соли в нижней.

1275. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ СРЕ́ДНЕГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //moderate-humus meadow-chernozemic soil //sol chernozemique moderée en humus à nappe phréatique //mässig-humus wiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-чернозёмных почв, содержащих 6-9% гумуса в верхнем горизонте.

1276. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ СРЕ́ДНЕМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //medium deep meadow-chernozemic soil //sol chernozemique semi-profond à nappe phréatique //halbtiefer wiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-черноземных почв с мощностью гумусового горизонта A+AB 40-80 см.

1277. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ ТУ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //fat meadow-chernozemic soil //sol chernozemique grasse à nappe phréatique //fetter wiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк. (1967) для вида лугово-чернозёмных почв, содержащих более 9% гумуса в верхнем горизонте.

1278. ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ ЩЕ́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //crevasced meadow-chernozemic soil //sol chernozemique crevassé à nappe phréatique //spaltiger wiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк. (1967) для рода лугово-чернозёмных почв холодной фации на иловато-глинистых загипсованных или закарбоначенных породах очень плотного слитого сложения, характеризующихся образованием глубоких трещин и засыпанием в них мелкозёма гумусового горизонта, вскипающих с поверхности или в пределах гумусового горизонта.

1279. ЛЮВИСО́ЛЬ //luvisol //luvisol //Luvisol (от лат. luo - мыть, вымывать и лат. solum - почва) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, в профиле которых ясно выражен диагностический аргилло-

вый[x] горизонт и основным процессом почвообразования наряду с аккумуляцией гумуса в горизонте А служит нисходящее перемещение ила без его разрушения.

1280. ЛЮВИСОЛЬ БЕЛЁСАЯ //albic luvisol //luvisol albique //albischer Luvisol (от лат. albus - белый) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, имеющих светлый[x] или темный[x] горизонт А (если не эродирован), белёсый горизонт A_2 и аргилловый[x] горизонт В, причем горизонт A_2 входит затёками по граням структурных отдельностей в верхнюю часть горизонта В; степень насыщенности основаниями в этих почвах 35% и более, по крайней мере в нижней части горизонта В; плинтитового[x] горизонта нет в пределах 125 см от поверхности.

1281. ЛЮВИСОЛЬ ГЛЕЕВАЯ //gleyic luvisol //luvisol gleyique //gleyischer Luvisol (от русск. глей) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, имеющих светлый[x], темный[x] или торфянистый (мощностью менее 30 см) горизонт А и аргилловый[x] горизонт В со степенью насыщенности основаниями 35% и более, по крайней мере, в нижней части горизонта В; имеющих глеевый[x] горизонт или признаки переувлажнения в тот или иной период года; не имеющих белёсого горизонта A_2, резко по мех.составу сменяемого горизонтом В; не имеющих плинтитового[x] горизонта в пределах 125 см от поверхности.

1282. ЛЮВИСОЛЬ ЖЕЛЕЗИСТАЯ //ferric luvisol //luvisol ferrique //ferrischer Luvisol (от лат. ferrum - железо) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, имеющих светлый[x] или темный[x] горизонт А (если не эродирован) и желтовато-бурый до красновато-бурого аргилловый[x] горизонт В, бо́льшая часть которого имеет емкость поглощения менее 24 мэкв на 100 г глины со степенью насыщенности основаниями 35% или более, по крайней мере в нижней части горизонта В; плинтитовый[x] горизонт отсутствует в пределах 125 см от поверхности.

1283. ЛЮВИСОЛЬ ИЗВЕСТКОВАЯ //calcic luvisol //luvisol calcique //kalkischer Luvisol (от лат. calx - известь) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих светлый[x] или темный[x] горизонт А (если не эродирован), не твердеющий при высыхании; бурый аргилловый[x] горизонт В, бо́льшая часть которого имеет емкость поглощения более 24 мэкв на 100 г глины со степенью насыщенности основаниями более 35%, по крайней мере в нижней части горизонта В; и кальциевый[x] горизонт в пределах 125 см

от поверхности, при отсутствии плинтитового[x] горизонта.

1284. ЛЮВИСОЛЬ ОКРАШЕННАЯ // chromic luvisol // luvisol chromique // chromischer Luvisol (от греч. chromos - цвет, окраска) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, имеющих светлый[x] или темный[x] горизонт А (если не эродирован), твердеющий при высыхании, и интенсивно бурый до красного аргиллювый[x] горизонт В, большая часть которого имеет емкость поглощения более 24 мэкв на 100 г глины со степенью насыщенности основаниями 35% или более, по крайней мере в нижней части горизонта В; плинтитового[x] горизонта нет в пределах 125 см от поверхности.

1285. ЛЮВИСОЛЬ ПЛИНТИТОВАЯ // plinthic luvisol // luvisol plinthique // plinthischer Luvisol (от греч. plinthos - кирпич) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, имеющих светлый[x] или темный[x] горизонт А, или торфянистый горизонт мощностью менее 30 см, аргиллювый[x] горизонт В со степенью насыщенности основаниями 35% и более, по крайней мере, в нижней части горизонта В; имеющих плинтитовый[x] горизонт в пределах 125 см от поверхности; возможно имеющих признаки сезонного переувлажнения или даже глеевый[x] горизонт.

1286. ЛЮВИСОЛЬ СЕРАЯ // gray luvisol // luvisol gris // grauer Luvisol - см. Серая древесная почва.

1287. ЛЮВИСОЛЬ СЕРАЯ БРЮНИСОЛЬНАЯ // brunisolic gray luvisol // luvisol gris brunisolique // brunisolischer grauer Luvisol - см. Серая древесная брюнисольная почва.

1288. ЛЮВИСОЛЬ СЕРАЯ ДВУПРОФИЛЬНАЯ // bisequa gray luvisol // luvisol gris bisequa // bisequa grauer Luvisol - см. Серая древесная двупрофильная почва.

1289. ЛЮВИСОЛЬ СЕРАЯ ОГЛЕЕННАЯ // gleyed gray luvisol // luvisol gris gleyifie // vergleyter grauer Luvisol - см. Серая древесная оглеенная почва.

1290. ЛЮВИСОЛЬ СЕРАЯ ОСОЛОДЕЛАЯ // solodic gray luvisol // luvisol gris solodique // solodischer grauer Luvisol - см. Серая древесная осолоделая почва.

1291. ЛЮВИСОЛЬ СЕРАЯ СКАЛЬНАЯ // lithic gray luvisol // luvisol gris lithique // lithischer grauer Luvisol - см. Серая древесная скальная почва.

1292. ЛЮВИСОЛЬ СЕРАЯ ТЁМНАЯ // dark gray luvisol // luvisol gris fon-

cé //dunkelgrauer Luvisol - см. Серая древесная темная почва.

1293. ЛЮВИСО́ЛЬ СЕ́РАЯ ТИПИ́ЧНАЯ //orthic gray luvisol //luvisol gris orthique //orthischer grauer Luvisol - см. Серая древесная типичная почва.

1294. ЛЮВИСО́ЛЬ СЕ́РО-БУ́РАЯ //gray brown luvisol //luvisol brun-gris //graubrauner Luvisol - термин канадской школы (1968) для большой группы почв, имеющих темный горизонт A_1 с лесным муллевым гумусом, осветленный горизонт A_2 и аригилловый[x)] горизонт B; будучи развитыми на основных или карбонатных породах, они отличаются высокой степенью насыщенности основаниями. Почвы формируются под широколиственными или смешанными лесами в умеренном климате.

1295. ЛЮВИСО́ЛЬ СЕ́РО-БУ́РАЯ БРУНИСО́ЛЬНАЯ //brunisolic gray-brown luvisol //luvisol brun-gris brunisolique //brunisolischer graubrauner Luvisol - термин канадской школы (1968) для подгруппы серо-бурых лювисолей, отличающихся бурой окраской верхней части осветленного горизонта A_2.

1296. ЛЮВИСО́ЛЬ СЕ́РО-БУ́РАЯ ДВУПРО́ФИЛЬНАЯ //bisequa gray-brown luvisol //luvisol brun-gris bisequa //bisequa graubrauner Luvisol - термин канадской школы (1968) для подгруппы серо-бурых лювисолей, в верхней части осветленного горизонта которых сформирован своеобразный подзолистый профиль из тонких слоев A_e, B_{fh} или B_f и "C"(A_2).

1297. ЛЮВИСО́ЛЬ СЕ́РО-БУ́РАЯ ОГЛЕ́ЕННАЯ //gleyed gray-brown luvisol //luvisol brun-gris gleyifie //vergleyter graubrauner Luvisol - термин канадской школы (1968) для почв любой из подгрупп серо-бурых лювисолей, имеющих слабые признаки оглеения в профиле.

1298. ЛЮВИСО́ЛЬ СЕ́РО-БУ́РАЯ СКА́ЛЬНАЯ //lithic gray-brown luvisol //luvisol brun-gris lithique //lithischer graubrauner Luvisol - термин канадской школы (1968) для почв любой из подгрупп серо-бурых лювисолей, имеющих плотную породу в пределах 50 см от поверхности.

1299. ЛЮВИСО́ЛЬ СЕ́РО-БУ́РАЯ ТИПИ́ЧНАЯ //orthic gray-brown luvisol //luvisol brun-gris orthique //orthischer graubrauner Luvisol - термин канадской школы (1968) для подгруппы серо-бурых люви-

солей, имеющих хорошо выраженные гумусовый, осветленный и аргиллювый [x)] горизонты.

1300. ЛЮВИСО́ЛЬ СЛИТА́Я //vertic luvisol //luvisol vertique //vertischer Luvisol (от лат. verto - оборачивать) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих светлый[x)] или темный[x)] горизонт А (если не эродирован) и аргиллювый[x)] горизонт В, бо́льшая часть которого имеет ёмкость поглощения более 24 мэкв на 100 г глины со степенью насыщенности основаниями более 35%, по крайней мере в нижней части горизонта В; почва обнаруживает широкие до глубины порядка 50 см трещины в определенную часть года; плинтитовый[x)] горизонт отсутствует в пределах 125 см от поверхности.

1301. ЛЮВИСО́ЛЬ ТИПИ́ЧНАЯ //orthic luvisol //luvisol orthique //orthischer Luvisol (от гр. orthos - настоящий) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих светлый[x)] или темный[x)] горизонт А (если не смыт), не твердеющий при высыхании, и бурый аргиллювый[x)] горизонт В, бо́льшая часть которого имеет емкость поглощения более 24 мэкв на 100 г глины со степенью насыщенности основаниями 35% или более, по крайней мере, в нижней части горизонта В; плинтитового[x)] горизонта нет в пределах 125 см от поверхности.

1302. ЛЮВИСО́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //luvisolic soil //sol luvisolique //luvisolischer Boden - термин канадской школы (1968) для порядка почв, включающего хорошо или неудовлетворительно дренированные почвы, сформированные под широколиственными, смешанными или хвойными лесами или лесостепями умеренного климата; характеризующиеся наличием элювиального горизонта A_2 и глинно-иллювиального (аргиллового[x)]) горизонта В. Обычно имеют горизонт A_1 с нейтральной реакцией, в то время как A_2 и В слабо или среднекислые.

1303. ЛЮВИФИБРИ́СТ //luvifibrist //luvifibrist //Luvifibrist (от лат. luo - вымывать, лат. fibra - ткань и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Поиближения (США, 1960-70) для большой группы фибристов (см.), имеющих под слоем торфа гумусо-иллювиальный горизонт.

1304. ЛЮВИХЕМИ́СТ //luvihemist //luvihemist //Luvihemist (от лат. luo - вымывать, греч. hemi - половина и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70)

для большой группы хемистов (см.), имеющих в профиле под торфяным гумусо-иллювиальный горизонт.

1305. МАЛОГУМУСНАЯ ПОЧВА //low humic soil // sol peu humifére // humusarmer Boden - общеупотребительный термин для почв с низким содержанием гумуса в верхнем горизонте, причем количественный критерий малогумусности принимается свой особый для каждого типа почвы.

1306. МАЛОМОЩНАЯ ПОЧВА //shallow soil // sol peu profond, sol mincé // dünner Boden - общеупотребительный термин для почв, имеющих малую мощность всего профиля либо отдельных горизонтов, особенно гумусовых; для каждого типа почв количественное выражение понятия маломощности принимается своим.

1307. МАНГРОВАЯ ПОЧВА //mangrove soil // sol de mangrove // Mangroveboden (от англ. mangrove) - термин для почв мангровых зарослей, формирующихся в приливной полосе океанических побережий тропиков; почва отличается недифференцированным сильно оглеенным профилем, большим содержанием сероводорода, гумусностью, большой биогенностью, значительным засолением.

1308. МАРГАЛИТОВАЯ ПОЧВА //margalitic soil, margalite soil // sol margalitique // margalitischer Boden (от лат. marga - мергель и греч. lithos - камень) - термин Деймса (1950) для темных трещиноватых глинистых почв Индонезии, формирующихся на элювии мергелей, затем распространенный на все темные трещиноватые слитые глинистые почвы типа вертисолей, и, наконец, оставленный в шестидесятых годах полностью в пользу терминов "регур" (Индонезия) и "вертисоль".

1309. МАРШ //marsh, swamp, bog // marécage, marais // Marsch, Sumpf, Moor (от нем. Marsch) - термин западно-европейских школ для травяных болот низменных морских побережий, затопляемых лишь в периоды наиболее высоких приливов и нагонов воды; влажные луга и болота здесь часто имеют галофитную растительность.

1310. МАРШ //marsh // march // Marsch - термин немецкой школы для почв ландшафтов того же названия, заменивший все старые названия маршевых почв. Син.: маршевая почва.

1311. МАРШ БЕСКАРБОНАТНЫЙ //non-calcic marsh // march non-calcique // Kleimarsch - термин Шрёдера и Брюммера (1968) для маршей на бескарбонатном наносе.

1312. МА́РШ КАРБОНА́ТНЫЙ //calcareous marsh //march calcique //Kalkmarsch - термин Шрёдера и Брюммера (1968) для маршей на карбонатном наносе с заметной аккумуляцией $CaCO_3$.

1313. МА́РШ ЛАГУ́ННЫЙ //lagoonal marsh //march de lagune //Brackmarsch - термин Шрёдера и Брюммера (1968) для маршей, формирующихся в условиях солоноватых лагун.

1314. МА́РШ МОРСКО́Й //sea marsh //march de la mer //Seemarsch - термин Шрёдера и Брюммера (1968) для маршей приморских низменностей.

1315. МА́РШ РЕЧНО́Й //river marsh //march fluviatile //Flußmarsch - термин Шрёдера и Брюммера (1968) для маршей речных дельт. Син.: плавни, плавневая почва.

1316. МА́РШ СОЛЁНЫЙ //salt marsh //march saline //Salzmarsch - термин Шрёдера и Брюммера (1968) для маршей, формирующихся в условиях притока соленых вод и характеризующихся значительным накоплением воднорастворимых солей.

1317. МА́РШ ТОРФЯНО́Й //peat marsh //march tourbeaux //Torfmarsch - термин Шрёдера и Брюммера (1968) для маршей с поверхностным слоем торфа.

1318. МА́РШ С ТВЁРДОЙ ПОДПО́ЧВОЙ //knick-crack, knick-marsh soil, knick-marsh //sol marécageux à sous-sol dur, march à sous-sol dur //Knickmarsch, (Knickboden) - термин Шрёдера и Брюммера (1968) для ма́ршей, имеющих на незначительной глубине под иловатым слоем твердую песчаную, глинистую или каменистую подпочву.

1319. МА́РШЕВАЯ ПО́ЧВА //marsh soil //sol marais //Marschboden - термин западно-европейских школ для почв приморских и речных маршей. Син.: марш.

1320. МБУ́ГА //mbuga //mbuga //Mbuga - местное название темных слитых трещиноватых глинистых почв типа вертисолей, распространенное в Танзании и прилегающих странах Африки.

1321. МЕ́ДИСАПРИ́СТ //medisaprist //medisaprist //Medisaprist (от лат. medium - средний, греч. sapros - гнилой и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы сапристов (см.), имеющих среднегодовую температуру почвы выше 8°С и разницу между среднелетней и среднезимней температурами на глубине 30 см более 5°С;

в пределах этой большой почвенной группы выделяются 9 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) торфянистые (fibric), 3) торфянистые землистые (fibric terric), 4) фловаквентные (fluvaquentic), 5) переходные (hemic), 6) переходные землистые (hemic terric), 7) озёрные (limnic), 8) скальные (lithic) и 9) землистые (terric) медисапристы.

1322. МЕ́ДИФИБРИ́СТ //medifibrist //medifibrist //Medifibrist (от лат. medium - средний, лат. fibra - ткань и порядкового корня ist для гистосолей)-термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы фибристов (см.) суббореального умеренного пояса, имеющих среднегодовую температуру почвы выше 8°С и разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 30 см более 5°С и имеющих менее трех четвертей сфагнового материала в составе торфа; в пределах этой большой почвенной группы выделяются 12 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) фловаквентные (fluvaquentic), 3) переходные (hemic), 4) переходные землистые (hemic terric), 5) водонасыщенные (hydric), 6)озёрные (limnic), 7) скальные (lithic), 8) перегнойные (sapric), 9) перегнойные землистые (sapric terric), 10) сфагновые (sphagnic), 11) сфагновые землистые (sphagnic terric) и 12) землистые (terric) медифибристы.

1323. МЕ́ДИХЕМИ́СТ //medihemist //medihemist //Medihemist (от лат. medium - средний, греч. hemi - половина и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы хемистов (см.), имеющих среднегодовую температуру почвы выше 8°С и разницу между среднелетней и среднезимней температурами на глубине 30 см более 5°С, не имеющих гумусоиллювиального горизонта и не имеющих аккумуляции сульфидов или сульфатов в профиле; в пределах этой большой почвенной группы выделяются 10 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) торфянистые (fibric), 3) торфянистые землистые (fibric terric), 4) фловаквентные (fluvaquentic), 5) водонасыщенные (hydric), 6) озёрные (limnic), 7) скальные (lithic), 8) перегнойные (sapric), 9) перегнойные землистые (sapric terric) и 10) землистые (terric) медихемисты.

1324. МЕ́ЗИСО́ЛЬ //mesisol //mesisol //Mesisol (от гр. mésos - средний и лат. solum - почва) - термин канадской школы (1968) для большой группы почв, входящей в порядок органических почв (см.), имеющих преимущественно полуторфянистую среднюю треть

(60-120 см) профиля или полуторфянистые верхнюю и среднюю трети (0-60 и 60-120), если в пределах средней трети есть землистый слой, вода, скальная порода или многолетняя мерзлота.

1325. МЕ́ЗИСО́ЛЬ ВО́ДНАЯ //hydric mesisol //mesisol hydrique//hydrischer Mesisol (от гр.hydor - вода) - термин канадской школы (1968) для мезисолей (см.), имеющих слой воды ниже 40 см вплоть до 160 см и глубже.

1326. МЕ́ЗИСО́ЛЬ ГУ́МУСОВАЯ //humic mesisol //mesisol humique //humus Mesisol (от лат.humus - гумус, перегной) - термин канадской школы (1968) для мезисолей (см.), имеющих преимущественно полуторфянистую среднюю треть (60-120 см) и подчиненный гумифицированный слой в пределах нижней трети (120-160 см).

1327. МЕ́ЗИСО́ЛЬ ЗЕМЛИ́СТАЯ //terric mesisol //mesisol terrique //terrischer Mesisol (от лат.terrae - земля) - термин канадской школы (1968) для мезисолей (см.), имеющих землистый слой (с содержанием органического вещества менее 30%) в пределах от 60 до 160 см от поверхности.

1328. МЕ́ЗИСО́ЛЬ КРИОГЕ́ННАЯ //cryic mesisol //mesisol cryique //kryischer Mesisol (от гр.cryos - холод) - термин канадской школы (1968) для мезисолей (см.), имеющих слой многолетней мерзлоты в пределах 160 см от поверхности.

1329. МЕ́ЗИСО́ЛЬ КУМУЛЯТИ́ВНАЯ //cumulo mesisol //mesisol cumulique //kumulischer Mesisol (от лат.accumulatio - накопление) - термин канадской школы (1968) для мезисолей (см.), имеющих наносный (аллювиальный) слой или несколько прослоек толщиной от 5 до 30 см под верхней третью (0-60 см) профиля.

1330. МЕ́ЗИСО́ЛЬ ОЗЕ́РНАЯ //limno mesisol //mesisol limnique //limnischer Mesisol (от гр. limne - озеро) - термин канадской школы (1968) для мезисолей (см.), имеющих озёрный торф ниже верхней трети (0-60 см) профиля.

1331. МЕ́ЗИСО́ЛЬ СКА́ЛЬНАЯ //lithic mesisol //mesisol lithique //lithischer Mesisol (от гр. lithos - камень) - термин канадской школы (1968) для мезисолей (см.), имеющих плотную породу в пределах от 10 до 160 см от поверхности.

1332. МЕ́ЗИСО́ЛЬ ТИПИ́ЧНАЯ //typic mesisol //mesisol typique //typischer Mesisol (от гр. typos - образец) - термин канадской

школы (1968) для мезисолей (см.) имеющих преимущественно полуторфянистый органический материал в пределах средней и нижней трети (60-160 см).

1333. МЕ́ЗИСО́ЛЬ ФИ́БРОВАЯ //fibric mesisol //mesisol fibrique //fibrischer Mesisol (от гр. fibra - ткань) - термин канадской школы (1968) для мезисолей (см.), имеющих преимущественно полуторфянистую среднюю треть (60-120 см) и подчиненный торфянистый слой в пределах нижней трети (120-160 см).

1334. МЕЛАНИЗИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //melanized soil //sol melanisé //melanisierter Boden (от греч. melanos - мягкий) - термин, не имеющий широкого распространения, для почв обогащенных нейтральным насыщенным гумусом.

1335. МЕЛАНИ́Т //melanite //mélanite //Melanit - местное название темных слитых трещиноватых глинистых почв типа вертисолей, распространенное в Гане.

1336. МЕ́ЛКОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //shallow podzolic soil //sol podzolique mincé //dünner Podsolboden - термин русск.шк. для вида подзолистых почв, мощность подзолистого горизонта которых составляет 5-20 см.

1337. МЕЛОВА́Я ПО́ЧВА //chalk soil //sol de craie //Kreideboden - общеупотребительный термин для щебнистых маломощных почв на меловых отложениях.

1338. МЕ́РГЕЛЕВАЯ ПО́ЧВА //marl soil, marly soil, marl earth, marl clay, marl loam //terre marneuse, argile marneuse, sol argileux-sableux-marneux //Mergelboden, Mergelton, mergeliger Lehm, Letten - термин немецкой школы для почв, сформированных на мергелях или мергелистых глинах, имеющий горизонт, сохранивший структуру исходной породы. Син.: пелосоль.

1339. МЕ́РГЕЛЬ-РЕНДЗИ́НА //marl-rendzina //marne-rendzine //Mergel-Rendzine - термин немецкой школы для нескелетных рендзин, сформированных на мергелях; согласно Пальльману, это собственно рендзина.

1340. МЕРЗЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА //pergelisoil, pergelisol, permafrost soil, ever frozen soil //pergélisol, sol toujours gelé, sol perpétuellement gelé //Permafrostboden, Dauerfrostboden - общеупотребительный термин для почв, имеющих на некоторой глубине в профиле слой многолетней ("вечной") мерзлоты.

1341. МЕРЗЛО́ТНАЯ ЛУ́ГОВО-ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //permafrost meadow-forest soil, meadow-forest pergelisol //pergélisol de forêt à pré // Wiesewaldpermafrostboden - термин русск.шк. (1967) для типа почв с профилем A_0-A_1-B-C, формирующихся в условиях близкого залегания многолетней мерзлоты (2-4 м) на породах тяжелого механического состава под березовыми лесами с пышным травостоем, характеризующихся черно-серым глубоко языковатым (до 100-120 см) гумусовым горизонтом.

1342. МЕРЗЛО́ТНАЯ ЛУ́ГОВО-ЛЕСНА́Я ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //gleyic permafrost meadow-forest soil, gleyic meadow-forest pergelisol //pergélisol gleyique de forêt à pré //gleyischer Wiesewaldpermafrostboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа мерзлотных лугово-лесных почв, формирующихся при высоком залегании многолетней мерзлоты (150-170 см), характеризующихся малой мощностью языковатого гумусового горизонта (15-20 см) и наличием признаков оглеения в переходном горизонте B.

1343. МЕРЗЛО́ТНАЯ ЛУ́ГОВО-ЛЕСНА́Я ОСТЕПНЁННАЯ ПО́ЧВА //heathed permafrost meadow-forest soil,heathed meadow-forest pergelisol // pergélisol bruyéreforme de forêt à pré//heidischer Wiesewaldpermafrostboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа мерзлотных лугово-лесных почв, формирующихся при глубоком залегании многолетней мерзлоты (глубже 3,5 м), характеризующихся менее черным и менее языковатым, но более растянутым гумусовым горизонтом по сравнению с другими подтипами; в нижней части профиля на глубине 100-120 см обычны мучнистые карбонатные выделения.

1344. МЕРЗЛО́ТНАЯ ЛУ́ГОВО-ЛЕСНА́Я ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typic permafrost meadow-forest soil, typic meadow-forest pergelisol //pergélisol typique de forêt à pré //typischer Wiesewaldpermafrostboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа мерзлотных лугово-лесных почв, имеющих мощный (25-30 см) языковатый гумусовый горизонт, не имеющих признаков оглеения в профиле, имеющих карбонатные новообразования в нижней части профиля (на глубине 120-150 см).

1345. МЕРЗЛО́ТНО-ТАЁЖНАЯ ПО́ЧВА //cryomorphic taiga soil //cryosol de taiga //Frostboden der Taiga, Frosterde der Taiga - термин для почв (Сибири), характеризующихся наличием многолетней мерзлоты в нижней части профиля и отсутствием или слабо выра-

женной оподзоленностью, кислой реакцией и высокой подвижностью гумуса (потечность гумуса), следами криотурбации.

1346. МЕРЗЛО́ТНО-ТАЁЖНАЯ ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //cryomorphic taiga gley soil //cryosol de la taiga èn gley //Gleyfrostboden der Taiga - термин для почв (Сибири), в профиле которых над слоем многолетней мерзлоты имеется ясно выраженный глеевый горизонт; син.: глеево-мерзлотно-таежная п.

1347. МЕРЗЛО́ТНО-ТАЁЖНАЯ КИ́СЛАЯ ПО́ЧВА //acid cryomorphic taiga soil //cryosol acide de taiga //saurer Frostboden der Taiga - термин для автоморфных почв Сибири, формирующихся под лиственничными лесами с мохово-кустарничковым покровом и имеющих недифференцированный буроватый профиль с потечным гумусом и кислой средой и иллювиально-гумусовым надмерзлотным горизонтом; син.: подбур.

1348. МЕРЗЛО́ТНО-ТАЁЖНАЯ ОЖЕЛЕЗНЁННАЯ ПО́ЧВА //ferrimorphic cryomorphic taiga soil //cryosol ferrugineux de taiga //eisenhaltiger Frostboden der Taiga - термин для ксероморфно-автоморфных почв Сибири, характеризующихся накоплением железа в поверхностном горизонте и высоким содержанием подвижного железа во всем профиле; почвы имеют кислую реакцию и высокую ненасыщенность основаниями.

1349. МЕРЗЛО́ТНО-ТАЁЖНАЯ ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //podzolized cryomorphic taiga soil //cryosol podzolisé de taiga //podsolierter Frostboder der Taiga - термин для автоморфных почв Сибири, имеющих слабо развитый осветленный горизонт в верхней части профиля и элювиально-иллювиальную дифференциацию профиля по илу и R_2O_3.

1350. МЕРЗЛО́ТНО-ТАЁЖНАЯ ОСТА́ТОЧЕО-КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //residually calcaric cryomorphic taiga soil //cryosol calcaire residuel de taiga //restkalkischer Frostboden der Taiga - термин для неоподзоленных почв светлохвойных лесов Сибири, формирующихся на карбонатных породах и имеющих карбонаты в нижней части профиля.

1351. МЕРЗЛО́ТНО-ТАЁЖНАЯ ПА́ЛЕВАЯ ПО́ЧВА //straw-yellow cryomorphic taiga soil //cryosol paille de taiga //strohgelbfarbener Frostboden der Taiga - термин для почв Сибири, формирующихся под лиственничными с травяным покровом лесами на древнеаллювиальных лессовидных суглинках и элювии плотных пород, характери-

зующихся наличием карбонатно-аккумулятивного горизонта над слоем многолетней мерзлоты, нейтральной реакцией, полной насыщенностью основаниями, отсутствием оподзоленности.

1352. МЕРЗЛО́ТНО-ТАЁЖНАЯ ПА́ЛЕВАЯ ОСОЛОДЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА //solodized straw-yellow cryomorphic taiga soil //cryosol paille solodisé de taïga //solodierter strohgelbfarbener Frostboden der Taiga - термин для мерзлотно-таёжных палевых почв, имеющих осолоделый горизонт A_1.

1353. МЁРТВАЯ ПО́ЧВА //dead soil //sol mort, sol à horizon supérieur de tourbe //tote Boden, Boden mit Torf-Oberhorizont - устаревший термин западноевропейских школ для почв, имеющих мощный торфяный слой с поверхности.

1354. МИ́КРОПОДЗО́Л //micropodzol //micropodzol //Mikro-Podsol (от греч. mikrós - малый и русск. подзол) - термин для почв с очень тонким (менее 1 см) подзолистым и соответственно тонким иллювиальным горизонтом; часто профиль микроподзола формируется в верхней части гумусового горизонта дерново-подзолистых или бурых лесных почв при вторичном поселении на них хвойного леса. Син.: повторно оподзоленная почва, поверхностно-подзолистая почва.

1355. МИНЕРА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //mineral soil //sol minéral //Mineralboden - 1) общеупотребительный термин для растительно-наземных почв, не имеющих торфяного горизонта; 2) термин 7-го Приближения (США, 1960) для почв, которые до глубины 30 см содержат менее 30% органического вещества при глинистой основе и менее 20% при песчаной.

1356. МИНЕРА́ЛЬНАЯ ЗАБОЛО́ЧЕННАЯ ПО́ЧВА //wet mineral soil //sol humid mineraux //mineralischer Naßboden - термин немецкой школы для поверхностно заболоченных почв с мраморовидным горизонтом. Син.: псевдоглей.

1357. МИЦЕЛЯ́РНО-КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //carbonate-mycelial soil //sol calcaire de mycelium //Mizel-Kalk Boden - термин русск.шк. для почв разных типов, имеющих выделение карбонатов в карбонатном горизонте в виде разных форм псевдомицелия (жилки, паутинки, налёты и т.д.).

1358. МО́ДЕР-РЕ́НДЗИНА //moder-rendzina //rendrine à humus de moder //Moderrendzina - термин немецкой школы для рендзин со среднеразложившимся гумусом типа модер.

1359. МОЛОДА́Я ПО́ЧВА //joung soil //sol jeune //neuentstandener Boden - общеупотребительный термин для слабо развитых почв небольшого возраста, обнаруживающих свойства, близкие к свойствам материнской породы.

1360. МО́ЛКЕН-ПОДЗО́Л //molken-podzol //molken-podzol //Molkenpodsol (от нем. Molken - сыворотка) - 1) термин Кубиены (1953) для подзолов с поверхностным атмосферным оглеением, в результате которого железо выносится из горизонта A_2 и откладывается в B, а профиль имеет строение A_0GBC; 2) термин франц. ск. (1967) для группы оподзоленных гидроморфных почв, имеющих с поверхности постоянное переувлажнение застойными водами, в которых гумусовый горизонт представлен гидромодеровым A_0, подзолистый горизонт замещен глеевым G с небольшим количеством конкреций, а ниже G идет ржавый горизонт B мощностью несколько сантиметров.

1361. МО́ЛЛИСО́ЛЬ //mollisol //mollisol //Mollisol (от лат. mollis - мягкий и лат. solum - почва) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для порядка минеральных почв, которые имеют либо моллевый[x)], либо такой поверхностный горизонт, который после перемешивания верхних 18 см отвечает всем требованиям к моллевому горизонту за исключением мощности, и кроме того имеет такой верхний подгоризонт мощнее 7,5 см в аргилловом[x)] или натриевом[x)] горизонте, который отвечает требованиям по окраске, гумусу, насыщенности и структуре к моллевому горизонту, но отделяется от поверхностного горизонта белёсым горизонтом, и 1) если имеется аргиллювый горизонт, то имеют насыщенность основаниями более 50% в нем и до 125 см ниже верхней границы аргиллового горизонта либо до 180 см ниже поверхности почвы, смотря по тому, что ниже, и 2) если имеется камбиевый[x)] горизонт, то имеют насыщенность основаниями более 50% во всех подгоризонтах до 180 см от поверхности почвы, и 3) имеют объемный вес мелкозёма выше 0,85 в верхнем горизонте и в любом камбиевом горизонте при преобладании в поглощающем комплексе аморфного материала, и 4) имеют менее 35% монтмориллонитовой глины в верхнем горизонте, если он лежит на материале, содержащем менее 40% $CaCO_3$, либо окраска моллевого горизонта не темнее подстилающих горизонтов, а разница между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с плотной породой менее 5^oC, и 5) после перемешивания верхних 18 см

имеют менее 30% глины в каком-либо горизонте вниз до контакта с плотной породой или до кальциевого[x)] горизонта или до 1 м (что ниже), если: а) имеются трещины в какой-то период большинство лет шириной минимум 1 см на 50 см, и б) имеется микрорельеф гильгаи, или в) имеются поверхности скольжения на глубине от 25 до 100 см, или г) имеются клиновидные или параллелепипедные естественные структурные агрегаты с длинными осями, отклоняющимися на 10-60° от горизонтали на глубине от 25 до 100 см; и 6) не имеют окисного[x)] горизонта; и 7) не имеют сподового[x)] горизонта. В пределах порядка моллисолей выделяются 7 подпорядков: 1) альболли, 2) акволли, 3) боролли, 4) рендолли, 5) удолли, 6) устолли и 7) ксеролли (см.).

1362. МОРОГА́Н //morogan //morogan //Morogan - местное название темных слитых трещиноватых глинистых почв типа вертисолей, распространенное в Румынии и широко используемое румынскими земледельцами.

1363. МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //deep soil //sol profond //tiefer Boden - общеупотребительный термин, не имеющий строгого содержания; понятие о мощности почвы, с одной стороны, меняется у разных авторов и достаточно субъективно, а с другой - оно объективно изменяется для разных типов почв.

1364. МРАМОРИЗО́ВАННАЯ ПО́ЧВА //marble-ferous soil //sol marblefié // marmorierter Boden - термин для почв, имеющих мраморовидную текстуру и окраску в каких-либо горизонтах, обычно связанную с избыточным увлажнением.

1365. МРАМОРОВИ́ДНАЯ ПО́ЧВА //marble-like soil //sol marbleiforme // marmorierter Boden - термин немецкой школы для поверхностно заболоченных почв с мраморовидным горизонтом. Син.: псевдоглей.

1366. МУ́РСИ //mourci //mourci //Mourci - местное название темных слитых трещиноватых глинистых почв типа вертисолей, распространенное среди земледельцев Мали.

1367. МО́ЛЛЕВАЯ ПО́ЧВА //mull soil //sol à mull //Mullboden (от нем. mull - мягкий) - термин франц.шк. (1965) для класса почв с моллевым типом гумуса и профилем A(BC) или ABC. Син.: Брюнифици́рованная почва.

1368. МО́ЛЛЕВАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА //tropical mull soil //sol à mull des pays tropicaux // tropischer Mullboden - термин франц.шк.

(1965) для подкласса моллевых почв районов с тропическим климатом, включающих бурые эутрофные тропические почвы. См.: Брюнифицированная тропическая почва.

1369. МО́ЛЛЕВАЯ УМЕ́РЕННАЯ ПО́ЧВА //temperate mull soil //sol à mull des pays tempéres //gemässigter Mullboden - термин франц. шк. (1965) для подкласса моллевых почв районов с умеренным климатом, включающих лессивированные и бурозёмные почвы. См.: Брюнифицированная гумидно-умеренная и Брюнифицированная континентально-умеренная почвы.

1370. МО́ЛЛЬ-РЕНДЗИ́НА //mull-rendzina //rendzine à humus de mull //Mullrendzina - термин немецкой школы для рендзин с хорошо разложившимся мягким гумусом типа моллъ.

1371. НА́ДУРАРГИ́Д //nadurargid //nadurargid //Nadurargid (от лат. natrium - натрий, лат. durus - твердый, лат. argilla - белая глина и порядкового корня id для аридисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аргидов (см.), которые 1) имеют столбчатый натриевый[x)] горизонт над дурипэном[x)], а верхнюю границу дурипэна в пределах 1 м от поверхности; 2) не имеют петрокальциевого[x)] горизонта в пределах 1 м от поверхности. В пределах этой группы выделяются 6 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) гидроморфные нормальные (aquic haplic), 4) нормальные (haplic), 5) нормальные моллевые (haplic mollic) и 6) моллевые (mollic) надураргиды.

1372. НАМЫВНА́Я ПО́ЧВА //aggradation soil //sol d'accumulation //Anschwemmungsboden - термин для группы почв, формирующихся в условиях активного накопления минерального почвообразующего материала, скорость которого сопоставима со скоростью почвообразования; соответственно периодическому отложению материала, профиль почвы обычно характеризуется слоистостью, наличием погребенных горизонтов; в зависимости от характера аккумуляции выделяют аллювиальные, делювиальные, пролювиальные и т.п. намывные почвы; син.: наносная почва.

1373. НАМЫ́ТАЯ ПО́ЧВА //warp soil, drift soil //sol de colmatage //Aufschwemmboden - термин для почв нижних частей или подножий склонов и террасовидных уступов склонов, верхняя часть профиля которых имеет ненормально большую для данных условий мощность за счет отложения смываемого в результате плоскостной

эрозии со склонов материала, обычно гумусового горизонта; иногда почва характеризуется слоистостью, часто избыточным увлажнением и соответствующим ему оглеением, обычно увеличенным гумусовым горизонтом.

1374. НАНО́СНАЯ ПО́ЧВА //carried soil //sol de transport //verschwemmter Boden - сборный термин для почв, формирующихся на современном наносе.

1375. НАНО́СНАЯ ПО́ЧВА //alluvial soil //sol alluvial //Auenboden - 1) термин Меншинга (1951), в настоящее время принятый в немецкой школе, для почв на голоценовом наносе постоянных водных потоков, т.е. на современном аллювии; син.: аллювиальная почва, пойменная почва; 2) общеупотребительный термин для почв, образующихся на современных отложениях в условиях постоянного или периодического поступления почвообразующего материала; син.: Намывная почва.

1376. НАНО́СНАЯ ПО́ЧВА ПУСТЫ́НЬ //transported desert soil //sol d'apport des déserts //Allochtonswüstenboden - термин франц.шк. (1965) для подгруппы грубых минеральных почв пустынь (см.), формирующихся на рыхлых молодых песчаных эоловых наносах. Син.: эрг.

1377. НАНО́СНАЯ АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //alluvial transported soil //sol d'apport alluvial //alluvial Allochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для группы почв с профилем АС, формирующихся на современных аллювиальных отложениях и входящих в подкласс слаборазвитых неклиматических почв (см.).

1378. НАНО́СНАЯ АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ГИ́ДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //hydromorphic alluvial transported soil //sol d'apport alluvial hydromorphe //hydromorphischer alluvial Allochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы наносных аллювиальных почв (см.), имеющих признаки гидроморфизма в профиле до глубины 1 м.

1379. НАНО́СНАЯ АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //humic alluvial transported soil //sol d'apport alluvial humifère //alluvial Humusallochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы наносных аллювиальных почв (см.), имеющих сильно гумусированный горизонт А и не имеющих признаков гидроморфизма в пределах профиля до глубины 1 м.

1380. НАНО́СНАЯ АЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical alluvial transported soil //sol d'apport alluvial modal //typischer al-

luvial Allochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы наносных аллювиальных почв (см.), имеющих слабо гумусированный горизонт А и не имеющих признаков гидроморфизма в профиле до глубины 1 м.

1381. НАНО́СНАЯ АНТРОПОГЕ́ННАЯ ПО́ЧВА //anthropic transported soil // sol d'apport anthropique //anthropogener Allochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для группы почв с профилем АС, формирующихся на антропогенных открытых поверхностях (выработки, карьеры, каналы, насыпи и т.п.).

1382. НАНО́СНАЯ АНТРОПОГЕ́ННАЯ ГИДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //hydromorphic anthropic transported soil //sol d'apport anthropique hydromorphe //hydromorphischer anthropogener Allochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для наносных антропогенных почв (см.), имеющих признаки гидроморфизма в пределах метровой толщи.

1383. НАНО́СНАЯ АНТРОПОГЕ́ННАЯ ГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //humic anthropic transported soil //sol d'apport anthropique humifère //anthropogener Humusallochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для наносных антропогенных почв (см.), имеющих сильно гумусированный горизонт А и не имеющих признаков гидроморфизма в пределах метровой толщи.

1384. НАНО́СНАЯ АНТРОПОГЕ́ННАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical anthropic transported soil //sol d'apport anthropique modal //typischer anthropogener Allochtonsboden - термин франц.шк.(1967) для наносных антропогенных почв (см.), имеющих слабо гумусированный горизонт А и не имеющих признаков гидроморфизма в пределах метровой толщи.

1385. НАНО́СНАЯ БУ́РАЯ ПО́ЧВА //brown alluvial soil //sol brun alluvial //braunen Auenboden - термин немецкой школы для луговых и лугово-глеевых пойменных почв с профилем A-B-G. Син.: вега.

1386. НАНО́СНАЯ БУ́РАЯ АЛЛОХТО́ННАЯ ПО́ЧВА //allochtonal brown alluvial soil //sol brun alluvial allochtoné //allochtonen braunen Auenboden - термин немецкой школы для луговых и лугово-глеевых пойменных почв с профилем A-B-G, сформированных путем переотложения материала ранее сформированных и разрушенных водной эрозией почв. Син.: вега аллохтонная.

1387. НАНО́СНАЯ БУ́РАЯ АУТОХТО́ННАЯ ПО́ЧВА //autochtonal brown alluvial soil //sol brun alluvial autochtoné //autochtonen braunen Auenboden - термин немецкой школы для луговых и лугово-глеевых

пойменных почв с профилем A-B-G, сформированных путем переотложения материала, образовавшегося при выветривании пород данной территории без их длительного транспортирования. Син.: вега аутохтонная.

1388. НАНО́СНАЯ ВУЛКАНИ́ЧЕСКАЯ РЫ́ХЛАЯ ПО́ЧВА //friable volcanic transported soil //sol d'apport volcanique friable //zerreibbarer vulkanischer Allochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для почв с профилем AC, формирующихся на рыхлых вулканических наносах и входящих в подкласс слаборазвитых неклиматических почв.

1389. НАНО́СНАЯ ВУЛКАНИ́ЧЕСКАЯ РЫ́ХЛАЯ ГИ́ДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //hydromorphic friable volcanic transported soil //sol d'apport volcanique friable hydromorphe //hydromorphischer zerreibbarer vulkanischer Allochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для наносных вулканических рыхлых почв (см.), имеющих признаки гидроморфизма в профиле до глубины 1 м.

1390. НАНО́СНАЯ ВУЛКАНИ́ЧЕСКАЯ РЫ́ХЛАЯ ГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //humic friable volcanic transported soil //sol d'apport volcanique friable humifère //zerreibbarer vulkanischer Humusallochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для наносных вулканических рыхлых почв (см.), имеющих сильно гумусированный горизонт A и не имеющих признаков гидроморфизма до глубины 1 м.

1391. НАНО́СНАЯ ВУЛКАНИ́ЧЕСКАЯ РЫ́ХЛАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical friable volcanic transported soil //sol d'apport volcanique friable modal //typischer zerreibbarer vulkanischer Allochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для наносных вулканических рыхлых почв (см.), имеющих слабо гумусированный горизонт A и не имеющих признаков гидроморфизма в профиле до глубины 1 м.

1392. НАНО́СНАЯ ГРУ́БАЯ ПО́ЧВА //coarse alluvial soil //sol alluvial grossière //Auenrohboden - термин немецкой школы для слабо развитых пойменных почв на грубозернистом аллювии (прирусловья) с профилем (A)-C. Син.: рамбла, дерновая пойменная слабо развитая почва.

1393. НАНО́СНАЯ КОЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //colluvial transported soil //sol d'apport colluvial //kolluvial Allochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для группы почв с профилем AC, формирующихся на современных коллювиальных отложениях и входящих в подкласс слаборазвитых неклиматических почв (см.).

1394. НАНО́СНАЯ КОЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ГИ́ДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //hydromorphic colluvial transported soil //sol d'apport colluvial hydromorphe //hydromorphischer kolluvial Allochtonsboden - термин франц. шк. (1967) для наносных коллювиальных почв (см.), имеющих признаки гидроморфизма в профиле до глубины 1 м.

1395. НАНО́СНАЯ КОЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //humic colluvial transported soil //sol d'apport colluvial humifère //kolluvial Humusallochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для наносных коллювиальных почв (см.), имеющих сильно гумусированный горизонт А и не имеющих признаков гидроморфизма в профиле до глубины 1 м.

1396. НАНО́СНАЯ КОЛЛЮВИА́ЛЬНАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical colluvial transported soil //sol d'apport colluvial modal //typischer kolluvial Allochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для наносных коллювиальных почв (см.), имеющих слабо гумусированный горизонт А и не имеющих признаков гидроморфизма в профиле до глубины 1 м.

1397. НАНО́СНАЯ МОЛОДА́Я ПО́ЧВА //joung alluvial soil //sol alluvial jeune //jungen Auenboden - термин немецкой школы для нейтральных и богатых карбонатами слабо развитых песчано-суглинистых почв пойм с профилем А-С. Син.: патерниа, дерновая пойменная почва.

1398. НАНО́СНАЯ РЕНДЗИ́НОВИ́ДНАЯ ПО́ЧВА //alluvial rendzina-like soil //sol rendzina alluvial //rendzina artiger Auenboden - термин немецкой школы для пойменных луговых почв на карбонатном аллювии. Син.: Боровина.

1399. НАНО́СНАЯ ЧЕРНОЗЁМОВИ́ДНАЯ ПО́ЧВА //chernozem-like alluvial soil //sol alluvial analogue au chernozem //schwarzerdeartige Auenboden - термин немецкой школы для мощных и сильно гумусированных пойменных почв с хорошей зернистой структурой. Син.: луговая черноземовидная пойменная почва.

1400. НАНО́СНАЯ ЭО́ЛОВАЯ ПО́ЧВА //aeolian transported soil //sol d'apport éolien //äolischer Allochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для группы почв с профилем АС, формирующихся на современных эоловых отложениях и входящих в подкласс слаборазвитых неклиматических почв (см.).

1401. НАНО́СНАЯ ЭО́ЛОВАЯ ГИ́ДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //hydromorphic aeolian transported soil //sol d'apport éolien hydromorphe //hydro-

morphischer äolischer Allochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для наносных эоловых почв (см.), имеющих признаки гидроморфизма в профиле до глубины 1 м.

1402. НАНО́СНАЯ ЭО́ЛОВАЯ ГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //humic aeolian transported soil //sol d'apport éolien humifère //äolischer Humusallochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для наносных эоловых почв (см.), имеющих сильно гумусированный горизонт А и не имеющих признаков гидроморфизма до глубины 1 м.

1403. НАНО́СНАЯ ЭО́ЛОВАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical aeolian transported soil //sol d'apport éolien modal //typischer äolischer Allochtonsboden - термин франц.шк. (1967) для наносных эоловых почв (см.), имеющих слабо гумусированный горизонт А и не имеющих признаков гидроморфизма до глубины 1 м.

1404. НАНО́СНЫЙ СУ́ГЛИНОК //alluvial loam //limon alluvial //Auenlehm - термин немецкой школы для аллювиального голоценового (современного) наноса суглинистого состава. Син.: аллювиальный суглинок.

1405. НАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА //saturated soil //sol saturé //gesättigter Boden - термин франц.шк. (1967) для подкласса почв, входящего в класс кальцемагнезиальных почв, содержащих максимум следы карбонатов в мелкозёме горизонта А и pH между 6,8 и 8,0.

1406. НАСЫ́ЩЕННАЯ ВО́ДОЙ ПО́ЧВА //aqueous soil, saturated with water soil //sol saturé en eau //wassergesättigter Boden - термин для почв, находящихся в состоянии насыщения водой, при котором водой заполнены все поры при полной влагоемкости.

1406а. НАТИ́ВНАЯ ПО́ЧВА //native soil //sol originel //Urboden - термин немецкой школы для слабо развитых наносных почв, образующихся при постоянном или периодическом затоплении. Син.: подводная грубая почва.

1407. НА́ТРАКВА́ЛЬФ //natraqualf //natraqualf //Natraqualf (от лат. natrium - натрий, лат. aqua - вода и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквальфов (см.), которые имеют в профиле натриевый[x)] горизонт. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 5 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) белёсые (albic), 3) белёсые языковатые (albic glossic), 4) языковатые (glossic) и 5) моллевые (mollic) натраквальфы.

1408. НА́ТРАКВО́ЛЛЬ //natraquoll //natraquoll //Natraquoll (от лат. natrium - натрий, лат. aqua - вода и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы акволлей (см.), которые имеют натриевый[x] горизонт и не имеют дурипэна[x] в профиле. В пределах данной большой почвенной группы выделяются две подгруппы почв: 1) типичные (typic) и 2) плотные (duric) натракволли.

1409. НА́ТРАЛЬБО́ЛЛЬ //natralboll //natralboll //Natralboll (от лат. natrium - натрий, лат. albus - белый и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы альболлей (см.), которые имеют натриевый[x] горизонт.

1410. НА́ТРАРГИ́Д //natrargid //natrargid //Natrargid (от лат. natrium - натрий, лат. argilla - белая глина и порядкового корня id для аридисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аргидов (см.), которые: 1) имеют столбчатый натриевый[x] горизонт; 2) не имеют петрокальциевого[x] горизонта в пределах 1 м от поверхности; 3) не имеют дурипэна[x] в пределах 1 м от поверхности. В пределах этой группы почв выделяются 10 подгрупп: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) гидроморфные плотные (aquic duric), 4) плотные (duric), 5) плотные моллевые (duric mollic), 6) языковатые моллевые (glossic mollic), 7) маломощные (lithic), 8) маломощные (lithic mollic), 9) моллевые (mollic) и 10) трещиноватые (vertic) натраргиды.

1411. НА́ТРИБОРА́ЛЬФ //natriboralf //natriboralf //Natriboralf (от лат. natrium - натрий, греч. boreas - северный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы боральфов (см.), которые имеют в профиле натриевый[x] горизонт.

1412. НА́ТРИБОРО́ЛЛЬ //natriboroll //natriboroll //Natriboroll (от лат. natrium - натрий, греч. boreas - северный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы бороллей (см.), которые: 1) имеют натриевый[x] горизонт; 2) не имеют камбиевого[x] горизонта, перекрывающего натриевый горизонт и отделенного от него белесым горизонтом; 3) имеют температуры выше, чем криоборолли (см.). В пределах этой большой почвенной группы выделяются три подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) языковатые (glossic) и

3) мелкие (leptic) натриборолли.

1413. НАТРИЕВАЯ ПОЧВА //sodium soil //sol sodique //Natriumboden - термин немецкой школы для почв, имеющих содержание обменного натрия более 15% емкости поглощения. Син.: солонец, щелочная почва.

1414. НАТРИКСЕРАЛЬФ //natrixeralf //natrixeralf //Natrixeralf (от лат. natrium - натрий, греч. xeros - сухой и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ксеральфов (см.), которые имеют в профиле натриевый[x)] горизонт, но не имеют дурипэна[x)]. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 2 подгруппы почв: 1) типичные (typic) и 2) гидроморфные (aquic) натриксеральфы.

1415. НАТРИКСЕРОЛЛЬ //natrixeroll //natrixeroll //Natrixeroll (от лат. natrium - натрий, греч. xeros - сухой и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ксероллей (см.), имеющих натриевый[x)] горизонт и не имеющих дурипэна[x)] в пределах 1 м от поверхности либо петрокальциевого[x)] горизонта в пределах 1,5 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 4 подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) плотные (duric) и 4) языковатые (glossic) натриксероллы.

1416. НАТРУСТАЛЬФ //natrustalf //natrustalf //Natrustalf (от лат. natrium - натрий, лат. ustus - обожженный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устальфов (см.), которые имеют натриевый[x)] горизонт, но не имеют дурипэна[x)] в пределах 1 м от поверхности или сплошного плинтита в пределах 1,25 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 4 подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) моллевые (mollic) и 4) салортидные (salorthidic) натрустальфы.

1417. НАТРУСТОЛЛЬ //natrustoll //natrustoll //Natrustoll (от лат. natrium - натрий, лат. ustus - обожженный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устоллей (см.), которые: 1) имеют натриевый[x)] горизонт; 2) не имеют петрокальциевого[x)] горизонта с верхней границей в пределах 1,5 м от поверхности; 3) не имеют

дурипэна[x)] с верхней границей в пределах 1 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 7 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) гидроморфные плотные (aquic duric), 4) плотные (duric), 5) языковатые (glossic), 6) мелкие (leptic) и 7) трещинова́тые (vertic) натрустолли.

1418. НЕГЛУБОКОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА // non-deep podzolic soil // sol podzolique semi-profond // halbtiefer Podsolboden - термин русск.шк. для вида подзолистых почв, мощность подзолистого горизонта которых составляет 20-30 см.

1419. НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА // unsaturated soil // sol non-saturé // ungesättigter Boden - общеупотребительный термин для почв, имеющих степень насыщенности основаниями менее 100%, однако, не имеющий точного определения и различно применяемый в каждом конкретном случае.

1420. НЕ́ ПОДВЕ́РЖЕННАЯ ПУСТЫ́ННОЙ ТРАНСПОРТИРО́ВКЕ ПО́ЧВА // non exposed to desert movements soil // sol non soumi à mouvement des déserts // nicht-bewegungsempfindlicher Wüstenboden - термин франц.шк. (1965) для подгруппы грубых минеральных почв пустынь (см.), представляющих собой скопления крупных камней, не перемещаемые эоловой деятельностью.

1421. НЕПО́ЛНОРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА // non-complete soil, not completely developed soil // sol peu evolué, sol non-complet // nichtgeschlossener Boden - термин русск.шк. для почв, в профиле которых присутствуют не все горизонты, характерные для данного почвенного типа; часть горизонтов может быть фрагментарными или отсутствовать полностью; обычно это маломощные щебнистые почвы.

1422. НЕРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА // abnormal soil, immature soil, imperfectly developed soil, raw soil // sol non-mûr, sol immature, sol incomplet, sol anormal, sol brut // unentwickelter Boden, unreifer Boden, Rohboden - термин западно-европейских школ для слабо развитых почв с профилем (A)-C. Син.: слаборазвитая почва, инфантильная почва, эмбриональная почва, примитивная почва, грубая почва, почва недостаточного развития.

1423. НЕРА́ЗВИТАЯ АЛЬПИ́ЙСКАЯ ПО́ЧВА // raw alpine soil // sol brut alpine // Alpine Rohboden - термин немецкой школы для высокогорных очень слабо развитых почв альпийского пояса с профилем (A)-C. Син.: рёмарк.

1424. НИВА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //nival snow basin soil //sol de niches de nivation, sol de cuvettes â neige //Schneemuldenboden, Schneebeckenboden - термин западно-европейских школ для примитивных почв, формирующихся в небольших закрытых углублениях среди снеговых покровов высокогорий или высоких широт в нивальной зоне.

1425. НИТОСО́ЛЬ //nitosol //nitosol //Nitosol (от лат. nitidus - блестящий, яркий, обильный и лат. solum - почва) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих глубокий оглиненный аргилловый[x)] горизонт В с диффузными верхней и нижней границами, с низкой ёмкостью поглощения глины при отсутствии плинтитового горизонта. Это переходные к ферраллитным, но весьма плодородные почвы тропиков и субтропиков, обычно, но не всегда, имеющие красную окраску и отличающиеся ясными глянцеватыми плёнками на гранях структурных отдельностей в горизонте В.

1426. НИТОСО́ЛЬ БЕ́ДНАЯ //dystric nitosol //nitosol dystrique //dystrischer Nitosol (от гр. dystrophic - бесплодный) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих светлый[x)] или темный[x)] горизонт А (если не эродирован), мощный аргилловый[x)] горизонт В с глянцеватыми структурными отдельностями (обычно интенсивно красный), с емкостью поглощения менее 24 мэкв на 100 г глины и степенью насыщенности основаниями менее 35%, с диффузными верхней и нижней границами; плинтитового[x)] горизонта нет в пределах 125 см от поверхности.

1427. НИТОСО́ЛЬ БОГА́ТАЯ //eutric nitosol //nitosol eutrique //eutrischer Nitosol (от гр. eutrophic - плодородный) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих светлый[x)] или темный[x)] горизонт А (если не эродирован), мощный аргилловый[x)] горизонт В с глянцеватыми структурными отдельностями (обычно интенсивно красный), с ёмкостью поглощения менее 24 мэкв на 100 г глины и степенью насыщенности основаниями более 35%, с диффузными верхней и нижней границами; плинтитового[x)] горизонта нет в пределах 125 см от поверхности.

1428. НИТОСО́ЛЬ ГУ́МУСОВАЯ //humic nitosol //nitosol humique//humus Nitosol (от лат. humus - перегной, гумус) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих темный[x)] горизонт А и мощный аргилловый[x)] горизонт В с содержанием гумуса более 1,5% в верхней его части, с глянцевитыми структурными отдельностями, с диффузными верхней и нижней границами, с емкостью поглоще-

ния менее 24 мэкв на 100 г глины и степенью насыщенности основаниями менее 35% по крайней мере в некоторых подгоризонтах; плинтитового[x)] горизонта нет в пределах 125 см от поверхности.

1429. НОВЕ́ЙШАЯ ПО́ЧВА //recent soil //sol récente, sol actuel //rezente Boden, gegenwärtiger Boden, neugebildeter Boden - общеупотребительный термин для почв, сформированных на голоценовых отложениях, т.е. формирующихся в современную эпоху.

1430. НОРМА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //normal soil //sol normal //normaler Boden- устаревший термин В.В.Докучаева для автохтонных почв, залегающих на месте своего образования.

1431. ОА́ЗИСНАЯ ПО́ЧВА //oases soil //sol de oases //Oasisboden - см. Культурно-поливная почва.

1432. ОГЛЕ́ЕННАЯ ПО́ЧВА //gleyed soil //sol gleyifié //vergleyter Boden (от русск. глей) - общеупотребительный сборный термин для почв, имеющих в профиле признаки избыточного увлажнения в виде сизых или ржавых пятен и т.п.; обычно при наименовании почвы указывают степень (слабо, средне, сильно оглеенная) и глубину (поверхностно, глубоко оглеенная) оглеения в профиле; наиболее часто термин употребляется в широком смысле без точного указания на конкретную форму проявления глеевого процесса; в случае указания в названии конкретного проявления оглеения обычно используют термины "глееватая" и "глеевая".

1433. ОГЛИ́НЕННАЯ ПО́ЧВА //clayed soil //sol argileux //Tonboden (от русск. глина) - термин для почв, обогащенных глинистым материалом в результате выветривания и почвообразования во всём профиле или в какой-либо его части.

1434. ОЖЕЛЕЗНЁННАЯ ПО́ЧВА //ferrimorphic soil //sol ferrugineux //eisenhaltiger Boden - термин для почв, вторично обогащенных окислами железа в результате почвообразования в данных условиях либо в результате отложения гидроокиси железа из протекающих грунтовых вод в условиях геохимического барьера для железа, как например в поймах северных рек, близ болот или на перегибах склонов.

1435. ОЗЁРНАЯ ПО́ЧВА //lacustrine soil //sol lacustre //Seeboden - термин для слабо развитых почв на молодых озёрных отложениях.

1436. ОЙТА́К - см. Поверхностно-лугово-пустынная п.

1437. ОЙТА́ЧНАЯ ПО́ЧВА - см. Поверхностно-лугово-пустынная п.

1438. ОКАРБОНА́ЧЕННАЯ ПО́ЧВА //carbonated soil //sol recalcifié // kalkischer Boden - термин, часто применяющийся в западной литературе, для почв характеризующихся вскипанием с поверхности вследствие перепаханности, перерытости или эродированности одновременно с наличием карбонатно-аккумулятивного горизонта.

1439. ОКРЕМНЕ́ЛАЯ КОРА́ - см. Кремнёвая кора.

1440. О́КСИСО́ЛЬ //oxisol //oxisol //Oxisol (от греч. oxus - кислый и лат. solum - почва) - термин 7-го Приближения (США, 1960-69) для порядка минеральных почв, которые имеют окисный[x)] горизонт в пределах 2 м от поверхности, либо плинтит[x)], образующий сплошной слой в пределах 30 см от поверхности; над окисным горизонтом нет ни сподового[x)], ни аргиллового[x)] горизонта. В пределах этого порядка выделяются 5 подпорядков почв: 1) аквоксы, 2) гумоксы, 3) ортоксы, 4) торроксы и 5) устоксы.

1441. ОКУЛЬТУ́РЕННАЯ ПО́ЧВА //previously cultivated land //terre jadis cultivée //ehemals bebauter Boden - 1) термин, употребляемый в широком смысле для всех почв, измененных сельскохозяйственной деятельностью человека; 2) термин более узкого значения для почв, улучшенных сельскохозяйственной деятельностью человека, но не преобразованных коренным образом.

1442. ОЛИВИЗИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //olivied soil //sol olivisée //olivisierter Boden /от лат. oliva - оливка (в связи с цветом)/ - термин З.А.Корнблюма (1970) для гидроморфных почв, имеющих в профиле оливковоокрашенный плотный горизонт, окраска которого, не исчезающая при окислении на воздухе, связана с цветом железосодержащих глинистых минералов, формирующихся в условиях периодического избыточного увлажнения при непромывном водном режиме (отсутствие выноса железа).

1443. ОЛУГОВЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА //meadow-like soil, meadowed soil, meadowized soil //sol à nappe phréatique secondaire, sol de pré secondaire //verwiesenter Boden, wiesenartiger Boden - термин для почв, получивших луговой режим увлажнения в результате современных вторичных процессов в результате поднятия грунтовых вод, орошения и т.п.; син.: Вторично-луговая п.

1444. ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //podzolized soil //sol podzolisé //podsolierter Boden - 1) общеупотребительный, но не строго опреде-

ленный термин для почв, в профиле которых обнаруживаются морфологически или аналитически признаки подзолообразования, хотя почва в целом относится не к подзолистому типу; 2) общеупотребительный сборный термин для всех почв, относящихся как к типу подзолистых, так и иных, имеющих в профиле признаки подзолообразовательного процесса; термин без строгого содержания; 3) общеупотребительный термин для почв, имеющих в профиле оподзоленный горизонт A_2 или его зачаточные признаки; 4) термин франц.шк. (1967) для класса почв формирующихся под влиянием гумуса типа мор, большое количество фульвокислот которого интенсивно реагирует с минералами, в том числе и глинистыми, разрушая их и формируя комплексы с железом и алюминием; почвы характеризуются элювиальным белёсым горизонтом A_2, сильно обедненным глиной, железом и основаниями, и иллювиальным горизонтом В, имеющим: 1) повышенное содержание полуторных окислов, характеризующееся отношением (C + Fe + Al): глина < 0,15; 2) повышенное содержание гумуса (более 0,5% или большее чем в A_2); 3) органожелезистые плёнки на минеральных частицах, особенно песчаных; 4) присутствие гранул окислов железа и органического вещества, видимых в сильную лупу. Класс включает в себя группы подзолов, подзолистых почв, охро-подзолистых почв, крипто-подзолистых почв, бореальных подзолов, альпийских подзолов, глеевых подзолов, молькен-подзолов и подзолов тропических низменностей, объединяемые по климатическому признаку или гидроморфизму в три подкласса.

1445. ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА УМЕ́РЕННОГО КЛИ́МАТА //podzolized soil of temperate climate //sol podzolisé de climat tempére //podsolierter Boden der gemässigtes Klima - термин франц.шк.(1967) для подкласса оподзоленных почв (см.), формирующихся условиях умеренного климата, включающего группы подзолов, подзолистых почв, охро-подзолистых почв, крипто-подзолистых почв.

1446. ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА ХОЛО́ДНОГО КЛИ́МАТА //podzolized soil of cold climate //sol podzolisé de climat froid //podsolierter Boden der kalten Klima - термин франц.шк. (1967) для подкласса оподзоленных почв (см.), формирующихся в условиях холодного климата, ограничивающего формирование развитого подзолистого профиля, включающего группы бореальных и альпийских подзолов.

1447. ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ГИ́ДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //hydromorphic podzolized

soil //sol podzolisé hydromorphé //hydromorphischer podsolierter Boden - термин франц.шк. (1967) для подкласса оподзоленных почв (см.), профиль которых формируется под влиянием сильного гидроморфизма, маскирующего подзолообразование, включающего группы глеевых подзолов, мольken-подзолов и подзолов тропических низменностей.

1448. ОПО́ЛЕЦ //opoletz //opoletz //Opoletz (от русск. ополье - высокая дренированная равнина с плодородными темноцветными почвами на юге таежно-лесной зоны) - термин А.Н.Тюрюканова (1967) для серых лесных почв микроповышений Владимирского и других ополий средней России, имеющих реликтовые признаки оглеения и реликтовые карбонатные конкреции на глубине 80-100 см. Син.: серая лесная глееватая остаточно-карбонатная почва (Л.П.Рубцова).

1449. ОПО́ЛИЦА //opolitza //opolitza //Opolitza - термин А.Н.Тюрюканова (1967) для серых лесных почв микропонижений Владимирского и других ополий средней России, имеющих второй гумусовый горизонт в нижней части профиля и некоторые признаки избыточного увлажнения. Син.: темносерая лесная остаточно-луговая почва (Л.П.Рубцова, 1970).

1450. ОПО́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //opolje soil //sol des opolje //opolischer Boden - устаревший сборный термин для темноцветных почв ополий Русской равнины - достаточно дренированных равнин с покровными и лёссовидными суглинками в подзонах южной тайги и широколиственных лесов.

1451. ОПУСТЫ́НЕННАЯ ПО́ЧВА //desertified soil //sol désertifié //verwüsteter Boden - термин для почв пустынной зоны, претерпевающих постепенное обсыхание в результате понижения грунтовых вод, теряющих бывшую гумусированность, дифференциацию профиля, приобретающих на поверхности пустынную корку.

1452. ОРГАНИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА //organic soil //sol organique //organischer Boden - общеупотребительный термин для сборного понятия почв или образований, очень богатых органическим веществом, включая лесную подстилку, торф, ил и т.п.

1453. ОРГАНИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА //organic soil //sol organique //organischer Boden - термин канадской школы (1968) для порядка почв, насыщенных водой бо́льшую часть года, если не дренированы искусственно, сформированных преимущественно из органиче-

ских отложений и содержащих более 30% органического вещества, до глубины 60 см, если поверхностный слой состоит преимущественно из тканевой массы; до контакта с плотной породой, если он имеет место между 10 и 25 см; до глубины 40 см для полуторфянистой и гумифицированной массы.

1454. ОРОГЕ́ННАЯ ПО́ЧВА //orogenic soil, oromorphic soil, mountain soil //sol de montagne //Gebirgsboden (от греч. óros - гора и génos - род) - см. Горная почва.

1455. ОРОША́ЕМАЯ ПО́ЧВА //irrigated soil //sol irrigué //Bewässerungsboden - 1) термин для почв, используемых в орошаемом земледелии независимо от возраста орошения; 2) см. Культурно-поливная почва.

1456. ОРОША́ЕМАЯ ВТОРИ́ЧНО-ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА //secondary meadow irrigated soil //sol irrigué à nappe phréatique secondaire //sekundarwiesen Bewässerungsboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа орошаемых лугово-серозёмных почв, формирующихся после подъема уровня грунтовых вод при орошении серозёмов; син.: Серозём орошаемый глееватый, Орошаемая сероземно-луговая п.

1457. ОРОША́ЕМАЯ ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА //meadow irrigated soil //sol irrigué à nappe phréatique //Bewässerungswiesenboden - термин русск. шк. (1967) для типа орошаемых почв серозёмной зоны, формирующихся при орошении гидроморфных почв.

1458. ОРОША́ЕМАЯ ЛУ́ГОВО-ПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //meadow-desert irrigated soil //sol irrigué désertique à nappe phréatique //Bewässerungswiesenwüstenboden - термин русск.шк. (1967) для типа лугово-пустынных почв, измененных длительным орошением.

1459. ОРОША́ЕМАЯ ЛУ́ГОВО-ПУСТЫ́ННАЯ ЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА //saliniferous meadow-desert irrigated soil //sol salifére irrigué désertique à nappe phréatique //salzhaltig Bewässerungswiesenwüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода орошаемых лугово-пустынных почв, содержащих более 0,3% легкорастворимых солей в верхней части профиля.

1460. ОРОША́ЕМАЯ ЛУ́ГОВО-ПУСТЫ́ННАЯ МА́ЛОМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //shallow meadow-desert irrigated soil //sol mincé irrigué désertique à nappe phréatique //dünner Bewässerungswiesenwüstenboden - термин русск.шк. (1967) для вида орошаемых лугово-пустынных почв с мощностью агроирригационного горизонта 20-40 см.

1461. ОРОША́ЕМАЯ ЛУ́ГОВО-ПУСТЫ́ННАЯ МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //deep meadow-desert irrigated soil //sol profond irrigué désertique à nappe phréatique //tiefer Bewässerungswiesenwüstenboden - термин русск.шк. (1967) для вида орошаемых лугово-пустынных почв с мощностью агроирригационного горизонта более 70 см.

1462. ОРОША́ЕМАЯ ЛУ́ГОВО-ПУСТЫ́ННАЯ ОБЫ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //ordinary meadow-desert irrigated soil //sol ordinaire irrigué désertique à nappe phréatique //gewöhnlicher Bewässerungswiesenwüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода орошаемых лугово-пустынных почв, содержащих менее 0,3% легкорастворимых солей в верхней части профиля.

1463. ОРОША́ЕМАЯ ЛУ́ГОВО-ПУСТЫ́ННАЯ СРЕ́ДНЕМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //medium deep meadow-desert irrigated soil //sol semi-profond irrigué désertique a nappe phréatique //halbtiefer Bewässerungswiesenwüstenboden - термин русск.шк. (1967) для вида орошаемых лугово-пустынных почв с мощностью агроирригационного горизонта 40-70 см.

1464. ОРОША́ЕМАЯ ЛУ́ГОВО-СЕРОЗЁМНАЯ ПО́ЧВА //meadow-sierozemic irrigated soil //sol irrigué sierozemique à nappe phréatique //wiesensierosemischer Bewässerungsboden - 1) термин русск.шк. (1967) для типа лугово-серозёмных почв, измененных длительным орошаемым земледелием при чередовании промывного и выпотного ирригационного водного режима; по происхождению это бывшие лугово-серозёмные почвы, измененные орошением, и бывшие серозёмы с поднявшимися после орошения грунтовыми водами; 2) термин русск.шк. (1967) для подтипа орошаемых лугово-серозёмных почв, формирующихся при орошении лугово-серозёмных почв подгорных равнин с грунтовыми водами на глубине 3-5 м.

1465. ОРОША́ЕМАЯ ОСТА́ТОЧНО-СЕРОЗЁМНАЯ ПО́ЧВА //residually sierozemic irrigated soil //sol irrigué sierozemique residuel //restsierosemischer Bewässerungsboden - термин русск.шк. (1967) для типа серозёмных почв, измененных длительной сельскохозяйственной культурой при орошении.

1466. ОРОША́ЕМАЯ ОСТА́ТОЧНО-СЕРОЗЁМНАЯ МА́ЛОМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //shallow residually sierozemic irrigated soil //sol mincé irrigué sierozemique residuel //dünner restsierosemischer Bewässerungsboden - термин русск.шк. (1967) для вида орошаемых остаточно-серозёмных почв с мощностью агроирригационного горизонта менее 40 см.

1467. ОРОША́ЕМАЯ ОСТА́ТОЧНО-СЕРОЗЁМНАЯ МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //deep residually sierozemic irrigated soil //sol profond irrigué sierozemique residuel //tiefer restsierosemischer Bewässerungsboden - термин русск.шк. (1967) для вида орошаемых остаточно-серозёмных почв с мощностью агроирригационного горизонта более 70 см

1468. ОРОША́ЕМАЯ ОСТА́ТОЧНО-СЕРОЗЁМНАЯ СВЁТЛАЯ ПО́ЧВА //lucid residually sierozemic irrigated soil //sol clair irrigué sierozemique residuel //hell restsierosemischer Bewässerungsboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа орошаемых остаточно-серозёмных почв, сформировавшихся при орошении светлых серозёмов.

1469. ОРОША́ЕМАЯ ОСТА́ТОЧНО-СЕРОЗЁМНАЯ СРЕ́ДНЕМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //medium deep residually sierozemic irrigated soil //sol semi-profond irrigué sierozemique residuel //halbtiefer restsierosemischer Bewässerungsboden - термин русск.шк. (1967) для вида орошаемых остаточно-серозёмных почв с мощностью агроирригационного горизонта 40-70 см.

1470. ОРОША́ЕМАЯ ОСТА́ТОЧНО-СЕРОЗЁМНАЯ ТЁМНАЯ ПО́ЧВА //dark residually sierozemic irrigated soil //sol foncé irrigué sierozemique residuel //dunkel restsierosemischer Bewässerungsboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа орошаемых остаточно-серозёмных почв, сформировавшихся при орошении тёмных серозёмов.

1471. ОРОША́ЕМАЯ ОСТА́ТОЧНО-СЕРОЗЁМНАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typic residually sierozemic irrigated soil //sol typique irrigué sierozemique residuel //typischer restsierosemischer Bewässerungsboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа орошаемых остаточно-серозёмных почв, сформировавшихся при орошении типичных серозёмов.

1472. ОРОША́ЕМАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //irrigated desert soil //sol irrigué désertique //Bewässerungswüstenboden - термин русск.шк. (1967) для типа пустынных почв, преобразованных ирригационной культурой.

1473. ОРОША́ЕМАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА //saliniferous irrigated desert soil //sol irrigué désertique salifére //salzhaltig Bewässerungswüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода орошаемых пустынных почв, содержащих более 0,3% солей в профиле.

1474. ОРОША́ЕМАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ОБЫ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //ordinary irrigated desert soil //sol irrigué désertique ordinaire //gewöhnlicher Bewässerungswüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода орошаемых пустынных почв, содержащих менее 0,3% солей в профиле.

1475. ОРОША́ЕМАЯ ПУСТЫ́ННАЯ СЕ́РО-БУ́РАЯ ПО́ЧВА //gray-brown irrigated desert soil //sol brun-gris irrigué désertique //grau-brauner Bewässerungswüstenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа орошаемых пустынных почв, формирующихся при орошении серобурых пустынных почв.

1476. ОРОША́ЕМАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ТАКЫРОВИ́ДНАЯ ПО́ЧВА //takyr-like irrigated desert soil //sol irrigué désertique takyriforme //takyrartiger Bewässerungswüstenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа орошаемых пустынных почв недавнего орошения, в которых нет агроирригационного горизонта или он менее 20 см, характерна глыбистая пашня и коркообразование.

1477. ОРОША́ЕМАЯ СЕРОЗЁМНО-ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА - см. Орошаемая вторичнолуговая п.

1478. ОРТЕ́НТ //orthent //orthent //Orthent (от греч. orthos - настоящий и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка энтисолей (см.), которые: 1) имеют мех.состав тяжелее супеси в каком-либо горизонте ниже пахотного или 25 см (что ниже), но выше 100 см или контакта с плотной породой, если он выше 100 см; 2) не имеют фрагментов диагностических горизонтов, расположенных без видимого порядка под пахотным слоем; 3) содержат постепенно уменьшающееся с глубиной количество органического вещества, достигающее 0,35% или менее до глубины 125 см или в пределах 25 см ниже верхней границы любого слоя, который остается мерзлым в течение двух месяцев летнего максимума, либо имеют среднегодовую температуру почвы 0°C или менее; 4) не насыщены постоянно водой и не имеют характеристик переувлажнения, описанных для аквентов (см.). В пределах этого подпорядка выделяются 6 больших почвенных групп: 1) криортенты, 2) торриортенты, 3) тропоортенты, 4) удортенты, 5) усторгенты и 6) ксероортенты (см.).

1479. ОРТЗА́НД //ortsand //ortsand //Ortsand (нем. Ortsand от Ort-место и Sand - песок) - плотная гумусово-железистая плита или прослойка темнокоричневого цвета, образующаяся в иллюви-

альных горизонтах песчаных подзолистых почв в условиях повышенного увлажнения или в палеогидроморфных почвах.

1480. ОРТИД //orthid //orthid //Orthid (от греч. orthos - настоящий и порядкового корня id для аридисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка аридисолей (см.), которые: 1) не имеют аргиллового[x)] или натриевого[x)] горизонтов, если они только не погребенные, и 2) имеют в пределах 1 м от поверхности один или более из следующих горизонтов: кальциевый[x)], петрокальциевый[x)], гипсовый[x)] или дурипэн[x)]; либо обычно сухие между 18 и 50 см или до контакта с плотной породой, либо имеют проводимость насыщенного экстракта более 2 mmho /см при 25°С в какой-то части выше наиболее близкой из следующих глубин: контакт с плотной породой, 1,25 м при песчаном мех.составе, 90 см - при суглинистом, 75 см - при глинистом; либо в пределах горизонта С имеет место увеличение с глубиной выше перечисленных глубин насыщенности натрием плюс калием в какой-то части, либо 3) имеют солевой[x)] горизонт выше 75 см от поверхности и насыщены водой в пределах 1 м от поверхности более одного месяца. В пределах этого подпорядка выделяются 5 больших почвенных групп: 1) кальциортиды, 2) камбортиды, 3) дурортиды, 4) палеортиды и 5) салортиды (см.).

1481. ОРТОД //orthod //orthod //Orthod (от греч. orthos - настоящий и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка сподосолей (см.), которые: 1) имеют сподовый[x)] горизонт с подгоризонтом, в котором отношение % свободного Fe к % С менее 6; 2) имеют один из следующих признаков: а) пахотный горизонт с буроватым оттенком, лежащий прямо на сподовом горизонте; б) пахотный горизонт лежит прямо на сподовом, а последний имеет буроватую окраску или содержит более 0,7% свободного Fe во всех частях; в) сподовый горизонт не содержит подгоризонта, или он имеет лишь в менее чем половине каждого профиля, который бы содержал дисперсное органическое вещество и алюминий, но не достаточно свободного железа для покраснения после прокаливания (менее 0,35% свободного Fe в мелкозёме); 3) никогда не насыщены водой либо не имеют признаков переувлажнения, описанных для акводов (см.). В пределах этого подпорядка выделяются 4 большие почвенные группы: 1) криортоды, 2) фраджиортоды, 3) гаплортоды и 4) плакортоды (см.).

1482. ОРТО́КС //orthox //orthox //Orthox (от греч. orthos - настоящий, правильный и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка оксисолей (см.), которые имеют среднегодовую температуру почвы выше 22°С или имеют менее 20 кг/м^2 органического углерода в верхней метровой толще и не имеют периоды когда почва сухая в каком-либо горизонте ниже 18 см более двух месяцев подряд большинство лет. В пределах этого подпорядка выделяются 5 больших почвенных групп: 1) акрортоксы, 2) эутрортоксы, 3) гиббсиортоксы, 4) гаплортоксы и 5) умбриортоксы.

1483. ОРТШТЕ́ЙН //ortstein //ortstein //Ortstein (от нем. Ort - место и Stein - камень) - внутрипочвенное образование, особенно характерное для подзолистых и заболоченных почв, в форме отдельно разбросанных или собранных в плотный горизонт округлых железисто-марганцевых конкреций концентрического строения, имеющих размеры от одного до нескольких миллиметров.

1484. ОРТЭ́РДЕ //iron pan, orterde //orterde, sol ferrugineux //Orterde - 1) термин немецкой школы для почв с плотными ожелезненными прослоями; 2) термин немецкой школы для плотных ожелезненных прослоев в почвах.

1485. ОРУДЕНЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА //limonitized soil, soil with bog iron, soil with bog iron ore //sol limonitée, sol en cuirasse ferrugineuse //Raseneisenerzboden, Raseneisensteinboden, Sumpferzboden - термин русск.шк. для болотных и заболоченных почв таежной зоны, содержащих в профиле горизонт аккумуляции железистых конкреций, образованный при участии минерализованных (железистых) грунтовых вод.

1486. ОСВЕТЛЁННАЯ БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //bleached brown forest soil //sol brun forestier décoloré //gebleichter braune Waldboden - термин Г.Штремме для бурокрашенных почв Центральной Европы, имеющих осветленный горизонт в верхней части профиля под гумусово-аккумулятивным горизонтом и характеризующихся аккумуляцией глины в иллювиальном горизонте за счет лессивирования. Син.: podzol secundar (Чернеску, 1934), sol lessivé (Дюшофур, 1951), Fahlerde (Эвальд, 1958), псевдоподзол (Герасимов, 1960), Parabraunerde (Мюккенхаузен, 1962), luvisol (Дюдаль, 1967).

1487. ОСВЕТЛЁННАЯ ЗЕМЛЯ́ //bleached earth //sol décoloré //Bleicher-

de - устаревший термин немецкой школы для подзолистых почв. Син.: подзол.

1488. ОСВЕТЛЁННАЯ ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //bleached forest soil //sol forestier décoloré //Bleicherdewaldboden - устаревший термин немецкой школы для слабоподзолистых почв. Син.: подзол.

1489. ОСВЕТЛЁННАЯ СТЕПНА́Я ПО́ЧВА //bleached steppe soil //sol decoloré de steppe //Steppenbleicherde - устаревший термин немецкой школы. См.: солодь.

1490. ОСВЕТЛЁННЫЙ ПЕСО́К //bleached sand //sable décoloré, sable lessivé //Bleichsand - устаревший термин немецкой школы для песчаных подзолов. Син.: подзол.

1491. ОСОЛОДЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА //solodized soil, solodic soil //sol solodisé, sol solodoide, sol solodique //solodartiger Boden, solodierter Boden - термин для степных почв, имеющих белёсую кремнеземистую присыпку в гумусовом горизонте, потечность гумуса, дифференцированный профиль по илу и R_2O_3, признаки оглеения в нижней части профиля, относительно высокое вскипание и щелочную реакцию.

1492. ОСОЛОНЦО́ВАННАЯ ПО́ЧВА //solonetzized soil, alkalinized soil // sol solonetzisé, sol alkalisé //solonetzierter Boden - термин для почв, получивших свойства солонцеватости в результате современных вторичных процессов, как например в некоторых случаях при орошении почв слабоминерализованными щелочными водами.

1493. ОСТА́ТОЧНАЯ ПО́ЧВА //residual soil, autochtonal soil //sol autochtone //Ortsboden, Vervitterungsboden - термин западноевропейских школ для почв, формирующихся на остаточной коре выветривания коренных (скальных) горных пород. Син.: аутохтонная почва, элювиальная почва.

1494. ОСТА́ТОЧНО-ДЕРНО́ВАЯ ПО́ЧВА //residually sod soil, residually dern soil //sol gazonné résiduel, sol dern résiduel //Restrasenboden - 1) термин русск.шк. для подзолистых почв, в верхней части подзолистого горизонта которых морфологически и аналитически обнаруживаются признаки бывшего гумусоаккумулятивного (дернового или пахотного) горизонта; в прошлом - это дерновые почвы; 2) термин русск.шк. для почв моховых хвойных лесов речных террас (бывших дерновых пойменных), имеющих хорошо развитый гумусовый горизонт, на фоне которого проявляет-

ся современный процесс оподзоливания.

1495. ОСТА́ТОЧНО-КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //residually calcareous soil // sol calcaire résiduel //Restkalkboden - общеупотребительный термин для почв, сформированных на карбонатных материнских породах, верхняя часть профиля которых лишена карбонатов в результате прогрессивного выщелачивания при почвообразовании; содержание карбонатов в таких почвах постепенно увеличивается сверху вниз, достигая максимума в горизонте С.

1496. ОСТА́ТОЧНО-ЛУГОВА́Я ТЕМНОЦВЕ́ТНАЯ ПО́ЧВА - см. Луговато-пустынная почва.

1497. ОСТА́ТОЧНО-СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //residually solonetzic soil // sol solonetzoide résiduel //restsolonetzartiger Boden - термин русск.шк. для почв, имеющих морфологические и физические признаки солонцеватых почв в каком-либо горизонте, но не содержащих в нём поглощенного натрия, либо содержащих его менее 5% от ёмкости поглощения; син.: физически солонцеватая почва, безнатровая солонцеватая почва.

1498. ОСТЕПНЁННАЯ ПО́ЧВА //heathed soil //sol bruyéreforme //heidischer Boden - термин для полугидроморфных или палеогидроморфных почв речных долин или депрессий степного пояса, которые в процессе эволюции стали более дренированными в результате опускания грунтовых вод, утеряли оглеенность, засоленность или солонцеватость и находятся на стадии перехода в соответствующую данным зональным условиям степную почву.

1499. ОСТЕПНЯ́ЮЩАЯСЯ ПО́ЧВА //heathing soil //sol bruyérée //heideartiger Boden - термин для полугидроморфных почв речных долин или депрессий степной зоны, постепенно дренирующихся в результате опускания грунтовых вод, и находящихся на переходе от луговых к степным почвам.

1500. ОСУ́ШЕННАЯ ПО́ЧВА //dried up soil, drained soil //sol asséche //trockengelegter Boden, entwässerter Boden - термин для почв, искусственно дренированных с помощью инженерных дренажных сооружений; син.: дренированная почва.

1501. О́ХРАКВА́ЛЬФ //ochraqualf //ochraqualf //Ochraqualf (от греч. ochros - светлый, лат. aqua - вода и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквальфов (см.), которые: 1) имеют светлый[x)] верхний гумусовый горизонт, но не имеют фраджипэна[x)], натрие-

вого[x] горизонта или дурипэна[x]; 2) не имеют языков белёсого горизонта в аргилловом[x] горизонте; 3) не имеют резкого перехода по мех.составу между белёсым и аргилловым горизонтами; 4) имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см более 5°С. В пределах этой группы выделяются следующие подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) аэральные (aeric), 3) аэральные умбровые (aeric umbric), 4) вулканические (andic), 5) вулканические умбровые (andic umbric), 6) песчаные (arenic), 7) хромудертовые (chromudertic), 8)моллевые (mollic), 9) умбровые (umbric) и 10) трещиноватые (vertic) охраквальфы.

1502. ОХРАКВОКС //ochraquox //ochraquox //Ochraquox (от греч. ochros - светлый, лат. aqua - вода и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквоксов (см.), которые имеют светлый[x] верхний гумусовый горизонт, но не имеют плинтита[x], образующего сплошной слой в пределах 1,25 м от поверхности, и не имеют прослоев гиббсита или агрегатов, цементированных гиббситом, в пределах верхнего метра.

1503. ОХРАКВУЛЬТ //ochraquult //ochraquult //Ochraquult (от греч. ochros - светлый, лат. aqua - вода и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквультов (см.), которые: 1) не имеют фраджипэна[x]; 2) имеют светлый[x] верхний гумусовый горизонт; 3)имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см более 5°С; 4) не имеют сплошного плинтита[x] в пределах 1,25 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 6 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) аэральные (aeric), 3) песчаные (arenic), 4) песчаные плинтитовые (arenic plinthic), 5) глубокопесчаные (grossarenic) и 6) плинтитовые (plinthic) охраквульты.

1504. ОХРЕПТ //ochrept //ochrept //Ochrept (от греч. ochros - светлый и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка инсептисолей (см.), которые: 1) имеют светлый[x] верхний горизонт, либо темный[x] или моллевый[x] горизонт мощностью менее 25 см, если среднегодовая температура более 8°С или среднелетняя температура на глубине 50 см или контакте с плотной породой более 15°С, если почва распахана или не имеет горизонта A_o и более 8°С, если

имеет горизонт A_0; 2) имеют разницу между среднелетними и среднезимними температурами на глубине 50 см или на контакте с плотной породой более 5°С; 3) имеют преобладание в поглощающем комплексе кристаллических алюмосиликатных глинистых минералов и менее 60% стекловатого вулканического пепла или иного пирокластического материала во фракциях пыли, песка и гравия; 4) имеют более яркую окраску, чем аквепты (см) или никогда не насыщены водой и не дренируются искусственно; 5) не имеют плаггенового[x)] горизонта. В пределах этого подпорядка выделяются 7 больших почвенных групп: 1) криохрепты, 2) дурохрепты, 3) дистрохрепты, 4) эутрохрепты, 5) фраджиохрепты, 6) устохрепты и 7) ксерохрепты (см.).

1504а. ОХРИСТО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //ochro-podzolic soil//sol ocre-podzolique //Ockerpodsolboden - термин И.А.Соколова (1972) для почв, переходных между подзолистыми иллювиально-Al-Fe-гумусовыми и охристыми вулканическими почвами, формирующихся в зоне слабых пеплопадов Камчатки и характеризующихся двучленным профилем с ярким белёсым горизонтом и обилием ржавых выцветов в верхней части.

1505. ОХРОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //ochro-podzolic soil //sol ocre-podzolique //Ockerpodsolboden - термин франц.шк.(1965,1967) для группы почв, входящей в подкласс оподзоленных почв умеренного климата, не имеющих горизонта A_2 или имеющих прерывистый A_2, с горизонтом В яркой окраски благодаря окислам железа, с относительно большой аккумуляцией гумуса (2-3%), имеющих горизонт B_{fe} и иногда B_h, но без конкреций; зачаточный горизонт B_h мощностью 2-3 см лежит в верхней части горизонта B_{fe}.

1506. ОХРОПОДЗО́ЛИСТАЯ ГЛУБОКО́ ГИ́ДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //deeply hydromorphic ochro-podzolic soil //sol ocre-podzolique à hydromorphie profonde //tiefer hydromorphischer Ockerpodsolboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы охроподзолистых почв, в профиле которых под горизонтом В лежит глеевый горизонт G или псевдоглеевый горизонт B_g.

1507. ОХРОПОДЗО́ЛИСТАЯ ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //lessivated ochro-podzolic soil //sol ocre-podzolique lessivé //lessivierter Ockerpodsolboden - термин франц.шк. (1965) для подгруппы охроподзолистых почв, содержащих в горизонте В значительно больше железа, чем в горизонте А.

1508. ОХРОПОДЗО́ЛИСТАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical ochro-podzolic soil //sol ocre-podzolique modal //typischer Ockerpodsolboden - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы охроподзолистых почв, не имеющих оглеения в нижней части профиля и содержащих близкие количества железа в горизонтах А и В.

1509. ОЧЁС ТОРФЯНО́Й //tir //couche supérieure meuble et peu décomposée d'une tourbiére à sphagnes //Bunkerde - термин для слаборазложившегося верхнего слоя торфа верхового сфагнового болота.

1510. ПА́ЛЕАКВУ́ЛЬТ //paleaquult //paleaquult //Paleaquult (от греч. paleos - древний, лат.aqua - вода и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквультов (см.), которые: 1) не имеют фраджипэна[x], 2) не имеют плинтита[x] в пределах 125 см от поверхности; 3) имеют аргилловый горизонт с таким распределением глины, что ее содержание не уменьшается на так много, как 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, либо горизонт, в котором происходит уменьшение содержания глины, обнаруживает скелетные зерна на структурных поверхностях или содержит более 5% объема плинтита; 4) имеют менее 10% выветривающихся минералов во фракции 20-200μ в верхних 50 см аргиллового горизонта; в пределах этой большой почвенной группы выделяются 7 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) аэральные (aeric), 3) песчаные (arenic), 4) песчаные плинтитовые (arenic plinthic), 5) песчаные темные (arenic umbric), 6) глубокопесчаные (grossarenic), 7) темные (umbric) палеаквульты.

1511. ПА́ЛЕАРГИ́Д //paleargid //paleargid //Paleargid (от греч.paleos - древний, лат.argilla - белая глина и порядкового корня id для аридисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аргидов (см.), которые: 1) имеют либо петрокальциевый[x] горизонт в пределах 1 м от поверхности, либо имеют аргилловый[x] или призматический или глыбистый натриевый[x] горизонт, который содержит более 35% глины в какой-то части и либо а) увеличение абсолютное на 15% глины на расстоянии 2,5 см на верхней границе аргиллового горизонта, либо б) увеличение абсолютное глины более, чем на 10%, если почва распахана и нижняя граница $A_{пах}$ служит верхней границей аргиллового горизонта; 2) не имеют дурипэна[x] в пределах 1 м от поверхности. В пределах этой группы почв выделяются 7 под-

групп: 1) типичные (typic), 2) плотные (duric), 3) маломощные (lithic), 4) маломощные моллевые (lithic mollic), 5) моллевые (mollic), 6) моллевые петрокальциевые (mollic petrocalcic) и 7) петрокальциевые (petrocalcic) палеаргиды.

1512. ПАЛЕБОРА́ЛЬФ //paleboralf //paleboralf //Paleboralf (от греч. paleos - древний, греч. boreas - северный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы боральфов (см.), которые: 1) имеют аргиллювый[x)] горизонт глубже 60 см от минеральной поверхности (если на поверхности имеется пепловый вулканический покров, то глубина измеряется от его основания); 2) имеют мех.состав тяжелее супеси в каком-либо подгоризонте выше аргиллового горизонта. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 8 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) резко дифференцированные (abruptic), 3) гидроморфные (aquic), 4) гидроморфные криогенные (aquic cryic), 5) криогенные (cryic), 6) криогенные языковатые (cryic glossic), 7) криогенные моллевые (cryic mollic) и 8) языковатые (glossic) палеборальфы.

1513. ПАЛЕБОРО́ЛЛЬ //paleboroll //paleboroll //Paleboroll (от греч. paleos - древний, греч. boreas - северный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы бороллей (см.), которые: 1) имеют аргиллювый[x)] горизонт с верхней границей глубже 50 см ниже минеральной поверхности; 2) имеют мех.состав тяжелее пылеватой супеси во всех горизонтах выше аргиллового. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 11 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) резко дифференцированные (abruptic), 3) резко дифференцированные криогенные (abruptic cryic), 4) белёсые (albic), 5) белёсые криогенные (albic cryic), 6) гидроморфные (aquic), 7) гидроморфные криогенные (aquic cryic), 8) криогенные (cryic), 9) криогенные глоссоборальфовые (cryic glossoboralfic), 10) глоссоборальфовые (glossoboralfic) и 11) мощные (pachic) палеборолли.

1514. ПА́ЛЕВО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //straw-yellow podzolic soil //sol paille podzolique //strohgelbfarbener Podsolboden - термин Я.Н.Афанасьева (1926) для дерново-подзолистых почв западных районов Европейской части СССР, характеризующихся буроватой окраской горизонта A_1 или $A_П$ и буроватой или палевой окраской верхней части подзолистого горизонта; син.: дерново-палево-подзолистая п.

1515. ПА́ЛЕГУМУ́ЛЬТ //palehumult //palehumult //Palehumult (от греч. paleos - древний, лат.humus - гумус и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы гумультов (см.), которые: 1) имеют аргиллювый[x)] горизонт, содержащий менее 10% способных к выветриванию минералов во фракции 20-200 μ в пределах верхнего метра и 2) имеют такое распределение глины, что ее содержание не уменьшается на столь много как 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, либо слой, в котором происходит уменьшение содержания глины, обнаруживает скелет или другие признаки элювиирования глины. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 4 подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) гумоксовые (humoxic), 3) ортоксовые (orthoxic) и 4) засушливые (xeric) палегумульты.

1516. ПА́ЛЕКСЕРА́ЛЬФ //palexeralf //palexeralf //Palexeralf (от гр. paleos - древний, греч.xeros - сухой и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ксеральфов (см.), которые: 1) имеют петрокальциевый[x)] горизонт с верхней границей в пределах 1,5 м от поверхности или имеют аргиллювый[x)] горизонт с одним или обоими из следующих признаков: а) содержание глины не уменьшается на столь много как 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, а окраска почвы красная; б) глинистый состав в верхней части и увеличение глины более чем на 20% на расстоянии 7,5 см или на 15% на расстоянии 2,5 см на верхней границе; 2) не имеют дурипэна[x)] в пределах 1 м и сплошного плинтита[x)] в пределах 1,25 м от поверхности; 3) имеют желтую окраску в какой-либо части аргиллового горизонта. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 7 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) маломощные (lithic), 4) гаплоксерультовые (haploxerultic), 5) моллевые (mollic), 6) петрокальциевые (petrocalcic) и 7) ультовые (ultic) палексеральфы.

1517. ПА́ЛЕКСЕРО́ЛЛЬ //palexeroll //palexeroll //Palexeroll (от гр. paleos - древний, греч.xeros - сухой и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ксероллей (см.), которые: 1) имеют петрокальциевый[x)] горизонт с верхней границей в пределах 1,5 м от поверхности, перекрываемый бескарбонатным слоем, либо имеют

аргилловый[x)] горизонт, который либо а) имеет такое вертикальное распределение глины, что ее содержание не уменьшается на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности и имеет яркую красноватую окраску, либо б) имеет глинистый состав в верхней части и возрастание (абсолютное) глины минимум на 20% в пределах 7,5 см или на 15% в пределах 2,5 см на верхней границе; 2) не имеют натриевого[x)] горизонта, если только он не подстилается петрокальциевым горизонтом с верхней границей в пределах 1,5 м от поверхности; 3) не имеют кальциевого[x)], петрокальциевого или гипсового[x)] горизонта с верхней границей в пределах 1,5 м от поверхности, если только какая-то часть перекрывающего один из них горизонта не свободна от карбонатов и имеет состав тяжелее пылеватой супеси; 4) не имеют дурипэна[x)] в пределах 1 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 9 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) резко дифференцированные (abruptic), 3) резко дифференцированные гидроморфные (abruptic aquic), 4) гидроморфные (aquic), 5) петрокальциевые (petrocalcic), 6) мощные (pachic), 7) натриевые петрокальциевые (natric petrocalcic), 8) ультовые (ultic) и 9) трещиноватые (vertic) палексероллы.

1518. ПАЛЕКСЕРУЛЬТ //palexerult //palexerult //Palexerult (от гр. paleos - древний, греч. xeros - сухой и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ксерультов (см.), которые: 1) имеют аргилловый горизонт, в верхней метровой толще которого содержится менее 10% способных к выветриванию минералов во фракции 20-200 μ ; 2) не обнаруживают уменьшения содержания глины на столь много как 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, а слой, в котором происходит уменьшение глины, имеет признаки элювиирования глины; 3) имеют желтую окраску профиля; 4) не имеют сплошного плинтита[x)] в пределах 1,25 м от поверхности; 5) не имеют фраджипэна[x)].

1519. ПАЛЕОГИДРОМОРФНАЯ ПОЧВА //paleohydromorphic soil //sol paleohydromorphé //paleohydromorphischer Boden (от греч. palaiós - древний) - термин В.А.Ковды для почв, прошедших в своём эволюционном развитии стадию гидроморфизма, а сейчас существующих в условиях автоморфного почвообразования и имеющих в своем профиле реликтовые признаки древней гидроморфной аккумуляции веществ.

1520. ПА́ЛЕОПО́ЧВА //paleosol //paléosol //Paleosol - см. Ископаемая почва.

1521. ПА́ЛЕОРТИ́Д //paleorthid //paleorthid //Paleorthid (от греч. paleos - древний, греч. orthos - настоящий и порядкового корня id для аридисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортидов (см.), которые: 1) имеют петрокальциевый[x)] горизонт с его верхней границей в пределах 1 м от поверхности; 2) не имеют дурипэна[x)] в пределах 1 м от поверхности; 3) не имеют солевого[x)] горизонта в пределах 75 см от поверхности, если насыщены водой (т.е. в пределах капиллярной каймы) в пределах 1 м от поверхности более чем на 1 месяц. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 5 подгрупп: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) моллевые (mollic), 4) устоллевые (ustollic) и 5) ксероллевые (xerollic) палеортиды.

1522. ПА́ЛЕОСО́ЛЬ //paleosol //paléosol //Paleosol - см. Ископаемая почва.

1523. ПА́ЛЕУДА́ЛЬФ //paleudalf //paleudalf //Paleudalf (от греч. paleos - древний, лат. udus - влажный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удальфов (см.), которые не имеют натриевого[x)] или антропового[x)] горизонта или фраджипэна[x)], но имеют аргиллювый[x)] горизонт, с таким распределением глины, что содержание глины не уменьшается на столь много как 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, а окраска его преобладает красноватых оттенков. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 11 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) белёсые гидроморфные (albaquic), 3) гидроморфные (aquic), 4) аквультовые (aquultic), 5) песчаные (arenic), 6) глубокопесчаные (grossarenic), 7) моллевые (mollic), 8) плинтитовые (plinthic), 9) родудультовые (rhodudultic), 10) ультовые (ultic) и 11) трещиноватые (vertic) палеудальфы.

1524. ПА́ЛЕУДОЛЛЬ //paleudoll //paleudoll //Paleudoll (от греч. paleos - древний, лат. udus - влажный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удоллей (см.), которые имеют аргиллювый[x)] горизонт с таким распределением глины, что ее содержание не падает на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности и которые окрашены ярко краснее оранжевого цвета или имеют

красные крупные пятна. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 4 подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) резко дифференцированные (abruptic), 3) гидроморфные (aquic) и 4) трещиноватые (vertic) палеудолли.

1525. ПАЛЕУДУЛЬТ //paleudult //paleudult //Paleudult (от греч. paleos - древний, лат. udus - влажный и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удультов (см.), которые: 1) имеют аргиллювый горизонт, содержащий менее 10% способных к выветриванию минералов во фракции 20-200 μ в пределах верхнего метра; 2) обнаруживают уменьшение содержания глины менее, чем на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, а слой, в котором выражено это уменьшение, имеет скелет или другие признаки элювиирования глины; 3) не имеют фраджипэна[x]; 4) не имеют сплошного плинтита[x] в пределах 1,25 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 14 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) гидроморфные песчаные (aquic arenic), 4) гидроморфные глубокопесчаные (aquic grossarenic), 5) гидроморфные псамментовые (aquic psammentic), 6) песчаные (arenic), 7) песчаные плинтито-гидроморфные (arenic plinthaquic), 8) песчаные плинтитовые (arenic plintic), 9) глубокопесчаные (grossarenic), 10) гумусовые (humic), 11) гумусовые псамментовые (humic psammentic), 12) плинтито-гидроморфные (plinth-aquic), 13) плинтитовые (plinthic) и 14) псамментовые (psammentic) палеудульты.

1526. ПАЛЕУСТАЛЬФ //paleustalf //paleustalf //Paleustalf (от греч. paleos - древний, лат. ustus - обожженный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устальфов (см.), которые: 1) имеют петрокальциевый[x] горизонт с верхней границей в пределах 1,5 м от поверхности, либо имеют аргиллювый[x] горизонт, имеющий один или оба следующих признака: а) такое распределение глины, что ее содержание не уменьшается на столь много как 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, а в окраске преобладают красные тона; б) глинистый состав в верхней части при увеличении содержания глины на 20% на расстоянии 7,5 см или на 15% на 2,5 см на верхней границе; 2) не имеют дурипэна[x] в пределах 1 м от поверхности; 3) не имеют сплошного плинтита в пределах 1,25 м от поверхности. В пределах этой

большой почвенной группы выделяются 19 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) гидроморфные песчаные (aquic arenic), 4) аквультовые (aquultic), 5) аквультовые песчаные (aquultic arenic), 6) аквультовые глубокопесчаные (aquultic grossarenic), 7) песчаные (arenic), 8) песчаные влажные (arenic udic), 9) песчаные ультовые (arenic ultic), 10) глубокопесчаные (grossarenic), 11) глубокопесчаные ультовые (grossarenic ultic), 12) петрокальциевые (petrocalcic), 13) плинтитовые (plinthic), 14) плинтудультовые (plinthudultic), 15) красные (rhodic), 16) удертовые (udertic), 17) влажные (udic), 18) ультовые (ultic) и 19) трещиноватые (vertic) палеустальфы.

1527. ПАЛЕУСТОЛЛЬ //paleustoll //paleustoll //Paleustoll (от греч. paleos - древний, лат. ustus - обожженный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устоллей (см.), которые: 1) имеют петрокальциевый[x)] горизонт с верхней границей в пределах 1,5 м от поверхности либо аргиллювый[x)] горизонт, который имеет или а) такое вертикальное распределение глины, что ее содержание не падает на 20% от максимального, в пределах 1,5 м от поверхности при красноватой окраске почвы или б) глинистый состав в верхней части и увеличение абсолютное глины минимум на 20% в пределах 7,5 см или на 15% в пределах 2,5 см верхней границы аргиллового горизонта; 2) не имеют дурипэна[x)] с верхней границей в пределах 1 м от поверхности; 3) не имеют натриевого[x)] горизонта. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 10 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) резко дифференцированные (abruptic), 3) резко дифференцированные гидроморфные (abruptic aquic), 4) резко дифференцированные влажные (abruptic udic), 5) гидроморфные (aquic), 6) мощные (pachic), 7) петрокальциевые (petrocalcic), 8) удертовые (udertic), 9) влажные (udic) и 10) трещиноватые (vertic) палеустолли.

1528. ПАЛЕУСТУЛЬТ //paleustult //paleustult //Paleustult (от греч. paleos - древний, лат. ustus - обожженный и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устультов (см.), которые: 1) имеют аргиллювый[x)] горизонт, который в верхней метровой части содержит менее 10% способных к выветриванию минералов во фракции

20-200 μ ; 2) не обнаруживают уменьшения содержания глины на столь много как 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, а слой, в котором уменьшается содержание глины, имеет скелет или другие признаки элювиирования глины; 3) имеют желтую окраску профиля; 4) не имеют плинтита[x)] в пределах 1,25 м от поверхности; 5) не имеют фраджипэна[x)]. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 4 подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) песчаные (arenic) и 4) плинтитовые (plinthic) палеустульты.

1529. ПАРАБУРОЗЕМ //parabraunerde, parabrownearth // parabraunerde //Parabraunerde - термин Мюккенхаузена (1962) для буроокрашенных почв Центр.Европы, близких к бурозёмам, но имеющих в профиле осветленный тусклый горизонт, сформированный, в отличие от подзолистого горизонта, в процессе обезиливания (лессивирования). Син.: podzol secundar (Чернеску, 1934), sol lessivé (Дюшофур, 1951), Fahlerde (Эвальд, 1958), псевдоподзол (Герасимов, 1960), gebleichter braune Waldboden (Штремме, 1950), luvisol (Дюдаль, 1967).

1530. ПАРАБУРОЗЕМ-БУРОЗЕМ //parabrownearth -brownearth//parabrown earth - sol brun//Parabraunerde-Braunerde - термин немецкой школы для почв, переходных между парабурозёмом и бурозёмом.

1531. ПАРАБУРОЗЕМ-ПОДЗОЛ //parabrownearth-podzol//parabraunerde - podzol //Parabraunerde-Podsol - термин немецкой школы для почв, переходных между парабурозёмом и подзолом.

1532. ПАРАБУРОЗЕМ ПСЕВДОГЛЕЕВЫЙ //pseudogley parabrownearth// pseudogley parabraunerde //Pseudogley-Parabraunerde - термин немецкой школы для почв, переходных от псевдоглея к парабурозёму.

1533. ПАРАБУРОЗЕМ-ПСЕВДОГЛЕЙ //parabrownearth-pseudogley//parabraunerde - pseudogley //Parabraunerde-Pseudogley - термин немецкой школы для почв, переходных от парабурозёма к псевдоглею.

1534. ПАРАБУРОЗЕМ-ЧЕРНОЗЕМ //parabrownearth - chernozem// parabraunerde-chernozem //Parabraunerde-Schwarzerde - термин немецкой школы для почв, переходных от парабурозёма к чернозёму.

1535. ПАРАВЕРТИСОЛЬ //paravertisol//paravertisol//Paravertisol - термин западно-европейских школ для почв легкого механического

состава или с признаками других по отношению к вертисолям типов почв, имеющих одновременно свойства вертисолей, то есть трещиноватость, способность к самомульчированию, набухаемость при увлажнении.

1536. ПАРА́МОСО́ЛЬ //paramosol //paramosol //Paramosol (от исп. paramo - степь) - термин, предложенный Л.Брамао (1964) для почв высокогорных лугов Южной Америки, но не получивший признания и распространения вследствие недостаточной обоснованности.

1537. ПА́РАРЕНДЗИ́НА //pararendzina //pararendzina //Pararendsina - термин Кубиены (1953) для рендзиновидных почв, сформированных на среднекарбонатных породах, содержащих $CaCO_3$ от 10 до 50%. Син.: бурая карбонатная почва, рендзина доломитовая.

1538. ПА́РАРЕНДЗИ́НА БУ́РАЯ //brown pararendzine//pararendzine brune //braune Pararendsina - термин западно-европейских школ для рендзиновидных бурых лесных почв, сформированных на рыхлых суглинистых или более легких породах, содержащих от 10 до 50% $CaCO_3$. Син.: Бурая лесная регосольная почва.

1539. ПА́РАЧЕРНОЗЕМ //parachernozem//parachernozem//Paratschernosem - термин Кубиены (1953) для черноземов, сформировавшихся на материнских породах, богатых основаниями, но не карбонатных; отличающихся от черноземов более бурой окраской и наличием начальной стадии брюнификации с образованием нерезко выраженного горизонта В.

1540. ПАТЕ́РНИА //paternia //paternia //Paternia - термин немецкой школы (Кубиена, 1953) для нейтральных и богатых карбонатами слабо развитых песчано-суглинистых пойменных почв с профилем А-С. Син.: наносная молодая почва, дерновая пойменная почва.

1541. ПА́ХОТНАЯ ПО́ЧВА //arable soil, arable land, plough land // terre arable, terrain arable // Ackerboden, Ackerland - 1) общеупотребительный термин для распаханных и освоенных для земледелия почв; 2) термин для почв, имеющих мощность пахотного слоя не более 30 см.

1542. ПЕ́ДАЛЬФЕ́Р //pedalfer //pedalfer //Pedalfer (от гр. pedon - почва, лат. aluminium - алюминий и ferrum - железо) - термин Марбута (1928) для почв, лишенных карбонатов кальция и относительно или абсолютно в каком-либо из горизонтов обогащенных соединениями алюминия и железа.

1543. ПЕ́ДОКА́ЛЬ //pedocal //pedocal //Pedokal (от гр. pedon - почва и calx - известь) - термин Марбута (1928) для почв с аккумуляцией карбонатов кальция в профиле либо насыщенных кальцием.

1544. ПЕДО́Н //pedon //pedon //Pedon (от греч. pedón - почва) - термин 7-го Приближения (США, 1960) для полного профиля почвы, включающего все ее генетические горизонты до материнской или подстилающей породы.

1545. ПЕ́ЛЛОКСЕРЕ́РТ //pelloxerert //pelloxerert //Pelloxerert (от греч. pellos - тусклый, греч. xeros - сухой и порядкового корня ert для вертисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ксерертов (см.), которые имеют темную окраску в верхних 30 см в более чем половине каждого разреза. В пределах этой группы выделяются 4 подгруппы: 1)типичные пеллоксереры (typic), 2) окрашенные пеллоксереры (chromic), 3) окрашенные энтовые пеллоксереры (chromic entic) и 4) энтовые пеллоксереры (entic).

1546. ПЕ́ЛЛУДЕ́РТ //pelludert //pelludert //Pelludert (от греч. pellos - тусклый, лат. udus - влажный и порядкового корня ert для вертисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удертов (см.), которые имеют темную окраску в верхних 30 см в более чем половине каждого разреза. Среди этой группы выделяются три подгруппы: 1) типичные пеллудерты (typic), 2) окрашенные пеллудерты (chromic) и 3) энтовые пеллудерты (entic).

1547. ПЕ́ЛЛУСТЕ́РТ //pellustert //pellustert //Pellustert (от греч. pellos - тусклый, лат. ustus - обожженный и порядкового корня ert для вертисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устертов (см.), которые имеют темную окраску в верхних 30 см в более чем половине каждого разреза. Среди этой группы выделяются 8 подгрупп: 1) типичные пеллустерты (typic), 2) окрашенные пеллустерты (chromic), 3) окрашенные энтовые пеллустерты (chromic entic), 4) окрашенные влажные пеллустерты (chromudic), 5) энтовые пеллустерты (entic), 6) палеустоллевые пеллустерты (paleustollic), 7) влажные пеллустерты (udic) и 8) удортентовые пеллустерты (udorthentic).

1548. ПЕ́ЛОСО́ЛЬ //pelosol //pelosol //Pelosol (от греч. pelos -глина) - термин Ф.Фогеля для глинистых почв с профилем $A-C_a-C$

или A-B_a-C_a-C, сформированных на мергелистых глинах и унаследовавших от материнской породы ее структуру в горизонте C_a или B_a.

1549. ПЕЛОСО́ЛЬ-ПСЕ́ВДОГЛЕ́Й //pelosol-pseudogley //pelosol-pseudogley //Pelosol-Pseudogley - термин немецкой школы для почв, переходных между пелосолями и псевдоглеем.

1550. ПЕ́ПЕЛЬНАЯ ПО́ЧВА //ashen-gray soil //sol gris cendreux // Aschenboden - устаревшее название подзолов, распространенное в западно-европейских школах. См. Подзол.

1551. ПЕ́ПЛОВАЯ ПО́ЧВА //ash soil //sol cendré //Aschenboden - см. Андосоль.

1552. ПЕ́ПЛОВО-ВУЛКАНИ́ЧЕСКАЯ ГУ́МУСОВО-АЛЛОФА́НОВАЯ ПО́ЧВА //humus-allophanous ash-volcanic soil //sol cendre-volcanique humus-allophanouse //humus-allophanhaltig aschevulkanischer Boden - термин М.А.Глазовской (1972) для семейства почв, входящих в генерацию кислых гумусовых почв ассоциации субаэральных кислых ульматно-фульватных почв; почвы этого семейства формируются во влажном климате разных термических поясов в областях активной вулканической деятельности при периодическом поступлении на поверхность вулканического пепла; почвы характеризуются значительным содержанием свежего вулканического стекла, аллофанов, подвижных соединений железа, высокой гумусностью, кислой реакцией, потечным ульматно-фульватным гумусом; профиль их состоит из горизонтов A_{fu}-B_h-($A_{ufm}B_{hma}$) с частым чередованием погребенных слоев; син.: вулканическая гумусо-аллофановая п., вулканическая пепловая п.

1553. ПЕ́ПЛОВО-ГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //ashy-humus soil //sol cendré humique //aschfarbiger Humusboden - см. Андосоль.

1554. ПЕРВИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //primary soil, primitive soil, immature soil, embryonic soil //sol autochtone, sol primitif, présol, sol jeune, sol embrionnaire //autochtoner Boden, neuentstandener Boden, unentwickelter Boden, embryonaler Boden - 1)общеупотребительный термин для почв, находящихся на первых стадиях почвообразования на любых почвообразующих породах и не имеющих никаких почвенных горизонтов и профиля как такового, за исключением очень слабо выраженного (до нескольких см) гумусового горизонта, непосредственно в поверхностных слоях горной породы; син.: примитивная п., неразвитая п., эмбрио-

нальная п.; 2) термин Б.Б.Полынова для почв, находящихся на первых стадиях развития на массивно-кристаллических породах; 3) термин В.Р.Вильямса для почв, формировавшихся на первых стадиях начального почвообразования в древние геологические эпохи вместе с появлением первых организмов на суше Земного шара; 4) термин почвенно-геохимической школы для почв, находящихся на первых стадиях почвообразования на первичных магматических горных породах.

1555. ПЕРЕГНОЙ //muck, mould //muck, terreau //Muck, Düngererde - 1) общеупотребительный термин для мертвого органического вещества, находящегося в различной стадии разложения; в этом широком понимании термин включает самые различные образования, такие как гумус, компост, подстилку, сильно разложившийся торф и т.д.; 2) термин для слоя мертвого органического вещества со степенью разложения более 45%.

1556. ПЕРЕГНОЙНАЯ ПОЧВА //muck soil, mould soil //sol de muck, sol terreaux //Muckboden, Düngererde - термин для почв, богатых органическим веществом со степенью минерализации более 45%.

1557. ПЕРЕГНОЙНАЯ ГРУНТОВО-ГЛЕЕВАЯ ПОЧВА //ground water gley muck soil //sol muck gley à eau de fond //grundwassergley Muck-Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа дерново-глеевых почв, сильно оглеенных в нижней части профиля в результате избыточного увлажнения жесткими грунтовыми водами, что дает профиль A_1-A_{1g}-B_g-G; верхний горизонт содержит более 12% гумуса и имеет интенсивную черную окраску; син.: темноцветная п., дерновая темноцветная п.

1558. ПЕРЕГНОЙНАЯ ПОВЕРХНОСТНО-ГЛЕЕВАЯ ПОЧВА //surface gley muck soil //sol muck gley superficiel //oberflachengley Muckboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа дерново-глеевых почв, сильно оглеенных с поверхности в результате устойчивого поверхностного переувлажнения, что дает профиль A_{1g}-AG-B_g-C; верхний горизонт содержит более 12% гумуса и имеет интенсивную черную окраску.

1559. ПЕРЕГНОЙНО-БОЛОТНАЯ ПОЧВА - см. Перегнойно-глеевая п.

1560. ПЕРЕГНОЙНО-ГЛЕЕВАЯ ПОЧВА //humus-gley soil //sol humique èn gley //Humusgleyboden - термин для болотных почв с профилем A-G, имеющих в верхней части профиля богатый органическим веществом горизонт, содержащий более 20% органического веще-

ства при песчаном субстрате и более 30% при глинистом, причем органическое вещество имеет степень минерализации более 45%; верхний перегнойный горизонт подстилается глеевым.

1561. ПЕРЕГНО́ЙНО-КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //humus carbonate soil //sol calcaire humique //Humuskarbonatboden - см. Гумусо-карбонатная почва, Дерново-карбонатная почва.

1562. ПЕРЕГНО́ЙНО-МИ́КРОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //humic micropodzol //micropodzol humiféré //Humusmikropodsol - термин западно-европейских школ для перегнойных (дерновых) почв, имеющих в верхней части профиля едва заметный подзолистый горизонт обычно сразу под лесной подстилкой; формируется при поселении хвойного леса на дерновых почвах.

1563. ПЕРЕГНО́ЙНО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //humus-podzolic soil //sol humus-podzolique //Humuspodsolboden - термин русск.шк. для дерново-подзолистых почв, обычно заболоченных в разной степени, гумусо-аккумулятивный горизонт которых имеет черную или чернобурую окраску и содержит 10-20% гумуса.

1564. ПЕРЕГНО́ЙНО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ГРУНТО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //ground water muck-podzolic soil //sol muck-podzolique gley à eau de fond //grundwassergley muckpodsoliger Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа болотно-подзолистых почв с профилем A_1-A_2-B_g-C_g, сильно оглеенных в нижней части профиля в результате грунтового заболачивания и характеризующихся высоким (20-30%) содержанием органического вещества в горизонте A_1.

1565. ПЕРЕГНО́ЙНО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПОВЕ́РХНОСТНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //surface gley muck-podzolic soil //sol muck-podzolique gley superficiel //oberflachengley muckpodsoliger Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа болотно-подзолистых почв с профилем A_{1g}-A_{2g}-B_g-C, сильно оглеенных в верхней части профиля в результате поверхностного заболачивания и имеющих сильно гумусированный (20-30% гумуса) горизонт A_1.

1566. ПЕРЕГНО́ЙНО-ПОДЗО́ЛИСТО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //humus-podzolic-gley soil //sol humique-podzolique-gleyique //Humuspodsolgleyboden - термин русск.шк. для болотно-подзолистых почв с профилем A_0-A_1-A_2-(B_g)-G, гумусоаккумулятивный горизонт A_1 которых имеет черную или чернобурую окраску и содержит 10-20% гумуса.

1567. ПЕРЕГНО́ЙНО-ТОРФЯ́НАЯ ПО́ЧВА //muck-peat soil, mould-peat soil //sol muck-tourbeux // Mucktorfboden - термин для болотных

или заболоченных почв, верхний органогенный слой которых имеет степень разложения 25-45%.

1568. ПЕРЕРЫ́ТАЯ ПО́ЧВА //broken-up soil //sol défoncé, sol brisé // umgebrochen Boden, zerbröckelt Boden - термин для почв, нормальный профиль которых нарушен или изменен активной деятельностью роющих животных.

1569. ПЕРЕХО́ДНАЯ ПО́ЧВА //transitional soil, intermediate soil, intergrade soil //sol de transition, sol intermediaire //Grenzboden, Übergangsboden, Zwischenboden - общеупотребительный термин для почв, переходных в генетическом, пространственном, систематическом или диагностическом отношении между соседними таксономическими единицами (между двумя типами или видами и т.п.).

1570. ПЕСО́К //sand //sable //Sand - 1) термин для фракции механического (гранулометрического) состава почв размером 0,05-3,00 мм с подразделением на песок крупный (1-3 мм), песок средний (0,25-1,00 мм) и песок мелкий (0,05-0,25 мм); 2) термин для типа поверхности земли, сложенной песчаным материалом.

1571. ПЕСО́К АЛЛЮВИА́ЛЬНЫЙ //alluvial sand //sable alluvial //alluvialer Sand - термин для песков, образующихся в настоящее время по берегам крупных и малых рек и в их дельтах при отложении аллювия, связанного с эрозией на водосборе и в русле реки.

1572. ПЕСО́К БАРХА́ННЫЙ //dune sand //sable dunaire //Dünensand - см. Песок дюнный.

1573. ПЕСО́К БУГРИ́СТЫЙ //mound sand, hill sand //sable de butte // Hügelsand - термин для закреплённых песков, рельеф которых представлен возвышениями разных очертаний, между которыми имеются различной глубины понижения и котловины выдувания.

1574. ПЕСО́К ГРЯ́ДОВЫЙ //dene //bande de sable //Sandstreifen - термин для закреплённых песков, рельеф которых имеет форму параллельных гряд.

1575. ПЕСО́К ДРЕ́ВНЕАЛЛЮВИА́НЫЙ //old alluvial sand //sable alluvial ancienne //altes Sandalluvium, alte alluvialer Sand - термин для речных песков, формирование которых происходило в послеледниковое время и которые были частично изменены последующим воздействием воды, ветра, растительности, почвообразования.

1576. ПЕСО́К ДЮ́ННЫЙ //dune sand //sable dunaire //Dünensand - термин для скоплений песков, располагающихся отдельными песчаными холмами подковообразной формы перпендикулярно направлению ветров; в русской терминологии этот термин обычно употребляется к районам умеренного и холодного влажного климата, в то время как для пустынь и полупустынь больше используется синоним "песок барханный".

1577. ПЕСО́К МОРСКО́Й //marine sand, maritime sand, sea sand, seashore sand, beach sand, coastal sand //sable marine, sable côtier, sable de la mer, sable de côte maritime, sable rivageque //Seesand, Meersand, Seeküstesand, Meeresküstesand, Küstesand - термин для песков, образующихся на отлогих берегах и отмелях при разрушении берега моря или при впадение в море рек, несущих твердые частицы.

1578. ПЕСО́К ОЗЁРНЫЙ //lake sand, lacustrine sand //sable lacustre //Seesand - термин для песков, образующихся на отлогих берегах и отмелях при разрушении берега озера или при впадении реки, несущей твердые частицы.

1579. ПЕСО́К ПОДВИ́ЖНЫЙ //shifting sand //sable mobile, sable volatil //Flugsand - термин для песков, поверхность которых постоянно перевевается ветром, в результате чего происходит передвижение всего песчаного массива в направлении господствующего ветра.

1580. ПЕСО́К РЕЧНО́Й //river sand //sable de rivière //Flussand - см. Песок аллювиальный.

1581. ПЕСО́К ФЛЮВИОГЛЯЦИА́ЛЬНЫЙ //fluvioglacial sand //sable fluvioglaciaire //fluvioglazialer Sand - термин для песков, сформировавшихся при таянии ледниковых покровов и содержащих эратические валуны и суглинистые прослои.

1582. ПЕСО́К ЭО́ЛОВЫЙ //aeolian sand //sable éolien //äolischer Sand - термин для песков, сформированных при развевании продуктов выветривания горных пород в аридном климате.

1583. ПЕСТРОЦВЕ́ТНАЯ ПО́ЧВА //mottled soil, variegated soil, gay soil //sol marbrée, sol tachetée //marmorierter Boden, gesprenkelter Boden - термин русск.шк. для почв, формирующихся на древних пестроцветных корах выветривания, обычно сильно глинистых, имеющих крайне неоднородную окраску, создаваемую чередованием

светлых и темных, ярких и тусклых пятен разной формы и размера.

1584. ПЕСТРОЦВЕ́ТНАЯ ПЕСЧА́НИКОВАЯ ПО́ЧВА //variegated sandstone soil //sol en grès bigarré //Buntsandsteinboden - термин немецкой школы для слабо развитых почв на пестроцветных песчаниках.

1585. ПЕСЧА́НАЯ ПО́ЧВА //sandy soil //sol sablonneux, sol sableux, terre sableuse //Sandboden, sandiger Boden - 1) термин для почв, имеющих песчаный механический состав в верхних горизонтах; 2) термин для почв, формирующихся на мощных песчаных отложениях.

1586. ПЕСЧА́НАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //sandy desert soil //sol sableux désertique, sol sablonneux désertique, terre sableuse désertique //Sandwüstenboden - термин русск.шк. (1967) для типа слаборазвитых почв песчаных пустынь.

1587. ПЕСЧА́НАЯ ПУСТЫ́НЯ //sandy desert //désert sableux //Sandwüste - общеупотребительный термин для пустынь с песчаной поверхностью, образующейся либо за счет эолового разрушения местных коренных пород, либо за счет перевевания аллювиальных отложений, их транспортировки и переотложения; пески обычно собраны в гряды, бугры, барханы, пирамиды.

1588. ПЕ́ТРИКОВАЯ ПО́ЧВА //petric soil //sol petrique //petrischer Boden (от гр. petros - камень) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, содержащих в профиле конкреционный слой (см.) в пределах 100 см от поверхности, имея в виду железистые конкреции.

1589. ПЕТРОГИ́ПСОВАЯ ПО́ЧВА //petrogypsic soil //sol petrogypsique //petrogipsischer Boden (от гр. petros - камень и gýpsos - гипс) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, содержащих в профиле петрогипсовый слой (см.) в пределах 100 см от поверхности.

1590. ПЕТРОГИ́ПСОВЫЙ СЛО́Й //petrogypsic horizon //horizon petrogypsique //petrogipsischer Horizont (от гр. petros - камень и gýpsos - гипс) - термин американской школы для внутрипочвенных прослоев, цементированных гипсовыми кристаллами в сплошной слой мощностью более 10 см до такой степени, что его сухие фрагменты не распадаются в воде, но разрушаются кислотой; обычно вместе с гипсом присутствует и карбонат кальция, усиливающий цементацию. Син.: гипсовая кора.

1591. ПЕТРОЖЕЛЕ́ЗИСТАЯ ПО́ЧВА //petroferric soil //sol petroferrique //petroferrischer Boden (от гр. petros - камень и лат. ferrum - железо) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, содержащих в профиле петрожелезистый слой (см.) в пределах 100 см от поверхности.

1592. ПЕТРОЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ СЛО́Й //petroferric horizon //horizon petroferrique //petroferrischer Horizont (от гр. petros - камень и лат. ferrum - железо) - термин ФАО/ЮНЕСКО для внутрипочвенных прослоев, мощностью более 10 см, цементированных окислами железа до такой степени, что они в сухом состоянии не пробиваемы лопатой или буром, очень твердые и плотные; их сухие фрагменты не распадаются в воде, но разрушаются кислотой. Син.: железистая кираса, железистая кора.

1593. ПЕТРОКА́ЛЬЦИЕВАЯ ПО́ЧВА //petrocalcic soil //sol petrocalcique //petrokalkischer Boden (от гр. petros - камень и лат. calx - известь) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, содержащих в профиле петрокальциевый слой (см.) в пределах 100 см от поверхности.

1594. ПЕТРОКА́ЛЬЦИЕВЫЙ СЛО́Й //petrocalcic horizon //horizon petrocalcique //petrokalkischer Horizont (от гр. petros - камень и лат. calx - известь) - термин американской школы для сплошного плотного известкового внутрипочвенного слоя, цементированного карбонатом кальция или, местами, магния; может присутствовать примесь кремнезема; сухие фрагменты слоя не распадаются в воде, и в сухом состоянии слой не пробиваем лопатой или буром; слой массивный или плитчатый и очень твердый; некапиллярные поры заполнены, и слой непроницаем для корней; водопроницаемость его ничтожная; мощность слоя обычно более 10 см.

1595. ПЕ́ЧРЕНДЗИ́НА //pechrendzina //pechrendzine //Pechrendzina - термин Кубиены (1953) для альпийских рендзин с гидромодером, формирующихся в нивальном поясе высокогорий и характеризующихся следами криотурбации и солифлюкции в почвенном профиле. Син.: рендзина альпийская с гидромодером.

1596. ПЛА́ВНИ //deltaic marsh //marais de delta //Deltamarsch - заболоченные или затопленные большую часть года низменные приустьевые участки речных долин, обычно в дельтах, покрытые труднопроходимыми зарослями влаголюбивой растительности

(главным образом тростника, камыша, рогоза); иногда в плавнях встречаются пойменные леса; для плавней характерны многочисленные старицы и протоки; почва представляет собой обогащенную органическим веществом сильно оглеенную недифференцированную на горизонты постоянно влажную массу, в верхней части с полуторфянистой дерниной.

1597. ПЛАГГЕ́ПТ //plaggept //plaggept //Plaggept (от нем. Plaggen - луг и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка инсептисолей (см.), которые имеют с поверхности плаггеновый[x)] горизонт.

1598. ПЛА́ЙЯ //playa //playa //Playa (от исп. playa - площадь, ровное место) - термин, иногда применяемый в американской литературе для такыров и такыровидных поверхностей; происходит от местного названия соответствующих почв. Син.: такыр.

1599. ПЛА́КАКВЕ́ПТ //placaquept //placaquept //Plakaquept (от греч. plax - плитка, лат. aqua - вода и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквептов (см.), имеющих слоеватый[x)] горизонт в пределах 100 см от поверхности и формирующихся в районах с очень большими осадками в течение всего года под дождевыми лесами, часто заболоченными, в тропическом или субтропическом климате.

1600. ПЛА́КАКВО́Д //placaquod //placaquod //Plakaquod (от греч. plax - плитка, лат. aqua - вода и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы акводов (см.), которые имеют слоеватый горизонт над сподовым[x)] горизонтом и фраджипэн[x)] или белёсый горизонт над фраджипэном. С поверхности может присутствовать торфянистый горизонт. Горизонты выше слоеватого насыщены водой в какой-то период и имеют сизые пятна.

1601. ПЛА́КАНДЕПТ //placandept //placandept //Plakaquept (от греч. plax - плитка, яп. an - тёмный, яп. do - почва и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы андептов (см.), которые имеют слоеватый[x)] горизонт, являющийся непроницаемым для воды и корней, что приводит к переувлажнению почвы выше него; почвы формируются в постоянно влажном климате без сухого сезона.

1602. ПЛА́КОГУМО́Д //placohumod //placohumod //Plakohumod (от греч.

plax - плитка, лат. humus - гумус и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы гумодов (см.), которые имеют слоеватый подгоризонт в сподовом[x] горизонте.

1603. ПЛАКО́РНАЯ ПО́ЧВА //plane soil //sol de plan //Ebeneboden (от греч. plax - плоскость) - термин Г.Н.Высоцкого для почв водораздельных слабо наклонных поверхностей, характеризующихся глубоким залеганием грунтовых вод, отсутствием существенного смыва и намыва материала; согласно классическим представлениям докучаевской школы, почвы и растительность плакорных условий имеют наиболее типичные зональные черты; син.: автоморфная почва, автономная почва.

1604. ПЛА́КОРТО́Д //placorthod //placorthod // Plakorthod (от греч. plax - плитка, греч. orthos - настоящий и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортодов (см.), которые имеют слоеватый горизонт над или в сподовом[x] горизонте.

1605. ПЛА́НОСОЛЬ //planosol //planosol //Planosol (от лат. planus - плоский, ровный и лат. solum - почва) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, характеризующихся присутствием белёсого горизонта A_2 над непроницаемым или слабо проницаемым горизонтом в пределах 125 см от поверхности или над аргиллювым[x] горизонтом В при резком изменении мех.состава (минимум вдвое) между A_2 и В и ровной границе между ними; характеризующихся оглеением в нижней части профиля.

1606. ПЛА́НОСО́ЛЬ БЕ́ДНАЯ //dystric planosol //planosol dystrique // dystrischer Planosol (от гр. dystrophic - бесплодный) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих светлый[x] горизонт А, белёсый горизонт A_2 и аргиллювый[x] горизонт В; обнаруживающих резкое изменение (минимум вдвое) мех.состава между горизонтами A_2 и В; имеющих степень насыщенности основаниями менее 50% в горизонте В; имеющих глеевый[x] горизонт или признаки переувлажнения в нижней части профиля.

1607. ПЛА́НОСО́ЛЬ БОГА́ТАЯ //eutric planosol //planosol eutrique // eutrischer Planosol (от гр. eutrophic - плодородный) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих светлый[x] горизонт А, белёсый горизонт A_2 и аргиллювый[x] горизонт В; обнаруживающих резкое изменение (минимум вдвое) мех.состава между горизонта-

ми A_2 и B; имеющих степень насыщенности основаниями более 50% в горизонте B; имеющих глеевый[x)] горизонт или признаки переувлажнения в нижней части профиля.

1608. ПЛА́НОСО́ЛЬ ГУ́МУСОВАЯ //humic planosol //planosol humique // humus Planosol (от лат. humus - перегной, гумус) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих темный[x)] горизонт A, белёсый горизонт A_2 и аргилловый[x)] горизонт B; обнаруживающих резкое изменение (минимум вдвое) мех.состава между горизонтами A_2 и B; имеющих глеевый горизонт или признаки переувлажнения в нижней части профиля.

1609. ПЛА́НОСО́ЛЬ КРИОГЕ́ННАЯ //cryic planosol //planosol cryique // kryischer Planosol (от гр. kryos - холод) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих светлый[x)] или темный[x)] горизонт A, белёсый горизонт A_2 и аргилловый[x)] горизонт B; обнаруживающих резкое изменение (минимум вдвое по глине) мех.состава между горизонтами A_2 и B; имеющих глеевый горизонт или признаки переувлажнения в нижней части профиля; имеющих слой многолетней мерзлоты или признаки криотурбации в пределах 125 см от поверхности.

1610. ПЛА́НОСО́ЛЬ МО́ЛЛЕВАЯ //mollic planosol //planosol mollique // mollischer Planosol (от гр. mollic - мягкий) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих моллевый[x)] горизонт A, белёсый горизонт A_2 и аргилловый[x)] горизонт B; обнаруживающих резкое изменение (минимум вдвое) мех.состава между горизонтами A_2 и B; имеющих глеевый горизонт или признаки переувлажнения в нижней части профиля.

1611. ПЛА́НОСО́ЛЬ СО́ЛОДОВАЯ //solodic planosol //planosol solodique //solodischer Planosol (от русск. солодь) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих светлый[x)], темный[x)] или моллевый[x)] горизонт A, белёсый горизонт A_2 и натриевый горизонт B (с содержанием поглощенного натрия более 15% от емкости поглощения по крайней мере в одном из подгоризонтов); обнаруживающих резкое изменение (минимум вдвое по глине) мех.состава между горизонтами A_2 и B; имеющих глеевый горизонт или признаки переувлажнения в нижней части профиля.

1612. ПЛАНТАЖИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //subsoiled soil //sol sous-solageque //Plaggenboden - термин для сильно измененных плантажной вспашкой почв, в которых верхняя часть профиля полностью перемешана.

1613. ПЛА́СТОСО́ЛЬ //plastosol //plastosol //Plastosol (от греч. plásso - леплю, образую) - термин Кубиены и Моккенхаузена для бурых, серых и красных сиаллитных суглинистых почв тропиков и субтропиков, обладающих значительной пластичностью, часто формирующихся на карбонатных породах. Син.: Красный суглинок, Бурый суглинок, Серый суглинок.

1614. ПЛА́СТОСО́ЛЬ БУ́РАЯ //brown plastosol //plastosol brun //Braunplastosol - термин немецкой школы для бурых сиаллитных суглинистых почв тропиков и субтропиков, часто формирующихся на карбонатных породах. Син.: бурый суглинок.

1615. ПЛА́СТОСО́ЛЬ КРА́СНАЯ //red plastosol //plastosol rouge //Rotplastosol - термин немецкой школы для красных сиаллитных суглинистых почв тропиков и субтропиков, обладающих значительной пластичностью, часто формирующихся на карбонатных породах. Син.: Красный суглинок.

1616. ПЛА́СТОСО́ЛЬ СЕ́РАЯ //gray plastosol //plastosol gris //Grauplastosol - термин немецкой школы для серых сиаллитных суглинистых почв с высокой пластичностью, часто формирующихся на карбонатных породах, и имеющих мраморовидный осветленный горизонт в верхней части профиля в результате поверхностного переувлажнения, соответствующего псевдоглею. Син.: серый суглинок, белый суглинок, серая гидроморфная почва.

1617. ПЛИ́НТАКВА́ЛЬФ //plinthaqualf //plinthaqualf //Plinthaqualf (от греч. plinthos - кирпич, лат. aqua - вода и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (1960-70) для большой группы аквальфов (см.), которые имеют сплошной горизонт плинтита[x)] либо плинтит составляет более половины матрицы какого-нибудь подгоризонта аргиллового[x)] горизонта в пределах 125 см от поверхности почвы.

1618. ПЛИ́НТАКВЕ́ПТ //plinthaquept //plinthaquept //Plinthaquept (от греч. plinthos - кирпич, лат. aqua - вода и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквептов (см.), которые: 1) имеют сплошной или составляющий более половины матрицы плинтит[x)] в каком-либо подгоризонте в верхних 125 см почвы; 2) имеют почвенные температуры выше, чем криаквепты (см.).

1619. ПЛИ́НТАКВО́КС //plinthaquox// plinthaquox// Plinthaquox (от греч. plinthos - кирпич, лат. aqua - вода и порядкового корня

ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквоксов (см.), которые имеют плинтит[x], образующий сплошной слой в пределах 1,25 м от поверхности.

1620. ПЛИ́НТАКВУ́ЛЬТ //plinthaquult //plinthaquult //Plinthaquult (от греч. plinthos - кирпич, лат. aqua - вода и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквультов (см.), которые имеют сплошной плинтит[x] в пределах 1,25 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются две подгруппы почв: 1)типичные (typic) и 2) окисные (oxic) плинтаквульты.

1621. ПЛИНТИ́Т //plinthite //plinthite //Plinthit (от гр. plinthos - кирпич) - термин американской школы, принятый в международной терминологии и относящийся к внутрипочвенным горизонтам различной мощности, характерным для почв тропиков и субтропиков, представляющим собою сплошную богатую полуторными окислами и бедную гумусом сильно выветрелую смесь глины с кварцем и другими примесями, обычно красно-пятнистого облика с плитчатым, полигональным или сетчатым рисунком в профиле, которая необратимо отвердевает в сплошной твердый слой или в неправильные агрегаты при чередовании увлажнения и обсыхания; если механический состав слоя легче пылеватого очень тонкого песка, то более половины объема составляют отдельные конкреции или несоединенные мягкие красные пятна. Термин соответствует определению латерита Бьюкенена, но более строгий и узкий, чем современное представление о латерите (см.).

1622. ПЛИНТИ́ТОВАЯ ПО́ЧВА //plinthic soil //sol plinthique //plinthischer Boden (от гр. plinthos - кирпич) - сборное понятие для почв, имеющих в своём профиле горизонт плинтита (см.) в пределах 125 см от поверхности.

1623. ПЛИНТИ́ТОВЫЙ ГОРИЗО́НТ //plinthic horizon //horizon plinthique //plinthischer Horizont (от гр. plinthos - кирпич) - см. Плинтит.

1624. ПЛИ́НТОГУМУ́ЛЬТ //plinthohumult //plinthohumult //Plinthohumult (от греч. plinthos - кирпич, лат. humus - гумус и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы гумультов (см.), имеющих сплошной или занимающий более половины объема какого-либо подгоризонта слой плинтита[x] в пределах 125 см от поверхности.

1625. ПЛИ́НТОКСЕРА́ЛЬФ //plinthoxeralf //plinthoxeralf //Plinthoxeralf (от греч.plinthos - кирпич, греч.xeros - сухой и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ксеральфов (см.), которые имеют сплошной плинтит[x)] в пределах 1,25 м от поверхности.

1626. ПЛИ́НТУДУ́ЛЬТ //plinthudult //plinthudult //Plinthudult (от греч.plinthos - кирпич, лат.udus - влажный и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удультов (см.), которые имеют сплошной плинтит[x)] в пределах 1,25 м от поверхности.

1627. ПЛИ́НТУСТА́ЛЬФ //plinthustalf //plinthustalf //Plinthustalf (от греч.plinthos - кирпич, лат.ustus - обожженный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устальфов (см.), которые имеют сплошной плинтит[x)] в пределах 1,25 м от поверхности.

1628. ПЛИ́НТУСТУ́ЛЬТ //plinthustult //plinthustilt //Plinthustult (от греч. plinthos - кирпич, лат.ustus - обожженный и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устультов (см.), которые имеют сплошной плинтит[x)] в пределах 1,25 м от поверхности.

1629. ПЛЫВУ́Н //floating earth //terre tremblante //Schwingerde - общеупотребительный термин для почв или отдельных прослоев, пересыщенных водой, причем содержание воды значительно превышает полную влагоемкость.

1630. ПОВЕ́РХНОСТНОВО́ДНЫЙ ГЛЕ́Й //surface waterlogged soil //sol avec nappe perchée //Staunässegley - термин Мюккенхаузена (1962) для почв с осветленным поверхностным или близким к поверхности мраморовидным горизонтом, формирующимся в результате поверхностного переувлажнения. Син.: псевдоглей.

1631. ПОВЕ́РХНОСТНО-ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //surface gleyic soil //sol gleyique superficiel //oberflachen gleyischer Boden - термин русск.шк. для почв, имеющих в верхней части профиля пятна оглеения (чередование сизых и ржавых пятен разной формы и размера) , образующихся в результате сезонного поверхностного переувлажнения.

1632. ПОВЕ́РХНОСТНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //surface gley soil //sol gley su-

perficiel //Oberflachengleyboden - термин русск.шк. для почв, имеющих в верхней части профиля сплошной глеевый горизонт, формирующийся в результате поверхностного переувлажнения почвы.

1633. ПОВЕ́РХНОСТНО-ГЛЕ́ЕВО-ЭЛЮВИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА - см. Кислая поверхностно-глеево-элювиальная п.

1634. ПОВЕ́РХНОСТНО-ЗАБОЛО́ЧЕННАЯ ПО́ЧВА //surfacely wet soil//sol humide superficiel //oberflachen nasser Boden - общеупотребительный термин для почв, испытывающих периодическое сезонное или постоянное переувлажнение в результате застоя поверхностных атмосферных либо стоковых вод, что может иметь место в силу превышения осадков над испарением, наличия уплотненных водонепроницаемых слоев или многолетней мерзлоты в почве, особых условий рельефа.

1635. ПОВЕ́РХНОСТНО-ЛУГОВА́ТО-БУ́РАЯ ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //surface meadowish brown semi-desert soil //sol brun subaride à nappe phréatique superficiel //oberflachen schwach Wiesen-brauner Halbwüstenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-бурых полупустынных почв, формирующихся в западинах при глубоких грунтовых водах, характеризующихся повышенной гумусностью (более 2%), пониженным уровнем вскипания (с 50-70 см), отсутствием выделений гипса, наличием солонцеватого горизонта на глубине от 40-50 до 70-80 см.

1636. ПОВЕ́РХНОСТНО-ЛУГОВА́ТО-КАШТА́НОВАЯ ПО́ЧВА //surfacely meadowish chestnut soil //sol châtain à nappe phréatique superficiel // oberflachen schwachwiesen-kastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-каштановых почв, формирующихся в понижениях рельефа при глубоких (более 7 м) грунтовых водах и характеризующихся несколько повышенной гумусированностью, промытостью от легкорастворимых солей и пониженной карбонатностью профиля.

1637. ПОВЕ́РХНОСТНО-ЛУГОВА́ТО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ПО́ЧВА //surface-meadowish-cinnamon soil //sol cinnamome a nappe phréatique superficiel// oberflachen gleyischer zimtfarbener Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-коричневых почв, имеющих оглеение в верхней части профиля вследствие поверхностного переувлажнения.

1638. ПОВЕ́РХНОСТНО-ЛУГОВА́ТО-СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ПО́ЧВА //surface-meado-

wish-gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamome à nappe phréatique superficiel //oberflachen gleyischer grauer zimtfarbiger Wiesenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-серо-коричневых почв, имеющих только поверхностное оглеение в результате переувлажнения поверхностными водами.

1639. ПОВЕ́РХНОСТНО-ЛУГОВА́ТО-ЧЕРНОЗЕМНАЯ ПО́ЧВА //surfacela meadowish chernozemic soil //sol chernozemique à nappe phréatique superfaciel //oberflachen schwach wiesentschernosemischer Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-чернозёмных почв, формирующихся при уровне грунтовых вод более 7 м и периодическом весеннем поверхностном переувлажнении и характеризующихся повышенной гумусированностью и мощностью, промытостью от солей и карбонатов, комковатой структурой гумусового горизонта, отсутствием белоглазки.

1640. ПОВЕ́РХНОСТНО-ЛУ́ГОВО-ПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //surface meadow-desert soil //sol désertique à nappe phréatique superficiel //oberflachen Wiesen-Wüstenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-пустынных почв, избыточно увлажняемых водами поверхностного стока при выпадении осадков и характеризующихся наличием мелкокомковатого гумусового горизонта, под которым лежит глееватый горизонт; син.: ойтак, ойтачная п.

1641. ПОВЕ́РХНОСТНО-ОГЛЕ́ЕННАЯ ПО́ЧВА //surface gleyed soil //sol gleyifie superficiel //oberflachen vergleyter Boden - термин русск.шк. для почв, имеющих в верхней части профиля в разной степени оглеенный горизонт, формирующийся в результате поверхностного переувлажнения.

1642. ПОВЕ́РХНОСТНО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //surface podzolic soil // sol podzolique superficiel //Oberflachenpodsolboden - термин русск.шк. для вида подзолистых почв, мощность подзолистого горизонта которых не превышает 5 см или горизонт A_2 выражен отдельными пятнами под лесной подстилкой.

1643. ПОВТО́РНО-ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //secondly podzolized soil, repeatedly podzolized soil //sol répétement podzolisé //wiederholen podsolierter Boden - термин Н.П.Ремезова (1955) для дерново-подзолистых и бурых лесных почв, в верхней части гумусоаккумулятивного горизонта A_1 которых непосредственно под лесной подстилкой формируется слабо выраженный сплошной или отдельными пятнами подзолистый горизонт A_2, что обычно имеет

место при смене лиственного леса хвойным или при поселении хвойного леса на залежах.

1644. ПОГРЕБЁННАЯ ПО́ЧВА //buried soil //sol enfoui //eingegrabener Boden - термин для почв, погребенных в толще различных, главным образом, четвертичных, континентальных наносов, в том числе и аллювиальных; погребенные почвы являются свидетелями перерывов в процессе накопления отложений и важным материалом для реконструкции палеогеографических условий времени этих перерывов; свойства погребенных почв изменены по сравнению с теми, какие имелись в период их образования.

1645. ПОГРЕБЁННЫЙ ТОРФ //dary //tourbe de marais recouverte d'argile //tonüberdeckter Moortorf - термин западно-европейских школ для торфяных прослоев лугового или болотного происхождения, погребенных глинистым наносом.

1646. ПОДБЕ́Л //podbel //podbel //Podbel - термин Ю.А.Ливеровского (1960) для буроземов и буроземно-подзолистых почв Приморья, имеющих в верхней части профиля осветленный мраморовидный горизонт в результате поверхностного переувлажнения. Син.: бурая таежная глеевая почва, буро-глееподзолистая почва.

1647. ПОДБЕ́Л ЛУ́ГОВЫЙ //meadow podbel //podbél à nappe phréatique // Wiesenpodbel (от русск. белый и приставки под, означающей приближение, близкость) - термин Ю.А.Ливеровского (1962) для заболоченных почв депрессий Приморья, имеющих в профиле осветленный горизонт, сформированный в результате временного поверхностного переувлажнения верховодкой в пределах сильно дифференцированного по механическому составу профиля. Син.: псевдоглей, дерново-глеевая псевдоподзоленная почва, подбел пойменный, дерново-глеевая почва с осветленным горизонтом.

1648. ПОДБЕ́Л ПО́ЙМЕННЫЙ //alluvial podbel //podbél alluvial //Auenpodbel (от русск. белый и приставки под, означающей приближение, близость) - термин А.И.Зинченко (1969) для заболоченных почв поймы р.Оки, имеющих в профиле осветленный горизонт, сформированный в результате временного поверхностного переувлажнения верховодкой в пределах сильно дифференцированного по механическому составу профиля. Син.: псевдоглей, подбел луговый, дерново-глеевая псевдоподзоленная почва, дерново-глеевая почва с осветленным горизонтом.

1649. ПОДБЕ́Л ТАЁЖНЫЙ КИ́СЛЫЙ //acid taiga podbel //podbel acide de

taiga //saurer Taigapodbel - термин Ливеровского и Рубцовой (1956) для осветленных почв дальневосточных лесов трансуперакваальных ландшафтов, в которых осветленный горизонт образовался путем оглеения без формирования иллювиального горизонта; син.: подбел.

1650. ПОДБУ́Р //podbur //podbur //Podbur (от русск.частицы под, означающей близость, и бурый - соответственно окраске) - термин В.О.Таргульяна для кислых ожелезненных неоподзоленных иллювиально-гумусовых грубообломочных почв бореального пояса; син.: таёжная литогенная п., кислая неоподзоленная п., мерзлотно-таёжная ожелезненная п.

1651. ПОДБУ́Р ТАЁЖНЫЙ // taiga podbur//podbur de taiga//Taigapodbur - термин В.О.Таргульяна для кислых ожелезнённых иллювиально-гумусовых почв таёжной зоны, не имеющих оподзоленного осветлённого горизонта; син.: кислая таёжная п., мерзлотно-таёжная кислая п., кислая таёжная неоподзоленная п., таёжномерзлотная ожелезнённая п., бурая субарктическая п., ржаво-окрашенная лесная п.

1652. ПОДБУ́Р ТУ́НДРОВЫЙ // tundric podbur//podbur de toundra//Tundrapodbur - термин В.О.Таргульяна для кислых ожелезненных иллювиально-гумусовых почв тундровой зоны, не имеющих оподзоленного осветленного горизонта.

1653. ПОДВИ́ЖНЫЙ ПЕСО́К //shifting sand//sable mobile, sable volatil //Flugsand - общеупотребительный термин для не закреплённых растительностью и перевеваемых ветром песчаных пространств.

1654. ПОДВО́ДНАЯ ПО́ЧВА //subwater soil, water-logged soil// sol engorgé //Unterwasserboden, durchtränkter Boden - термин для почв, образующихся при постоянном или почти постоянном затоплении водой. Син.: субгидральная почва.

1655. ПОДВО́ДНАЯ ГРУ́БАЯ ПО́ЧВА //raw subwater soil, raw water-logged soil //sol engorgé grossiére //Unterwasser-Rohboden - термин немецкой школы для слабо развитых наносных (аллювиальных) почв, формирующихся на грубозернистом наносе в условиях постоянного или почти постоянного затопления.

1656. ПОДДУ́БИЦА //poddubitza //poddubitza //Poddubitza - термин К.Д.Глинки (1902), происходящий от русского народного названия, для буроокрашенных почв со слабо дифференцированным профилем, формирующихся под дубовыми и хвойно-широколиственными

лесами на богатых, часто карбонатных глинистых породах северо-западных областей Европейской части СССР.

1657. ПОДЗО́Л //podzol //podzol //Podsol, устаревшие Bleicherde, Bleichsand (от русск. подзол - производное от цвета древесной золы) - русский народный термин, введенный в научный обиход В.В.Докучаевым и получивший в почвенной литературе ряд различных толкований: 1) наиболее широкое понимание термина в работах В.В.Докучаева и его коллег и учеников, когда под ним понимаются все почвы северных лесных районов, имеющие подзолистый горизонт A_2 той или иной мощности с поверхности или под гумусовым горизонтом; в этом смысле термин широко используется в народе в качестве синонима термина "подзолистая почва"; 2) термин русск.шк. для вида собственно подзолистых почв с профилем A_0-A_2-B-C, которые имеют в профиле сплошной мучнистый белёсый подзолистый горизонт A_2; 3) термин В.Р.Вильямса для собственно подзолистых почв с профилем A_0-A_2-B-C не зависимо от мощности и степени выраженности подзолистого горизонта; при этом различаются маломощные, среднемощные и мощные подзолы; 4) термин для почв с профилем A_0-A_2-B-C, у которых мощность подзолистого горизонта A_2 превышает 40 см (при меньшей мощности A_2 почва называется подзолистой, а не подзолом) (Д.Г.Виленский, Н.П.Ремезов); 5) термин западно-европейских школ для почв, обычно песчаных, характеризующихся аккумуляцией аморфных органических веществ вместе с R_2O_3 или по отдельности в иллювиальном горизонте B; 6) термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, имеющих в профиле сподовый[x)] горизонт, т.е. горизонт иллювиальной аккумуляции аморфных соединений железа, алюминия и гумуса при отсутствии перемещения по профилю неразрушенной глины; 7) термин франц.шк. (1967) для группы оподзоленных почв умеренного климата (см.), имеющих профиль A_0-(A_1)-A_2-B-C, в котором подзолистый горизонт A_2 полностью обесцвечен и пепельного оттенка, а горизонт B может отсутствовать (в случае интенсивного бокового выноса).

1658. ПОДЗО́Л АЛЬПИ́ЙСКИЙ //alpine podzol //podzol alpine//Alpenpodsol - термин франц.шк. (1967) для группы оподзоленных почв холодного климата, характерных для высокогорий, имеющих повышенную степень насыщенности основаниями при довольно мощном горизонте A_2.

1659. ПОДЗО́Л АЛЬФЕГУ́МУСОВЫЙ //alfehumic podzol //podzol alfehumique

//alfehumischer Podsol - термин М.А.Глазовской (1972) для иллювиально-железисто-алюминиево-гумусовых подзолов.

1660. ПОДЗО́Л БОЛО́ТНЫЙ //slough podzol//podzol tourbeux//sumfiger Podsol - термин западно-европейских школ для подзолисто-глеевых почв или глеевых подзолов, встречающихся в низменностях по окраинам болот.

1661. ПОДЗО́Л БОРЕА́ЛЬНЫЙ //boreal podzol//podzol boréal//Boreal-podsol - термин франц.шк. (1967) для группы оподзоленных почв холодного климата, имеющих повышенную степень насыщенности основаниями при мощном (10-15 см) горизонте A_2.

1662. ПОДЗО́Л-БУРОЗЕМ //podzol-brownearth//podzol-sol brun//Podsol-Braunerde - термин немецкой школы для почв, переходных от подзола к бурозёму.

1663. ПОДЗО́Л ВТОРИ́ЧНЫЙ //secondary podzol//podzol secondaire//sekundär Podsol - 1) термин Н.Чернеску (1934) (в оригинале автора podzol secúndar) для буроокрашенных почв Центральной Европы, близких у бурозёмам, но имеющих в профиле осветленный тусклый горизонт, сформированный, в отличие от подзолистого горизонта, в процессе обезиливания (лессивирования); син.: sol lessivé (Дюшофур, 1951), Fahlerde (Эвальд, 1958), псевдоподзол (Герасимов, 1960), Parabraunerde (Мюккенхаузен, 1962), gebleichten braunen Waldboden (Штремме, 1950), luvisol (Людаль, 1967); 2) термин Д.А.Драницына (1914) для дерново-подзолистых почв Сибири, имеющих второй гумусовый горизонт ниже подзолистого, что дает профиль типа A_0-A_1-A_2-A_1-B-C; син.: вторичноподзолистая почва, почва со вторым гумусовым горизонтом.

1664. ПОДЗО́Л ГЛЕ́ЕВЫЙ //gleyic podzol//podzol a gley//Gleypodsol - 1) термин для подзолов, имеющих глеевый горизонт в нижней части профиля в результате грунтового переувлажнения. Син.: подзол грунтово-водный, подзолисто-глеевая почва; 2) термин франц.шк. (1965,1967) для группы оподзоленных гидроморфных почв, имеющих глеевый горизонт в нижней части подзолистого профиля.

1665. ПОДЗО́Л ГЛЕ́ЕВЫЙ //gleyic podzol//podzol gleyique//gleyischer Podsol (от русск. глей) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих сподовый[x)] и глеевый[x)] диагностические горизонты, либо имеющих признаки переувлажнения в тот или иной период го-

да, но не имеющих тонких железистых прослоев в или над сподовым горизонтом В.

1666. ПОДЗО́Л ГЛЕ́ЕВЫЙ ЗАБОЛО́ЧЕННЫЙ //water-logged gleypodzol //podzol à gley à eau stagnante //Staunässegleypodsol - термин нем.шк. для подзолисто-глеевых почв.

1667. ПОДЗО́Л-ГЛЕ́Й //podzol-gley //podzol-gley //Podsol-Gley - термин немецкой школы для почв, переходных от подзола к глею.

1668. ПОДЗО́Л ГЛУБОКО́ ГИ́ДРОМО́РФНЫЙ //deeply hydromorphic podzol // podzol à hydromorphie profonde //untergrundhydromorphischer Podsol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы подзолов (см.), в профиле которых под горизонтом В лежит глеевый горизонт G или псевдоглеевый горизонт B_g, горизонт В может иметь признаки гидроморфизма, а горизонт A_2 имеет чистую подзолистую окраску.

1669. ПОДЗО́Л ГРУНТО́ВОВО́ДНЫЙ //ground-water podzol //podzol de nappe, podzol à eau de fond //Grundwasserpodsol, Gleypodsol - термин американской школы для подзолов, имеющих глеевый горизонт в нижней части профиля в результате грунтового переувлажнения. Син.: подзол глеевый, подзолисто-глеевая почва.

1670. ПОДЗО́Л ГРУНТО́ВОВО́ДНЫЙ ТРОПИ́ЧЕСКИЙ //tropical ground-water podzol //podzol de nappe tropical //tropischer Grundwasserpodsol - термин франц.шк.(1967) для группы оподзоленных гидроморфных почв, распространенных в тропиках и имеющих очень мощный и слабо отличающийся в глубине от С горизонт A_2 и конкреционный горизонт В, образованный путем бокового притока железа.

1671. ПОДЗО́Л ГУ́МОСОВО-ЖЕЛЕ́ЗИСТО-ИЛЛЮВИА́ЛЬНЫЙ - см. Подзол иллювиально-гумусово-железистый.

1672. ПОДЗО́Л ГУ́МУСОВО-ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ //humus-iron podzol //podzol ferrohumique //Humuseisenpodsol - термин западно-европейских школ для подзолов, характеризующихся аккумуляцией гумуса и железа в иллювиальном горизонте при преимущественном накоплении железа. Син.: подзол иллювиально-гумусово-железистый.

1673. ПОДЗО́Л ГУ́МУСО-ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ //humo-ferric podzol //podzol humoferrique //humuseisen Podsol - термин канадской школы (1968) для большой группы почв, входящих в порядок подзолистых почв, у которых горизонт В представлен типом B_{hf}, то-есть имеющих

иллювиальный горизонт, в верхних 10 см которого содержание гумуса менее 1%, а содержание оксалатнорастворимой суммы Fe+Al превышает минимум на 0,8% таковое в горизонте С; отношение гумуса к оксалатнорастворимому Fe менее 20. Под лесной подстилкой может лежать горизонт A_1, или A_2, или B_h; горизонты A_1 и A_2 могут отсутствовать.

1674. ПОДЗО́Л ГУ́МУСО-ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ //humo-ferrugenious podzol //podzol humo-ferrugineuse //Humuseisenpodsol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы подзолов (см.), имеющих горизонт В, подразделяющийся на гумусо-иллювиальную часть B_h вверху и железисто-иллювиальную часть B_{fe} внизу.

1675. ПОДЗО́Л ГУ́МУСО-ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ ДВУПРО́ФИЛЬНЫЙ //bisuequa humo-ferric podzol //podzol humo-ferrique bisequa //bisequa humus-eisen Podsol (от лат.bisequa - две серии, две фазы) - термин канадской школы (1968) для подгруппы гумусо-железистых подзолов, в которых подзолистый профиль со всеми его диагностическими горизонтами подстилается глинисто-иллювиальным (аргилловым[x]) горизонтом на глубине более 45 см; эти подзолы развиты в пределах верхнего осветленного мощного горизонта бывшей лювисоли; подзолистый горизонт В должен быть глубже 15 см. Почвы с подобным строением профиля, но с аргилловым горизонтом выше 45 см, относятся к двупрофильным лювисолям.

1676. ПОДЗО́Л ГУ́МУСО-ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ КРИОГЕ́ННЫЙ //cryic humo-ferric podzol //podzol humo-ferrique cryique //cryischer humus-eisen Podsol (от гр.cryos - холод) - термин канадской школы (1968) для почв любой из подгрупп группы гумусо-железистых подзолов, в профиле которых лежит слой многолетней мерзлоты в пределах 100 см от поверхности.

1677. ПОДЗО́Л ГУ́МУСО-ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ МИ́НИ //mini humo-ferric podzol // podzol humo-ferrique mini //mini humus-eisen Podsol (от лат. mini - укорачивать) - термин канадской школы (1968) для подгруппы гумусо-железистых подзолов, в профиле которых осветленный горизонт имеет мощность менее 2,5 см, выражен пятнами, не выражен (соль с перцем) или отсутствует вовсе; маломощный (менее 7,5 см) горизонт A_1 может присутствовать.

1678. ПОДЗО́Л ГУ́МУСО-ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ ОГЛЕ́ЕННЫЙ //gleyed humo-ferric podzol //podzol humo-ferrique gleyifié //vergleyter humus-eisen Podsol (от русск. глей) - термин канадской школы (1968) для

почв любой из подгрупп группы гумусо-железистых подзолов, в профиле которых заметны признаки слабого оглеения.

1679. ПОДЗО́Л ГУ́МУСО-ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ СКА́ЛЬНЫЙ //lithic humo-ferric podzol //podzol humo-ferrique lithique //lithischer humus-eisen Podsol (от лат. lithos - камень) - термин канадской школы (1968) для почв любой из подгрупп группы гумусо-железистых подзолов, в профиле которых встречена плотная порода в пределах 50 см от поверхности.

1680. ПОДЗО́Л ГУ́МУСО-ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ СЛОЕВА́ТЫЙ //placic humo-ferric podzol //podzol humo-ferrique placique //plakischer humus-eisen Podsol (от лат. plax - плитка, слой) - термин канадской школы (1968) для подгруппы гумусо-железистых подзолов, в профиле которых (в нижней части горизонта В или в горизонте С) выделяется слоеватый горизонт в виде одной или нескольких тонких извилистых железистых прослоек.

1681. ПОДЗО́Л ГУ́МУСО-ЖЕЛЕ́ЗИСТЫИ ТЁМНЫЙ //sombric humo-ferric podzol //podzol humo-ferrique sombrique //sombrischer humus-eisen Podsol (от лат. umbra - тень) - термин канадской школы (1968) для подгруппы гумусо-железистых подзолов, в профиле которых выделяется под подстилкой гумусовый горизонт A_1 мощностью более 7,5 см, а горизонт A_2 отсутствует.

1682. ПОДЗО́Л ГУ́МУСО-ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ ТИПИ́ЧНЫЙ //orthic humo-ferric podzol //podzol humo-ferrique orthique //orthischer humus-eisen Podsol (от гр. orthos - настоящий) - термин канадской школы (1968) для подгруппы гумусо-железистых подзолов, имеющих в профиле под подстилкой осветленный горизонт A_2 мощностью более 2,5 см.

1683. ПОДЗО́Л ГУ́МУСОВО-ИЛЛЮВИА́ЛЬНЫЙ - см. Подзол иллювиально-гумусовый.

1684. ПОДЗО́Л ГУ́МУСОВЫЙ //humic podzol, humus podzol //podzol humifére, podzol humique //Humuspodsol, humus Podsol - термин западно-европейских школ для подзолов, характеризующихся аккумуляцией гумуса в иллювиальном горизонте. Син.: подзол иллювиально-гумусовый.

1685. ПОДЗО́Л ГУ́МУСОВЫЙ //humic podzol//podzol humique //humus Podsol - 1) термин канадской школы (1968) для большой группы почв, входящих в порядок подзолистых почв, у которых горизонт В представлен типом B_h, то-есть имеющих иллювиально-гумусо-

вый темный горизонт мощностью более 10 см и содержанием гумуса более 2% при незначительном содержании железа, не краснеющий при прокаливании, содержащий экстрагируемый Al, имеющий отношение гумуса к свободному железу более 20; ниже этого горизонта могут идти и более ожелезненные слои B_{hf}, B_{fh} или B_f; 2) термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих сподовый[x)] горизонт B с подгоризонтом, содержащим диспергированное органическое вещество и алюминий и не имеющим достаточного количества железа для покраснения почвы при прокаливании; не имеющих тонких железных прослоек в или над сподовым горизонтом B; 3) термин франц.шк. (1967) для подгруппы подзолов (см.), имеющих гумусо-иллювиальный горизонт B_h и не имеющих определенного железисто-иллювиального горизонта

1686. ПОДЗО́Л ГУ́МУСОВЫЙ ГЛЕ́ЕВЫЙ //gleyic humic podzol //podzol humique à gley //Gleyhumuspodsol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы глеевых подзолов, имеющих постоянный близкий к поверхности уровень грунтовых вод, горизонт A_2 прокрашенный тёмным гумусом; гумус не образует плёнок выше горизонта B_h, но образует пленки в B_h; выше горизонта B_h лежит глеевый горизонт G.

1687. ПОДЗО́Л ГУ́МУСОВЫЙ ОГЛЕ́ЕННЫЙ //gleyed humic podzol //podzol humique gleyifié //vergleyter humus Podsol (от русск. глей) - термин канадской школы (1968) для почв любой из подгрупп группы гумусовых подзолов, в профиле которых заметны слабые признаки оглеения.

1688. ПОДЗО́Л ГУ́МУСОВЫЙ СКА́ЛЬНЫЙ //lithic humic podzol //podzol humique lithique //lithischer humus Podsol (от лат. lithos - камень) - термин канадской школы (1968) для почв любой из подгрупп группы гумусовых подзолов, в профиле которых имеется плотная порода в пределах 50 см от поверхности.

1689. ПОДЗОЛ ГУ́МУСОВЫЙ СЛОЕВА́ТЫЙ //placic humic podzol //podzol humique placique //plakischer humus Podsol (от лат. plax - плитка, слой) - термин канадской школы (1968) для подгруппы гумусовых подзолов, имеющих в профиле маломощный (обычно менее 2,5 см) слоеватый горизонт, состоящий из одной или серии очень тонких (менее 3 мм) волнистых прослоек темно-красного цвета, непроницаемых и твердых, часто стекловатых, цементированных органическим веществом и железом (гумус 1-12%, Fe 5-20%, Mn 0-15%); этот слой может лежать в горизонте B, но

не в B_h, или даже в горизонте С.

1690. ПОДЗО́Л ГУ́МУСОВЫЙ ТИПИ́ЧНЫЙ //orthic humic podzol //podzol humique orthique //orthischer humus Podsol (от гр. orthos - настоящий) - термин канадской школы (1968) для подгруппы гумусовых подзолов, не имеющих слоеватого горизонта в профиле.

1691. ПОДЗО́Л ДЕПРЕ́ССИЙ //bluff podzol //podzol de dépression // Senkepodsol - устаревший термин западно-европейских школ для глееватых подзолистых почв понижений рельефа.

1692. ПОДЗО́Л ЖЕЛЕ́ЗИСТО-ГУ́МУСОВО-ИЛЛЮВИА́ЛЬНЫЙ - см. Подзол иллювиально-железисто-гумусовый.

1693. ПОДЗО́Л ЖЕЛЕ́ЗИСТО-ГУ́МУСОВЫЙ //iron-humus podzol //podzol humo-ferrugineux //Eisenhumuspodsol - термин западно-европейских школ для подзолов, характеризующихся аккумуляцией гумуса и железа в иллювиальном горизонте при преимущественно накоплении гумуса. Син.: подзол иллювиально-железисто-гумусовый.

1694. ПОДЗО́Л ЖЕЛЕ́ЗИСТО-ГУ́МУСОВЫЙ //ferro-humic podzol //podzol ferro-humique //ferro-humus Podsol - термин канадской школы (1968) для большой группы почв, входящих в порядок подзолистых почв, у которых горизонт В представлен типом B_{fh}, то-есть имеющих иллювиальный горизонт В, в котором основные продукты аккумуляции - это гумус, Fe и Al. В естественном состоянии они имеют лесную подстилку, подстилаемую осветленным горизонтом A_2 (который может быть неразличимым или даже отсутствовать). Верхние 10 см горизонта В содержат более 1% гумуса, а содержание оксалатнорастворимой суммы Fe+Al превышает таковое в горизонте С минимум на 0,8%; отношение гумуса к оксалатнорастворимому Fe менее 20. Горизонт B_h менее 10 см мощностью может лежать выше горизонта B_{hf}, а ниже могут встречаться подгоризонты B_{fh} или B_f.

1695. ПОДЗО́Л ЖЕЛЕ́ЗИСТО-ГУ́МУСОВЫЙ МИ́НИ //mini ferro-humic podzol // podzol ferro-humique mini //mini ferro-humus Podsol (от лат. mini - укорачивать) - термин канадской школы (1968) для подгруппы железисто-гумусовых подзолов, в профиле которых осветленный горизонт A_2 имеет мощность менее 2,5 см или отсутствует вовсе.

1696. ПОДЗО́Л ЖЕЛЕ́ЗИСТО-ГУ́МУСОВЫЙ ОГЛЕ́ЕННЫЙ //gleyed ferro-humic podzol //podzol ferro-humique gleyifié //vergleyter ferro-humus Podsol (от русск. глей) - термин канадской школы (1968)

для почв любой из подгрупп группы железисто-гумусовых подзолов, в профиле которых имеются признаки слабого оглеения.

1697. ПОДЗО́Л ЖЕЛЕ́ЗИСТО-ГУ́МУСОВЫЙ СКА́ЛЬНЫЙ //lithic ferro-humic podzol //podzol ferro-humique lithique //lithischer ferro-humus Podsol (от лат. lithos - камень) - термин канадской школы (1968) для почв любой из подгрупп группы железисто-гумусовых подзолов, в профиле которых имеется плотная порода в пределах 50 см от поверхности.

1698. ПОДЗО́Л ЖЕЛЕ́ЗИСТО-ГУ́МУСОВЫЙ СЛОЕВА́ТЫЙ //placic ferro-humic podzol //podzol ferro-humique placique //plakischer ferro-humus Podsol (от лат. plax - плитка, слой) - термин канадской школы (1968) для подгруппы железисто-гумусовых подзолов, в профиле которых присутствует маломощный слоеватый горизонт, состоящий из нескольких или одной извилистых прослоек тёмно-красного цвета.

1699. ПОДЗО́Л ЖЕЛЕ́ЗИСТО-ГУ́МУСОВЫЙ ТЁМНЫЙ //sombric ferro-humic podzol //podzol ferro-humique sombrique //sombrisher ferro-humus Podsol (от лат. umbra - тень) - термин канадской школы (1968) для подгруппы железисто-гумусовых подзолов, которые в профиле под подстилкой имеют тёмный гумусовый горизонт A_1 и не имеют выраженного осветленного горизонта A_2; горизонт A_1 имеет мощность более 7,5 см, тёмную окраску, pH < 5,5.

1700. ПОДЗО́Л ЖЕЛЕ́ЗИСТО-ГУ́МУСОВЫЙ ТИПИ́ЧНЫЙ //orthic ferro-humic podzol //podzol ferro-humique orthique //orthische ferro-humus Podsol (от гр. orthos - настоящий) - термин канадской школы (1968) для подгруппы железисто-гумусовых подзолов, имеющих в профиле между подстилкой и горизонтом В осветленный горизонт A_2 мощностью более 2,5 см и не имеющих слоеватого горизонта.

1701. ПОДЗО́Л ЖЕЛЕ́ЗИСТО-ИЛЛЮВИА́ЛЬНЫЙ - см. Подзол иллювиально-железистый.

1702. ПОДЗО́Л ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ //iron podzol //podzol ferrugineuse // Eisenpodsol - 1) термин западно-европейских школ для подзолов, преимущественно песчаных, характеризующихся аккумуляцией железа в иллювиальном горизонте. Син.: подзол иллювиально-железистый; 2) термин франц.шк. (1967) для подгруппы подзолов, имеющих железисто-иллювиальный горизонт B_{fe}, и не имеющих определенного гумусо-иллювиального горизонта B_h.

1703. ПОДЗО́Л ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ //ferric podzol //podzol ferrique //ferrischer Podsol (от лат. ferrum - железо) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих сподовый[x)] горизонт B, который во всех подгоризонтах имеет отношение свободного железа к углероду более 6; и не имеющих тонких железистых прослоек в или над сподовым горизонтом B.

1704. ПОДЗО́Л ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ ГИ́ДРОМО́РФНЫЙ //hydromorphic iron podzol // podzol ferrugeneuse hydromorphe //hydromorphischer Eisenpodsol - термин франц.шк. (1967) для подгруппы глеевых подзолов, имеющих конкреционный горизонт B_h с аккумуляцией железа из грунтовых вод.

1705. ПОДЗО́Л ЗАДЕРНЁННЫЙ //sod podzol //podzol gazonné //Rasenpodsol, Rasenpodsolboden - термин немецкой школы для подзолов с дерниной с поверхности.

1706. ПОДЗО́Л ИЛЛЮВИА́ЛЬНО-ГУ́МУСОВО-ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ //humus-iron-illuvial podzol //podzol ferro-humique illuvial //Humuseisenilluvialpodsol - термин для подзолов, преимущественно песчаных, характеризующихся аккумуляцией гумуса и железа в иллювиальном горизонте, при преимущественном накоплении железа. Син.: подзол гумусово-железистый.

1707. ПОДЗО́Л ИЛЛЮВИА́ЛЬНО-ГУ́МУСОВЫЙ //humus-illuvial podzol //podzol humus-illuvial //Humusilluvialpodsol - 1) термин для почв (преимущественно песчаных), характеризующихся аккумуляцией органического вещества в иллювиальном горизонте (западно-европейские и американская школы) и подзолистом горизонте в верхней части профиля (русская школа). Син.: подзол гумусовый; 2) термин М.А.Глазовской (1972) для семейства почв, входящих в генерацию кислых элювиально-иллювиальных почв ассоциации субаэральных кислых ульматно-фульватных почв; син.: подзол альфегумусовый; почва характеризуется профилем A_{OO}-A_O-E_p-B_{hFeAl}-C_{sial}.

1708. ПОДЗО́Л ИЛЛЮВИА́ЛЬНО-ЖЕЛЕ́ЗИСТО-ГУ́МУСОВЫЙ //iron-humus-illuvial podzol //podzol humo-ferrugineux illuvial //Eisenhumusilluvialpodsol - термин для подзолов, преимущественно песчаных, характеризующихся аккумуляцией гумуса и железа в иллювиальном горизонте, при преимущественном накоплении гумуса. Син.: подзол железисто-гумусовый.

1709. ПОДЗО́Л ИЛЛЮВИА́ЛЬНО-ЖЕЛЕ́ЗИСТЫЙ //iron-illuvial podzol //podzol

ferrugineux illuvial //Eisenilluvialpodsol - термин для подзолов, преимущественно песчаных, характеризующихся аккумуляцией железа в иллювиальном горизонте. Син.:подзол железистый.

1710. ПОДЗО́Л КА́РЛИКОВЫЙ //dwarf podzol//podzol nain//Zwergpodsol - 1) термин немецкой школы для микроподзолов; син.:микроподзол; 2) термин русск.шк. для вида собственно подзолистых почв с профилем A_0-A_2-B-C, имеющих сплошной мучнистый белёсый подзолистый горизонт A_2 при малой мощности генетических горизонтов и всего профиля в целом (50-70 см) и резко выраженной дифференциации профиля; 3) общеупотребительный термин для подзолов, имеющих малую мощность генетических горизонтов и всего профиля в целом, измеряемую несколькими сантиметрами.

1711. ПОДЗО́Л МАЛОМО́ЩНЫЙ //shallow podzol//podzol mincé//dünner Podsol - термин русск.шк. для подзолов, у которых мощность горизонта A_2 менее 20 см.

1712. ПОДЗО́Л МО́ЩНЫЙ //deep podzol//podzol profond//tiefer Podsol - термин русск.шк. для подзолов, у которых мощность подзолистого горизонта A_2 составляет 30-50 см.

1713. ПОДЗО́Л ОРТЗА́НДОВЫЙ //ortsand podzol//podzol ortsandique//Ortsandpodsol - термин для песчаных подзолов, имеющий пестрый иллювиальный горизонт в виде отдельных псевдофибр. Син.: подзол слоеватый, подзол псевдофибровый.

1714. ПОДЗО́Л ОРТШТЕ́ЙНОВЫЙ //ironpan podzol//podzol à alios//Ortsteinpodsol - термин франц.шк. (1965) для подгруппы подзолов (см.), имеющих в профиле сильно сцементированный железистый слой, сплошной или крупными блоками.

1715. ПОДЗО́Л-ПА́РАБУРОЗЕМ //podzol-parabraunerde //podzol-parabraunerde //Podsol-Parabraunerde - термин немецкой школы для почв, переходных между подзолом и парабуроземом.

1716. ПОДЗО́Л-ПСЕ́ВДОФИ́БРОВЫЙ //pseudofibrous podzol//podzol pseudofibreuse //pseudo-faseriger Podsol - устаревший термин для песчаных подзолов с тонкослоистым иллювиальным горизонтом в виде отдельных псевдофибр. Син.: подзол слоеватый, подзол ортзандовый.

1717. ПОДЗО́Л СВЕРХМО́ЩНЫЙ //super-deep podzol //podzol super-profond //übertiefer Podsol - термин русск.шк. для подзолов, имеющих подзолистый горизонт A_2 мощностью более 50 см.

1718. ПОДЗО́Л СЛА́БО РА́ЗВИТЫЙ //leptic podzol //podzol leptique // leptischer Podsol (от гр. leptos - мелкий, слабый) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих в профиле сподовый[x)] горизонт B, а горизонт A_2 очень тонкий, либо прерывистый, либо полностью морфологически не выраженный (в естественном состоянии под лесом). Этот термин включает в себя понятия бурых подзолов и бурых подзолистых почв Северной Европы и С.Америки и до некоторой степени понятие крипто-подзолов французской школы.

1719. ПОДЗО́Л СЛА́БО РА́ЗВИТЫЙ //feebly developed podzol //podzol faiblement développe //schwach entwickelter Podsol - термин западно-европейских школ для подзолистых почв, имеющих в профиле очень тонкий или представленный отдельными пятнами подзолистый горизонт A_2.

1720. ПОДЗО́Л СЛОЕВА́ТЫЙ //banded podzol, bandy podzol //podzol en bandes //Bändchenpodsol - термин немецкой школы для подзолов с тонкослоистым иллювиальным горизонтом в виде псевдофибр. Син.: подзол псевдофибровый, подзол ортзандовый.

1721. ПОДЗО́Л СЛОЕВА́ТЫЙ //placic podzol //podzol placique //plakischer Podsol (от гр. plax - плоский камень) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих сподовый[x)] горизонт B и тонкие железистые прослои в или над сподовым горизонтом B; эти почвы могут обнаруживать признаки сезонного переувлажнения.

1722. ПОДЗО́Л СРЕДНЕМО́ЩНЫЙ //semi-deep podzol //podzol semi-profond //halbtiefer Podsol - термин русск.шк. для подзолов, у которых мощность подзолистого горизонта A_2 составляет 20-30 см.

1723. ПОДЗО́Л ТИПИ́ЧНЫЙ //orthic podzol //podzol orthique //orthischer Podsol (от гр. orthos - настоящий) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих сподовый[x)] горизонт B, который имеет отношение свободного железа к углероду 6 или меньше; не имеющих подгоризонтов, содержащих диспергированное органическое вещество и алюминий и содержащих не достаточно железа для покраснения почвы при прокаливании; не имеющих тонких железистых прослоек в или над сподовым горизонтом B.

1724. ПОДЗО́Л ТОРФЯ́НИСТЫЙ //peaty podzol //podzol tourbeux //Anmoorpodsol - термин русск.шк. для подзолистых почв, имеющих с поверхности торфянистый горизонт, непосредственно подстилаемый подзолистым горизонтом A_2; син.: торфянисто-подзолистая почва.

1725. ПОДЗО́Л ТОРФЯ́НИСТЫЙ КА́РЛИКОВЫЙ //dwarf peaty podzol //podzol tourbeux nain //Anmoorzwergpodsol - термин русск.шк. для торфянистых подзолов, имеющих полно развитый, но маломощный профиль при незначительной мощности всех генетических горизонтов.

1726. ПОДЗО́Л ТОРФЯ́НИСТЫЙ МАЛОМО́ЩНЫЙ //shallow peaty podzol //podzol tourbeux mincé //dünner Anmoorpodsol - термин русск.шк. для торфянистых подзолов, имеющих подзолистый горизонт A_2 мощностью менее 20 см.

1727. ПОДЗО́Л ТОРФЯ́НИСТЫЙ МО́ЩНЫЙ //deep peaty podzol //podzol tourbeux profond //tiefer Anmoorpodsol - термин русск.шк. для торфянистых подзолов, имеющих подзолистый горизонт A_2 мощностью 30-50 см.

1728. ПОДЗО́Л ТОРФЯ́НИСТЫЙ СВЕ́РХМО́ЩНЫЙ //super-deep peaty podzol // podzol tourbeux super-profond //übertiefer Anmoorpodsol - термин русск.шк. для торфянистых подзолов, имеющих подзолистый горизонт A_2 мощностью более 50 см.

1729. ПОДЗО́Л ТОРФЯ́НИСТЫЙ СРЕДНЕМО́ЩНЫЙ //semi-deep peaty podzol // podzol tourbeux semi-profond //halbtiefer Anmoorpodsol - термин русск.шк. для торфянистых подзолов, имеющих подзолистый горизонт A_2 мощностью 20-30 см.

1730. ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //podzolic soil //sol podzolique //Podsolboden, podsoliger Boden (от русск. подзол - производное от цвета древесной золы) - русский народный термин, введённый в научный обиход В.В.Докучаевым и получивший в почвенной литературе ряд различных толкований: 1) термин русск.шк. для типа почв таежно-лесной зоны бореального пояса, включающего подтипы глееподзолистых (см.), собственно подзолистых и дерново-подзолистых почв и характеризующихся дифференциацией профиля на элювиальную и иллювиальную части в результате процесса оподзоливания, т.е. разрушения минеральной части при участии кислого фульфатного гумуса в верхней части профиля с образованием подзолистого горизонта A_2, перемещения вниз с нисходящим током воды продуктов этого разрушения и отложения их в нижней части профиля с образованием иллювиального горизонта B; 2) термин русск.шк. для подтипа подзолистых почв, т.е. для собственно подзолистых почв, не имеющих в верхней части профиля минерального гумусоаккумулятивного горизонта A_1 и харак-

теризующихся профилем A_0-A_2-B-C; 3) общеупотребительный термин для всей сборной группы почв, включая подзолисто-болотные почвы, имеющих подзолистый горизонт A_2 в верхней части профиля при резко выраженной дифференциации профиля на элювиальную и иллювиальную части; 4) общеупотребительный устаревший термин для всех почв лесной зоны бореального пояса, имеющих дифференцированный профиль, включая почвы без подзолистого горизонта A_2; 5) термин франц.шк. (1965,1967) для группы почв, входящих в подкласс оподзоленных почв умеренного климата, имеющих профиль A_0-A_1-A_2-B-C, в котором горизонт A_2 хорошо развит, но не пепельный, что отличает их от подзолов; у них отсутствует настоящий гумусо-иллювиальный горизонт B_h (возможен зародышевый), а горизонт B представлен B_{fe}, содержащим более 1% гумуса с отношением C:N более 14, причем в горизонте B гумуса больше, чем в A_2; горизонт B имеет микроструктуру, характерную для класса оподзоленных почв; 6) термин канадск.шк. (1968) для порядка почв, которые имеют в своём профиле "подзолистый" горизонт B, состоящий из одного или более видов B_h, B_{hf}, B_{fh}, B_f (горизонт, аналогичный сподовому[x]) горизонту американской школы), в котором основным продуктом аккумуляции является органическое в-во (преимущественно, фульвокислоты), связанное в разной степени с Fe и Al; почвы кислые (обычно с pH < 5,5) и имеют высокую зависимую от pH емкость обмена катионов в горизонте B (обычно более 8 мэкв/100 г; почвы формируются под хвойными и смешанными лесами или под травянистой растительностью в холодных и умеренных климатах на кислых почвообразующих породах; в естественном состоянии почвы имеют грубогумусную подстилку (типа мор или модер), могут иметь или не иметь под подстилкой гумусовый горизонт A_1, обычно имеют осветленный элювиальный горизонт A_2, но последний может отсутствовать или не выделяться морфологически.

1731. ПОДЗО́ЛИСТАЯ А́НТРОПОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //anthropomorphic podzolic soil //sol podzolique anthropomorphe //anthropomorphischer Podsolboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы подзолистых почв, в профиле которых горизонт A_2 замаскирован созданным вспашкой пахотным горизонтом светлобуроватой или серой окраски, а горизонт B остаётся чистым, но часто раздробленным; гумус в типичном случае становится моллевым.

1732. ПОДЗО́ЛИСТАЯ ГИДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //hydromorphic podzolic soil

//sol podzolique hydromorphé //hydromorpher podsoliger Boden - термин для подзолистых почв, имеющих ясные признаки избыточного увлажнения в нижней части профиля, обычно в виде глеевого горизонта. Син.: подзолисто-болотная почва, подзолисто-глеевая почва.

1733. ПОДЗО́ЛИСТАЯ ГЛУБОКО́ ГИ́ДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //deeply hydromorphic podzolic soil //sol podzolique à hydromorphie profonde // tiefer hydromorphischer Podsolboden - термин франц.шк.(1967) для подгруппы подзолистых почв, в профиле которых под горизонтом B лежит глеевый G или псевдоглеевый B_g горизонт; признаки оглеения могут быть и в горизонте B.

1734. ПОДЗО́ЛИСТАЯ ГУМУСИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //humified podzolic soil // sol podzolique humifére //Humuspodsolboden - термин франц.шк. (1965) для подгруппы подзолистых почв, отличающихся повышенной аккумуляцией гумуса в верхней части профиля.

1735. ПОДЗО́ЛИСТАЯ КА́РЛИКОВАЯ ПО́ЧВА //dwarf podzolic soil //sol podzolique nain //Zwergpodsolboden - термин русск.шк. для подтипа подзолистых почв теплой западно-европейской фации, формирующихся под среднетаёжными хвойными мохово-кустарничковыми лесами и характеризующихся малой мощностью генетических горизонтов и всего профиля (50-70 см и менее) при чётком расчленении на генетические горизонты.

1736. ПОДЗО́ЛИСТАЯ КОНТА́КТНО-ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //contactly gleyic podzolic soil //sol podzolique à gley contact //berührunggleyischer Podsolboden - термин русск.шк. (1967) для рода подзолистых почв, развитых на двучленных породах и имеющих на контакте пород в профиле оглеенный горизонт, иногда сливающийся в единый горизонт с подзолистым.

1737. ПОДЗО́ЛИСТАЯ КОНТА́КТНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА - см. Подзолистая контактно-глееватая п.

1738. ПОДЗО́ЛИСТАЯ ЖЕЛЕЗИ́СТАЯ ПО́ЧВА //ferrugenious podzolic soil //sol podzolique ferrugineuse //eisenhaltiger Podsolboden - термин франц.шк. (1965) для подгруппы подзолистых почв, в нижней части профиля которых имеет место повышенная аккумуляция железа.

1739. ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПСЕВДОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //pseudogleyic podzolic soil //sol podzolique à pseudogley //pseudogleyischer Podsolboden - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы подзолистых почв,

в профиле которых под осветленным горизонтом A_2 лежит псевдоглеевый горизонт B_g, а горизонт В подзолистого типа отсутствует.

1740. ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПОВЕ́РХНОСТНО-ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //surfacely gleyed podzolic soil //sol podzolique a gley superficiel //Oberflachengley Podsolboden - подзолистая почва со следами оглеения в виде сизых и ржавых пятен в горизонтах A_1 или A_2.

1741. ПОДЗО́ЛИСТАЯ СТА́ГНОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //stagnogleyic podzolic soil //sol podzolique à stagnogley //stagnogleyischer Podsolboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы подзолистых почв, распространенных в горных районах с повышенным количеством осадков и в условиях избыточного увлажнения в течение большей части года; профиль A_0A_2G,B,C; горизонт G лежит на горизонте В, имеет белёсо-сизую окраску и содержит закисное железо; горизонт В ржавой окраски.

1742. ПОДЗО́ЛИСТАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical podzolic soil //sol podzolique modal //typischer Podsolboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы подзолистых почв, не имеющих в профиле горизонта глея, псевдоглея или стагноглея и имеющих профиль, не измененный земледелием.

1743. ПОДЗО́ЛИСТО-БОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА //hydromorphic podzolic soil //sol podzolique hydromorphé //hydromorpher podsoliger Boden - сборный термин для подзолистых почв, формирующихся в условиях избыточного грунтового увлажнения и образующих ряд переходов между подзолистыми и болотными почвами; син.: подзо[illegible] гидроморфная почва, подзолисто-глеевая почва.

1744. ПОДЗО́ЛИСТО-БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //podzolic-brown forest soil //sol podzolique-brun forestier //Podsolbraunwaldboden - термин русск.шк. для типа почв, формирующихся под широколиственными и хвойношироколиственными лесами в условиях затрудненного дренажа и характеризующихся четким расчленением профиля по подзолистому типу при слабом сезонном поверхностном оглеении; профиль почвы имеет строение A_0-A_1-AA_2-B-C

1745. ПОДЗО́ЛИСТО-БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //gley podzolic-brown forest soil //sol podzolique-brun forestier à gley //Gleypodsolbraunwaldboden - термин русск.шк. для типа подзолисто-бурых лесных почв с сильно оглеенным горизонтом в профиле.

1746. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНАЯ ПО́ЧВА //podzolic-zheltozemic soil // sol podzolique-jeltozemique //Podsolsheltosemboden - термин русск.шк. (1967) для типа влажносубтропических почв с сильно дифференцированным по илу и R_2O_3 профилем (коэффициент дифференциации ила более 2,0), имеющих в верхней части профиля сплошной белёсый горизонт и мощный иллювиальный горизонт в средней части при яркой желтой окраске нижней части профиля; син.: субтропическая подзолистая п., желтоземно-подзолистая п., желто-подзолистая п.

1747. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНАЯ ГА́ЛЕЧНИКОВАЯ ПО́ЧВА //shinglic podzolic-zheltozemic soil //sol podzolique-jeltozemique galetique //Geröllpodsolsheltosemboden - термин русск.шк. (1967) для рода подзолисто-желтозёмных почв, формирующихся на суглинках и глинах, подстилаемых не глубже 1-1,5 м галечниковым наносом.

1748. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНАЯ ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //gleyic podzolic-zheltozemic soil //sol podzolique-jeltozemique gleyique // gleyischer Podsolsheltosemboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа подзолисто-желтозёмно-глеевых почв, имеющих слабое оглеение в нижней части профиля.

1749. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНАЯ ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //gley podzolic-zheltozemic soil //sol podzolique-jeltozemique à gley //Podzolsheltosemgleyboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа подзолисто-желтозёмно-глеевых почв, имеющих сильное оглеение в нижней части профиля и слабое - выше.

1750. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНАЯ ГЛУБОКОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //deep podzolized podzolic-zheltozemic soil //sol podzolique-jeltozemique podzolisé profond //tiefer podsolierter Podsolsheltosemboden - термин русск.шк. (1967) для вида подзолисто-желтозёмных почв с глубиной нижней границы оподзоленного горизонта глубже 50 см.

1751. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНАЯ КОНКРЕЦИО́ННАЯ ПО́ЧВА //concretionary podzolic-zheltozemic soil //sol podzolique-jeltozemique à concrétions //Konkretionspodsolsheltosemboden - термин русск.шк. (1967) для рода подзолисто-желтозёмных почв, содержащих в одном или нескольких горизонтах профиля (не глубже 150 см) конкреции железа от 20 до 50% от массы почвы.

1752. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНАЯ КОНТА́КТНО-ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //contactly

gleyic podzolic-zheltozemic soil //sol podzolique-jeltozemique à gley contact //berührungschwachgley Podsolsheltosemboden - термин русск.шк. (1967) для рода подзолисто-желтозёмных почв, формирующихся на неоднородных по механическому составу породах и имеющих в профиле оглеение на контакте разных пород.

1753. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНАЯ МЕ́ЛКООПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //shallow podzolized podzolic-zheltozemic soil //sol podzolique-jeltozemique podzolisé mincé //dünnerpodsolierter Podsolsheltosemboden - термин русск.шк. (1967) для вида подзолисто-желтозёмных почв с глубиной нижней границы оподзоленного горизонта выше 25 см.

1754. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНАЯ НЕГЛУБОКООПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //non-deep podzolized podzolic-zheltozemic soil //sol podzolique-jeltozemique podzolisé non-profond //nicht tiefer podsolierter Podsolsheltosemboden - термин русск.шк. (1967) для вида подзолисто-желтозёмных почв с глубиной нижней границы оподзоленного горизонта от 25 до 50 см.

1755. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНАЯ НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА //unsaturated podzolic-zheltozemic soil //sol podzolique-jeltozemique non-saturé //ungesättigter Podsolsheltosemboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа подзолисто-желтозёмных почв, имеющих степень насыщенности основаниями менее 80%.

1756. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНАЯ ОБЫ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //ordinary podzolic-zheltozemic soil //sol podzolique-jeltozemique ordinaire // gewöhnlicher Podsolsheltosemboden - термин русск.шк. (1967) для рода подзолисто-желтозёмных почв, формирующихся на суглинистых и глинистых однородных почвообразующих породах.

1757. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНАЯ ОСТА́ТОЧНО-ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА //residually meadow podzolic-zheltozemic soil //sol podzolique-jeltozemique à nappe phréatique residuel //restwiesen Podsolsheltosemboden - термин русск.шк. (1967) для рода подзолисто-желтозёмных почв с остаточными признаками прошлого гидроморфизма (глубокая гумусовая прокраска, следы древнего оглеения, ржавые примазки, пятнистость).

1758. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНАЯ ОСТА́ТОЧНО-ЛУГОВА́Я ОРТШТЕ́ЙНОВАЯ ПО́ЧВА //ortstein residually meadow podzolic-zheltozemic soil //sol ortstein podzolique-jeltozemique à nappe phréatique residuel //restwiesen Ortsteinpodsolsheltosemboden - термин русск.шк.

(1967) для рода подзолисто-желтозёмных почв с наличием в одном или нескольких горизонтах профиля больших скоплений (более 50% от массы горизонта) ортштейнов, которые, местами сливаясь, образуют прочные железистые плиты.

1759. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНАЯ ПОВЕ́РХНОСТНО-ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //surfacely gleyic podzolic-zheltozemic soil //sol podzolique-jeltozemique gleyique superficiel //oberflachen gleyisher Podzolsheltosemboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа подзолисто-желтозёмно-глеевых почв, имеющих оглеение в верхней части профиля вследствие поверхностного переувлажнения.

1760. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНАЯ СЛА́БОНЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА //slightly unsaturated podzolic-zheltozemic soil //sol podzolique-jeltozemique peu non-saturé //schwach ungesättigter Podsolsheltosemboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа подзолисто-желтозёмных почв, имеющих степень насыщенности основаниями более 80, но менее 100%.

1761. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //podzolic-zheltozemic-gley soil //sol podzolique-jeltozemique à gley//Podsolsheltosemgleyboden - термин русск.шк. (1967) для типа гидроморфных субтропических почв, формирующихся в условиях избыточного поверхностного или грунтового увлажнения среди подзолисто-желтоземных почв; син.: подзолисто-охристо-глеевая п., субтропическая подзолисто-глеевая п., субтропическая подзолисто-болотная п., желтозёмно-подзолисто-глеевая п.

1762. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ГА́ЛЕЧНИКОВАЯ ПО́ЧВА //shinglic podzolic-zheltozemic-gley soil //sol podzolique-jeltozemique galetique à gley //Geröllpodsolsheltosemgleyboden - термин русск.шк. (1967) для рода подзолисто-желтозёмно-глеевых почв, формирующихся на суглинках и глинах, подстилаемых галечником на глубине 1-1,5 м.

1763. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ГЛУБОКОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА // deep podzolized podzolic-zheltozem-gley soil //sol podzolique-jeltozemique podzolisé profond à gley //tiefer podsolierter Podsolsheltosemgleyboden - термин русск.шк. (1967) для вида подзолисто-желтозёмно-глеевых почв с глубиной нижней границы подзолистого горизонта более 50 см.

1764. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ГЛУБОКООРТШТЕ́ЙНОВАЯ ПО́ЧВА // deep ortsteinic podzolic-zheltozemic-gley soil //sol podzo-

lique-jeltozemique à gley à ortstein profond //tiefer Ortsteinpodsolsheltosemgleyboden - термин русск.шк. (1967) для вида подзолисто-желтозёмно-глеевых почв с глубиной верхней границы ортштейнового горизонта 70-150 см.

1765. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНО-ГЛЕ́ЕВАЯ КОНКРЕЦИО́ННАЯ ПО́ЧВА //concretionary podzolic-zheltozemic-gley soil //sol podzolique-jeltozemique à concrétions à gley //Konkretionspodsolsheltosemgleyboden - термин русск.шк. (1967) для рода подзолисто-желтозёмно-глеевых почв, содержащих в одном из горизонтов не глубже 150 см конкреции в количестве от 20 до 50% почвенной массы.

1766. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНО-ГЛЕ́ЕВАЯ МЕ́ЛКОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //shallow podzolized podzolic-zheltozemic-gley soil//sol podzolique-jeltozemique podzolisé mincé à gley //dünner podsolierter Podsolsheltosemgleyboden - термин русск.шк. (1967) для вида подзолисто-желтозёмно-глеевых почв с нижней границей подзолистого горизонта выше 25 см.

1767. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНО-ГЛЕ́ЕВАЯ НЕГЛУБОКОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //non-deep podzolized podzolic-zheltozemic-gley soil //sol podzolique-jeltozemique podzolisé non-profond à gley //nichttiefer podsolierter Podsolsheltosemgleyboden - термин русск.шк. (1967) для вида подзолисто-желтозёмно-глеевых почв с глубиной нижней границы подзолистого горизонта 25-50 см.

1768. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ОБЫ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //ordinary podzolic-zheltozemic-gley soil //sol podzolique-jeltozemique ordinaire à gley //gewöhnlicher Podsolsheltosemgleyboden - термин русск.шк. (1967) для рода подзолисто-желтозёмно-глеевых почв, формирующихся на бескарбонатных мелкозёмистых породах.

1769. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ОРТШТЕ́ЙНОВАЯ ПО́ЧВА //ortstein podzolic-zheltozemic-gley soil //sol podzolique-jeltozemique à gley à ortstein //Ortsteinpodsolsheltosemgleyboden - 1) термин русск.шк. (1967) для рода подзолисто-желтозёмно-глеевых почв, имеющих в профиле большие (более 50% массы почвы) скопления ортштейнов, местами сливающихся и образующих плотные железистые плиты; 2) термин русск.шк. (1967) для вида подзолисто-желтозёмно-глеевых ортштейновых почв с глубиной верхней границы ортштейнового горизонта 30-70 см.

1770. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ОСТА́ТОЧНО-КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //

residually calcaric podzolic-zheltozemic-gley soil //sol podzolique-jeltozemique calcaire residuel a gley //restkalkischer Podsolsheltosemgleyboden - термин русск.шк. (1967) для рода подзолисто-желтозёмно-глеевых почв, формирующихся на карбонатных породах.

1771. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПОВЕ́РХНОСТНО-ОРТШТЕ́ЙНОВАЯ ПО́ЧВА //surfacely ortsteinic podzolic-zheltozemic-gley soil //sol podzolique-jeltozemique à gley à ortstein superficiel //dünner Ortsteinpodsolsheltosemgleyboden - термин русск.шк. (1967) для вида подзолисто-желтозёмно-глеевых почв с глубиной верхней границы ортштейнового горизонта менее 30 см.

1772. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНО-ГЛЕ́ЕВАЯ РЫ́ХЛООРТШТЕ́ЙНОВАЯ ПО́ЧВА //friable ortsteinic podzolic-zheltozemic-gley soil //sol podzolique-jeltozemique à gley à ortstein divisé //lockerortsteinhaltig Podsolsheltosemgleyboden - термин русск.шк. (1967) для вида подзолисто-желтозёмно-глеевых ортштейновых почв, отдельные конкреции в ортштейновом горизонте которых не образуют сплошной плиты, а рассеяны в массе почвы.

1773. ПОДЗО́ЛИСТО-ЖЕЛТОЗЁМНО-ГЛЕ́ЕВАЯ СЛИ́ТНООРТШТЕ́ЙНОВАЯ ПО́ЧВА //compact ortsteinic podzolic-zheltozemic-gley soil //sol podzolique-jeltozemique à gley à ortstein compact //kompakter ortsteinhaltig Podsolsheltosemgleyboden - термин русск.шк. (1967) для вида подзолисто-желтозёмно-глеевых ортштейновых почв, ортштейновый горизонт которых представлен сплошной цементированной плитой.

1774. ПОДЗО́ЛИСТО-О́ХРИСТО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //podzolic-ochre-gley soil //sol ocre-podzolique à gley //Podsolockergleyboden - устаревший термин С.А.Захарова для подзолисто-желтозёмно-глеевых почв (см.).

1775. ПОДЗО́ЛИСТО-ТЕМНОЦВЕ́ТНАЯ ПО́ЧВА //podzolic dark-coloured soil, podzolic fuscous soil //sol podzolique foncé //Dunkelpodsolboden - термин М.М.Филатова для подзолистых и дерново-подзолистых почв с темноокрашенным вторым гумусовым горизонтом, располагающимся в профиле под подзолистым горизонтом A_2 и формирующимся под воздействием жестких грунтовых вод.

1776. ПОДЗО́ЛОЗЁМ //podzolozem //podzolozem //Podsolosem (от русск. зола и земля) - термин М.А.Глазовской (1972), данный для группы элювизёмно-подзолистых почв (см.).

1777. ПО́ДЗОЛЮВИСО́ЛЬ //podzoluvisol //podzoluvisol //Podsoluvisol (от русск. подзол, лат. luo - вымывать и лат. solum - почва) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, переходных между подзолами и лювисолями, то-есть соответствующих понятию дерново-подзолистых и подзолистых почв русской школы. Для этих почв характерны светлый[x)], темный[x)] или торфяный[x)] (менее 30 см) горизонт А, подзолистый белёсый горизонт A_2 и горизонт В, объединяющий в себе свойства аргиллового[x)] и сподового[x)] горизонтов.

1778. ПО́ДЗОЛЮВИСО́ЛЬ БЕ́ДНАЯ //dystric podzoluvisol //podzoluvisol dystrique //dystrischer Podsoluvisol (от гр. dystrophic - бесплодный) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для подзолювисолей (см.), имеющих степень насыщенности основаниями менее 50% в горизонте В.

1779. ПО́ДЗОЛЮВИСО́ЛЬ БОГА́ТАЯ //eutric podzoluvisol //podzoluvisol eutrique //eutrischer Podsoluvisol (от гр. eutrophic - плодородный) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для подзолювисолей (см.), имеющих степень насыщенности основаниями более 50% в горизонте В.

1780. ПО́ДЗОЛЮВИСО́ЛЬ ГЛЕ́ЕВАЯ //gleyic podzoluvisol //podzoluvisol gleyique //gleyischer Podsoluvisol (от русск. глей) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для подзолювисолей (см.), имеющих глеевый[x)] горизонт в нижней части профиля.

1781. ПО́ДЗОЛЮВИСО́ЛЬ ЭПИГЛЕ́ЕВАЯ //epigleyic podzoluvisol //podzoluvisol epigleyique //epigleyischer Poodsoluvisol (от гр. epi - на и русск. глей) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для подзолювисолей (см.), имеющих признаки переувлажнения и оглеение в поверхностных горизонтах за счет атмосферного переувлажнения.

1782. ПО́ДОВАЯ ПО́ЧВА (от русск. под - степное блюдце вытянутой формы) - см. Луговая почва.

1783. ПОДПО́ЧВА //bottom soil, sub-soil //sous-sol //Unterboden - часто используемый термин, не имеющий строгого содержания, и относящийся у разных авторов либо к нижним горизонтам почвы (В и С), либо к материнской (С), либо к подстилающей (D) породе, либо к зоне аэрации до уровня грунтовых вод.

1784. ПОДСТИ́ЛКА //litter, leaf litter //couverture morte, couverture du sol //Bodenstreu, Streuschicht - общеупотребительный

термин для слоя мертвого органического вещества, не разложившегося или слабо разложившегося, образующегося в результате накопления растительного опада на поверхности почвы и составляющего генетический почвенный горизонт A_0; верхняя часть подстилки представлена свежим или слабо разложившимся растительным опадом, а нижняя - сильно минерализованными органическими остатками, частично перемешанными с минеральной почвой в результате жизнедеятельности почвенной фауны.

1785. ПОДСТИ́ЛКА ЛЕСНА́Я //forest leaf litter, leaf litter, litter // litiére forestière, couverture morte, couverture du sol // Waldstreu, Bodenstreu, Streuschicht - общеупотребительный термин для слоя мертвого органического вещества на поверхности лесных почв, состоящего из неразложившегося или слабо разложившегося лесного опада и составляющего горизонт A_0 лесных почв.

1786. ПО́ЙМЕННАЯ ПО́ЧВА //flooding soil, alluvial soil //sol d'inondation, sol alluvial //Auenboden, Schwemmlandboden - термин для сборной группы почв, формирующихся в условиях ежегодного затопления в поймах рек на свежеотложенных наносах. Син.: аллювиальная почва, наносная почва.

1787. ПО́ЙМЕННАЯ БОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА //swamp alluvial soil, back swamp soil //sol marécageux alluvial, sol marais des fonds de vallée //Auesumpboden, Mooralluvialboden - термин русск.шк. (1967) для типа болотных почв пойм, формирующихся в условиях затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми и поверхностными водами; выделяются под одним и тем же названием два самостоятельных типа почв: 1) пойменная болотная почва (лесной зоны) и 2) пойменная болотная почва (степей).

1788. ПО́ЙМЕННАЯ БОЛО́ТНАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //calcareous swamp alluvial soil //sol marécageux alluvial calcaire //Moorkalkalluvialboden - термин русск.шк. (1967) для рода пойменных болотных почв, имеющих слой гидрогенной аккумуляции карбонатов в профиле.

1789. ПО́ЙМЕННАЯ БОЛО́ТНАЯ НАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА //saturated swamp alluvial soil //sol marécageux alluvial saturée //gesättigter Mooralluvialboden - термин русск.шк. (1967) для рода пойменных болотных почв, имеющих степень насыщенности основаниями более 70-80%.

1790. ПО́ЙМЕННАЯ БОЛО́ТНАЯ НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА //unsaturated swamp alluvial soil //sol marécageux alluvial desaturée //nichtgesättigter Mooralluvialboden - термин русск.шк. (1967) для рода пойменных болотных почв, имеющих степень насыщенности основаниями менее 70-80%.

1791. ПО́ЙМЕННАЯ БОЛО́ТНАЯ ОРУДЕНЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА //limonitized swamp alluvial soil //sol marécageux alluvial limonitée //Sumpferzalluvialboden - термин русск.шк. (1967) для рода пойменных болотных почв, содержащих слой аккумуляции гидрогенного железа в профиле.

1792. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я ПО́ЧВА //wet meadow alluvial soil // sol mouillé de prairie humide alluvial //Auennasswiesenboden - 1) термин русск.шк. (1967) для типа пойменных почв пониженных участков низкой, центральной и высокой поймы с грунтовыми водами ближе 2 м, подвергающихся ежегодному длительному затоплению паводковыми водами и имеющих выпотной, периодически промывной водный режим; они характеризуются высокой гумусированностью и оглеенностью по всему профилю; 2) термин русск. шк. (1967) для подтипа пойменных влажнолуговых почв, характеризующихся слабо выраженной или невыраженной слоистостью почвообразующего аллювия, особенно в верхней части профиля, образованием на глинистом, часто иловатом аллювии, четким оглеением во всём профиле.

1793. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я ВЫСОКОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //high humic wet meadow alluvial soil //sol riche en humus mouillé de prairie humide alluvial //humusreich Auennasswiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных влажнолуговых почв, содержащих более 9% гумуса в горизонте A_1.

1794. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я ЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА //saliniferous wet meadow alluvial soil //sol salifére mouillé de prairie humide alluvial //salzhaltig Auennasswiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода пойменных влажнолуговых почв, содержащих в профиле легкорастворимые соли без поверхностного солевого максимума.

1795. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //calcaric wet meadow alluvial soil //sol calcaire mouillé de prairie humide alluvial //kalkarischer Auennasswiesenboden - термин русск. шк. (1967) для рода пойменных влажнолуговых почв, вскипающих

с поверхности или в пределах гумусового горизонта.

1796. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я МА́ЛОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //low humic wet meadow alluvial soil //sol peu humifére mouillé de prairie humide alluvial //humusarmer Auennasswiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных влажнолуговых почв, содержащих 4-7% гумуса в горизонте A_1.

1797. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я МА́ЛОМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //shallow wet meadow alluvial soil //sol mincé mouillé de prairie humide alluvial //dünner Auennasswiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных влажнолуговых почв с мощностью гумусового горизонта 20-40 см.

1798. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я МА́ЛОМО́ЩНАЯ УКОРО́ЧЕННАЯ ПО́ЧВА //shortened shallow wet meadow alluvial soil //sol plus mincé mouillé de prairie humide alluvial //verkürzener dünner Auennasswiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных влажнолуговых почв с мощностью гумусового горизонта менее 20 см.

1799. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //deep wet meadow alluvial soil //sol profond mouillé de prairie humide alluvial //tiefer Auennasswiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных влажнолуговых почв с мощностью гумусового горизонта 80-120 см.

1800. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я СВЕ́РХМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //super-deep wet meadow alluvial soil //sol super-profond mouillé de prairie humide alluvial //super-tiefer Auennasswiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных влажнолуговых почв с мощностью гумусового горизонта более 120 см.

1801. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я СЛА́БОГУМУСИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //weakly humusified wet meadow alluvial soil //sol plus peu humifére mouillé de prairie humide alluvial //schwach humushaltig Auennasswiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных влажнолуговых почв, содержащих 2-4% гумуса в горизонте A_1.

1802. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА //weakly developed wet meadow alluvial soil //sol peu évolué mouillé de prairie humide alluvial //unreifer Auennasswiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных влажнолуговых почв, содержащих менее 2% гумуса в горизонте A_1.

1803. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я СЛИТА́Я ПО́ЧВА //compact wet meadow alluvial soil //sol compact mouillé de prairie humide alluvial //kompakter Auennasswiesenboden- термин русск.шк. (1967) для рода пойменных влажнолуговых почв, характеризующихся слитостью всего профиля при максимуме уплотнения в горизонте В.

1804. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я СЛОИ́СТАЯ ПО́ЧВА //stratified wet meadow alluvial soil //sol stratifié mouillé de prairie humide alluvial //geschichteter Auennasswiesenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных влажнолуговых почв, характеризующихся четкой слоистостью почвообразующего аллювия при супесчано-суглинистом механическом составе, неустойчивым по годам режимом затопления, неравномерностью гумусированности и оглеения по профилю.

1805. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я СЛОИ́СТАЯ СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА //weakly developed stratified wet meadow alluvial soil //sol stratifié peu évolué mouillé de prairie humide alluvial //geschichteter unreifer Auennasswiesenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных влажнолуговых почв, характеризующихся сильной слоистостью почвообразующего аллювия и прерывистостью слабого гумусонакопления, формирующихся на лёгком грубом аллювии.

1806. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //solonetzic wet meadow alluvial soil //sol solonetzoide mouillé de prairie humide alluvial //solonetzartiger Auennasswiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода пойменных влажнолуговых почв, имеющих в нижней части гумусового горизонта уплотненный грубоструктурный подгоризонт с содержанием обменного натрия более 5% от емкости поглощения.

1807. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я СРЕ́ДНЕГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //moderate humic wet meadow alluvial soil //sol moderée en humus mouillé de prairie humide alluvial //mässighumus Auennasswiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных влажнолуговых почв, содержащих 7-9% гумуса в горизонте A_1.

1808. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я СРЕ́ДНЕМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //medium deep wet meadow alluvial soil //sol semi-profond mouillé de prairie humide alluvial //halbtiefer Auennasswiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных влажнолуговых почв с мощностью гумусового горизонта 40-80 см.

1809. ПО́ЙМЕННАЯ ВЛА́ЖНОЛУГОВА́Я ТЕМНОЦВЕ́ТНАЯ ПО́ЧВА //fuscous wet mea-

dow alluvial soil //sol foncé mouillé de prairie humide alluvial //dunkelfarbiger Auennasswiesenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных влажнолуговых почв, характеризующихся неустойчивым по годам режимом затопления, значительной гумусированностью и растянутостью гумусового профиля, общей замазанностью и сизоватостью всех горизонтов, общим вскипанием без выделения карбонатов.

1810. ПО́ЙМЕННАЯ ДЕРНО́ВАЯ ПО́ЧВА //sod alluvial soil //sol gazonné alluvial //Rasenalluvialboden - термин для пойменных почв с профилем АС или АВС, используемый разными авторами в разном значении: 1) термин Г.В.Добровольского для пойменных почв прирусловой части поймы, имеющих только атмосферное увлажнение в меженный период, формирующихся на наиболее легком, преимущественно песчаном аллювии; 2) термин русск.шк. (1967) для типа пойменных почв прирусловой и центральной поймы, формирующихся в условиях интенсивного аллювиального процесса под разнотравными лугами, кустарниками и лесами.

1811. ПО́ЙМЕННАЯ ДЕРНО́ВАЯ ПО́ЧВА (ЦЕНТРА́ЛЬНОЙ ПО́ЙМЫ) //sod alluvial soil (of central floodland) //sol gazonné alluvial (de terrain inondable centrale)//Rasenalluvialboden (der zentraler Überschwemmungsgebiet) - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных дерновых почв положительных элементов рельефа центральной поймы, формирующихся на неслоистом или слабо слоистом аллювии различного механического состава под злаковыми лугами и пойменными лесами и характеризующихся высокой гумусированностью, слабо кислой реакцией, мощным гумусовым горизонтом комковато-зернистой структуры.

1812. ПО́ЙМЕННАЯ ДЕРНО́ВАЯ КИ́СЛАЯ ПО́ЧВА //acid sod alluvial soil //sol gazonné alluvial acide //saurer Rasenalluvialboden - термин русск.шк. (1967) для рода пойменных дерновых почв, имеющих степень насыщенности основаниями менее 75%.

1813. ПО́ЙМЕННАЯ ДЕРНО́ВАЯ МА́ЛОМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //shallow sod alluvial soil //sol gazonné alluvial mincé //dünner Rasenalluvialboden - 1) термин русск.шк. (1967) для подрода пойменных дерновых почв, имеющих мощность неясно-слоистой толщи (в центральной пойме) менее 50 см; 2) термин Г.В.Добровольского для вида пойменных дерновых почв с мощностью гумусового горизонта 10-20 см.

1814. ПО́ЙМЕННАЯ ДЕРНО́ВАЯ МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //deep sod alluvial soil // sol gazonné profond //tiefer Rasenalluvialboden - 1) термин русск.шк. (1967) для подрода пойменных дерновых почв, имеющих мощность неясно-слоистой толщи (в центральной пойме) более 100 см; 2) термин Г.В.Добровольского для вида пойменных дерновых почв с мощностью гумусового горизонта более 40 см.

1815. ПО́ЙМЕННАЯ ДЕРНО́ВАЯ НАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА //saturated sod alluvial soil //sol gazonné alluvial saturé //gesättigter Rasenalluvialboden - термин русск.шк. (1967) для рода пойменных дерновых почв, имеющих степень насыщенности основаниями более 75%.

1816. ПО́ЙМЕННАЯ ДЕРНО́ВАЯ ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА (ВЫСО́КОЙ ПО́ЙМЫ) //podzolized sod alluvial soil (of high floodland) //sol gazonné alluvial podzolisé (de terrain inondable haute) //podsolierter Rasenalluvialboden (der hocher Überschwemmungsgebiet) - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных дерновых почв наиболее высоких частей поймы, редко затопляемых паводковыми водами, характеризующихся заметно дифференцированным профилем, наличием ясной общей белесоватости или отдельных белесых пятен в нижней части гумусового горизонта, кислой реакцией (pH 4-5), резким убыванием содержания гумуса с глубиной, обеднением верхнего горизонта илом и R_2O_3, фульвокислотным составом гумуса.

1817. ПО́ЙМЕННАЯ ДЕРНО́ВАЯ СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА //weakly developed sod flooding soil, weakly developed sod alluvial soil //sol pelouse d'inondation de formation faiblement, sol pelouse alluvial de formation faiblement //schwach gebilded Rasenschwemmlandboden - термин для почв прирусловой части поймы с профилем A-C, гумусовый горизонт A которых не превышает 10 см. Син.: наносная грубая почва, рамбла.

1818. ПО́ЙМЕННАЯ ДЕРНО́ВАЯ СРЕ́ДНЕМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //semi-deep sod alluvial soil //sol gazonné alluvial semi-profond //halbtiefer Rasenalluvialboden - 1) термин русск.шк. (1967) для подрода пойменных дерновых почв, имеющих мощность неясно-слоистой толщи (в центральной пойме) 50-100 см; 2) термин Г.В.Добровольского для вида пойменных дерновых почв с мощностью гумусового горизонта 20-40 см.

1819. ПО́ЙМЕННАЯ ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //sod-gley alluvial soil // sol gazonné gley alluvial //Rasengleyalluvialboden - 1) тер-

мин русск.шк. (1967) для типа пойменных почв плоских равнинных участков, пологих грив и неглубоких межгривных понижений центральной поймы, формирующихся в условиях ослабленного аллювиального процесса и постоянного питания грунтовыми водами; профиль почвы имеет строение A_1-B_g-G; 2) термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных дерново-глеевых почв понижений центральной поймы, характеризующихся хорошо выраженным горизонтом A_1 порошисто-зернистой или порошисто-комковатой структуры, под которым имеется оглеенный, а иногда и оруденелый горизонт гидрогенного происхождения.

1820. ПОЙМЕННАЯ ДЕРНОВО-ГЛЕЕВАЯ КИСЛАЯ ПОЧВА //acid sod-gley alluvial soil //sol gazonné-gley alluvial acide //saurer Rasengleyalluvialboden - термин русск.шк. (1967) для рода пойменных дерново-глеевых почв, имеющих степень насыщенности основаниями менее 75%.

1821. ПОЙМЕННАЯ ДЕРНОВО-ГЛЕЕВАЯ НАСЫЩЕННАЯ ПОЧВА //saturated sod-gley alluvial soil //sol gazonné-gley alluvial saturée //gesättigter Rasengleyalluvialboden - термин русск.шк. (1967) для рода пойменных дерново-глеевых почв, имеющих степень насыщенности основаниями более 75%.

1822. ПОЙМЕННАЯ ДЕРНОВО-ГЛЕЕВАЯ ОЖЕЛЕЗНЁННАЯ ПОЧВА //ferrimorphic sod-gley alluvial soil //sol gazonné-gley alluvial ferrugineux //eisenhaltiger Rasengleyalluvialboden - термин русск. шк. (1967) для рода пойменных дерново-глеевых почв, имеющих оруденелый или обогащенный железом горизонт гидрогенного происхождения в средней части профиля.

1823. ПОЙМЕННАЯ ИЛОВАТО-ГЛЕЕВАЯ ПОЧВА //silty-gley alluvial soil // sol gley limoneux alluvial //Sumpfgleyalluvialboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных болотных почв, формирующихся в ольховых топях и характеризующихся сильно насыщенным водой оглеенным иловатым профилем, не расчлененным на горизонты; при подсыхании почвенная масса растрескивается на неправильные отдельности; поверхность почвы сильно кочковатая.

1824. ПОЙМЕННАЯ ДЕРНОВО-ЛУГОВАЯ ПОЧВА //sod-meadow flooding soil, sod-meadow alluvial soil //sol pelouse - sol de prairie humide d'inondation //Rasenschwemmlandboden-Wiesenboden - согласно классификации Г.В.Добровольского, почва прирусловой

или центральной поймы с профилем A-C, в нижней части которого проявляются следы оглеения в виде ржаво-бурых и сизых пятен; почва, переходная между дерновой и луговой.

1825. ПО́ЙМЕННАЯ ДЕРНО́ВО-ЛУГОВА́Я МА́ЛОМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //shallow sod-meadow alluvial soil //sol mincé gazonné de prairie humide d' inondation //dünner Rasenalluvialboden-Wiesenboden - термин Г.В.Добровольского для вида дерново-луговых пойменных почв с мощностью гумусового горизонта менее 20 см.

1826. ПО́ЙМЕННАЯ ДЕРНО́ВО-ЛУГОВА́Я МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //deep sod-meadow alluvial soil //sol profond gazonné de prairie humide d'inondation //tiefer Rasenalluvialboden-Wiesenboden - термин Г.В. Добровольского для вида дерново-луговых пойменных почв с мощностью гумусового горизонта более 40 см.

1827. ПО́ЙМЕННАЯ ДЕРНО́ВО-ЛУГОВА́Я СРЕ́ДНЕМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //semi-deep sod-meadow alluvial soil //sol semi-profond gazonné de prairie humide d'inondation //halbtiefer Rasenalluvialboden-Wiesenboden - термин Г.В.Добровольского для вида дерново-луговых пойменных почв с мощностью гумусового горизонта 20-40 см.

1828. ПО́ЙМЕННАЯ ЗЕРНИ́СТАЯ ПО́ЧВА //granular alluvial soil //sol alluvial granuleux, sol alluvial granulaire //körnig Alluvialboden, granulär Alluvialboden - термин русск.шк. для пойменных почв, формирующихся преимущественно в центральной пойме на суглинистом и глинистом аллювии, который при высыхании растрескивается на мелкие полиэдрические отдельности.

1829. ПО́ЙМЕННАЯ ИЛОВА́ТО-ТОРФЯ́НАЯ ПО́ЧВА //silty peat alluvial soil //sol tourbe limoneux alluvial //Sumpftorfalluvialboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных болотных почв, имеющих с поверхности слой заиленного торфа мощностью более 50 см.

1830. ПО́ЙМЕННАЯ ИЛОВА́ТО-ТОРФЯ́НО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //silty-peat-gley alluvial soil //sol gley limoneux tourbeux alluvial //Sumpftotfgleyalluvialboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных болотных почв, имеющих с поверхности торфянистый слой мощностью до 50 см с хорошо разложившимся торфом буровато-коричневого или черного цвета, содержащим значительное количество ила, что приводит к образованию комковатой структуры при высыхании; ниже торфянистого идет глеевый горизонт.

1831. ПО́ЙМЕННАЯ ЛЕ́СОЛУГОВА́Я ПО́ЧВА //forest-meadow alluvial soil // sol de prairie et forêt humide alluvial //Auenwaldwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных луговых почв степной зоны, формирующихся под пойменными лесами и характеризующихся слабо выраженной или не выраженной слоистостью почвообразующего аллювия, особенно в верхней части профиля, формированием на глинистом, часто иловатом аллювии, четким слабым оглеением во всём профиле, приуроченностью к повышенным участкам центральной поймы, обычно карбонатностью, профилем $A\text{-}B_{гк}\text{-}C_{гк}$.

1832. ПО́ЙМЕННАЯ ЛЕ́СОЛУГОВА́Я СЛОИ́СТАЯ ПО́ЧВА //stratified forest-meadow alluvial soil //sol stratifié de prairie et forêt humide alluvial //geschichteter Auenwaldwiesenboden - термин русск. шк. (1967) для подтипа пойменных луговых почв степей, формирующихся под пологом пойменного леса и характеризующихся четкой слоистостью почвообразующего аллювия при супесчано-суглинистом механическом составе, неустойчивым по годам режимом затопления, неравномерностью гумусированности и оглеения по профилю, профилем $A_1\text{-}B\text{-}C_{гк}$.

1833. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́ТАЯ ОСТЕПНЯ́ЮЩАЯСЯ ПО́ЧВА //heathing meadowish alluvial soil //sol bruyérée de prairie peu humide alluvial //heideartiger Auenschwachwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных луговых почв степей, приуроченных к наиболее высоким редко заливаемым участкам пойм и дельт и характеризующихся ксерофитизацией растительного покрова, морфологически четким карбонатным горизонтом, перерытостью землероями.

1834. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА //meadow alluvial soil, meadow flooding soil, wet meadow soil //sol alluvial de prairie, sol alluvial de prairie humide, sol de prairie humide d'inondation, sol de prairie humide alluvial//Auenwiesenboden, Alluvialwiesenboden, alluvialer Wiesenboden, Schwemmlandwiesenboden - 1) термин Г.В.Добровольского для почв центральной поймы, имеющих грунтовое водное питание в меженный период, профиль A-B-G, следы оглеения в средней части профиля; 2) термин русск. шк. (1967) для типа пойменных почв степной зоны, имеющих признаки оглеения в подгумусовой части профиля и смешанный промывной - экссудационно-выпотной водный режим, формирующихся на повышенных участках прирусловой низкой, центральной и вы-

сокой поймы рек, дельтовых областей и конусов выноса временных водотоков под луговой или лесной растительностью; 3) термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных луговых почв степей, характеризующихся слабо выраженной или невыраженной слоистостью почвообразующего аллювия, особенно в верхней части профиля, образованием на глинистом, часто иловатом аллювии, четким слабым оглеением во всём профиле, приуроченностью к повышенным участкам центральной поймы, обычно карбонатностью, профилем $A\text{-}B_{гк}\text{-}C_{гк}$.

1835. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я ВЫСОКОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //high humic meadow alluvial soil //sol riche en humus de prairie humide alluvial //humusreich Auenwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных луговых почв степей, содержащих более 9% гумуса в горизонте A_1.

1836. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я ЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА //saliniferous meadow alluvial soil //sol salifére de prairie humide alluvial //salzhaltig Auenwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода пойменных луговых почв степей, содержащих в профиле легкорастворимые соли без поверхностного солевого максимума.

1837. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //calcaric meadow alluvial soil //sol calcaire de prairie humide alluvial//kalkarischer Auenwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода пойменных луговых почв степей, вскипающих с поверхности или в пределах гумусового горизонта при наличии выделений карбонатов в виде пятен и примазок и содержании CO_2 карбонатов по всему профилю менее 10%.

1838. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я МА́ЛОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //low humic meadow alluvial soil //sol peu humifére de prairie humide alluvial // humusarmer Auenwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных луговых почв степей, содержащих 4-7% гумуса в горизонте A_1.

1839. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я МА́ЛОМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //shallow meadow alluvial soil //sol mincé de prairie humide alluvial //dünner Auenwiesenboden - 1) термин русск.шк. (1967) для вида пойменных луговых почв степей с мощностью гумусового горизонта 20-40 см; 2) термин Г.В.Добровольского для пойменных луговых почв с мощностью гумусового горизонта 10-20 см.

1840. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я МА́ЛОМО́ЩНАЯ УКОРО́ЧЕННАЯ ПО́ЧВА //shortened

shallow meadow alluvial soil //sol plus mince de prairie humide alluvial //verkürzener dünner Auenwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных луговых почв степей с мощностью гумусового горизонта менее 20 см.

1841. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //deep meadow alluvial soil // sol profond de prairie humide alluvial //tiefer Auenwiesenboden - 1) термин русск.шк. (1967) для вида пойменных луговых почв степей с мощностью гумусового горизонта 80-120 см; 2) термин Г.В.Добровольского для пойменных луговых почв с мощностью гумусового горизонта более 40 см.

1842. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я СВЕ́РХМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //super-deep meadow alluvial soil //sol super-profond de prairie humide alluvial // super-tiefer Auenwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных луговых почв степей, имеющих мощность гумусового горизонта более 120 см.

1843. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я СЛА́БОГУМУСИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //weakly humusified meadow alluvial soil //sol plus peu humifére de prairie humide alluvial //schwachhumushaltig Auenwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных луговых почв степей, содержащих 2-4% гумуса в горизонте A_1.

1844. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА //weakly developed meadow alluvial soil //sol peu évolué de prairie humide alluvial //unreifer Auenwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных луговых почв степей, содержащих менее 2% гумуса в горизонте A_1.

1845. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я СЛИТА́Я ПО́ЧВА //compact meadow alluvial soil //sol compact de prairie humide alluvial//kompakter Auenwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода пойменных луговых почв степей, характеризующихся слитостью всего профиля при максимуме уплотнения в горизонте В.

1846. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я СЛОЙСТАЯ ПО́ЧВА //stratified meadow alluvial soil //sol stratifié de prairie humide alluvial//geschichteter Auenwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных луговых почв степей, характеризующихся четкой слоистостью почвообразующего аллювия при супесчано-суглинистом механическом составе, неустойчивым по годам режимом затопления, неравномерностью гумусированности и оглеения по профилю, профилем A_1-В-$C_{гк}$.

1847. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я СЛОИ́СТАЯ СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА //weakly developed stratified meadow alluvial soil //sol stratifié peu évolué de prairie humide alluvial //geschichteter unriefer Auenwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных луговых почв степей, характеризующихся сильной слоистостью почвообразующего аллювия и прерывистостью слабого гумусонакопления, формирующихся на лёгком грубом аллювии повышений прирусловой поймы; в межень эти почвы сухие и не испытывают влияния глубоких грунтовых вод; профиль типа А-С без признаков оглеения.

1848. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //solonetzic meadow alluvial soil //sol solonetzoide de prairie humide alluvial //solonetzartiger Auenwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для рода пойменных луговых почв степей, имеющих в нижней части гумусового горизонта уплотненный грубоструктурный горизонт с содержанием обменного натрия более 5% от емкости поглощения.

1849. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я СРЕ́ДНЕГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //moderate humic meadow alluvial soil //sol moderée èn humus de prairie humide alluvial //mässig-humus Auenwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для вида пойменных луговых почв степей, содержащих 7-9% гумуса в горизонте A_1.

1850. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я СРЕ́ДНЕМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //medium deep meadow alluvial soil //sol semi-profond de prairie humide alluvial //halbtiefer Auenwiesenboden - 1) термин русск.шк. (1967) для вида пойменных луговых почв степей с мощностью гумусового горизонта 40-80 см; 2) термин Г.В.Добровольского для пойменных луговых почв с мощностью гумусового горизонта 20-40 см.

1851. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУГОВА́Я ТЕМНОЦВЕ́ТНАЯ ПО́ЧВА //fuscous meadow alluvial soil //sol foncé de prairie humide alluvial //dunkelfarbiger Auenwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных луговых почв степей, формирующихся на равнинных участках центральной поймы с неустойчивым по годам режимом затопления и характеризующихся значительной гумусированностью всего профиля, общей небольшой замазанностью и сизоватостью в профиле, общим вскипанием без выделения карбонатов.

1852. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА //meadow-swamp alluvial soil //sol gley alluvial de prairie //Wiesengleyboden - термин

Г.В.Добровольского для переходных к болотным луговых пойменных почв, сильно оглеенных в средней и нижней части профиля вследствие грунтового заболачивания, что дает профиль - $A-B_g-G$.

1853. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ МА́ЛОМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //shallow meadow-swamp alluvial soil //sol mincé gley alluvial de prairie// dünner Wiesengleyboden - термин Г.В.Добровольского для лугово-болотных почв с мощностью гумусового горизонта менее 20 см

1854. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //deep meadow-swamp alluvial soil //sol profond gley alluvial de prairie //tiefer Wiesengleyboden - термин Г.В.Добровольского для лугово-болотных почв с мощностью гумусового горизонта более 40 см.

1855. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ СРЕ́ДНЕМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //semi-deep meadow-swamp alluvial soil //sol semi-profond gley alluvial de prairie //halbtiefer Wiesengleyboden - термин Г.В.Добровольского для лугово-болотных почв с мощностью гумусового горизонта 20-40 см.

1856. ПО́ЙМЕННАЯ ЛУ́ГОВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА - см. Пойменная лугово-болотная п.

1857. ПО́ЙМЕННАЯ ПЕРЕГНО́ЙНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //muck-gley alluvial soil //sol muck-gley alluvial //Muckgleyalluvialboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных дерново-глеевых почв притрассной части пойм в окраинных частях болот, характеризующихся наличием темного перегнойного горизонта A_1, под которым залегает глеевый горизонт, часто оруденелый.

1858. ПО́ЙМЕННАЯ ПУСТЫ́ННО-ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА //desert-meadow alluvial soil //sol désertique alluvial à nappe phréatique//Auenwüstenwiesenboden - 1) термин русск.шк. (1967) для типа луговых аллювиальных почв пустынь, формирующихся в долинах и дельтах рек в условиях поемного режима и характеризующихся слоистостью почвообразующего аллювия, слабым засолением, слабодифференцированным профилем; 2) термин русск.шк. (1967) подтипа пойменных пустынно-луговых почв центральной поймы с грунтовыми водами на глубине менее 3 м, характеризующихся высокой гумусностью (3-8%), высокой микроагрегированностью, значительным содержанием обменного магния, часто засоленностью.

1859. ПО́ЙМЕННАЯ ПУСТЫ́ННО-ЛУГОВА́Я СЛОИ́СТАЯ ПО́ЧВА //stratified desert-meadow alluvial soil //sol désertique alluvial stratifié

à nappe phreatique //geschichteter Auenwüstenwiesenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных пустынно-луговых почв низкой поймы, формирующихся при уровне грунтовых вод около 1 м и характеризующихся слаборазвитым профилем, сильно слоистым почвообразующим аллювием, средней гумусностью (1,5-4%), отсутствием засоления, син.: Тугайная п.

1860. ПОЙМЕННАЯ СЛОИСТАЯ ПОЧВА //stratified alluvial soil //sol alluvial stratifié //geschichteter Alluvialboden - термин русск.шк. для пойменных почв, формирующихся преимущественно в прирусловой части на слоистом грубозернистом (песчаном) аллювии.

1861. ПОЙМЕННАЯ СЛОИСТАЯ ДЕРНОВАЯ ПОЧВА //sod stratified alluvial soil //sol alluvial gazonné stratifié //deschichteter Rasen alluvialboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных дерновых почв прирусловой части поймы, формирующихся в прирусловой части поймы на грубом аллювии под пойменными лесами и злаково-разнотравными лугами и характеризующихся профилем A-(B)-C, слабой гумусированностью (1-2% гумуса), бедностью питательными элементами; слабокислой или нейтральной реакцией.

1862. ПОЙМЕННАЯ СЛОИСТАЯ ДЕРНОВО-ГЛЕЕВАЯ ПОЧВА //sod-gley stratified alluvial soil //sol gazonné-gley stratifié alluvial//geschichteter Rasengleyalluvialboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных дерново-глеевых почв, формирующихся в понижениях прирусловой поймы на слоистом аллювии под влажными кустарниками и лугами и являющихся переходными от слоистых примитивных слабо-дерново-глеевых к дерново-глеевым почвам, прежде всего по степени развития гумусового горизонта.

1863. ПОЙМЕННАЯ СЛОИСТАЯ ПРИМИТИВНАЯ СЛАБОДЕРНОВАЯ ПОЧВА //weak sod primitive stratified alluvial soil //sol alluvial stratifié peu gazonné primitive //schwachrasen embryonaler geschichteter Alluvialboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных дерновых почв прирусловых валов, песчаных кос, отмелей и островов, формирующихся под разреженной травянистой растительностью и характеризующихся слабо развитым гумусовым горизонтом (1-2% гумуса), отсутствием следов оглеения, бедностью питательными веществами, профилем A-C, слабокислой или нейтральной реакцией.

1864. ПО́ЙМЕННАЯ СЛО́ИСТАЯ СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ СЛА́БО-ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //weak-sod-gley weakly developed stratified alluvial soil // sol faible-gazonné-gley stratifié alluvial de formation faiblement //schwach Rasen-Gley schwach gebilded geschichteter Alluvialboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа пойменных дерново-глеевых почв, формирующихся в понижениях прирусловой части поймы и речных островов под травянистой растительностью и характеризующихся очень слабо развитым гумусовым горизонтом в верхней части слоистой песчаной аллювиальной толщи и оглеением нижней части профиля.

1865. ПО́ЛИГЕНЕТИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА //polygenetic soil //sol polygéne // polygener Boden (от греч. poly - много и genos - род) - 1) см. Полициклическая почва; 2) почва, в генезисе которой участвовало несколько процессов, как например, по мнению В.В. Тюлина и М.В.Россохиной (1970), в генезисе почв со вторым гумусовым горизонтом восточной части Русской равнины участвовали процессы гумусонакопления, оподзоливания, лессиважа и оглеения, причем специфика почв является результатом сочетания этих процессов.

1866. ПОЛИГОНА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //polygonal soil //sol polygonal //Polygonalboden, Strukturboden, Frostmusterboden (от греч. polýgonos - многоугольный) - термин применяемый для тундровых арктических почв, разбитых морозобойными трещинами с поверхности на многоугольники разной формы и величины. Син.: полигонально-трещиноватая почва.

1867. ПОЛИГОНА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА ХОЛО́ДНЫХ СТРА́Н //polygonal soil of cold regions //sol polygonal des pays froids //Polygonalboden der Kaltland - термин франц.шк. (1965) для группы почв, входящих в подкласс грубых минеральных почв климатического происхождения (см.), распространенных в холодных пустынях высоких широт или высокогорий и связанных в своём генезисе с морозным выветриванием.

1868. ПОЛИГОНА́ЛЬНАЯ СКРЫТОГЛЕ́ЕВАЯ АРКТИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА //polygonal cryptogleyic arctic soil //sol polygonal à cryptogley des arctic //polygonaler criptrogleischer Arktikboden - термин зонально-географической школы для типа почв арктического пояса, формирующихся в подзоне арктической тундры на возвышенно-равнинных элементах рельефа, сложенных мелкозёмистыми и щебнисто-мелкозёмистыми отложениями с трещино-полигональным микро-

рельефом; почвы имеют слабо выраженный гумусовый горизонт мощностью 1-2 см и неясный глеевый горизонт, переходящий в мерзлую породу.

1869. ПОЛИГОНА́ЛЬНАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical polygonal soil //sol polygonal typique //typischer Polygonalboden - термин франц. шк. (1965) для подгруппы полигональных почв холодных стран (см.), имеющих четко выраженную полигональную поверхность.

1870. ПОЛИГОНА́ЛЬНО-КАМЕНИ́СТАЯ ПО́ЧВА //polygonal stony soil //sol polygonal pierreux //Steinringboden - термин для почв арктических тундр, разбитых с поверхности морозобойными трещинами на полигональные образования с каменистыми кольцами по краям многоугольников.

1871. ПОЛИГОНА́ЛЬНО-ТРЕЩИНОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //polygonal fissure soil // sol en mosaïque //vieleckig gespaltener Boden - см. Полигональная почва.

1872. ПО́ЛИПЕДО́Н //polypedon //polypedon //Polypedon (от греч. полу́ - много и греч. педо́н - почва) - термин 7-го Приближения (США, 1960) для имеющего три измерения в пространстве почвенного тела, характеризующегося одним и тем же почвенным профилем (педоном).

1873. ПО́ЛИЦИКЛИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА //polygenetic soil //sol polygéne // polygener Boden - термин для почв, прошедших в своём развитии несколько различных циклов почвообразования в связи с изменением условий или факторов почвообразования во времени, например, в связи с изменением климата, растительности или гидрологии.

1874. ПО́ЛУБОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА //half bog soil, semibog soil //sol semi-tourbeux, sol semi-marécageux //anmooriger Boden, halbsumpfiger Boden - термин для почв, переходных от полно развитых растительно-наземных автоморфных к болотным гидроморфным, обычно характеризующихся наличием глеевого горизонта в нижней части профиля, связанного с грунтовым увлажнением, как например, дерново-подзолисто-глеевая или серая лесная глеевая почвы и т.п.

1875. ПОЛУГИДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //semi-hydromorphic soil, semi-hydromorphous soil //sol semi-hydromorphe //halbhydromorphischer Boden - термин русск.шк. для почв, формирующихся в условиях временного застоя поверхностных вод (верховодки) или при от-

носительно высоком уровне залегания грунтовых вод, что приводит к сезонному переувлажнению почвы либо её постоянному потпитыванию в нижней части профиля.

1876. ПО́ЛУПОДЗО́Л //semipodzol //semipodzol //Semipodsol - термин австрийск.шк.для подзолов со слабой степенью выраженности оподзоливания почвы.

1877. ПО́ЛУПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //semi-desert soil //sol semi-désertique, sol semi-arid //Halbwüstenboden - сборный термин для почв, формирующихся в полупустынных районах и поэтому не имеющий строгого определения.

1878. ПО́ЛУПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //semi-desert soil //sol subdésertique // Halbwüstenboden - термин франц.шк. (1965) для группы почв, входящей в подкласс слаборазвитых почв климатического происхождения (см.), формирующихся в прилегающих к пустыням областях и характеризующихся слабо развитым профилем, малым содержанием органического вещества при равномерном распределении его в профиле, насыщенным поглощающим комплексом, отсутствием горизонта аккумуляции извести (почва равномерно карбонатная).

1879. ПО́ЛУПУСТЫ́ННАЯ МИКРОДО́ННАЯ ПО́ЧВА //microdune semi-desert soil //sol subdésertique eolisé en microdunes //mikrodünen Halbwüstenboden - термин франц.шк. (1965) для подгруппы полупустынных почв (см.), поверхность которых осложнена микродюнами в результате эоловой дефляции.

1880. ПО́ЛУПУСТЫ́ННАЯ РАЗВЕВА́ЕМАЯ ПО́ЧВА //aeolated semi-desert soil //sol subdésertique eolise par déflation //äolisierter Halbwüstenboden - термин франц.шк. (1965) для подгруппы полупустынных почв (см.), подвергающихся современной эоловой дефляции.

1881. ПО́ЛУПУСТЫ́ННАЯ СЛА́БО ЗАСОЛЁННАЯ ИЛИ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //slightly saline or alkaline semi-desert soil//sol subdésertique faiblement salé ou alcalisé //schwach salziger oder alkalinер Halbwüstenboden - термин франц.шк. (1965) для подгруппы полупустынных почв (см.), имеющих в профиле AC слабое засоление или солонцеватость.

1882. ПО́ЛУПУСТЫ́ННАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical semi-desert soil // sol subdésertique modal //typischer Halbwüstenboden - термин франц.шк. (1965) для подгруппы полупустынных почв (см.), не имеющих солевого или солонцеватого горизонтов и не имеющих

признаков современной эоловой дефляции или аккумуляции.

1883. ПО́ЛУРЕНДЗИ́НА //semi-rendzina //semi-rendzine //Halbrendsina - термин Н.М.Сибирцева для дерново-карбонатных почв, формирующихся на рыхлых карбонатных породах, менее богатых карбонатом кальция, чем известняк. Син.: Псевдорендзина, Серый карбонатный суглинок.

1884. ПО́ЛУСУХОПУ́ТНАЯ ПО́ЧВА //semiterrestrial soil //sol semi-terrestre //semiterrestrischer Boden - термин немецкой школы для болотных и гидроморфных почв.

1885. ПО́ЛЬДЕР //polder, diked marsh //polder, marais endigué // Polder, eingedeichte Marsch (от голландского polder) - термин западно-европейских школ для осушенных и возделанных участков маршей, защищенных дамбами от затопления морем и характеризующихся высоким плодородием.

1886. ПО́ЛЬДЕРНАЯ ПО́ЧВА //polder soil //sol polderique //Polderboden - термин западно-европейских школ для высокоокультуренных почв польдеров, то-есть осушенных и возделанных участков маршей, защищенных дамбами от затопления морем.

1887. ПО́ЛЬСТЕРРЕНДЗИ́НА //polsterrendzina //polsterrendzine //Polsterrendzina - термин Кубиены для относительно сухих альпийских рендзин, формирующихся под подушкообразной растительностью. Син.: рендзина подушкообразная.

1888. ПО́ЧВА ПРЕ́РИЙ //prairie soil //sol de prairie //Prärieboden (от франц. prairie - луг) - сборный термин, не имеющий строгого определения, для почв прерий или влажных луговых степей северного полушария; в широком понимании термин охватывает все почвы прерий, включая гидроморфные и лесные (в лесных островных массивах переходной полосы); в более узком понимании включает только черноземовидные почвы влажных луговых степей. Син.: брюнизём.

1889. ПО́ЧВА СО ВТОРЫ́М ГУ́МУСОВЫМ ГОРИЗО́НТОМ //soil with second humus horizon //sol avec second horizon humique //Boden mit der zweite Humushorisont - 1) термин русск.шк. для подзолистых почв, ниже подзолистого горизонта A_2 которых выделяется в виде тёмных пятен или сплошной полосой гумусовый горизонт, сохранившийся от прежних фаз почвообразования; син.: вторично-подзолистая почва; 2) термин для почв разного генезиса и

разного систематического положения, имеющих в нижней части профиля второй гумусоаккумулятивный горизонт, который может быть либо реликтовым, либо иллювиального происхождения.

1890. ПО́ЧВА СО ВТОРЫ́М ПОДЗО́ЛИСТЫМ ГОРИЗО́НТОМ //soil with second podzolic horizon //sol avec second horizon podzolique //Boden mit der zweite Podsolhorisont - термин А.А.Роде (1933) для подзолистых почв на двучленных породах, имеющих второй осветленный горизонт на контакте пород ниже горизонта В; син.:желто-подзолистая п., контактно-подзолистая п., контактно-оподзоленная п., контактно-оглеенная п.

1891. ПО́ЧВОЭЛЮ́ВИЙ //soil eluvium //éluvium du sol //Bodeneluvium - термин для примитивных сильнокаменистых горных почв, формирующихся на плотных породах и имеющих лишь небольшой гумусированный и щебнистый мелкозёмистый слой на скальной породе; син.: горно-лесная примитивно-аккумулятивная п., горно-лесная примитивная п.

1892. ПРЕДПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //pre-podzolic soil //sol prepodzolique //Präpodsolboden - термин Т.А. и И.А.Соколовых (1963) для горно-таежных почв Восточной Сибири, формирующихся на массивно-кристаллических породах и характеризующихся кислой реакцией, высокой ненасыщенностью, значительным содержанием оксалатнорастворимых R_2O_3 при ожелезнении верхней части почвы под подстилкой.

1893. ПРИМИТИ́ВНАЯ ПО́ЧВА //primitive soil //sol primitif, présol //neuntstandener Boden, unentwickelter Boden (от лат. primitivus - самый ранний) - общеупотребительный термин для крайне слабо развитых почв с профилем (А)-С. Син.: неразвитая п., слаборазвитая п., инфантильная п., эмбриональная п.

1894. ПРИМИТИ́ВНАЯ АЛЬПИ́ЙСКАЯ ПО́ЧВА //alpine primitive soil //sol alpine primitif //Alpiner Rohboden - термин Кубиены для очень слабо развитых скелетных высокогорных почв с профилем (А)-С. Син.: неразвитая альпийская почва.

1895. ПРИМИТИ́ВНАЯ ПО́ЧВА СУБТРОПИ́ЧЕСКИХ И ТРОПИ́ЧЕСКИХ ПУСТЫ́НЬ //primitive soil of subtropical and tropical deserts //sol primitif du désert subtropicale et tropicale //neuntstandener Boden der subtropischer und tropischer Wüsten - термин зонально-географической школы для группы почв с неразвитым профилем и слабой выветрелостью исходного материала, характеризующихся

ничтожной гумусированностью и низкой обменной способностью, часто засоленностью и карбонатностью с поверхности.

1896. ПРИМИТИ́ВНАЯ АРКТИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА //arctic primitive soil //sol arctic primitif //arktischer Rohboden - термин Кубиены для очень слабо развитых скелетных почв арктического пояса с профилем (А)-С.

1897. ПРИМИТИ́ВНО-ЩЕБНИ́СТАЯ ПО́ЧВА //stony primitive soil //sol pierreux primitif //unentwickelter Steinboden - слабо развитая сильно щебнистая почва с профилем А-С мощностью до 25 см, развитая на плотной породе. Син.: литосоль, скелетная почва.

1898. ПРОГРАДИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //prograded soil //sol progradée // progradierter Boden - термин для почв, обогащенных гумусом, обменными основаниями и питательными веществами, но обнаруживающих в профиле признаки прошлых стадий обеднения (оподзоливания, выщелачивания); например, проградированные чернозёмы, сформированные из дерново-подзолистых или серых лесных почв.

1899. ПРОМЫ́ТАЯ ПО́ЧВА //leached out soil //sol lessivé //ausgewaschener Boden - общеупотребительный термин для почв, лишенных легкорастворимых солей.

1900. ПРО́ТОРЕНДЗИ́НА //protorendzina //protorendzina //Protorendzina - термин немецкой школы для примитивно-щебнистых скелетных почв с профилем (А)-С, формирующихся на известняках. Син.: сирозём-рендзина (нем.).

1901. ПСА́ММАКВЕ́НТ //psammaquent //psammaquent //Psammaquent (от греч. psammos - песок, лат. aqua - вода и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквентов (см.), которые: 1) имеют температуру почвы теплее, чем криаквенты (см.) и имеют среднелетнюю и среднезимнюю температуры на глубине 50 см различающиеся на 5^{o}С или более; 2) имеют мех.состав супеси или легче во всех горизонтах ниже пахотного при 25 см (что ниже) до глубины 1 м или до контакта с плотной породой (что глубже). Большая группа псаммаквентов включает 3 подгруппы: 1) типичные псаммаквенты (typic), 2) маломощные псаммаквенты (lithic) и 3) моллевые псаммаквенты (mollic).

1902. ПСАММЕ́НТ //psamment //psamment //Psamment (от греч. psammos - песок и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка энтисолей (см.).

которые: 1) имеют ниже 25 см или пахотного слоя (что ниже) мех.состав супеси или легче во всех частях до глубины 1 м или до контакта с плотной породой, если он выше метра; 2) не имеют фрагментов диагностических горизонтов, располагающихся без видимого порядка под пахотным слоем; 3) не насыщены постоянно водой и не имеют характеристик переувлажнения, описанных для аквентов (см.). В пределах этого подпорядка выделяются 6 больших почвенных групп: 1) криопсамменты, 2) кварцпсамменты, 3) торрипсамменты, 4) удипсамменты, 5) устипсамменты и 6) ксероп самменты (см.).

1903. ПСЕ́ВДОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //pseudogley soil //sol à pseudogley // pseudogley Boden - термин, распространенный в Зап.Европе для гидроморфных почв, в верхней части профиля которых имеется оглеенный горизонт, сформированный временным периодическим переувлажнением (верховодкой) почвы над водонепроницаемым слоем.

1904. ПСЕ́ВДОГЛЕ́Й //pseudogley //pseudogley //Pseudogley (от греч. pséudos - ложь и русск. глей) - термин Кубиены (1953) для почв с резко дифференцированным профилем (по илу и полуторным окислам), осветленный приповерхностный горизонт которых сформирован поверхностным переувлажнением почвы. Син.: поверхностноводный глей, глеевая псевдоподзолистая п. (Герасимов и Зонн, 1971).

1905. ПСЕ́ВДОГЛЕ́Й ВТОРИ́ЧНЫЙ //secondary pseudogley //pseudogley secondaire //sekundär Pseudogley - термин немецкой школы для поверхностно заболоченных лесных почв (как правило, парабурозёмов), в которых поверхностное оглеение вторично по отношению к основному процессу почвообразования. Син.: поверхностно-глееватая п., поверхностно-глеевая п., поверхностно-оглеенная п.

1906. ПСЕ́ВДОГЛЕ́Й-ГЛЕ́Й //pseudogley-gley//pseudogley-gley //Pseudogley-Gley - термин немецкой школы для почв, имеющих в верхней части профиля осветленный горизонт, сформированный при поверхностном переувлажнении, а в нижней части профиля - глеевый горизонт, связанный с грунтовыми водами.

1907. ПСЕ́ВДОГЛЕ́Й-ПАРАБУРОЗЁМ //pseudogley - parabrownearth //pseudogley - parabrownerde//Pseudogley-Parabraunerde - термин немецкой школы для почв, переходных между псевдоглеем и пара-

бурозёмом, характеризующихся мраморовидной окраской (ржаво-бурые и сизовато-белёсые) и обилием железисто-марганцевых конкреций в осветленном приповерхностном горизонте A_2.

1908. ПСЕ́ВДОГЛЕ́Й ПЕРВИ́ЧНЫЙ //primary pseudogley //pseudogley primaire, pseudogley autochtoné //primäre Pseudogley - термин немецкой школы для псевдоглеевых первично переувлажненных почв, в которых приповерхностный осветленный горизонт формируется только под влиянием поверхностного переувлажнения.

1909. ПСЕ́ВДОГЛЕ́Й-ПОДЗО́Л //pseudogley-podzol //pseudogley-podzol //Pseudogley-Podsol - термин немецкой школы для почв, переходных между псевдоглеем и подзолом.

1910. ПСЕ́ВДОГЛЕ́Й РЕЛИ́КТОВЫЙ //relict pseudogley //pseudogley relicte //Reliktpseudogley - термин австрийск.шк. для почв, имеющих в профиле признаки псевдоглея, то-есть поверхностного оглеения, но не имеющие в современном водном режиме условий для поверхностного временного переувлажнения.

1911. ПСЕ́ВДОГЛЕ́Й СКЛО́НОВЫЙ //slope pseudogley //sol à faux gley de pente, pseudogley de pente //Hangpseudogley - термин немецко-австрийск.шк. для псевдоглеевых (см.) почв, сформированных на склонах вследствие образования временной верховодки внутрипочвенным склоновым током.

1912. ПСЕ́ВДОМИЦЕЛЛЯ́РНАЯ ПО́ЧВА //pseudo-mycelium soil //sol à pseudo-mycelium //Pseudomyzelboden (от греч. pséudos - ложь и лат. mycelium - грибница) - общеупотребительный термин для почв, имеющих в профиле выделения карбоната кальция в виде белой ложегрибницы.

1913. ПСЕ́ВДООПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //pseudo-podzolized soil //sol pseudo-podzolisé //pseudopodsolierter Boden - термин И.П.Герасимова (1960) для лесных почв, в которых анализ обнаруживает перемещение илистой фракции вниз по профилю без ее разрушения в условиях слабо кислой реакции среды. Син.: лессивированная почва, иллимеризованная почва.

1914. ПСЕ́ВДОПОДЗО́Л //pseudopodzol //pseudopodzol //Pseudopodsol - термин Герасимова (1960) для буроокрашенных почв Центр.Европы, близких к буроземам, но имеющих в профиле осветленный тусклый горизонт, сформированный, в отличие от подзолистого горизонта, в процессе обезиливания (лессивирования). Син.: podzol secundar (Чернеску, 1934), sol lessivé (Дюшофур,

1951), иллимеризованная почва (Фридланд, 1957); Fahlerde (Эвальд, 1958), Parabraunerde (Мюккенхаузен, 1962), псевдоподзолистая почва, псевдооподзоленная почва, gebleichten braunen Waldboden (Штремме, 1950), luvisol (Дюдаль,1967).

1915. ПСЕ́ВДОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //pseudopodzolic soil //sol pseudopodzolique //Pseudopodsolboden - см. Псевдоподзол.

1916. ПСЕ́ВДОРЕНДЗИ́НА //pseudorendzina //pseudorendzina //Pseudorendsina - термин Тихеевой для дерново-карбонатных почв,формирующихся на рыхлых карбонатных породах, менее богатых карбонатом кальция, чем известняк. Син.: Полурендзина, Серый карбонатный суглинок.

1917. ПСЕ́ВДОФИ́БРОВАЯ ПО́ЧВА //pseudofibrous soil //sol pseudofibreux //pseudofaseriger Boden (от греч.pseudos - ложь и греч. fibra - ткань) - общеупотребительный термин для лёгких почв, имеющих в нижней части профиля извилистые тонкие прослойки, обогащенные и цементированные железом и гумусом. Син.: коварванная почва, ортзандовая почва.

1918. ПСЕ́ВДОЧЕРНОЗЁМ //pseudochernozem //pseudochernozem //Pseudotschernosem, Feuchtschwarzerde - термин немецкой школы для луговых черноземовидных почв. Син.: луговая почва.

1919. ПУ́ЛЬВЕРЭ́РДЕ //pulvererde //pulvererde //Pulvererde (от нем. pulver - порошок, порох и erde - земля) - термин Ван Беммелена (1862) для польдерных пестроокрашенных кислых почв с аккумуляцией сульфатов железа; син.: кошачья глина, кислая сульфатная п.

1920. ПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //desert soil //sol désertique //Wüstenboden - общеупотребительный сборный термин для почв пустынь, не имеющих развитого профиля. Син.: ерма.

1921. ПУСТЫ́ННАЯ ГАМА́ДНАЯ ПО́ЧВА //hamada desert soil //sol desertique de hamada //Hamada-Wüstenboden - термин немецкой школы для неразвитых почв каменистой пустыни (гамады).

1922. ПУСТЫ́ННАЯ ГИ́ПСОВАЯ ПО́ЧВА //gypsic desert soil //sol desertique à gyps //Gipskrustenboden - термин немецкой школы для пустынных образований палеоаккумулятивного характера, имеющих слой гипса той или иной мощности. Син.: пустынная гипсовая кора, гипсовая пустынная кора, гипсовая кора.

1923. ПУСТЫ́ННАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //calcareous desert soil //sol

désertique calcaire //Kalkkrustenboden - термин немецкой школы для пустынных образований палеоаккумулятивного характера, имеющих слой карбоната кальция той или иной мощности и того или иного типа (калише, канкар, известковая плита и т.п.). Син.: пустынная карбонатная кора, карбонатная пустынная кора, карбонатная кора, известковая кора.

1924. ПУСТЫ́ННАЯ КРА́СНАЯ ПО́ЧВА //red desert soil //sol désertique rouge //Rotwüstenboden - см. Красная пустынная почва.

1925. ПУСТЫ́ННАЯ ПЕСЧА́НАЯ ПО́ЧВА //sandy desert soil //sol desertique sablonneux, sol desertique sableux //Sandwüstenboden - общеупотребительный термин для почв песчаных пустынь, не имеющих развитого профиля. Син.: песчаная пустынная почва.

1926. ПУСТЫ́ННАЯ ПЫЛЕВА́Я ПО́ЧВА //desert dust soil //sol désertique poudreux //Wüstenstaubboden - термин западно-европейских школ для пустынных пылевых поверхностных отложений, не имеющих заметного профиля и почвообразования.

1927. ПУСТЫ́ННАЯ СЕ́РАЯ ПО́ЧВА //gray desert soil //sol désertique gris //graue Wüstenboden - термин американской школы для светлоокрашенных почв пустынь, не имеющих развитого профиля. Син.: серая пустынная почва.

1928. ПУСТЫ́ННАЯ СЕ́РАЯ СЕ́ВЕРНАЯ ПО́ЧВА //northern gray desert soil // sol désertique gris du Nord //nordischer graue Wüstenboden - устаревший термин американской школы для полупустынных серозёмов. Син.: серозём.

1929. ПУСТЫ́ННЫЙ ДЕТРИ́Т //desert detritus //debris désertique, détritus desertique //Wüstendetritus, Wüstenüberreste - щебнистый покров каменистых пустынь. Син.: пустынный каменистый покров, пустынный панцырь.

1930. ПУСТЫ́ННЫЙ ЗАГА́Р //desert varnish //vernis du désert, vernis désertique //Wüstenlack - см. Защитная корка.

1931. ПУСТЫ́ННЫЙ КАМЕНИ́СТЫЙ ПОКРО́В //desert pavement //pavés du désert //Wüstenpflasterboden, Steinschuttmäntel, Steinsohle - щебнистый покров каменистых пустынь, результат эолово-термического выветривания. Син.: пустынный детрит, пустынный панцырь.

1932. ПУСТЫ́ННЫЙ ПА́НЦЫРЬ //desert pavement, desert quirasse //pavés du desert, quirasse désertique//Wüstenpflasterboden - см.

Пустынный каменистый покров. Син.: пустынный детрит, пустынный каменистый покров.

1933. ПУСТЫ́НЯ КАМЕНИ́СТАЯ - см. Каменистая пустыня.

1934. ПУЦЦОЛА́Н //pouzzolane //pouzzolané //Pouzzolane (от франц. poussier - труха, либо poussiéré - пыль, прах) - местное название во французском Центральном массиве рыхлых легко эродируемых сильно гумусированных маломощных почв на вулканических пеплах.

1935. ПЯТНИ́СТО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //mottled podzolic soil, speckled podzolic soil //sol podzolique marbré //gesprenkelter Podsolboden - термин Н.А.Ногиной (1972) для своеобразных почв Восточной Сибири, в которых оподзоленность выражена пятнисто, т.е. в одном разрезе имеются участки с ясно выраженным белёсым горизонтом, обычно маломощным (3-4 см и менее), и участки, где его совсем нет, где прямо под подстилкой залегает ожелезненный охристо-бурый горизонт В.

1936. ПЫХУ́Н //pychun //pyhun //Pychun - народный русский термин, распространенный в Сибири для распылённых (бесструктурных и микроструктурных) почв черноземного или лугово-черноземного типов .

1937. РА́МБЛА //rambla //rambla //Rambla - термин немецкой школы (Кубиена, 1953) для слабо развитых пойменных почв на грубозернистом аллювии (прирусловья) с профилем (А)-С. Син.: наносная грубая почва, пойменная дерновая слабо развитая почва.

1938. РА́НКЕР //ranker //ranker //Ranker (от австр. Rank - крутой склон) - 1) термин Кубиены (1953), широко распространившийся в западно-европейских школах, для слабо дифференцированных почв с профилем А-С на кислых кремнеземистых породах, преимущественно в горных условиях. Син.: гумусо-силикатная почва; 2) термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, не имеющих иных диагностических горизонтов кроме тёмного[x] горизонта А, лежащего непосредственно на бескарбонатной породе, встречающейся не ближе 25 см от поверхности; 3) термин франц.шк. (1965,1967) для группы слаборазвитых гумусовых почв (см.), имеющих хорошо развитый гумусовый горизонт А с частично гумифицированным органическим веществом, не имеющих горизонта В, формирующихся на кислых бескарбонатных породах, имеющих pH менее 6,8.

1939. РА́НКЕР АЛЬПИ́ЙСКИЙ //alpine ranker //ranker alpine //alpiner Ranker - термин западно-европейских школ для ранкеров альпийского пояса, характеризующихся слабой гумификацией органического вещества, перемешанного с мелкой щебенкой кислых пород в горизонте А, при почти полном отсутствии глинообразования и кислой реакции почвы; мощность почвы с профилем А-С обычно 15-20 см. Син.: альпийская гумусовая почва.

1940. РА́НКЕР АТЛАНТИ́ЧЕСКИЙ //atlantic ranker //ranker atlantique //atlantischer Ranker - термин франц.шк. (1965) для подгруппы ранкеров (см.), формирующихся в условиях атлантического гумидного климата.

1941. РА́НКЕР-БУРОЗЁМ //ranker-brownearth //ranker-sol brun //Ranker-Braunerde - термин немецкой школы для почв, переходных между ранкером и бурозёмом.

1942. РА́НКЕР КОЛЛЮВИА́ЛЬНЫЙ //colluvial ranker //ranker colluvial// Kolluvialranker - термин западно-европейских школ для слабо дифференцированных почв с профилем А-С, формирующихся на кислых кремнеземистых породах в условиях постоянного омоложения профиля за счет приноса коллювиального рыхлого материала, отличающегося несортированностью и большой щебнистостью. Син.: кислая коллювиальная почва.

1943. РА́НКЕР КРИ́ПТОПОДЗО́ЛИСТЫЙ //cryptopodzolic ranker //ranker crypto-podzolique //kriptopodsolischer Ranker - устаревший термин франц.шк. См.: Криптоподзолистая гумусированная почва.

1944. РА́НКЕР МО́ДЕРОВЫЙ //moder ranker //ranker à moder Moderranker - термин франц.шк. (1967) для подгруппы ранкеров (см.), имеющих среднеразложенный гумус типа модер.

1945. РА́НКЕР МО́ДЕРОВЫЙ ВЫСОКОГО́РНЫЙ //alpine moder ranker //ranker à moder altialpin //alpiner Moderranker - термин франц.шк. (1967) для подгруппы ранкеров (см.), имеющих среднеразложенный гумус типа модер и формирующихся в условиях высокогорий.

1946. РА́НКЕР МО́РОВЫЙ //mor ranker //ranker à mor //Morranker - термин франц.шк. (1967) для подгруппы ранкеров (см.), имеющих грубый гумус типа мор.

1947. РА́НКЕР МО́ЛЛЕВЫЙ //mull ranker //ranker à mull //Mullranker - термин нем.шк. для подгруппы ранкеров, имеющих моллевый тип гумуса.

1948. РА́НКЕР ПСЕ́ВДОАЛЬПИ́ЙСКИЙ //pseudo-alpine ranker //ranker pseudo-alpine//pseudo-alpiner Ranker - термин западно-европейских школ для сильно гумусированных почв субальпийского пояса с профилем А-С, характеризующихся значительной мощностью гумусового щебенчатого горизонта (40-50 см), кислым фульватным гумусом, относительно развитым глинообразованием и некоторым передвижением вниз по профилю железа в нижнюю часть горизонта A_1. Син.: гумусо-силикатная почва, ранкер криптоподзолистый, ранкер скрытоподзолистый. Во франц.шк. (1967) термин заменен на термин криптоподзолистая гумусированная почва.

1949. РА́НКЕР СКЛО́НОВЫЙ //slope ranker //ranker de pente //Abhangranker - см. Ранкер эрозионный.

1950. РА́НКЕР СКРЫ́ТОПОДЗО́ЛИСТЫЙ //cryptopodzolic ranker //ranker cryptopodzolique //criptopodsolierter Ranker - см. Ранкер псевдоальпийский, Ранкер криптоподзолистый.

1951. РА́НКЕР ТРОПИ́ЧЕСКИЙ //tropical ranker //ranker tropique //tropischer Ranker - термин франц.шк. (1965) для подгруппы ранкеров (см.), формирующихся в условиях тропического гумидного климата.

1952. РА́НКЕР ТУ́НДРОВЫЙ //tundra ranker //ranker de toundra //Tundraranker - термин немецкой школы для грубогумусных (полуторфянистых) высокогорных тундровых почв нивального пояса. Син.: гумусо-силикатная почва.

1953. РА́НКЕР ЭРОЗИО́ННЫЙ //erosion ranker //ranker d'erosion //Erosionranker - термин западно-европейских школ для почв со слабо дифференцированным профилем А-С, формирующихся на кислых кремнеземистых породах в условиях постоянно идущей эрозии поверхности, что приводит к постоянному омоложению почвы; почвы маломощные и щебнистые с поверхности, с кислым гумусом типа модер или даже мор. Син.: Ранкер склоновый.

1954. РАССОЛЁННАЯ ПО́ЧВА //desalinized soil //sol desalifié //entsalzerter Boden - термин для почв, потерявших своё засоление в результате современных вторичных процессов, как например, в случае мелиорации.

1955. РАССОЛОНЦО́ВАННАЯ ПО́ЧВА //dealkalized soil //sol déalcalisé //entbaserter Boden - термин для почв, потерявших свои солонцовые свойства в результате современных вторичных процессов, как например, в случае мелиорации.

1956. РАСТИ́ТЕЛЬНОНАЗЕ́МНАЯ ПО́ЧВА // terrestrial soil // sol terrestre // Landboden, terrestrischer Boden - термин В.В.Докучаева для почв, формирующихся под влиянием растительного покрова в условиях атмосферного увлажнения. Син.: наземная п., сухопутная п., субаэральная п.

1957. РЕ́Г // reg // rég // Reg (от арабск. регх) - употребляемое в Алжирской Сахаре название каменистых пустынь типа серир. Син.: каменистая пустыня.

1958. РЕГОСО́ЛЬ // rhegosol, regosol // rhegosol // Rhegosol (от греч. rhegos - покров и лат. solum - почва) - 1) термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв на рыхлых неаллювиальных отложениях с очень слабо развитым профилем, практически не дифференцированным или лишь слабо дифференцированным на генетические горизонты; 2) термин канадской школы (1968) для порядка и большой группы почв, хорошо или слабо дренированных с хорошими до умеренных условиями окисления, имеющих слабо развитый профиль с горизонтами, слишком слабо выраженными для того, чтобы быть отнесенными к какому-либо определенному диагностическому типу.

1959. РЕГОСО́ЛЬ // regosol // régosol // Regosol (от гр. rhegos - покров) - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы почв, входящих в группу Грубых минеральных эрозионных почв (см.), формирующихся на рыхлых породах и имеющих профиль (А)С или С.

1960. РЕГОСО́ЛЬ БЕ́ДНАЯ // dystric rhegosol // rhegosol dystrique // dystrischer Rhegosol (от греч. rhegos - покров, лат. solum - почва и греч. dystrophe - отсутствие пищи) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, развитых на рыхлых современных неаллювиальных отложениях, не имеющих никаких диагностических горизонтов, за исключением возможного светлого[x)] горизонта А, и имеющих pH (KCl) ниже 4,2 в верхней 50-см толще.

1961. РЕГОСО́ЛЬ БОГА́ТАЯ // eutric rhegosol // rhegosol eutrique // eutrischer Rhegosol (от греч. rhegos - покров, лат. solum - почва и греч. éutrophe - хорошая пища) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, развитых на рыхлых современных неаллювиальных отложениях, не имеющих никаких диагностических горизонтов, за исключением возможного светлого[x)] горизонта А, и имеющих pH (KCl) 4,2 и выше в верхней 50-см толще.

1962. РЕ́ГОСО́ЛЬ ЗАСОЛЁННАЯ //saline regosol //regosol saline //salzartige Regosol - термин канадской школы (1968) для регосолей имеющих солевой горизонт в пределах 100 см от поверхности.

1963. РЕ́ГОСО́ЛЬ КАРБОНА́ТНАЯ //calcaric rhegosol //rhegosol calcaire //kalkarischer Rhegosol (от греч. rhegos - покров, лат. solum - почва и лат. calxic - известь) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, развитых на карбонатных рыхлых современных отложениях, не имеющих никаких диагностических горизонтов, за исключением возможного светлого[x)] горизонта А, имеющих pH (KCl) 4,2 и выше в верхней 50-см толще и содержащих достаточное количество карбонатов в той же толще для вскипания при действии 10% HCl.

1964. РЕ́ГОСО́ЛЬ КРИОГЕ́ННАЯ //cryic rhegosol //rhegosol cryique //kryischer Rhegosol (от греч. rhegos - покров, лат. solum - почва, греч. cryos - холод и génos - род) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, развитых на рыхлых современных неаллювиальных отложениях, не имеющих никаких диагностических горизонтов, за исключением возможного светлого[x)] горизонта А и имеющих слой многолетней мерзлоты в пределах 100-см толщи.

1965. РЕ́ГОСО́ЛЬ КРИОГЕ́ННАЯ //cryic regosol //regosol cryique //kryischer Regosol (от гр. cryos - холод) - термин канадской школы (1968) для регосолей, имеющих слой многолетней мерзлоты в пределах 100 см от поверхности.

1966. РЕ́ГОСО́ЛЬ КУМУЛЯ́ТИВНАЯ //cumulic regosol //regosol cumulique //kumulischer Regosol (от лат. accumulatio - накопление) - термин канадской школы (1968) для регосолей, имеющих нерегулярный гумусовый горизонт в виде темных прослоек в верхней части профиля и не имеющих в профиле солей, оглеения, многолетней мерзлоты или плотной породы в пределах 100 см от поверхности.

1967. РЕ́ГОСО́ЛЬ ОГЛЕ́ЕННАЯ //gleyed regosol //regosol gleyifié //vergleyter Regosol (от русск. глей) - термин канадской школы (1968) для регосолей, имеющих в профиле признаки слабого оглеения в пределах 50 см от поверхности.

1968. РЕ́ГОСО́ЛЬ СКА́ЛЬНАЯ //lithic regosol //regosol lithique //lithischer Regosol (от гр. lithos - камень) - термин канадской школы (1968) для регосолей, имеющих в профиле плотную породу

в пределах от 10 до 50 см от поверхности, или для регосолей, имеющих сухой торф (либо подстилку) более 10 см мощности и минеральный материал до 10 см мощности над плотной породой.

1969. РЕ́ГОСО́ЛЬ ТИПИ́ЧНАЯ //orthic regosol //regosol orthique //orthischer Regosol (от гр.orthos - настоящий) - термин канадской школы (1968) для регосолей на рыхлых породах, не имеющих в профиле солей, оглеения, многолетнеи мерзлоты или плотной породы в пределах 100 см от поверхности.

1970. РЕ́ГОСО́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //regosolic soil //sol régosolique, sol régique, sol régolique //regosolischer Boden (от гр.rhegos - покров) - термин франц.шк. (1965) для подгруппы слаборазвитых эрозионных почв (см.), формирующихся на рыхлых породах.

1971. РЕГРАДИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //regraded soil //sol regradé //regradierter Boden (от лат.regradatio - обратное движение) - общеупотребительный термин для почв, изменившихся в процессе эволюции в сторону подщелачивания реакции, увеличения насыщенности основаниями, увеличения карбонатности и гумусированности.

1972. РЕ́ГУР //regur //régur //Regur (от народного индийского названия на хинди - regar) - черные тропические почвы, сильноглинистые и трещиноватые, набухающие при увлажнении, с низким содержанием гумуса, распространенные на низких ровных поверхностях тропических саванн. Син.: черная хлопковая п., черная тропическая п., тропический чернозем, вертисоль.

1973. РЕЛИ́КТОВАЯ ПО́ЧВА //relic soil, relict soil //sol relique, sol relicte //Restboden, Reliktboden (от лат.relictum - остаток) - 1) см. Ископаемая почва; 2) термин для почв, в строении профиля и свойствах которых имеются черты, возникшие в прежних условиях почвообразования, отличных от современных, например латеритные почвы в пустынях Австралии и т.п.

1974. РЁМАРК //remarc //rémarc //Rëmark - термин немецкой школы для высокогорных очень слабо развитых почв с профилем (А)-С. Син.: неразвитая альпийская почва.

1975. РЕНДЗИ́НА //rendzina //rendzine //Rendzina (от польск.народн. названия мелких вязких почв на известняках, воспроизводящего звук идущего по камням плуга) - 1) термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, не имеющих других диагностических горизонтов кроме моллевого[x)] горизонта А и,

возможно, камбиевого[x)] горизонта В, причем горизонт А мощностью не более 50 см, содержащих или непосредственно перекрывающих карбонатный материал, имеющий более 40% $CaCO_3$; плотная порода не встречается ближе 25 см от поверхности; 2) общеупотребительный термин для почв с профилем А-С, формирующихся на карбонатных породах; согласно западно-европейским школам, рендзины имеют гумус типа мюлль и образуются только на карбонатных породах, достаточно мягких и глинистых для обеспечения хорошего перемешивания почвенного материала; согласно Палльману (1947) термин относится только к слабо скелетным почвам на мергелях; 3) термин франц.шк. (1967) для группы почв, входящей в подкласс карбонатных почв класса кальцемагнезиальных почв, имеющих маломощный профиль АС или AR, зернистую или комковатую структуру и более, чем следы карбонатов кальция в горизонте А, pH менее 7,0, не имеющих горизонта В или (В), формирующихся на плотных карбонатных породах.

1976. РЕНДЗИ́НА АЛЬПИ́ЙСКАЯ //alpine rendzina //rendzine alpine //alpiner Rendzina - термин западно-европейских школ для маломощных сильно-гумусированных кислых почв альпийского высокогорного пояса, формирующихся на карбонатных породах и являющихся аналогами ранкеров.

1977. РЕНДЗИ́НА АЛЬПИ́ЙСКАЯ С ГИ́ДРОМО́ДЕРОМ //alpine rendzina with hydromoder //rendzine alpine avec hydromoder //alpiner Rendzina mit Hydromoder - термин западно-европейских школ для альпийских высокогорных рендзин нивального пояса с торфянистым гумусом и следами криотурбации в почвенном профиле (выталкивание камней на поверхность) и солифлюкции, приводящеи к ярусному расположению полос из щебня и камней. Син.: Печрендзина (Кубиена, 1953).

1978. РЕНДЗИ́НА БЕ́ЛАЯ //white rendzina //rendzine blanc //weisse Rendzina - см. Рендзина серая.

1979. РЕНДЗИ́НА БРЮНИФИЦИ́РОВАННАЯ //brunified rendzina //rendzine brunifiée //braunartiger Rendzina - термин франц.шк. (1965) для почв, переходных от рендзин к буроземам и формирующихся на глинистых и суглинистых малокарбонатных породах; они имеют профиль А-(В)-С или даже А-В-С и менее гумусны, без зернистой структуры. Син.: рендзина деградированная, рендзина бурая.

1980. РЕНДЗИ́НА БРЮНИФИЦИ́РОВАННАЯ ГУ́МУСОВАЯ //humic brunified rend-

zina //rendzine brunifiée humifèré //braunartiger Humusrendzina - термин франц.шк. (1967) для подгруппы бурых кальциевых почв (см.), имеющих слабо развитый переходный горизонт (В), содержащих 10-20% гумуса.

1981. РЕНДЗИ́НА БРЮНИФИЦИ́РОВАННАЯ ТИПИ́ЧНАЯ //typical brunified rendzina //rendzine brunifiée modal//typischer braunartiger Rendzina - термин франц.шк. (1967) для подгруппы бурых кальциевых почв (см.), имеющих слаборазвитый переходный горизонт (В), содержащих менее 10% гумуса.

1982. РЕНДЗИ́НА БУ́РАЯ //brown rendzina //rendzine brun //verbraunter Rendzina - 1) термин немецкой школы для рендзин, имеющих преобладание бурой окраски в гумусовом горизонте А; 2) термин французской школы для брюнифицированных рендзин; в обоих случаях почва представляет собой переход к бурозёмам.

1983. РЕНДЗИ́НА ДЕГРАДИ́РОВАННАЯ //degraded rendzina //rendzine dégradée //degradierter Rendzina - см. Рендзина брюнифицированная.

1984. РЕНДЗИ́НА ДОЛОМИ́ТОВАЯ //dolomitic rendzina //rendzine dolomitique //dolomitischer Rendzina - термин французской школы для рендзин, формирующихся на доломитовых известняках или известковистых песчаниках и являющихся переходными от рендзин к бурозёмам; они обычно мало глинистые и часто раздельночастичные.

1985. РЕНДЗИ́НА КРА́СНАЯ //red rendzina //rendzine rouge //rote Rendzina - термин западно-европейских школ для подтипа типичных рендзин, богатых окислами железа, иногда рубефицированных (в этом случае они древнего происхождения). Формируются часто в результате переотложения терра-россы и обломков известняков и почти всегда являются вторичными.

1986. РЕНДЗИ́НА МАГНЕЗИА́ЛЬНАЯ //magnesium rendzina //rendzine magnésienne //Magnezia-Rendsina - термин западно-европейских школ для рендзин, сформировавшихся на плотных породах, содержащих карбонат магния наряду с известью.

1987. РЕНДЗИ́НА МА́ЛОКАРБОНА́ТНАЯ //poor in fine calcium carbonate rendzina //rendzine pauvre en calcaire fin //kalkmagerer Rendzina - термин франц.шк. (1967) для подгруппы рендзин, содержащих в горизонте А мало тонкодисперсного карбоната кальция.

1988. РЕНДЗИ́НА МО́ЛЛЕВИ́ДНАЯ //mull-like rendzina //rendzine de mull //mullartiger Rendzina - термин немецкой школы для рендзин с хорошо сформированным относительно мощным профилем и с большим содержанием муллевого гумуса.

1989. РЕНДЗИ́НА НАСТОЯ́ЩАЯ //true rendzina //rendzine vraié //echter Rendzina - термин франц.шк. (1965) для группы маломощных почв с профилем АС, входящих в подкласс рендзиновидных почв (см.), характеризующихся мелкой или средней структурой (зернистой или ореховатой).

1990. РЕНДЗИ́НА ОКРА́ШЕННАЯ //chromic rendzina //rendzine chromique //chromischer Rendzina (от польск.народн.названия и греч. chromos - цвет) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для рендзин (см.), имеющих бурую, буроватую или красноватую окраску профиля.

1991. РЕНДЗИ́НА ПОДУ́ШКООБРА́ЗНАЯ //pillow-like rendzina //rendzine en forme de coussin //Polsterrendzina - термин западно-европейских школ для относительно сухих высокогорных рендзин, формирующихся в альпийском поясе под специфической ксерофильной растительностью (Silene acaulis), образующей полусферические подушки; органическое вещество образует с поверхности сухой волокнистый горизонт, а глубже - более гумифицированный, черный, из более свежего материала. Син.: польстеррендзина (Кубиена, 1953).

1992. РЕНДЗИ́НА СЕ́РАЯ //gray rendzina //rendzine gris //grauer Rendzina - термин западно-европейских школ для подтипа типичных рендзин, очень богатых известью и малогумусных, формирующихся обычно на мелах. Син.: рендзина белая.

1993. РЕНДЗИ́НА СИ́ЛЬНО ВСКИПА́ЮЩАЯ //strongly effervescent rendzina //rendzine à très forte effervescence //stark aufbrausender Rendzina - термин франц.шк. (1967) для подгруппы рендзин, богатых активным карбонатом кальция.

1994. РЕНДЗИ́НА СИ́ЛЬНО ГУМУСИ́РОВАННАЯ //strongly humusified rendzina //rendzine tres humifèré //stark humus Rendzina - термин франц.шк. (1967) для подгруппы рендзин, содержащих 10-20% гумуса в горизонте А.

1995. РЕНДЗИ́НА СМЕ́ШАННАЯ //mixed rendzina, mixed carbonated siliceous soil //sol rendziniforme mixte, rendzine silico-calcaire //rendsinartiger Boden, Kieselkalkrendzina, gemischter karbo-

nathaltiger Kieselboden - устаревший термин западно-европейских школ для рендзин, формирующихся на карбонатных, но не известняковых, породах.

1996. РЕНДЗИ́НА СУ́БАЛЬПИЙСКАЯ //subalpine rendzina //rendzine subalpine //Tangelrendzina - термин немецкой школы для грубогумусных маломощных рендзин субальпийского пояса.

1997. РЕНДЗИ́НА ТЁМНАЯ //pellic rendzina //rendzine pellique //pellischer Rendzina (от польск.народн.названия и греч.pellos - темный, лишенный окраски) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для рендзин (см.), имеющих серую, темносерую или черную окраску тусклых тонов в верхней 30-см толще профиля.

1998. РЕНДЗИ́НА ТИПИ́ЧНАЯ //typical rendzina //rendzine typique, modal //typischer Rendzina - 1) термин западно-европейских школ для основного типа рендзин, формирующихся на породах,достаточно богатых как карбонатами, так и глинами с образованием гумуса типа насыщенного кальцием мюлля. Среди них выделяются серые или белые, красные и черные лесные рендзины в качестве подтипов; 2) термин франц.шк. (1967) для подгруппы рендзин, содержащих умеренное количество гумуса и умеренно вскипающих с поверхности.

1999. РЕНДЗИ́НА ЧЁРНАЯ //black rendzina //rendzine noire //schwarze Rendzina - термин западно-европейских школ для подтипа типичных рендзин, формирующихся под лесами на склонах с осыпями; они сильно гумусированы и содержат мало глины; этот подтип является переходным к типу горных гумусных карбонатных почв.

2000. РЕНДЗИ́НА ЧЁРНАЯ ГО́РНАЯ //mountainous black rendzina //rendzine noire de montagne //schwarze Gebirgsrendzina - термин западно-европейских школ для сильно гумусированных и сильно щебнистых почв горных склонов, формирующихся на плотных известняках. Син.: гумусо-карбонатная почва, перегнойно-карбонатная почва.

2001. РЕНДЗИ́НОВИ́ДНАЯ ПО́ЧВА //rendzina-like soil //sol rendziniformé //rendzinartiger Boden - термин франц.шк. (1965) для подкласса кальцемагнезиморфных почв, формирующихся на известковых или доломитовых породах, относительно богатых гумусом и имеющих хорошо оформленную структуру.

2002. РЕНДО́ЛЛЬ //rendoll //rendoll //Rendoll (от польск.rendzina - рендзина и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка моллисолей (см.) и единственной входящей в этот подпорядок большой почвенной группы; рендоллы - это моллисоли, которые не имеют аргиллового[x)] или кальциевого[x)] горизонта; они содержат материал, включая грубые фрагменты менее 7,5 см диаметром, который имеет более 40% $CaCO_3$ в или непосредственно под моллевым[x)] поверхностным горизонтом; моллевый горизонт имеет мощность не более 50 см. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 10 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) криогенные (cryic), 4) энтовые (entic), 5) эутрохрептовые (eutrochreptic), 6) эутропептовые (eutropeptic), 7) гаплустовые (haplustic), 8) торфянистые (histic), 9) маломощные (lithic) и 10) трещиноватые (vertic) рендоллы.

2003. РЕТИНИЗИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //retinized soil //sol retinizée //retinisierter Boden (от лат.retina - сеть) - термин Н.А.Караваевой и В.О.Таргульяна (1960) для почв, формирующихся в присутствии многолетней мерзлоты в профиле и характеризующихся наличием надмерзлотного второго гумусового горизонта, в котором гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами в отличие от поверхностного гумусового горизонта этих почв с преобладанием фульвокислот над гуминовыми.

2004. РЖА́ВАЯ ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //rusty coloured forest soil //sol forestier de coleur de rouille //rostfarbener Waldboden - 1) устаревший термин Г.Штремме для бурых лесных песчаных почв, имеющих яркую бурую окраску; 2) устаревший термин канадск.шк. для буроокрашенных кислых ожелезненных потечно-гумусовых почв лесов севера Канады, не имеющих осветленного оподзоленного горизонта; син.: Подбур таёжный.

2005. РИГОСО́ЛЬ //rigosol //rigosol //Rigosol, rigolte Boden - термин западно-европейских школ для почв террасированных склонов, используемых под плантации. Син.: террасированная почва.

2006. РИ́СОВАЯ ПО́ЧВА //paddy soil, rice soil //sol à riz //Reisboden - общеупотребительный термин для затопляемых ежегодно под культуру риса почв, обладающих после многолетнего использования рядом общих специфических особенностей.

2007. РО́ДОКСЕРА́ЛЬФ //rhodoxeralf //rhodoxeralf //Rhodoxeralf (от

греч.rhodon - темнокрасная роза, греч.xeros - сухой и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ксеральфов (см.), которые имеют тёмнокрасную окраску во всех частях аргиллового[x] горизонта и не имеют натриевого[x] горизонта или дурипэна[x]. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 4 подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) маломощные (lithic), 3) окисные (oxic) и 4) петрокальциевые (petrocalcic) родоксеральфы.

2008. РО́ДУДУ́ЛЬТ //rhodudult //rhodudult //Rhodudult (от греч.rhodon - темнокрасная роза, лат.udus - влажный и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удультов (см.), которые: 1) имеют темнокрасную окраску верхних горизонтов; 2) имеют темнокрасную окраску аргиллового[x] горизонта; 3) не имеют фраджипэна[x] 4) не имеют сплошного плинтита[x] в пределах 1,25 м от поверхности; 5) обнаруживают уменьшение содержания глины более чем на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, а слой, в котором происходит это уменьшение, не имеет признаков элювиирования глины; 6) аргиллювый горизонт содержит более 10% способных к выветриванию минералов во фракции 20-200 μ в пределах верхнего метра. В пределах этой большой почвенной группы выделяются три подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) маломощные (lithic) и 3) псамментовые (psammentic) родудульты.

2009. РО́ДУСТА́ЛЬФ //rhodustalf //rhodustalf //Rhodustalf (от греч. rhodon - темнокрасная роза, лат.ustus - обожженный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устальфов (см.), которые: 1) имеют темнокрасный аргиллювый[x] горизонт, 2) не имеют натриевого[x] горизонта или дурипэна[x] в пределах 1 м и петрокальциевого[x] горизонта в пределах 1,5 м от поверхности; 3) не имеют плинтита[x] в пределах 1,25 м от поверхности; 4) имеют аргиллювый горизонт с таким распределением глины, что: а) содержание глины уменьшается более чем на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, если преобладает темнокрасная окраска; б) песчаный или суглинистый состав в верхней части, если имеет место увеличение глины на 20% на расстоянии 7,5 см или на 15% на расстоянии 2,5 см на верхней границе. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 4 подгруп-

пы почв: 1) типичные (typic), 2) маломощные (lithic), 3) окисные (oxic) и 4) влажные (udic) родустальфы.

2010. РОДУСТУЛЬТ //rhodustult //rhodustult //Rhodustult (от греч. rhodon - темнокрасная роза, лат.ustus - обожженный и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устультов (см.), которые: 1) имеют темнокрасную окраску профиля; 2) не имеют сплошного плинтита[x)] в пределах 1,25 м от поверхности; 3) обнаруживают уменьшение содержания глины более чем на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, а слой с уменьшением содержания глины не имеет признаков элювиирования глины; 4) имеют аргиллювый[x)] горизонт с содержанием способных к выветриванию минералов более 10% во фракции 20-200μ в верхней метровой толще его.

2011. РУБРОЗЁМ //rubrozem //rubrozem //Rubrosem (от лат.rubrum - красный и русск. земля) - термин амер.шк. для красновато-черных почв субтропических прерий, в которых процесс ослабленной ферраллитизации сочетается с усиленным гумусонакоплением.

2012. РУБЕФИЦИРОВАННАЯ ПОЧВА //rubeficized soil //sol rubefié //rubefizierter Boden - термин для почв, в которых имеет место процесс необратимой коагуляции и последующей кристаллизации окислов железа в профиле в результате периодического просыхания почвы в сухой и жаркий период года после приноса их и отложения в течение влажного периода.

2013. РУДЯК - см. Болотная руда.

2014. РУСЛОВАЯ ПОЧВА //flow earth, flowage soil //sol d'ecoulement, sol fluageuse //Fließerde - термин немецкой школы для грубого прируслового наноса водных потоков, или руслового наноса временных пересыхающих потоков.

2015. РУХЛЯК //ruchlak //ruhlac //Ruchlak - русский народный термин для рыхлых горных пород различного происхождения и состава.

2016. САДОВАЯ ПОЧВА //hortisol, garden soil //sol de jardin //Gartenboden - общеупотребительный термин для сильно окультуренных почв зрелых садов, вспаханных на большую глубину и обильно удобряемых, в результате чего они сильно и глубоко гумусированы и богаты элементами питания, имеют благоприятные водно-физические свойства. Син.: хортисоль.

2017. САЗОВАЯ ПОЧВА //saz soil //sol de saz //Sasboden (от тюрк.) - термин, распространенный в республиках Средней Азии, для почв подгорных равнин, развивающихся под влиянием грунтовых вод "сазового" (подгорного, устойчивого) режима и омергелеванных в нижней части профиля.

2018. САЛОРТИД //salorthid //salorthid //Salorthid (от лат.sal - соль, греч.orthos - настоящий и порядкового корня id для аридисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортидов (см.), которые: 1) не имеют солевого[x)] горизонта с его верхней границей в пределах 75 см от поверхности, если насыщены водой (т.е. в пределах капиллярной каймы) в пределах 1 м от поверхности более, чем 1 месяц; 2) не имеют кальциевого[x)] или гипсового[x)] горизонта выше солевого горизонта; 3) не имеют дурипэна[x)] в пределах 1 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются две подгруппы почв: 1) типичные (typic) и 2) моллевые (mollic) салортиды.

2019. САМОМУЛЬЧИРУЮЩАЯСЯ ПОЧВА //selfmulching soil //sol à bonne structure naturelle, sol à mulching naturel, sol à structure finement divisée (autodivision) //selbstmulchiger Boden, Ackergare - общеупотребительный термин для глинистых малогумусных почв, склонных к образованию рыхлой гранулированной мульчи на поверхности в результате чередования замерзания и оттаивания или увлажнения и высыхания.

2020. САПРИСТ //saprist //saprist //Saprist (от греч.saprós - гнилой, сгнивший и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка гистосолей (см.), имеющих перегнойный верхний горизонт, в котором ботанический состав растительных остатков в большей части нельзя определить; в пределах этого подпорядка выделяются 4 большие почвенные группы: 1) боросапристы, 2) криосапристы, 3) медисапристы и 4) тропосапристы (см.).

2021. САПРОПЕЛЬ //sapropel //sapropel //Sapropel (от греч. saprós - гнилой и pelós - ил) - органический ил, вязкие илистые отложения, образующиеся на дне застойных водоёмов в результате перегнивания остатков растительных и животных организмов, преимущественно в анаэробных условиях.

2022. СВЕТЛОЗЁМ //light coloured soil //sol clair //Hellboden, Hel-

lerde - устаревший термин Н.А.Димо (1907) для типа серозёмов. Син.: серозём.

2023. СВЕТЛОЗЁМ СТРУКТУ́РНЫЙ //structured light coloured soil //sol clair structural //Strukturhellboden - устаревший термин Н.А.Димо (1907) для одного из выделявшихся им подтипов серозёмов. В настоящее время эти почвы выделяются как тип серобурых пустынных почв. Син.: Серо-бурая пустынная почва.

2024. СВЕ́ТЛО-КАШТА́НОВАЯ ПО́ЧВА //light chestnut soil //sol châtain clair //hellkastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. для подтипа каштановых почв, содержащих в верхнем 15-см слое 1,5-2,5% гумуса при глинистом и суглинистом составе и 1,2-1,8% - при супесчаном; 2) термин русск.шк. (1967) для подтипа каштановых почв умеренной восточно-европейской и казахстанской фации, содержащих указанное выше количество гумуса.

2025. СВЕ́ТЛО-КАШТА́НОВАЯ ГЛУБИ́ННО-ХОЛО́ДНАЯ МУЧНИ́СТОКАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //mealcarbonated deep-cold light chestnut soil //sol châtain clair calcaire en gruau èn froid profond //tieferkalt mehlkalkischer hellkastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа каштановых почв глубинно-холодной восточно-сибирской фации, характеризующихся малой мощностью профиля (А+В, до 25 см), мучнистой формой карбонатных выделений, отсутствием выделений гипса и солей.

2026. СВЕ́ТЛО-КАШТА́НОВАЯ ТЁПЛАЯ ПО́ЧВА //warm light chestnut soil //sol châtain clair chaude //warm hellkastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа каштановых почв тёплой южноевропейской фации, характеризующихся содержанием гумуса в горизонте A_1 1,5-2,3%, мощностью горизонтов A_1+B_1 30-40 см, слабой выраженностью карбонатной плесени, поверхностным вскипанием, наличием белоглазки с глубины 40-60 см, солонцеватостью.

2027. СВЕ́ТЛО-СЕ́РАЯ ПО́ЧВА //light gray soil //sol gris clair //hellgrauer Boden - см. Светло-серая лесная почва.

2028. СВЕ́ТЛО-СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //light gray forest soil //sol gris clair forestier //hellgrauer Waldboden - термин русск.шк.для подтипа серых лесных почв, переходного к дерново-подзолистым почвам, от которых они отличаются ореховатой структурой оподзоленного горизонта A_2B; профиль, как и у всех серых лесных почв, имеет строение A_0-A_1-A_2B-B-C и характеризуется обильной

белёсой присыпкой SiO_2 в верхней части.

2029. СВЕ́ТЛО-СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА - см. Серая лесная глеевая малогумусная почва.

2030. СВЕ́ТЛО-СЕ́РАЯ ЛЕ́СО-СТЕПНА́Я ПО́ЧВА //light gray forest-steppe soil //sol gris clair de steppe à forêt //hellgrauer Waldsteppenboden - см. Светло-серая лесная п.

2031. СЕ́БХА //sebcha, sebkcha //sebcha //Sebcha (от арабск.народного названия) - 1) название временных солёных озер, расположенных в котловинах пустынь на севере Африки; в сухие длительные периоды они пересыхают и превращаются в солончаки; наиболее крупные себхи называются по арабски шоттами; 2) термин, употребляемый в северной Африке для солончаков с мощными солевыми поверхностными корами, вспученными (как бы вспаханными плугом) с образованием землисто-солевых глыб на поверхности; 3) почвенные поверхности серовато-белёсого цвета, связанные с солончаками.

2032. СЕВЕРОТАЁЖНАЯ МЕРЗЛО́ТНАЯ ПА́ЛЕВАЯ ОЖЕЛЕЗНЁННАЯ ПО́ЧВА //north taiga cryogenic buffish ferrimorphic soil //sol ferrugineux cryogene de couleur chamois de taiga du nord //eisenhaltiger Nordtaigagemsfarbigboden - термин И.П.Герасимова (1952) для почв горной северной ксерофитной тайги, характеризующихся наличием гумусового горизонта, равномерным распределением оснований по профилю, полной насыщенностью подгумусовых горизонтов, нейтральной реакцией, отсутствием оподзоливания и оглеения, наличием поверхностного ожелезнения (по валовому анализу).

2033. СЕ́МИПОДЗО́Л //semipodzol //semipodzol //Semipodsol - см. Полуподзол.

2034. СЕ́РАЯ ЗЕМЛЯ́ //gray earth //terre gris //grauer Erde - устаревшее название русск.шк. для серых лесных почв.

2035. СЕ́РАЯ ПО́ЧВА //gray soil //sol gris //grauer Boden - см. Серая лесная почва.

2036. СЕ́РАЯ ГИДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //gray hydromorphic soil //sol hydromorphé gris //graue hydromorpher Boden - термин американской школы для серых сиаллитных суглинистых почв тропиков и субтропиков, соответствующих псевдоглею. Син.: Белый суглинок, Пластосоль серая, Серый суглинок.

2037. СЕ́РАЯ ГРУНТО́ВО-ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА - см. Серая лесная грунтово-глееватая п.

2038. СЕ́РАЯ ГРУНТО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА - см. Серая лесная грунтово-глеевая п.

2039. СЕ́РАЯ ДРЕВЕ́СНАЯ ПО́ЧВА //gray wooded soil //sol gris de bois //grauer Holzboden - термин канадской школы (1968) для большой группы почв, входящей в порядок лювисольных почв, для которых характерно наличие гумусового, осветленного элювиального и иллювиального горизонта, в котором глина является основным элементом аккумуляции (аргиллювый[x]) горизонт). Почва может иметь деградированный черноземовидный гумусовый горизонт с серой присыпкой и часто плитчатой структурой. Часто присутствует переходный горизонт АВ с серыми корочками. Почва может быть слабо или средне кислой, но степень насыщенности основаниями высокая. Материнские породы часто карбонатные. Почвы формируются в умеренно-холодном климате под смешанными лесами в лесо-степной переходной зоне. Син.: лювисоль серая.

2040. СЕ́РАЯ ДРЕВЕ́СНАЯ БРЮНИСО́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //brunisolic gray wooded soil //sol gris brunisolique de bois //brunisolischer grauer Holzboden - термин канадской школы (1968) для подгруппы серых древесных почв, верхняя часть осветленного горизонта которых имеет бурую окраску. Син.: лювисоль серая брюнисольная.

2041. СЕ́РАЯ ДРЕВЕ́СНАЯ ДВУПРО́ФИЛЬНАЯ ПО́ЧВА //bisequa gray wooded soil //sol gris bisequa de bois //bisequa grauer Holzboden - термин канадской школы (1968) для подгруппы серых древесных почв, в осветленном горизонте которых выделяется своеобразный подзолистый профиль из небольшой мощности слоев A_2, B_{fh} или B_f. Син.: лювисоль серая двупрофильная.

2042. СЕ́РАЯ ДРЕВЕ́СНАЯ ОГЛЕ́ЕННАЯ ПО́ЧВА //gleyed gray wooded soil //sol gris gleyifié de bois //vergleyter grauer Holzboden - термин канадской школы (1968) для почв любой из подгрупп группы серых древесных почв, в профиле которых заметны слабые признаки оглеения. Син.: Лювисоль серая оглеенная.

2043. СЕ́РАЯ ДРЕВЕ́СНАЯ ОСОЛОДЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА //solodic gray wooded soil //sol gris solodique de bois //solodischer grauer Holzboden - термин канадской школы (1968) для подгруппы серых древесных почв, имеющих признаки, характерные для всей группы, но отличающихся присутствием плотного призмовидного или глыбистого

аргиллового[x)] горизонта, в котором заметную роль играет обменный натрий, а плёнки на гранях имеют очень тёмную окраску. Син.: лювисоль серая осолоделая.

2044. СЕ́РАЯ ДРЕВЕ́СНАЯ СКА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //lithic gray wooded soil // sol gris lithique de bois //lithischer grauer Holzboden - термин канадской школы (1968) для почв любой из подгрупп группы серых древесных почв, в профиле которых имеется плотная порода в пределах 50 см от поверхности. Син.: лювисоль серая скальная.

2045. СЕ́РАЯ ДРЕВЕ́СНАЯ ТЁМНАЯ ПО́ЧВА //dark gray wooded soil //sol gris foncé de bois //dunkelgrauer Holzboden - термин канадской школы (1968) для подгруппы серых древесных почв, у которых горизонт A_1 имеет мощность более 5 см, а общая мощность A_1+A_2 более 15 см. В горизонтах A_1 и A_2 видны явные следы деградации, особенно в сухом состоянии. Син.: Лювисоль серая тёмная.

2046. СЕ́РАЯ ДРЕВЕ́СНАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //orthic gray wooded soil // sol gris orthique de bois //orthischer grauer Holzboden - термин канадской школы (1968) для подгруппы серых древесных почв, у которых имеется нормальная для данной группы последовательность горизонтов гумусового, осветлённого и аргиллового[x)]; мощность гумусового горизонта в естественном состоянии менее 5 см. Син.: лювисоль серая типичная.

2047. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ЗЕМЛЯ́ //gray forest earth //terre gris forestier //grauer Walderde - устаревшее название русск.шк. для серых лесных почв.

2048. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //gray forest soil //sol gris forestier // grauer Waldboden - 1) типовое название для почв, формирующихся под широколиственными лесами умеренно-континентального климата в подзоне широколиственных лесов и в подзоне северной лесостепи; характеризуются наличием ореховатого оподзоленного горизонта A_2B или A_1A_2 под гумусовоаккумулятивным горизонтом, ниже которого идёт ореховатый же четко выраженный иллювиальный горизонт; 2) название среднего подтипа типа серых лесных почв, имеющих профиль A_1-A_1A_2-B_1-B_2-C, гумусовый горизонт мощностью 15-25 см с содержанием гумуса 5-6%, переходный ореховатый оподзоленный горизонт с обильной кремнеземистой присыпкой, четко выраженный иллювиальный горизонт с крупноорехо-

ватой структурой и присыпкой в верхней части и с призмовидной структурой в нижней; на гранях структурных отдельностей иллювиального горизонта характерны темные глянцевые корочки аморфного вещества и кальцоморфной глины; 3) во франц.шк. (1965, 1967) термин для группы брюнифицированных (моллевых) континентально-умеренных почв с профилем АВС, имеющих текстурный рыхлый и хорошо оструктуренный горизонт В, обогащенный гумусом слабо развитый горизонт A_2 и серый горизонт A_1.

2049. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ВЫСОКОВСКИПА́ЮЩАЯ ПО́ЧВА //high effervescing gray forest soil //sol gris forestier effervescente haute //hochaufbrausen grauer Waldboden - термин русск.шк. (1967) для вида серых лесных почв, вскипающих от HCl выше 100 см.

2050. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГЛЕЕВА́ТАЯ ОСТА́ТОЧНО-КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //residually calcareous gleyed gray forest soil //sol gris de forêt gleyifié avec calcaire residuel //vergleyter grauer Waldboden mit residuell Kalkstein - термин Л.П.Рубцовой (1970) для серых лесных почв микроповышений Владимирского ополья, имеющих реликтовый горизонт карбонатных конкреций с 80-85 см и реликтовые признаки оглеения в виде ржавых и сизых пятен с 80-100 см. Син.: ополец (А.Н.Тюрюканов, 1967).

2051. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //gley gray forest soil //sol gris forestier à gley //gley grauer Waldboden - термин русск.шк. (1967) для типа заболоченных серых лесных почв, отличающихся ясно выраженными признаками оглеения в той или иной части профиля в зависимости от условий переувлажнения.

2052. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА СО ВТОРЫ́М ГУ́МУСОВЫМ ГОРИЗО́НТОМ //gley gray forest soil with second humus horizon //sol gris forestier gley avec second horizon humique //gley grauer Waldboden mit der zweite Humushorisont - термин русск.шк. (1967) для рода серых лесных глеевых почв, под оподзоленным горизонтом которых прослеживается темноокрашенный горизонт мелкоореховатой структуры, у сильноглеенных почв он стального оттенка; в сильнооподзоленных почвах окраска этого горизонта менее интенсивная вследствие обилия белесой присыпки по граням структурных отдельностей.

2053. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГЛЕ́ЕВАЯ ВЫСОКОВСКИПА́ЮЩАЯ ПО́ЧВА //high effervescing gley gray forest soil //sol gris forestier gley effervescente haute //hochaufbrausen gley grauer Waldboden - тер-

мин русск.шк. (1967) для рода серых лесных глеевых почв, развитых на карбонатных породах, что приводит к вскипанию от HCl в средней части профиля.

2054. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГЛЕ́ЕВАЯ МА́ЛОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //low-humus gley gray forest soil //sol gris forestier gley peu humifére //humusarmer gley grauer Waldboden - термин русск.шк. (1967) для вида серых лесных глеевых почв, содержащих менее 3% гумуса в горизонте A_1.

2055. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГЛЕ́ЕВАЯ МНО́ГОГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //high-humus gley gray forest soil //sol gris forestier gley riche en humus //humusreich gley grauer Waldboden - термин русск.шк. (1967) для вида серых лесных глеевых почв, содержащих более 5% гумуса в горизонте A_1.

2056. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГЛЕ́ЕВАЯ ОБЫ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //ordinary gley gray forest soil //sol gris forestier gley ordinaire //gewöhlicher gley grauer Waldboden - термин русск.шк. (1967) для рода серых лесных глеевых почв (выделяемого в пределах соответствующего подтипа), не имеющих каких-либо отклонений от признаков данного подтипа; название "обычный" при определении почвы опускается.

2057. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГЛЕ́ЕВАЯ ОСОЛОДЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА //solodized gley gray forest soil //sol gris forestier gley solodizée //solodierter gley grauer Waldboden - термин русск.шк. (1967) для рода серых лесных глеевых почв с более резко выраженной кремнеземистой присыпкой и более высоким залеганием карбонатов; анализы щелочных вытяжек обнаруживают повышенное содержание кремнекислоты в гумусовом и осолоделом горизонтах, в некоторых случаях в нижних горизонтах имеется поглощенный натрий.

2058. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГЛЕ́ЕВАЯ СЛА́БОДИФФЕРЕНЦИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //weakly differentiated gley gray forest soil //sol gris forestier gley faiblement différentié //schwach unterschiedener gley grauer Waldboden - термин русск.шк. (1967) для рода серых лесных глеевых почв со слабо проявленными типовыми чертами, формирующихся на песках.

2059. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГЛЕ́ЕВАЯ СЛИТА́Я ПО́ЧВА //compact gley gray forest soil //sol gris forestier gley compact //kompakter gley grauer Waldboden - термин русск.шк. (1967) для рода серых лесных глеевых почв, развитых на иловато-глинистых породах теплои

фации и имеющих слитое сложение.

2060. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГЛЕ́ЕВАЯ СРЕ́ДНЕГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //moderate-humus gley gray forest soil //sol gris forestier gley moderée en humus //mässig-humus gley grauer Waldboden - термин русск. шк. (1967) для вида серых лесных глеевых почв, содержащих 3-5% гумуса в горизонте A_1.

2061. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГЛУБОКОВСКИПА́ЮЩАЯ ПО́ЧВА //deep effervescing gray forest soil //sol gris forestier effervescente profond //tiefaufbrausen grauer Waldboden - термин русск.шк.(1967) для вида серых лесных почв, вскипающих от HCl глубже 100 см.

2062. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГРУНТО́ВО-ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //ground water gleyic gray forest soil //sol gris forestier gleyique à eau de fond //grundwassergleyischer grauer Waldboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа серых лесных глеевых почв, имеющих слабые признаки оглеения в нижней части профиля в результате грунтового переувлажнения в виде ржавых и сизых пятен и конкреций.

2063. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГРУНТО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //ground water gley gray forest soil //sol gris forestier gley à eau de fond //grundwassergley grauer Waldboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа серых лесных глеевых почв, имеющих признаки сильного оглеения в нижней части профиля в результате грунтового заболачивания: сплошной глеевый горизонт под горизонтом В, сизые и ржавые пятна в горизонте В, конкреции.

2064. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я КОНТА́КТНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //contactly gley gray forest soil //sol gris forestier en gley contact //berührunggley grauer Waldboden - термин русск.шк. (1967) для рода серых лесных глеевых почв, развитых на двучленных породах, причем на контакте пород формируется глеевый горизонт, ниже которого признаки оглеения отсутствуют.

2065. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //podzolized gray forest soil //sol gris forestier podzolisé //podsolierter grauer Waldboden - термин русск.шк. (1967) для вида серых лесных почв, характеризующихся обильной кремнеземистой белёсой присыпкой в верхней части профиля.

2066. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ПОВЕ́РХНОСТНО-ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //surface gleyic gray forest soil //sol gris forestier gleyique superficiel //oberflachen gleyischer grauer Waldboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа серых лесных глеевых почв, имеющих слабые

признаки оглеения в верхней части профиля в результате периодического поверхностного избыточного увлажнения: стальной оттенок гумусового горизонта, сизоватые и охристые пятна, марганцовисто-железистые конкреции различного размера.

2067. СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я СИ́ЛЬНООПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //strongly podzolized gray forest soil //sol gris forestier fortement podzolisé // stark podsolierter grauer Waldboden - термин русск.шк.(1967) для вида серых лесных почв, имеющих подгоризонт A_1A_2 в нижней части гумусового горизонта, характеризующийся белёсо-серой окраской и листоватой структурой.

2068. СЕ́РАЯ ЛЕ́СОСТЕПНА́Я ПО́ЧВА //gray forest-steppe soil //sol gris de steppe à forêt //grauer Waldsteppenboden - термин русск. шк. для почв, формирующихся под широколиственными лесами северной лесостепи; в настоящее время устаревший. Син.: серая лесная почва.

2069. СЕ́РАЯ ОСОЛОДЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА //gray solodic soil //sol solodique gris //grauer Solod - устаревший термин западно-европейских школ. См.: Солодь.

2070. СЕ́РАЯ ПОВЕ́РХНОСТНО-ГЛЕЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА - См. Серая лесная поверхностно-глееватая п.

2071. СЕ́РАЯ ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //gray semi-desert soil //sol gris subdésertique //grauer Halbwüstenboden - термин франц.шк. (1967) для группы слаборазвитых засушливых почв (см.), характерных для прилегающих к жарким пустыням районов, содержащих менее 1% гумуса в горизонте А, весьма однородном до 50 см.

2072. СЕ́РАЯ ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ РАЗВЕВА́ЕМАЯ ПО́ЧВА //aeolated gray semidesert soil //sol gris subdésertique éolisé //äolisierter grauer Halbwüstenboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы серых полупустынных почв (см.), характеризующихся сильной подверженностью воздействию ветровой эрозии.

2073. СЕ́РАЯ ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ СЛА́БО ЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА //slightly saline gray semidesert soil //sol gris subdésertique faiblement salin //schwach salziger grauer Halbwüstenboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы серых полупустынных почв (см), характеризующихся слабым засолением в профиле.

2074. СЕ́РАЯ ПОЛУПУСТЫ́ННАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical gray semi-desert soil //sol gris subdésertique modal//typischer grauer Halb-

wüstenboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы серых полупустынных почв (см.), не имеющих слабого засоления в профиле и не развеваемых ветром.

2075. СЕ́РАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //gray desert soil//sol gris désertique //grauer Wüstenboden - термин американской школы для сероокрашенных карбонатных почв полупустыни. Син.: серозём.

2076. СЕРИ́Р //serir //sérir //Serir (от арабск.) - каменистые пустыни пониженных районов Сахары, поверхность которых покрыта эоловой галькой плотных коренных пород, подстилаемой уплотненным песком или песчаником. Низменные места сериров обычно заняты такырами или солончаками.

2077. СЕ́РО-БУ́РАЯ ПО́ЧВА - см. Серо-бурая пустынная почва.

2078. СЕ́РО-БУ́РАЯ ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //gray-brown podzolic soil// sol brun-gris podzolique //grau-brauner podsolierter Boden, Fahlerde (по Эвальду) - термин М.Болдуина (1928) для буроокрашенных почв широколиственных лесов США, имеющих под серо-бурым гумусовоаккумулятивным горизонтом палевый осветленный горизонт, ниже которого идёт оглиненный бурый иллювиальный горизонт.

2079. СЕ́РО-БУ́РАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //gray-brown desert soil//sol brun-gris désertique //graue-brauner Wüstenboden - термин для почв пустынь умеренного пояса, формирующихся под разреженной солянковой растительностью; профиль состоит из серого карбонатного бесструктурного горизонта А мощностью 10-15 см, следующего за ним уплотненного структурного, часто солонцеватого горизонта В мощностью 10-25 см, ниже которого следует горизонт гипса и еще ниже горизонт хлоридов и сульфатов; содержание гумуса в верхнем горизонте обычно менее 1%.

2080. СЕ́РО-БУ́РАЯ ПУСТЫ́ННАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //calcaric gray-brown desert soil //sol brun-gris désertique calcaire //kalkarischer graue-brauner Wüstenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа серо-бурых пустынных почв, характеризующихся высокой карбонатностью (9-12% CO_2 карбонатов в суглинистых и 6-9% в легких почвах), низкой гумусированностью, не резким обособлением поверхностной корки.

2081. СЕ́РО-БУ́РАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ЛЕССОВАЯ ПО́ЧВА //loess gray-brown desert soil //sol brun-gris désertique de loess //grau-brauner Löss-

wüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода серо-бурых пустынных почв, формирующихся на лёссе и характеризующихся нечеткой выраженностью горизонтов, слабым развитием белоглазки, солонцеватостью.

2082. СЕ́РО-БУ́РАЯ ПУСТЫ́ННАЯ МАЛОКАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //low calcaric gray-brown desert soil //sol brun-gris désertique peu calcaire //schwach kalkarischer graue-brauner Wüstenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа серо-бурых пустынных почв, характеризующихся пониженной карбонатностью (4-6% CO_2 карбонатов в верхних и около 1% в нижних горизонтах), резким обособлением горизонтов, сильно развитым слоеватым горизонтом, содержанием гумуса 0,4-0,9% в верхнем горизонте.

2083. СЕ́РО -БУ́РАЯ ПУСТЫ́ННАЯ НЕПО́ЛНОРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА //non-complete gray-brown desert soil //sol brun-gris désertique non-complet //nichtgeschlossener grau-brauner Wüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода серо-бурых пустынных почв на плотных породах, характеризующихся щебнистостью, малой мощностью горизонтов и профиля в целом.

2084. СЕ́РО-БУ́РАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ОБЫ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //ordinary gray-brown desert soil //sol brun-gris désertique ordinaire //gewöhnlicher grau-brauner Wüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода серо-бурых пустынных несолонцеватых почв, в которых уплотненность горизонта В связана с его оглиненностью, а легкорастворимые соли появляются лишь глубже 50 см.

2085. СЕ́РО-БУ́РАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ПОДСТИЛА́ЕМАЯ ГИ́ПСОМ ПО́ЧВА //gypsum-bedded gray-brown desert soil //sol brun-gris désertique à gypse //grundgipshaltig grau-brauner Wüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода серо-бурых пустынных почв, имеющих под почвенными горизонтами слой шестоватого гипса более древнего по отношению к почвообразованию происхождения (морского, лагунного и т.п.).

2086. СЕ́РО-БУ́РАЯ ПУСТЫ́ННАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //solonetzic gray-brown desert soil //sol brun-gris désertique solonetzoïde //solonetzartiger grau-brauner Wüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода серо-бурых пустынных почв, характеризующихся грубой и плотной коркой с трещинами, уплотненностью и глянцевитостью призмовидного горизонта В, значительным содержанием обменного натрия.

2087. СЕ́РО-БУ́РАЯ ПУСТЫ́ННАЯ СОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //saliniferous gray-brown desert soil //sol brun-gris désertique salifére // salzhaltig grau-brauner Wüstenboden - термин русск.шк.(1967) для рода серо-бурых пустынных почв, характеризующихся значительным содержанием легкорастворимых солей выше 50 см.

2088. СЕРОЗЁМ //serozem, sierozem //sierozem //Sierosem (от русск. серая земля) - 1) термин С.С.Неуструева (1908) для типа почв субтропических эфемеровых и эфемерово-разнотравных полупустынь, характеризующегося слабой дифференциацией профиля при высокой оглиненности верхней и средней части, низкой гумусированностью при растянутом гумусовом горизонте, высокой карбонатностью и высокой сезонной биогенностью. Син.: светлозём, серая пустынная почва, белозём; 2) термин франц.шк. (1965, 1967) для группы изогумусовых насыщенных почв районов с прохладным сезоном в период дождей, характеризующихся слабой декарбонатизацией поверхностного горизонта, слабой гумусированностью (до 1% в верхнем 20-см слое), комковатой структурой в верхнем горизонте и полиэдрической - в нижних.

2089. СЕРОЗЁМ ГЛУБОКО́ ТРЕЩИНОВА́ТЫЙ //deeply vertic sierozem //sierozem vertique en profondeur //tiefer vertischer Sierosem - термин франц.шк. (1967) для подгруппы серозёмов, характеризующихся глубокой трещиноватостью.

2090. СЕРОЗЁМ КО́РОВЫЙ //crust sierozem //sierozem encroûté //Krustsierosem - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы серозёмов, имеющих гипсовую кору в нижней части профиля.

2091. СЕРОЗЁМ КЫ́РОВЫЙ //kyric sierozem //sierozem kyrique //kyrischer Sierosem - устаревший термин А.Н.Розанова для пустынных почв. См.: Серо-бурая пустынная почва.

2092. СЕРОЗЁМ НЕПО́ЛНОРА́ЗВИТЫЙ //non-complete sierozem //sierozem non-complet //nichtgeschlossener Sierosem - термин русск.шк. (1967) для рода серозёмов, формирующихся на плотных породах или галечниках и характеризующихся щебнистостью и малой мощностью профиля.

2093. СЕРОЗЁМ ОБЫКНОВЕ́ННЫЙ //ordinary sierozem //sierozem ordinaire //gewöhnlicher Sierosem - см. Серозём типичный.

2094. СЕРОЗЁМ ОБЫ́ЧНЫЙ //ordinary sierozem //sierozem ordinaire // gewöhnlicher Sierosem - термин русск.шк. (1967) для рода се-

розёмов, формирующихся на глубоких мелкозёмистых незасоленных породах.

2095. СЕРОЗЁМ ОРОША́ЕМЫЙ ГЛЕЕВА́ТЫЙ - см. Орошаемая вторично-луговая п.

2096. СЕРОЗЁМ ОСТА́ТОЧНО-СОЛОНЧАКОВА́ТЫЙ //residually saliniferous sierozem //sierozem salifére residuel //restsalzhaltig Sierosem - термин русск.шк. (1967) для рода серозёмов, содержащих в нижней части профиля горизонт с аккумуляцией легкорастворимых солей более 0,3%.

2097. СЕРОЗЁМ ПРИМИТИ́ВНЫЙ //primitive sierozem //sierozem primitif //unentwickelter Sierosem - устаревший термин Б.В.Горбунова для пустынных почв; в настоящее время они относятся частично к серо-бурым пустынным и частично к такыровидным пустынным почвам.

2098. СЕРОЗЁМ ПСЕ́ВДОГЛЕ́ЕВЫЙ //pseudogleyic sierozem //sierozem à pseudogley //pseudogleyischer Sierosem - термин франц.шк. (1967) для подгруппы серозёмов, имеющих псевдоглеевый горизонт в профиле (пятнистость, железистые конкреции).

2099. СЕРОЗЁМ СВЕ́ТЛЫЙ //clear sierozem, lucid sierozem //sierozem clair //hell Sierosem - термин С.С.Неуструева (1908) для подтипа серозёмов, характеризующегося низкой гумусностью (1-1,5%), малой мощностью гумусового горизонта (30-40 см), слоеватостью с поверхности, высокой карбонатностью профиля, распространенного в Ср.Азии до высоты 300-600 м над у.м. на древних речных террасах и подгорных равнинах.

2100. СЕРОЗЁМ СЛА́БО ЗАСОЛЁННЫЙ //slightly saline sierozem //sierozem faiblement salé //schwach salzhaltigier Sierosem - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы сероземов, характеризующихся слабым засолением в нижней части профиля.

2101. СЕРОЗЁМ СЛА́БО СОЛОНЦЕВА́ТЫЙ //slightly alkaline sierozem //sierozem faiblement alcalisé //schwach alkalischer Sierosem - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы серозёмов, имеющих повышенное содержание поглощенного натрия в одном из горизонтов профиля (до 10% от емкости поглощения).

2102. СЕРОЗЁМ СТРУКТУ́РНЫЙ //structured sierozem //sierozem structural //Strukturs ierosem - устаревший термин С.С.Неуструева (1908) для подтипа солонцеватых серозёмов, который в настоя-

щее время относится к типу серо-бурых пустынных почв.

2103. СЕРОЗЁМ ТЁМНЫЙ //dark sierozem //sierozem foncé //dunkler Sierosem - термин С.С.Неуструева (1908) для подтипа наиболее высоко гумусированных (3,5-4,5% гумуса) серозёмов верхней зоны предгорий Ср.Азии.

2104. СЕРОЗЁМ ТИПИ́ЧНЫЙ //typical sierozem //sierozem modal, sierozem typique //typischer Sierosem - 1) термин С.С.Неуструева (1908) для подтипа среднегумусированных (2-3,5% гумуса) серозёмов холмистых предгорий Ср.Азии, имеющих большую мощность гумусового горизонта (55-80 см) при постепенном падении содержания гумуса с глубиной; 2) термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы серозёмов, не имеющих трещиноватости, засоления в верхней части, солонцеватости, гипсовой коры или псевдоглея в профиле.

2105. СЕРОЗЁМ ТУГА́ЙНЫЙ //tugai sierozem //sierozem de tugai //Tugaisierosem - устаревший термин С.С.Неуструева для пустынных почв недавних пойменных разливов под пустынной растительностью с элементами тугая и испытывающих современное опустынивание; см. Такыровидная пустынная остаточно-гумусная п., такыровидная пустынная остаточно-луговая п.

2106. СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ПО́ЧВА //gray-cinnamon soil, gray-cinnamonic soil //sol gris-châtain, sol gris-cinnamome//grauer zimtfarbener Boden - термин А.Н.Розанова (1956) для почв сухих субтропических степей Закавказья, аналогичных каштановым почвам сухих умеренно-суббореальных степей; позднее распространен на почвы всех сухих субтропиков мира, имеющие серо-коричневую окраску профиля, ореховато-комковатую структуру, содержание гумуса в верхнем горизонте 1,5-4,5% при его небольшой мощности (до 45 см), нейтральную или слабощелочную реакцию и карбонатный горизонт на глубине 30-40 см; в системе русск.шк. (1967) выделяется на правах типа.

2107. СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ГА́ЖЕВАЯ ПО́ЧВА //gazha gray-cinnamon soil // sol gris-cinnamome à gaja //grauer zimtfarbener Gashaboden (от азерб. гажа - белый гипс) - см. Серо-коричневая гипсоносная п.

2108. СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ГА́ЛЕЧНИКОВАЯ ПО́ЧВА //shinglic gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamome galetique //grauer zimtfarbener Geröllboden - термин русск.шк. (1967) для рода серо-коричневых

почв со слабодифференцированным профилем и с большим содержанием гальки не глубже метаморфического горизонта.

2109. СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ГИ́ПСОНО́СНАЯ ПО́ЧВА //gypsic gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamome gypsique //gipshaltig grauer zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для рода серо-коричневых почв, содержащих значительные аккумуляции гипса в подгумусовом горизонте в виде мучнистой массы, состоящей из мельчайших кристалликов гипса, с содержанием гипса до 60-90%, причем вниз по профилю кристаллы гипса становятся постепенно крупнее.

2110. СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ГЛУБОКО́СОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //deep saliniferous gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamome salifére profond //tiefer salzhaltig grauer zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для вида серо-коричневых почв, содержащих легкорастворимые соли глубже 80 см.

2111. СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ОБЫКНОВЕ́ННАЯ ПО́ЧВА //ordinary gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamome ordinaire //gewöhnlicher grauer zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа серо-коричневых почв, содержащих 2,5-3,5% гумуса (на пашне 2-2,5%) в верхнем горизонте, вскипающих с поверхности, имеющих четко выраженный карбонатно-аккумулятивный горизонт.

2112. СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ОБЫ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //ordinary gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamome ordinaire //gewöhnlicher grauer zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для рода серо-коричневых почв, формирующихся на мощных однородных мелкоземистых породах и не имеющих солонцеватости, солончаковатости или гипсовых аккумуляций.

2113. СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ПРИМИТИ́ВНАЯ ПО́ЧВА //primitive gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamome primitif //unentwickelter grauer zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для рода серо-коричневых почв с малоразвитым профилем и содержанием гумуса около 1% в верхнем горизонте; оглинение и карбонатно-аккумулятивный горизонт выражены слабо.

2114. СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СВЕ́ТЛАЯ ПО́ЧВА //light gray-cinnamon soil// sol gris-cinnamome clair //hellzimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа серо-коричневых почв, содержащих 2-2,5% гумуса (на пашне 1,5-2%) в верхнем горизонте.

2115. СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СИ́ЛЬНОСОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //strongly solonetzic gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamome solonetzoïde forte //stark solonetzartiger grauer zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для вида серо-коричневых почв, имеющих в профиле плотный призмовидный горизонт с содержанием обменного натрия более 10% от емкости поглощения.

2116. СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //solonetzic gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamome solonetzoïde//solonetzartiger grauer zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для рода и вида серо-коричневых почв, имеющих призмовидный плотный солонцовый горизонт с содержанием обменного натрия 5-10% от емкости поглощения.

2117. СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //saliniferous gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamome salifére//salzhaltig grauer zimtfarbener Boden - 1) термин русск.шк. (1967) для рода серо-коричневых почв, содержащих легкорастворимые соли в профиле; 2) термин той же шк. для вида серо-коричневых почв, содержащих легкорастворимые соли на глубине 30-80 см.

2118. СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ СОЛОНЧАКО́ВАЯ ПО́ЧВА //saline gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamome saline //salzhaltig grauer zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для вида серо-коричневых почв,содержащих легкорастворимые соли на глубине 5-30 см.

2119. СЕ́РО-КОРИ́ЧНЕВАЯ ТЕМНАЯ ПО́ЧВА //dark gray-cinnamon soil //sol gris-cinnamome foncé //dunkel grauer zimtfarbener Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа серо-коричневых почв, содержащих 4-5% гумуса (на пашне 3-3,5%) в верхнем горизонте и 0,7-0,9% на глубине 1 м, вскипающих с поверхности, имеющих четко выраженный карбонатно-аккумулятивный горизонт с белоглазкой.

2120. СЕ́РЫЙ КАРБОНА́ТНЫЙ СУ́ГЛИНОК //gray carbonate loam //limon gris carbonate //Graukalklehm - термин А.А.Зайцева для дерново-карбонатных почв, формирующихся на рыхлых карбонатных породах, менее богатых карбонатом кальция, чем известняк. Син.: Псевдорендзина, Полурендзина.

2121. СЕ́РЫЙ ЛЕСНО́Й СУ́ГЛИНОК //gray forest loam //limon gris forestier //grauer Waldlehm - устаревшее название русск.шк. для серых лесных почв.

2122. СЕ́РЫЙ ПОДВО́ДНЫЙ ТО́РФ //gray subwater peat // tourbe gris de submersion //Grauschlammboden - устаревший термин немецкой школы для богатых органическим веществом серых и черных иловатых подводных почв. Син.: Гиттия.

2123. СЕ́РЫЙ СУ́ГЛИНОК //gray loam //limon gris //Graulehm - устаревший термин немецкой школы для серых сиаллитных суглинистых почв субтропиков и тропиков, соответствующих псевдоглею. Син. Белый суглинок, Пластосоль серая, Серая гидроморфная почва.

2124. СЕ́ТЧАТАЯ ПО́ЧВА //net-like soil //sol réticulé //Netzboden - термин франц.шк. (1965) для подгруппы полигональных почв холодных стран (см.), поверхность которых разбита сетью трещин на нерегулярные неправильные отдельности.

2125. СЖА́ТАЯ ПО́ЧВА //strangling soil //sol d'etranglement //Würgeboden - термин немецкой школы для криотурбированных арктических и субарктических почв, имеющих микроморфологические и макроморфологические признаки сжатия почвенной массы (ледяными клиньями).

2126. СИАЛЛИ́ТНАЯ ПО́ЧВА //siallitic soil //sol siallitique //siallitischer Boden (от греч. silicium - кремний, aluminium - алюминий и lithos - камень) - термин для почв, формирующихся на сиаллитных корах выветривания, то есть имеющих значительное содержание вторичных глинных минералов, в которых значительную роль играют кремний и алюминий.

2127. СИ́ДЕРАКВО́Д //sideraquod //sideraquod //Sideraquod (от греч. sideros - железо, лат. aqua - вода и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы акводов (см.), которые: 1) имеют температуру почвы выше, чем криакводы (см.), а разницу между среднелетними и среднезимними температурами на 50 см более $5^{\circ}C$; 2) имеют один или оба следующих признака: а) не менее 50% каждого профиля имеют сподовый[x)] горизонт, содержащий во всех подгоризонтах достаточно свободного железа для покраснения почвы после прокаливания (более 0,5% Fe в мелкозёме); б) буроватый $A_{пах}$, содержащий более 0,7% свободного Fe в мелкозёме; 3) не имеют фраджипэна[x)] под сподовым горизонтом; 4) не имеют дурипэна[x)] или слоеватого горизонта над сподовым. В пределах этой большой почвенной группы выделяются две подгруппы почв: 1) типичные (typic) и 2) энтовые (entic) сидеракводы.

2128. СИЛКРИ́Т //silcrite //silcrite //Silkrit (от лат.silicon - кремний) - термин Стифенса для поверхностных почвенных образований, характерных для пустынь тропиков и субтропиков и представляющих собой очень твердые и плотные, цементированные натечным кремнезёмом (опал или халцедон) обломки кремневых кор различной величины, часто образующие сплошные покровы большой протяженности.

2129. СИ́ЛЬНОЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА //strongly saliniferous soil, strong saliniferous soil, strongly saline soil //sol salifére forte //stark-salzhaltig Boden - термин русск.шк. для почв, содержащих в слое 0-50 см или в слое максимальной солевой аккумуляции 0,5-1,0% (при хлоридном и сульфатно-хлоридном), 0,7-2,0% (при сульфатном и хлоридно-сульфатном) и 0,5-0,7% (при содовом и смешанном засолении) легкорастворимых солей.

2130. СИ́ЛЬНО ОГЛЕ́ЕННАЯ ПО́ЧВА //strongly gleyed soil //sol gleyifié forte //stark vergleyter Boden- 1) устаревший термин русск. шк.; см. Глеевая п.; 2) общеупотребительный термин для почв, имеющих в профиле сильно выраженные признаки переувлажнения в виде сплошного глеевого горизонта в той или иной части профиля либо обильных сизых и ржавых пятен.

2131. СИ́ЛЬНООПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //strongly podzolized soil //sol fortément podzolisé //stark podsolierter Boden - 1) термин русск.шк. для почв, имеющих сильную степень оподзоленности; в этом широком понимании термин включает в себя как сильноподзолистые почвы, имеющие достаточно четкие критерии выделения степени оподзоленности в каждом из подтипов подзолистых почв, так и сильно оподзоленные почвы других типов, например, сильно оподзоленные черноземы, причем в последнем случае четких критериев выделения степени оподзоленности не существует; 2) общеупотребительный термин для почв разных типов (чернозёмов, краснозёмов, бурозёмов и др.), имеющих морфологические или аналитические признаки сильной оподзоленности; однако, четких критериев выделения этой степени оподзоленности нет.

2132. СИ́ЛЬНО-ОСОЛОДЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА //strongly solodized soil //sol solodisé forte //stark solodierter Boden - 1) термин русск.шк. для солодей с мощным (более 20 см) гумусовым горизонтом; 2) термин для почв степных ландшафтов, имеющих признаки интенсивного осолодения в профиле: образование горизонта A_2, сильная белёсая кремнезёмистая присыпка, сильная дифференциа-

ция профиля по илу, R_2O_3 и реакции.

2133. СИ́ЛЬНОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //strongly podzolic soil //sol podzolique forte //Starkpodsolboden, stark podsoliger Boden - 1) термин русск.шк. для вида подзолистых почв, имеющих сплошной подзолистый горизонт A_2 рассыпчато-листоватой или чешуйчатой структуры; 2) термин русск.шк. для вида подзолистых почв, имеющих сплошной подзолистый горизонт A_2 мощностью более 30 см при резко выраженной дифференциации профиля по глине и R_2O_3.

2134. СИ́ЛЬНОПОДЗО́ЛИСТАЯ КА́РЛИКОВАЯ ПО́ЧВА //dwarf strongly podzolic soil //sol podzolique forte nain //Starkpodsolzwergboden, stark podzoliger Zwergboden - термин русск.шк. для вида подзолистых почв теплой западно-европейской фации, характеризующихся малой мощностью генетических горизонтов и профиля в целом и имеющих сплошной подзолистый горизонт A_2 рассыпчато-листоватой или чешуйчатой структуры.

2135. СИ́ЛЬНО-СМЫ́ТАЯ ПО́ЧВА //strongly eroded soil //sol érodé forte //stark erodierter Boden - термин для почв, верхняя часть профиля которых, включая горизонт A и верхнюю часть горизонта B, полностью снесена в результате интенсивной эрозии; для разных типов почв разные авторы используют различные критерии сильной степени эрозии.

2136. СИ́ЛЬНОСОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //strongly solonetzic soil //sol solonetzoïde forte //stark solonetzartiger Boden - термин русск.шк. для почв степей и полупустынь, имеющих в профиле подгоризонт (обычно в нижней части гумусового горизонта) с призмовидной структурой, сильным уплотнением и оглинением, содержащий обменного натрия 15-20% от емкости поглощения.

2137. СИ́ЛЬНОСОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА - см. Сильнозасолённая п.

2138. СИРОЗЁМ //syrozem //syrozem //Syrosem - термин Кубиены (1953) для сборной группы слабодифференцированных почв типа регосолей и литосолей с профилем A-C. Син.: неразвитая почва, грубая почва.

2139. СИРОЗЁМ-РЕНДЗИ́НА //syrozem-rendzina //syrozem-rendzine //Syrosem-Rendzina - термин немецкой школы для примитивно-щебнистых скелетных почв с профилем (A)-C, формирующихся на известняках. Син.: проторендзина (нем.).

2140. СКА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //lithic soil //sol lithique //lithischer Boden (от гр.lithos - камень) - 1) термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, имеющих плотную горную породу в пределах 50 см от поверхности, но не ближе 25 см (граница для Литосоли); 2) общеупотребительный термин, не имеющий точного содержания, для примитивных почв крутых горных склонов и обнажений плотных горных пород; 3) термин франц.шк. (1965) для подгруппы слаборазвитых эрозионных почв (см.), формирующихся на плотных коренных породах.

2141. СКЕЛЕ́ТНАЯ ПО́ЧВА //skeletal soil, stony soil //sol squélettique //Skelettboden, Gesteinboden - 1) полноразвитая почва с профилем A-B-C или иным, содержащая значительное количество обломочного материала в виде щебня, гравия, валунов и т.п.; син.: щебнистая почва, каменистая почва; 2) слабо развитая почва с профилем A-C на плотных коренных породах, мощность которой ограничена глубиной 25 см, причем мелкозёмистый горизонт сильно насыщен щебенкой горной породы; син.: литосоль, примитивно-щебнистая почва.

2142. СКРЫ́ТОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //cryptogleyic soil, concealed gley soil //sol cryptogleyique, sol de gley caché, sol de gley occulte //verborgener Gleyboden, Kriptogley - термин для почв арктической зоны, не имеющих видимых признаков оглеения.

2143. СКРЫ́ТОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //concealed podzol soil, cryptopodzolic soil //sol cryptopodzolique, sol de podzol caché, sol de podzol occulte//verborgener Podsolboden, Kriptopodsol - термин Д.Драницына (1914), первоначально использованный автором для наименования почв лесотундры, не имеющих подзолистого горизонта, но согласно общей существовавшей в то время зональной концепции, предшествующих появлению южнее слабоподзолистых и затем подзолистых почв. Позднее термин был широко использован разными авторами для наименования почв, не имеющих морфологических признаков оподзоленности в горизонтах A и B, но по аналитическим данным характеризующимся перемещением аморфных веществ и ила из верхнего горизонта в среднюю часть профиля. Син.: Криптоподзолистая почва, Криптоподзол.

2144. СЛА́БОДИФФЕРЕНЦИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //weakly differentiated soil //sol faiblement différentié //schwach unterschieden Boden - термин русск.шк. для почв, обычно песчаных, в профиле которых очень слабо выражена дифференциация на генетические горизон-

ты, что затрудняет отнесение их к тому или иному виду.

2145. СЛА́БОЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА //weakly saline soil, slightly saline soil, weakly saliniferous soil, slightly saliniferous soil // sol peu salifére, sol peu saline, sol peu solonchakoïde // schwach salzhaltig Boden - термин русск.шк. для почв, содержащих в слое 0-50 см или в горизонте солевой аккумуляции 0,2-0,3% (при хлоридном и сульфатно-хлоридном), 0,3-0,6 (при сульфатном и хлоридно-сульфатном) и 0,1-0,3% (при содовом и смешанном засолении) легкорастворимых солей.

2146. СЛА́БО ОГЛЕЁННАЯ ПО́ЧВА //slightly gleyed soil //sol gleyifié faiblement //schwach vergleyter Boden- устаревший термин русск.шк. См. Глееватая п.

2147. СЛА́БООПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //weakly podzolized soil //sol faiblement podzolisé //schwach podsolierter Boden - 1) термин русск.шк. для почв, имеющих тонкий либо выраженный отдельными пятнами подзолистый горизонт или имеющих слабые признаки оподзоленности в верхней части профиля; в этом широком понимании термин включает в себя как слабоподзолистые почвы, так и слабо оподзоленные почвы других типов, например, слабооподзоленные бурозёмы; 2) общеупотребительный термин для почв разных типов (чернозёмов, краснозёмов, бурозёмов и т.д.), имеющих слабые признаки оподзоленности, выраженные морфологически либо выявляемые только при анализе.

2148. СЛА́БО-ОСОЛОДЁЛАЯ ПО́ЧВА //slightly solodized soil //sol peu solodisé //schwach solodierter Boden - термин для почв степных ландшафтов, имеющих слабые признаки осолодения в профиле: легкая белесоватость гумусовых горизонтов, незначительная кремнезёмистая присыпка, слабая дифференциация профиля по илу, R_2O_3 и реакции.

2149. СЛА́БОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //slightly podzolic soil //sol podzolique faible //schwach podsoliger Boden, schwacher Podsolboden - 1) термин русск.шк. для вида собственно подзолистых почв с профилем A_0-A_2-B-C, в которых, в соответствии со слабой степенью подзолистости, подзолистый горизонт A_2 выражен отдельными белесыми пятнами комковатой структуры, а горизонт B слабо прослеживается в профиле; 2) общеупотребительный термин для сборной группы почв, включая глееподзолистые, подзолистые, дерново-подзолистые и другие, в профиле которых подзоли-

стый горизонт A_2, в соответствии со слабой степенью подзолистости, выражен отдельными белёсыми пятнами, а горизонт В слабо прослеживается в профиле.

2150. СЛА́БОПОДЗО́ЛИСТАЯ КА́РЛИКОВАЯ ПО́ЧВА //dwarf slightly podzolic soil//sol podzolique faible nain //schwach podsoliger Zwergboden - термин русск.шк. для вида подзолистых почв теплой западно-европейской фации, характеризующихся малой мощностью генетических горизонтов и профиля в целом и имеющих комковатый подзолистый горизонт, выраженный отдельными пятнами.

2151. СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА //weakly developed soil //sol peu évolué //unreifer Boden - 1) термин франц.шк. (1965,1967) для класса почв с профилем АС, слабо дифференцированным по минеральной части, содержащим более чем следы гумуса в верхнем 20-см слое или 1-1,5% гумуса в слое большем 2-3-см; полностью отсутствуют горизонты A_2 и В; 2) общеупотребительный термин для слабо развитых почв с профилем (А)-С. Син.: неразвитая почва.

2152. СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА КЛИМАТИ́ЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕ́НИЯ //weakly developed soil of climatic origin//sol peu évolué d'origine climatique //unreifer Boden der Klimagenese - термин франц. шк. (1965) для подкласса почв с профилем АС, входящих в класс слаборазвитых почв (см.), связанных в своём распространении с климатическими влияниями, а условия климата при этом ограничивают развитие почвенного профиля.

2153. СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ ПО́ЧВА НЕКЛИМАТИ́ЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕ́НИЯ //weakly developed soil of non-climatic origin //sol peu évolué d'origine non climatique //unreifer Boden der Nichtklimagenese - термин франц.шк. (1965) для подкласса почв с профилем АС, входящих в класс слаборазвитых почв (см.), в своём распространении не связанных с климатическими условиями.

2154. СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ АЛЛОФА́НОВАЯ ПО́ЧВА //weakly developed allophanic soil //sol peu évolué à allophanes //unriefer Allophanboden - термин франц.шк. (1967) для группы слаборазвитых гумусовых почв (см.), богатых аморфными силикатами (аллофанами) и формирующихся на молодых вулканических наносах - пеплах, туфах, лавах; при дальнейшем развитии они переходят в почвы, которые классифицируются уже как андосоли (см.).

2155. СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ ГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //weakly developed humic soil //sol peu évolué humifere //unriefer Humus Boden - терм-

франц.шк. (1967) для подкласса слаборазвитых почв (см.), имеющих профиль AC или AR, но с сильно гумусированным горизонтом A, формирующихся в условиях гумидного умеренного климата, слабо оглиненных, но имеющих повышенную емкость поглощения благодаря гумусу или аллофану.

2156. СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ ЗАСУ́ШЛИВАЯ ПО́ЧВА //weakly developed xeric soil //sol peu évolué xerique //unriefer Xeroboden - термин французск.шк. (1967) для подкласса слаборазвитых почв (см.), характеризующихся профилем AC или AR, отсутствием горизонта аккумуляции извести, малой гумусированностью, плохо развитой структурой в результате общей засушливости и слабого развития почвообразования. Включает группы серых полупустынных почв и ксероранкеров.

2157. СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ МЕРЗЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА //weakly developed permafrost soil //sol peu évolué à permagel //unreifer Frostboden - термин франц.шк. (1967) для подкласса слаборазвитых почв (см.), имеющих слой многолетней мерзлоты в профиле на глубине от нескольких сантиметров до двух метров.

2158. СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ НАНО́СНАЯ ПО́ЧВА //weakly developed transported soil //sol peu évolué d'apport //unreifer Allochtonsboden - термин франц.шк. (1965) для группы почв, входящей в подкласс слаборазвитых почв неклиматического происхождения (см.), формирующихся на современных аллювиальных наносах.

2159. СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ НАНО́СНАЯ ГИДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //hydromorphic weakly developed transported soil //sol peu évolué d'apport hydromorphe //hydromorphischer unriefer Allochtonsboden - термин франц.шк. (1965) для слаборазвитых наносных почв (см.), имеющих в профиле признаки глея или псевдоглея.

2160. СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ НАНО́СНАЯ СЛА́БО ЗАСОЛЁННАЯ ИЛИ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //slightly saline or alkaline weakly developed transported soil //sol peu évolué d'apport faiblement salé ou alcalisé //schwach salziger oder alkalischer unriefer Allochtonsboden - термин франц.шк. (1965) для слаборазвитых наносных почв (см.), имеющих в профиле слабое засоление или солонцеватость.

2161. СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ НАНО́СНАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical weakly developed transported soil //sol peu évolué d'apport modal //typischer unreifer Allochtonsboden - термин франц.шк. (1965) для слаборазвитых наносных почв (см.), не имеющих в профиле

признаков гидроморфизма, засоления, солонцеватости и слитости.

2162. СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ НАНО́СНАЯ ТРЕЩИНОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //vertic weakly developed transported soil //sol peu évolué d'apport vertique //vertischer unriefer Allochtonsboden - термин франц.шк. (1965) для слаборазвитых наносных почв (см.), имеющих относительно темную окраску и грубую призмовидную структуру в результате глубокой трещиноватости.

2163. СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ НЕКЛИМАТИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА //weakly developed nonclimatic soil //sol peu évolué non climatique //nichtklimatischer unreifer Boden - термин франц.шк. (1967) для подкласса почв, входящих в класс слаборазвитых почв (см.), имеющих профиль АС, формирующихся на молодых почвообразующих породах и в своём распространении не связанных с климатом.

2164. СЛА́БОРА́ЗВИТАЯ ЭРОЗИО́ННАЯ ПО́ЧВА //weakly developed erosion soil //sol peu évolué d'érosion //unreifer Erosionsboden - термин франц.шк. (1965) для группы почв, входящей в подкласс слаборазвитых почв (см.), формирующихся на молодых эрозионных поверхностях.

2165. СЛА́БО-СМЫ́ТАЯ ПО́ЧВА //slightly eroded soil //sol peu érodé //schwach erodierter Boden - термин для почв, верхняя часть гумусового горизонта которых снесена поверхностной эрозией; разные авторы для разных типов почв дают различные критерии слабой степени эрозии.

2166. СЛА́БОСОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //slightly solonetzic soil //sol peu solonetzofde //schwach solonetzartiger Boden - термин русск. шк. для почв степей или полупустынь, содержащих 5-10% обменного натрия (от емкости поглощения) в каком-либо подгоризонте (обычно в нижней части гумусового горизонта) и имеющих в этом подгоризонте призмовидную структуру и уплотнение.

2167. СЛА́БОСОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА - см. Слабозасолённая п.

2168. СЛИТА́Я ПО́ЧВА //compact soil //sol compact //kompakter Boden - общеупотребительный термин для очень плотных и твердых в сухом состоянии почв, не имеющих структуры, или имеющих только крупноглыбистую либо крупную призмовидную структуру.

2169. СЛИТОЗЁМ //slitozem //slitozem //Slitosem - термин М.А.Глазовской (1972) для семейства монтмориллонитовых слитых почв

переменно влажных субтропических и тропических областей.

2170. СЛОЙСТАЯ ВЛАЖНОЛУГОВАЯ ПОЧВА - см. Пойменная влажно-луговая слоистая п.

2171. СЛОЙСТАЯ ДЕРНОВАЯ ПОЧВА - см. Пойменная слоистая дерновая п.

2172. СЛОЙСТАЯ ДЕРНОВО-ГЛЕЕВАЯ ПОЧВА - см. Пойменная слоистая дерново-глеевая почва.

2173. СЛОЙСТАЯ ПРИМИТИВНАЯ СЛАБОДЕРНОВАЯ ПОЧВА - см. Пойменная слоистая примитивная слабодерновая почва.

2174. СЛОЙСТАЯ СЛАБОРАЗВИТАЯ ВЛАЖНО-ЛУГОВАЯ ПОЧВА - см. Пойменная влажнолуговая слоистая слаборазвитая п.

2175. СЛОЙСТАЯ СЛАБОРАЗВИТАЯ СЛАБО-ДЕРНОВО-ГЛЕЕВАЯ ПОЧВА - см. Пойменная слоистая слаборазвитая слабо-дерново-глеевая п.

2176. СМОЛНИЦА //smolnitza //smolnitza //Smolnitza (от сербо-хорв. смоли - смоляной) - термин, распространенный в Румынии, Болгарии, Албании и др. для черных глинистых трещиноватых почв сухих умеренных и субтропических районов межгорных котловин и долин юго-восточной Европы; характеризуются периодическим избыточным увлажнением, содержанием гумуса 3-5%, близкой к нейтральной реакцией среды. Син.: вертисоль.

2177. СМОНИЦА //smonitza //smonitza //Smonitza - местное название темных слитых трещиноватых глинистых почв, распространенное в Австрии и Югославии. Син.: вертисоль.

2178. СМЫТАЯ ПОЧВА //denuded soil, eroded soil, washed off soil // sol dénudé, sol érodé, sol entraîné par l'eau //entblösster Boden, erodierter Boden, abgespülter Boden - термин для почв, у которых в результате поверхностной эрозии гумусовый горизонт частично или полностью, а в некоторых случаях и подгумусовые горизонты удалены (смыты) стекающими водами; почвы разделяются на слабо, средне и сильно смытые по разным критериям в зависимости от типа почвы. Син.: эродированная почва.

2179. СОДОВАЯ ПОЧВА //sodic soil, sodium soil //sol sodique //natriumhaltiger Boden, Natriumboden (от лат.sodium - натрий) - 1) общеупотребительный термин для почв, содержащих значительные количества свободной соды, включая содовые солонцы, солончаки-солонцы и солончаки, а также солончаковатые почвы; 2) термин франц.шк. (1967) для класса почв, генезис которых определяется воздействием солей натрия и включающих два под-

класса: А) почвы с недеградированной структурой (солончаки) и Б) почвы с деградированной структурой (солонцы-солончаки, солонцы и осолоделые почвы); 3) термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для солонцеватых почв, содержащих обменный натрий в количестве более 15% от емкости поглощения в каком-либо горизонте в пределах 125 см от поверхности, исключая солонцы.

2180. СОЛЕВА́Я КОРА́ - см. Кора солевая.

2181. СО́ЛОДЬ //solod //solod //Solod, Soloti (от русск.народного названия) - 1) термин, общепринятый для почв, формирующихся преимущественно из солонцов при их поверхностном избыточном увлажнении в степной и лесостепной зонах в плоских замкнутых понижениях, часто под осиновыми и березовыми "колками" или "кустами". Отличаются заметно развитым элювиальным осветленным горизонтом A_2, значительной разрушенностью солонцового горизонта, часто оглеением, кислой реакцией в верхней части профиля и щелочной - в нижней. Син.: засоленная подзолистая почва, степная осветленная почва, щелочной подзол, серая осолоделая почва; 2) термин канадской школы (1968) для большой группы почв, входящих в порядок солонцовых почв (см.), имеющих определенный переход между горизонтами A_1 и В в виде подгоризонта АВ или A_2; обычно присутствует пластинчатый горизонт A_2, который может иметь реликтовые вертикальные трещины по бывшей столбчатой структуре; глыбистая структура горизонта АВ имеет обильную кремнеземистую присыпку по граням; столбчатая структура обычно не четко выражена; солевой горизонт обычно карбонатный.

2182. СО́ЛОДЬ БЕСКАРБОНА́ТНАЯ //non-calcaric solod //solod non-calcaire //nichtkalkischer Solod - термин русск.шк. (1967) для рода солодей, не имеющих карбонатного горизонта в профиле.

2183. СО́ЛОДЬ БУ́РАЯ //brown solod //solod brun //braun Solod - термин канадской школы (1968) для подгруппы бурокрашенных солодей семиаридных степей.

2184. СО́ЛОДЬ ГЛУБО́КАЯ //deep solod //solod profond //tiefer Solod - термин русск.шк. (1967) для вида солодей с глубиной нижней границы горизонта A_2 более 20 см.

2185. СО́ЛОДЬ ГЛУБОКОДЕРНО́ВАЯ //deep sod solod //solod gazonnée profond //tieferrasen Solod - термин русск.шк. (1967) для вида солодей, имеющих мощность гумусового горизонта более 20 см.

2186. СО́ЛОДЬ ДЕРНИ́ННАЯ //turf solod //solod pelouse //Grasnabesolod - термин русск.шк. (1967) для вида солодей, имеющих мощность гумусового горизонта менее 5 см.

2187. СО́ЛОДЬ ДЕРНО́ВАЯ //sod solod //solod gazonnée //Rasensolod - термин русск.шк. для солодей с мощным (более 20 см) гумусовым горизонтом; син.: сильно осолоделая почва.

2188. СО́ЛОДЬ ДЕРНО́ВО-ГЛЕЕВА́ТАЯ //sod-gleyic solod //solod gazonnée-gleyique //rasengleyischer Solod - см. Солодь лугово-степная.

2189. СО́ЛОДЬ ДЕРНО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ //sod-gley solod //solod gazonnée-gley //rasengley Solod - см. Солодь луговая.

2190. СО́ЛОДЬ ЛУГОВА́Я //meadow solod //solod de prairie humide //Wiesensolod - термин русск.шк. (1967) для подтипа солодей, формирующихся при уровне грунтовых вод 1,5-3 м, характеризующихся наличием глеевого горизонта в нижней части профиля.

2191. СО́ЛОДЬ ЛУ́ГОВО-БОЛО́ТНАЯ //meadow-swampy solod //solod de prairie marecageux //Wiesenmoorsolod - термин русск.шк. (1967) для подтипа солодей, формирующихся в глубоких понижениях с длительным (более одного месяца) застаиванием поверхностных вод и характеризующихся оглеенным или оторфованным гумусовым горизонтом, белёсым оглеенным осолоделым горизонтом, глеевым горизонтом В и залеганием грунтовых вод на глубине 1-2 м.

2192. СО́ЛОДЬ ЛУ́ГОВО-СТЕПНА́Я //meadow-steppe solod //solod de prairie-steppe //Wiesensteppensolod - термин русск.шк. (1967) для подтипа солодей, формирующихся при повышенном поверхностном увлажнении и глубоких (5-7 м) грунтовых водах в западинах, лиманах, подах степной зоны, характеризующихся слабым оглеением в конце второго метра профиля, вскипанием около 100 см.

2193. СО́ЛОДЬ МЕ́ЛКАЯ //shallow solod //solod mincé //dünner Solod - термин русск.шк. (1967) для вида солодей, имеющих глубину нижней границы горизонта A_2 менее 10 см.

2194. СО́ЛОДЬ МЕ́ЛКОДЕРНО́ВАЯ //shallow sod solod //solod gazonnée peu profond //dünnerrasen Solod - термин русск.шк. (1967) для вида солодей, имеющих мощность гумусового горизонта 5-10 см.

2195. СО́ЛОДЬ НЕЗАСОЛЁННАЯ НЕСОЛОНЦЕВА́ТАЯ //non-saline non-solonetzic solod //solod non-saline non-solonetzique //nichtsalzhaltig nichtsolonetzartiger Solod - термин русск.шк. (1967) для

рода солодей, не имеющих натрия в поглощающем комплексе и солевого горизонта в профиле.

2196. СОЛОДЬ ОГЛЕЕННАЯ //gleyed solod //solod gleyifié //vergleyter Solod - термин канадской школы (1968) для солодей любой из подгрупп, имеющих признаки оглеения в каком-либо из горизонтов профиля.

2197. СОЛОДЬ СВЕТЛАЯ //clear solod, lucid solod, light solod //solod clair, solod limpide //hell Solod, klar Solod - термин русск.шк. (1967) для вида солодей, содержащих менее 3% гумуса в верхнем горизонте.

2198. СОЛОДЬ СЕРАЯ //gray solod //solod gris //grau Solod -1) термин русск.шк. (1967) для вида солодей, содержащих 3-6% гумуса в верхнем горизонте; 2) термин канадской школы (1968) для подгруппы сероокрашенных солодей субгумидной лесостепи с лесной растительностью.

2199. СОЛОДЬ СКАЛЬНАЯ //lithic solod //solod lithique //lithischer Solod - термин канадской школы (1968) для солодей любой из подгрупп, имеющих в профиле плотную скальную породу в пределах от 10 до 50 см от поверхности.

2200. СОЛОДЬ СОЛОНЦЕВАТАЯ //solonetzic solod //solod solonetzique //solonetzartiger Solod - термин русск.шк. (1967) для рода солодей, содержащих более 5% от емкости поглощения натрия в верхней части профиля.

2201. СОЛОДЬ СОЛОНЧАКОВАТАЯ //saliferous solod //solod salifére //salzhaltig Solod - термин русск.шк. (1967) для рода солодей, имеющих столь близко к поверхности солевой горизонт, что имеет место периодический подъем солей к поверхности.

2202. СОЛОДЬ СРЕДНЕДЕРНОВАЯ //medium sod solod //solod gazonnée moderée //mässigrasen Solod - термин русск.шк. (1967) для вида солодей, имеющих мощность гумусового горизонта 10-20 см.

2203. СОЛОДЬ СРЕДНЕМОЩНАЯ //medium deep solod //solod semi-profond //halbtiefer Solod - термин русск.шк. (1967) для вида солодей с глубиной нижней границы горизонта A_2 10-20 см.

2204. СОЛОДЬ ТЁМНАЯ //dark solod //solod foncé //dunkler Solod - термин русск.шк. (1967) для вида солодей, содержащих более 6% гумуса в поверхностном горизонте.

2205. СО́ЛОДЬ ТИПИ́ЧНАЯ //typic solod //solod typique //typischer Solod - см. Солодь дернинная.

2206. СО́ЛОДЬ ЧЕРНАЯ //black solod //solod noire //schwarz Solod - термин канадской школы (1968) для подгруппы чернокрашенных солодей субгумидных (луговых) степей, в которых солевой горизонт обычно значительно глубже карбонатного.

2207. СОЛОНЕ́Ц //solonetz, alkali soil, alkaline soil, alkali earth //solonetz, sol alcalin, sol à alcalis, terre alcaline //Solonetz, Alkaliboden, alkalischer Boden, alkalische Erde (от русск.народного названия, от лат. alcali - щелочь) - 1) термин русск.шк., ставший общеупотребительным, для почв, имеющих в гумусовом горизонте такое количество обменного натрия при практическом отсутствии легкорастворимых солей, которое обусловливает резкое развитие в почвах специфических свойств солонца: щелочной реакции, липкости и набухания во влажном состоянии, сильного уплотнения и твердости в сухом, образования крупных отдельностей (столбов, глыб, призм), большой подвижности органического вещества, подвижности пептизированных коллоидов, пониженной подвижности воды, пониженной водопроницаемости, высокого содержания непродуктивной влаги, расчленение профиля почвы на три главных слоя: элювиальный (надсолонцовый), иллювиальный (солонцовый) и солевой (подсолонцовый); 2) термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих в профиле натриевый[x)] горизонт в пределах 100 см от поверхности; 3) термин канадск.шк. (1968) для большой группы почв, входящих в порядок солонцовых почв (см.), в которых маломощный горизонт A_1 резко переходит в горизонт B (переход между A и B в пределах 2,5 см) со столбчатым очень плотным горизонтом B_1, в котором плоские или округлые головки столбиков имеют белёсую кремнезёмистую присыпку, а грани столбовидных отдельностей имеют тёмные корочки.

2208. СОЛОНЕ́Ц БЕЗНА́ТРОВЫЙ - см. Солонец остаточный.

2209. СОЛОНЕ́Ц БУ́РЫЙ //brown solonetz //solonetz brun //braun Solonetz - термин канадской школы (1968) для подгруппы солонцов с буроокрашенным профилем семиаридных степей.

2210. СОЛОНЕ́Ц ВЫСОКО́СОЛОНЦО́ВЫЙ //high solonetzic solonetz //solonetz grande solonetzique //hochsolonetzischer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для вида солонцов, содержащих натрия более 40% от ёмкости поглощения.

2211. СОЛОНЕ́Ц ГЛЕ́ЕВЫЙ //gleyic solonetz //solonetz gleyique //gleyischer Solonetz (от русск. солонец и глей) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для солонцов (см.), имеющих глеевый[x)] горизонт в нижней части профиля.

2212. СОЛОНЕ́Ц ГЛУБО́КИЙ //deep solonetz //solonetz profond //tiefer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для вида солонцов, имеющих мощность надсолонцового горизонта А более 18 см.

2213. СОЛОНЕ́Ц КАШТА́НОВО-ЛУГОВО́Й //chestnut-meadow solonetz //solonetz humide châtain //kastanienfarbiger Wiesensolonetz - термин русск.шк. (1967) для группы подтипов луговых солонцов каштановой зоны, имеющих в профиле некоторые признаки каштановых почв (окраска, гумусированность, мощность).

2214. СОЛОНЕ́Ц КАШТА́НОВО-ЛУГОВО́Й ВТОРИ́ЧНОЗАСОЛЁННЫЙ //secondary saline chestnut-meadow solonetz //solonetz humide châtain saline secondaire //sekundär salzhaltig kastanienfarbiger Wiesensolonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа луговых солонцов каштановой зоны, характеризующихся хорошо развитым солонцовым профилем при высоком содержании солей с поверхности или в горизонте B_1.

2215. СОЛОНЕ́Ц КАШТА́НОВО-ЛУГОВО́Й ОСОЛОДЕ́ЛЫЙ //solodized chestnut-meadow solonetz //solonetz humide châtain solodise //solodierter kastanienfarbiger Wiesensolonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа луговых солонцов каштановой зоны, имеющих в профиле белёсый осолоделый горизонт A_2.

2216. СОЛОНЕ́Ц КАШТА́НОВО-ЛУГОВО́Й ОСТА́ТОЧНЫЙ //residual chestnut-meadow solonetz //solonetz humide châtain residuel //residualler kastanienfarbiger Wiesensolonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа луговых солонцов каштановой зоны, содержащих обменного натрия менее 10% от ёмкости поглощения.

2217. СОЛОНЕ́Ц КАШТА́НОВО-ЛУГОВО́Й СОЛОНЧАКО́ВЫЙ //saliniferous chestnut-meadow solonetz //solonetz humide châtain salifére //salzhaltig kastanienfarbiger Wiesensolonetz - термин русск. шк. (1967) для подтипа луговых солонцов каштановой зоны, характеризующихся высоким (около 20 см) залеганием солевого горизонта.

2218. СОЛОНЕ́Ц КАШТА́НОВО-ЛУГОВО́Й ТИПИ́ЧНЫЙ //typic chestnut-meadow solonetz //solonetz humide châtain typique //typischer kastanienfarbiger Wiesensolonetz - термин русск.шк. (1967) для

подтипа луговых солонцов каштановой зоны, характеризующихся глубоким (глубже 30 см) солевым горизонтом, отсутствием горизонта A_2 и содержанием обменного натрия более 10% от ёмкости поглощения.

2219. СОЛОНЕ́Ц КАШТА́НОВЫЙ //chestnut solonetz //solonetz châtain // kastanienfarbiger Solonetz - термин русск.шк. (1967) для типа солонцов, распространенных среди каштановых почв в условиях непромывного режима при грунтовых водах глубже 7 м и имеющих окраску и гумусированность тех подтипов каштановых почв, среди которых или в комплексе с которыми они встречаются.

2220. СОЛОНЕ́Ц КАШТА́НОВЫЙ ОСТА́ТОЧНЫЙ //residual chestnut solonetz // solonetz châtain residuel //residueller kastanienfarbiger Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа каштановых солонцов, содержащих натрия менее 10% от емкости поглощения.

2221. СОЛОНЕ́Ц КАШТА́НОВЫЙ СОЛОНЧАКО́ВЫЙ //saliniferous chestnut solonetz //solonetz châtain salifère //salzhaltig kastanienfarbiger Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа каштановых солонцов, имеющих малую мощность профиля и отдельных генетических горизонтов и высокое положение солевого горизонта в профиле (с 15-25 см), что приводит к сезонному поднятию солей к поверхности.

2222. СОЛОНЕ́Ц КАШТА́НОВЫЙ ТИПИ́ЧНЫЙ// typic chestnut solonetz //solonetz châtain typique //typischer kastanienfarbiger Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа каштановых солонцов, не имеющих высокого засоления, белёсого горизонта A_2 и содержащих натрия более 10% от ёмкости поглощения.

2223. СОЛОНЕ́Ц КО́РКОВЫЙ //crust solonetz //solonetz ên croûte // Krustsolonetz - термин русск.шк. (1967) для вида солонцов, имеющих мощность надсолонцового горизонта А менее 5 см.

2224. СОЛОНЕ́Ц ЛУГОВА́ТО-КАШТА́НОВЫЙ //meadowish-chestnut solonetz // solonetz châtain peu humide //schwach wiesenkastanienfarbiger Solonetz - термин русск.шк. (1967) для группы подтипов лугово-каштановых солонцов, формирующихся при уровне грунтовых вод 4-6 м и характеризующихся слабыми признаками переувлажнения в нижней части профиля.

2225. СОЛОНЕ́Ц ЛУГОВА́ТО-КАШТА́НОВЫЙ ОСОЛОДЁЛЫЙ //solodized meadowish-chestnut solonetz //solonetz châtain peu humide solodisé // solodierter schwach wiesenkastanienfarbiger Solonetz - тер-

мин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-каштановых солонцов, формирующихся при уровне засолённых грунтовых вод 4–6 м и характеризующихся наличием белёсого осолоделого горизонта A_2.

2226. СОЛОНЕ́Ц ЛУГОВА́ТО-КАШТА́НОВЫЙ ОСТА́ТОЧНЫЙ //residual meadowish-chestnut solonetz //solonetz châtain peu humide residuel // residueller schwach wiesenkastanienfarbiger Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-каштановых солонцов, формирующихся при уровне засоленных грунтовых вод 4–6 м и характеризующихся содержанием обменного натрия менее 10% от емкости поглощения.

2227. СОЛОНЕ́Ц ЛУГОВА́ТО-КАШТА́НОВЫЙ СОЛОНЧАКО́ВЫЙ //saliniferous meadowish-chestnut solonetz //solonetz châtain peu humide salifère //salzhaltig schwach wiesenkastanienfarbiger Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-каштановых солонцов, формирующихся при уровне засоленных грунтовых вод 4–6 м и характеризующихся высоким засолением на глубине 20–40 см, что приводит к периодическому подъему солей к поверхности.

2228. СОЛОНЕ́Ц ЛУГОВА́ТО-КАШТА́НОВЫЙ ТИПИ́ЧНЫЙ //typic meadowish-chestnut solonetz //solonetz châtain peu humide typique //typischer schwach wiesenkastanienfarbiger Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-каштановых солонцов, формирующихся при уровне засолённых грунтовых вод 4–6 м и характеризующихся засолением в нижней части профиля на глубине 50–100 см, отсутствием белёсого осолоделого горизонта A_2 и содержанием обменного натрия более 10% от емкости поглощения.

2229. СОЛОНЕ́Ц ЛУГОВА́ТО-ПОЛУПУСТЫ́ННЫЙ //meadowish semi-desert solonetz //solonetz subdésertique peu humide //schwach Wiesenhalbwüstensolonetz - термин русск.шк. (1967) для группы подтипов лугово-полупустынных солонцов, формирующихся при уровне грунтовых вод 4–6 м и имеющих слабые признаки переувлажнения в нижней части профиля.

2230. СОЛОНЕ́Ц ЛУГОВА́ТО-ПОЛУПУСТЫ́ННЫЙ СОЛОНЧАКО́ВЫЙ //saliniferous meadowish semi-desert solonetz //solonetz subdésertique peu humide salifère //salzhaltig schwach Wiesenhalbwüstensolonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-полупустынных солонцов, формирующихся при уровне грунтовых вод 4–6 м и имеющий высокий (выше 30 см) солевой горизонт в профиле.

2231. СОЛОНЕ́Ц ЛУГОВА́ТО-ПОЛУПУСТЫ́ННЫЙ ТИПИ́ЧНЫЙ //typic meadowish se-

mi-desert solonetz //solonetz subdésertique peu humide typique //typischer schwach Wiesenhalbwüstensolonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-полупустынных солонцов, формирующихся при уровне грунтовых вод 4-6 м и имеющих низкий (ниже 30 см) солевой горизонт в профиле.

2232. СОЛОНЕ́Ц ЛУГОВА́ТО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ //meadowish-chernozemic solonetz //solonetz chernozemique peu humide //schwach wiesentschernosemischer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для группы подтипов лугово-чернозёмных солонцов, формирующихся при залегании грунтовых вод на глубине 4-6 м, причем капиллярная кайма периодически поднимается до корнеобитаемого слоя; в нижней части профиля видны слабые признаки переувлажнения.

2233. СОЛОНЕ́Ц ЛУГОВА́ТО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ ОСОЛОДЕ́ЛЫЙ //solodized meadowish-chernozemic solonetz //solonetz chernozemique peu humide solodisé //solodierter schwach wiesentschernosemischer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-чернозёмных солонцов, формирующихся при уровне грунтовых вод 4-6 м и характеризующихся присутствием белёсого осолоделого горизонта A_2.

2234. СОЛОНЕ́Ц ЛУГОВА́ТО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ ОСТА́ТОЧНЫЙ //residual meadowish-chernozemic solonetz //solonetz chernozemique peu humide residuel //residueller schwach wiesentschernosemischer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-чернозёмных солонцов, формирующихся при уровне грунтовых вод 4-6 м и характеризующихся содержанием натрия менее 10% от емкости поглощения.

2235. СОЛОНЕ́Ц ЛУГОВА́ТО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ СОЛОНЧАКО́ВЫЙ //saliniferous meadowish-chernozemic solonetz //solonetz chernozemique peu humide salifère //salzhaltig schwach wiesentschernosemischer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-чернозёмных солонцов, формирующихся при грунтовых водах на глубине 4-6 м и отличающихся высоким засолением в горизонте B_2 на глубине 20-30 см, что приводит к периодическому подъему солей к поверхности.

2236. СОЛОНЕ́Ц ЛУГОВА́ТО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ ТИПИ́ЧНЫЙ //typic meadowish-chernozemic solonetz //solonetz chernozemique peu humide typique //typischer schwach wiesentschernosemischer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-чернозёмных солонцов,

формирующихся при уровне грунтовых вод 4–6 м и характеризующихся сравнительно невысоким засолением на глубине 50–100 см, отсутствием горизонта A_2 и содержанием натрия более 10% от емкости поглощения.

2237. СОЛОНЕ́Ц ЛУГОВО́Й //meadow solonetz //solonetz humide //Wiesensolonetz – термин русск.шк. (1967) для типа солонцов степей, формирующихся на высоких пойменных террасах рек, озёр, соров при близком к поверхности залегании грунтовых вод (до 2,5 м) с преобладанием в водном режиме капиллярного насыщения влагой всего профиля; в черноземной зоне эти солонцы имеют тёмный почти чёрный цвет и высокую гумусированность, а в каштановой зоне их окраска тёмная, но с бурым оттенком, и гумусированность значительно меньше.

2238. СОЛОНЕ́Ц ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВЫЙ //meadow-chestnut solonetz //solonetz châtain humide //wiesenkastanienfarbiger Solonetz – 1) термин русск.шк. (1967) для типа солонцов, формирующихся среди каштановых почв в условиях дополнительного поверхностного или, чаще, грунтового увлажнения при уровне грунтовых вод ближе 6 м на недренированных равнинах, на древних речных террасах и в различных понижениях рельефа; 2) термин русск. шк. (1967) для группы подтипов лугово-каштановых солонцов, формирующихся при уровне грунтовых вод 2,5–3,5 м и характеризующихся наличием признаков переувлажнения в нижней части профиля, высокой гумусированностью и растянутостью гумусового профиля, сильным засолением нижней части профиля.

2239. СОЛОНЕ́Ц ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВЫЙ ОСОЛОДЕ́ЛЫЙ //solodized meadow-chestnut solonetz //solonetz châtain humide solodisé //solodierter wiesenkastanienfarbiger Solonetz – термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-каштановых солонцов, формирующихся при уровне грунтовых вод 2,5–3,5 м и характеризующихся наличием белёсого осолоделого горизонта A_2.

2240. СОЛОНЕ́Ц ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВЫЙ ОСТАТО́ЧНЫЙ //residual meadow-chestnut solonetz //solonetz châtain humide residuel //residueller wiesenkastanienfarbiger Solonetz – термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-каштановых солонцов, формирующихся при уровне грунтовых вод 2,5–3,5 м и характеризующихся содержанием обменного натрия менее 10% от емкости поглощения.

2241. СОЛОНЕ́Ц ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВЫЙ СОЛОНЧАКО́ВЫЙ //saliniferous meadow-

chestnut solonetz //solonetz châtain humide salifère //salzhaltig wiesenkastanienfarbiger Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-каштановых солонцов формирующихся при уровне засолённых грунтовых вод 2,5-3,5 м и характеризующихся высоким засолением на глубине 16-30 см, что приводит к их периодическому подъему к поверхности.

2242. СОЛОНЕ́Ц ЛУ́ГОВО-КАШТА́НОВЫЙ ТИПИ́ЧНЫЙ //typic meadow-chestnut solonetz //solonetz châtain humide typique //typischer wiesenkastanienfarbiger Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-каштановых солонцов, формирующихся при уровне грунтовых вод 2,5-3,5 м и характеризующихся засолением в нижней части профиля на глубине 50-100 см, отсутствием белёсого осолоделого горизонта A_2 и содержанием обменного натрия более 10% от ёмкости поглощения.

2243. СОЛОНЕ́Ц ЛУ́ГОВО-ПОЛУПУСТЫ́ННЫЙ //meadow semi-desert solonetz // solonetz subdésertique humide //Wiesenhalbwüstensolonetz - 1) термин русск.шк. (1967) для типа солонцов полупустыни, формирующихся в условиях дополнительного увлажнения на недренированных равнинах и древних речных террасах при глубине грунтовых вод ближе 7 м, что приводит к развитию признаков переувлажнения в нижней части профиля и большей гумусированности почв; 2) термин русск.шк. (1967) для группы подтипов лугово-полупустынных солонцов, формирующихся при уровне грунтовых вод 2,5-3,5 м и имеющих признаки заметного переувлажнения в нижней части профиля.

2244. СОЛОНЕ́Ц ЛУ́ГОВО-ПОЛУПУСТЫ́ННЫЙ СОЛОНЧАКО́ВЫЙ //saliniferous meadow semi-desert solonetz //solonetz subdésertique humide salifère //salzhaltig Wiesenhalbwüstensolonetz - термин русск. шк. (1967) для подтипа лугово-полупустынных солонцов, формирующихся при уровне грунтовых вод 2,5-3,5 м и имеющих высокий (ближе 30 см) солевой горизонт в профиле.

2245. СОЛОНЕ́Ц ЛУ́ГОВО-ПОЛУПУСТЫ́ННЫЙ ТИПИ́ЧНЫЙ //typic meadow semi-desert solonetz //solonetz subdésertique humide typique //typischer Wiesenhalbwüstensolonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-полупустынных солонцов, формирующихся при уровне грунтовых вод 2,5-3,5 м и имеющих низкий (глубже 30 см) солевой горизонт в профиле.

2246. СОЛОНЕ́Ц ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ //meadow-chernozemic solonetz //

solonetz chernozemique humide // Wiesentschernosemischer Solonetz - 1) термин русск.шк. (1967) для типа солонцов, формирующихся в условиях грунтового или смешанного поверхностного и грунтового дополнительного увлажнения на недренированных равнинах, на древних речных террасах и в различных понижениях рельефа среди чернозёмов и лугово-чернозёмных почв, характеризующихся тёмной почти черной окраской и высокой гумусированностью, свойственной чернозёмам и луговым почвам степей; 2) термин русск.шк. (1967) для группы подтипов лугово-чернозёмных солонцов, формирующихся при залегании грунтовых вод на глубине 2,5-3 м и отличающихся высокой гумусированностью, наличием водонасыщенного горизонта в нижней части профиля и энергичным её засолением.

2247. СОЛОНЕ́Ц ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ ОСОЛОДЕ́ЛЫЙ // solodized meadow-chernozemic solonetz // solonetz chernozemique humide solodisé // solodierter wiesentschernosemischer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-чернозёмных солонцов, формирующихся при уровне грунтовых вод 2,5-3,5 м и характеризующихся наличием белёсого осолоделого горизонта A_2.

2248. СОЛОНЕ́Ц ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ ОСТА́ТОЧНЫЙ // residual meadow-chernozemic solonetz // solonetz chernozemique humide residuel // residueller wiesentschernosemischer Solonetz - термин русск. шк. (1967) для подтипа лугово-чернозёмных солонцов, формирующихся при уровне грунтовых вод 2,5-3,5 м и содержащих натрия менее 10% от ёмкости поглощения.

2249. СОЛОНЕ́Ц ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ СОЛОНЧАКО́ВЫЙ // saliniferous meadow-chernozemic solonetz // solonetz chernozemique humide salifère // salzhaltig wiesentschernosemischer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-чернозёмных солонцов формирующихся при уровне грунтовых вод 2,5-3,5 м и характеризующихся высоким содержанием солей в горизонте B_2 на глубине 20-30 см, что приводит к периодическому поднятию солей к поверхности.

2250. СОЛОНЕ́Ц ЛУ́ГОВО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ ТИПИ́ЧНЫЙ // typic meadow-chernozemic solonetz // solonetz chernozemique humide typique // typischer wiesentschernosemischer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа лугово-чернозёмных солонцов, формирующихся при уровне грунтовых вод 2,5-3,5 м и характеризующихся отсутствием горизонта A_2, засолением в нижней части профиля на

глубине 50-100 см и содержанием натрия более 10% от ёмкости поглощения.

2251. СОЛОНЕ́Ц МАЛОМО́ЩНЫЙ //non-deep solonetz, shallow solonetz // solonetz non-profond, solonetz mincé //nichttiefer Solonetz, dünner Solonetz - термин русск.шк. (1967) для вида солонцов, имеющих мощность горизонтов A+B менее 30 см.

2252. СОЛОНЕ́Ц МЕ́ЛКИЙ //shallow solonetz //solonetz mincé //dünner Solonetz - термин русск.шк. (1967) для вида солонцов, имеющих надсолонцовый горизонт A мощностью 5-10 см.

2253. СОЛОНЕ́Ц МО́ЛЛЕВЫЙ //mollic solonetz //solonetz mollique //mollischer Solonetz (от русск. солонец и лат. mollis - мягкий) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для солонцов (см.), имеющих с поверхности моллевый[x)] горизонт A.

2254. СОЛОНЕ́Ц МО́ЩНЫЙ //thick solonetz, deep solonetz //solonetz profond //tiefer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для вида солонцов, имеющих мощность горизонтов A+B более 30 см.

2255. СОЛОНЕ́Ц НИ́ЗКОСОЛОНЦО́ВЫЙ //low solonetzic solonetz //solonetz peu solonetzique //schwach solonetzischer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для вида солонцов, содержащих натрия 10-25% от ёмкости поглощения.

2256. СОЛОНЕ́Ц ОГЛЕ́ЕННЫЙ //gleyed solonetz //solonetz gleyifié // vergleyter Solonetz - термин канадской школы (1968) для солонцов любой из подгрупп, имеющих пятна оглеения в каком-либо из горизонтов профиля.

2257. СОЛОНЕ́Ц ОСОЛОДЕ́ЛЫЙ //solodized solonetz //solonetz solodisé //solodierter Solonetz - 1) термин русск.шк. (1967) для солонцов, имеющих четко выраженный белёсый осолоделый горизонт A_2; 2) общеупотребительный термин для солонцов, верхний горизонт которых в разной степени разрушен процессом осолодения и затронута осолодением также верхняя часть столбчатого горизонта B.

2258. СОЛОНЕ́Ц ОСТА́ТОЧНЫЙ //residual solonetz //solonetz residuel // residueller Solonetz - термин русск.шк. для солонцов, имеющих комплекс типичных для солонцов морфологических и физических свойств, но содержащих обменного натрия менее 10% от ёмкости поглощения.

2259. СОЛОНЕ́Ц ПОЛУПУСТЫ́ННЫЙ //semi-desert solonetz //solonetz sub-

désertique //Halbwüstensolonetz - термин русск.шк. (1967) для типа солонцов полупустынных областей, формирующихся при глубоком стоянии грунтовых вод (ниже 7 м) и непромывном водном режиме на верхних террасах рек или на соленосных породах и характеризующихся маломощным сильнокарбонатным профилем, состоящим из светлосерого буроватого надсолонцового горизонта А, расчленяющегося на пористую корочку и слоеватую нижнюю часть, коричнево-бурого призматического уплотненного солонцового горизонта B_1 с карбонатными глазками, буроватого комковато-призмовидного солевого подсолонцового горизонта B_2.

2260. СОЛОНЕ́Ц ПОЛУПУСТЫ́ННЫЙ СОЛОНЧАКО́ВЫЙ //saliniferous semi-desert solonetz //solonetz subdésertique salifére //salzhaltig Halbwüstensolonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа полупустынных солонцов, характеризующихся высоким (выше 30 см) залеганием солевого горизонта в профиле.

2261. СОЛОНЕ́Ц ПОЛУПУСТЫ́ННЫЙ ТИПИ́ЧНЫЙ // typic semi-desert solonetz //solonetz subdésertique typique // typischer Halbwüstensolonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа полупустынных солонцов, характеризующихся низким (глубже 30 см) залеганием солевого горизонта в профиле.

2262. СОЛОНЕ́Ц ПРОГРАДИ́РОВАННЫЙ - см. Солонец реградированный.

2263. СОЛОНЕ́Ц РЕГРАДИ́РОВАННЫЙ //regraded solonetz //solonetz regradé //regradierter Solonetz - термин Д.Г.Виленского для вторично засоленных солонцов.

2264. СОЛОНЕ́Ц СЕ́РЫЙ //gray solonetz //solonetz gris //grau Solonetz - термин канадской школы (1968) для подгруппы сероокрашенных солонцов субгумидной лесостепи с угнетённым лесом.

2265. СОЛОНЕ́Ц СКА́ЛЬНЫЙ //lithic solonetz //solonetz lithique //lithischer Solonetz - термин канадской школы (1968) для солонцов любой из подгрупп, в профиле которых наблюдается плотная порода в пределах от 10 до 50 см от поверхности.

2266. СОЛОНЕ́Ц СО́ДОВЫЙ //sodic solonetz //solonetz sodique //sodischer Solonetz - термин для солонцов, содержащих свободную соду в профиле.

2267. СОЛОНЕ́Ц-СОЛОНЧА́К //solonetz-solonchak, alkali-saline soil // solonetz-solonchak, sol salin noir, sol alcalin //Solonetz-Solonchak, Alkaliboden - термин для почв, переходных между солонцами и солончаками.

2268. СОЛОНЕ́Ц СОЛОНЧАКО́ВЫЙ //saliniferous solonetz //solonetz salifère //salzhaltig Solonetz - термин русск.шк. для солонцов, содержащих высокий процент солей в средней или верхней части профиля (на глубине 20-50 см), что приводит к их периодическому поднятию к поверхности.

2269. СОЛОНЕ́Ц СРЕ́ДНЕСОЛОНЦО́ВЫЙ // medium solonetzic solonetz//solonetz solonetzique moderée //mässigsolonetzischer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для вида солонцов, содержащих натрия 25-40% от ёмкости поглощения.

2270. СОЛОНЕ́Ц СРЕ́ДНИЙ //medium solonetz //solonetz moderée //mässiger Solonetz - термин русск.шк. (1967) для вида солонцов, имеющих мощность надсолонцового горизонта А 10-18 см.

2271. СОЛОНЕ́Ц СТО́ЛБЧАТЫЙ //columnar alkali soil, columnar solonetz //sol à alcalis à structure colonnaire, solonetz à structure colonnaire //säulenförmiger Alkaliboden, säulenförmiger Solonetz - общеупотребительный термин для солонцов, имеющих столбчатую структуру в солонцовом горизонте.

2272. СОЛОНЕ́Ц ТИПИ́ЧНЫЙ //typic solonetz //solonetz typique //typischer Solonetz - 1) термин русск.шк. для солонцов, содержащих соли в нижней части профиля, не имеющих белёсого осолоделого горизонта A_2 и содержащих обменного натрия более 10% от ёмкости поглощения; 2) термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для солонцов, имеющих с поверхности светлый[x)] горизонт А.

2273. СОЛОНЕ́Ц ЧЕРНОЗЁМНО-ЛУГОВО́Й //chernozem-meadow solonetz //solonetz humide chernozemiforme //tschernosemartiger Wiesensolonetz - термин русск.шк. (1967) для группы подтипов луговых солонцов, формирующихся в зоне чернозёмов и имеющих некоторые признаки черноземного профиля (окраска, гумусированность, мощность).

2274. СОЛОНЕ́Ц ЧЕРНОЗЁМНО-ЛУГОВО́Й ВТОРИ́ЧНОЗАСОЛЁННЫЙ //secondary saline chernozem-meadow solonetz//solonetz humide chernozemiforme saline secondaire // sekundär salzhaltig tschernosemartiger Wiesensolonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа луговых солонцов чернозёмной зоны, характеризующихся хорошо развитым солонцовым профилем, часто с осолоделым горизонтом A_2, при высоком содержании солей с поверхности или в горизонте B_1.

2275. СОЛОНЕ́Ц ЧЕРНОЗЁМНО-ЛУГОВО́Й ОСОЛОДЕ́ЛЫЙ //solodized chernozem-

meadow solonetz //solonetz humide chernozemiforme solodisé //solodierter tschernosemartiger Wiesensolonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа луговых солонцов чернозёмной зоны, характеризующихся наличием белёсого осолоделого горизонта A_2.

2276. СОЛОНЕ́Ц ЧЕРНОЗЁМНО-ЛУГОВО́Й ОСТА́ТОЧНЫЙ //residual chernozem-meadow solonetz //solonetz humide chernozemiforme residuel //residueller tschernosemartiger Wiesensolonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа луговых солонцов чернозёмной зоны, содержащих обменного натрия менее 10% от ёмкости поглощения.

2277. СОЛОНЕ́Ц ЧЕРНОЗЁМНО-ЛУГОВО́Й СОЛОНЧАКО́ВЫЙ //saliniferous chernozem-meadow solonetz //solonetz humide chernosemiforme salifère //salzhaltig tschernosemartiger Wiesensolonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа луговых солонцов чернозёмной зоны с высоким (около 20 см) залеганием солевого горизонта.

2278. СОЛОНЕ́Ц ЧЕРНОЗЁМНО-ЛУГОВО́Й ТИПИ́ЧНЫЙ //typic chernozem-meadow solonetz //solonetz humide chernozemiforme typique //typischer tschernosemartiger Wiesensolonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа луговых солонцов чернозёмной зоны, имеющих глубокий (глубже 30 см) солевой горизонт, не имеющих белёсого осолоделого горизонта A_2 и содержащих обменного натрия более 10% от ёмкости поглощения.

2279. СОЛОНЕ́Ц ЧЕРНОЗЁМНЫЙ //chernozemic solonetz //solonetz chernozemique //tschernosemischer Solonetz - термин русск.шк.(1967) для типа солонцов, распространенных среди чернозёмов в условиях отсутствия воздействия грунтовых вод (глубже 5-7 м) и современного непромывного режима, характеризующихся тёмной почти черной окраской, высокой гумусированностью (3-7% гумуса в горизонте А), резко выраженным белесым горизонтом A_2.

2280. СОЛОНЕ́Ц ЧЕРНОЗЁМНЫЙ ОСОЛОДЕ́ЛЫЙ //solodized chernozemic solonetz //solonetz chernozemique solodisé //solodierter tschernosemischer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа черноземных солонцов, характеризующихся четким разделением надсолонцового горизонта на гумусовый A_1 и белёсый осолоделый A_2.

2281. СОЛОНЕ́Ц ЧЕРНОЗЁМНЫЙ ОСТА́ТОЧНЫЙ //residual chernozemic solonetz //solonetz chernozemique residuel //residueller tschernosemischer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа

черноземных солонцов, имеющих все морфологические и физические свойства солонца, но содержащих менее 10% натрия от емкости поглощения.

2282. СОЛОНЕ́Ц ЧЕРНОЗЁМНЫЙ СОЛОНЧАКО́ВЫЙ //saliniferous chernozemic solonetz //solonetz chernozemique salifère //salzhaltig tschernosemischer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа черноземных солонцов, имеющих малую мощность профиля и всех генетических горизонтов: A_1 корковый (1-5 см) или мелкий (5-10 см), $A+B_1$ менее 30 см, солевой горизонт совмещён с горизонтом B_2; характерно сезонное поднятие солей к поверхности; карбонатный горизонт выражен не четко; дифференциация профиля по илу резко выражена.

2283. СОЛОНЕ́Ц ЧЕРНОЗЁМНЫЙ ТИПИ́ЧНЫЙ //typic chernozemic solonetz // solonetz chernozemique typique //typischer tschernosemischer Solonetz - термин русск.шк. (1967) для подтипа черноземных солонцов, главным образом остепненных гидроморфных, имеющих сильно дифференцированный профиль, средний или глубокий горизонт A_1, столбчатый горизонт B_1, мощность горизонтов A+B 30-40 см, вскипание с 20-40 см, гипс с 65-70 см, карбонатный горизонт совмещенный с B_2 или ниже его.

2284. СОЛОНЕ́Ц ЧЁРНЫЙ //black solonetz //solonetz noire //schwarz Solonetz - термин канадской школы (1968) для подгруппы черноокрашенных солонцов субгумидных (луговых) степей.

2285. СОЛОНЕ́Ц ЩЕЛОЧНО́Й //alkaline solonetz //solonetz alcaline // alkalischer Solonetz - термин канадской школы (1968) для подгруппы солонцов, имеющих сильно щелочную реакцию в горизонте A, постепенный переход между A и B, черноокрашенный профиль, отсутствие признаков осолодения, проникновение верхушек столбиков горизонта B в горизонт A.

2286. СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //alkalised soil, solonetzic soil, solonetz-like soil //sol à alcalis, sol solonetzoïde //Alkaliboden, solonetzartige Boden - термин для почв, в которых имеются признаки солонцового процесса и, прежде всего, наличие поглощенного натрия (не более 20% от ёмкости поглощения), что вызывает подвижность почвенных коллоидов, передвижение их вниз по профилю и образование в профиле уплотненного горизонта с глянцевитыми плёнками на гранях структурных отдельностей. Син.: натриевая почва, щелочная почва.

2287. СОЛОНЦЕВА́ТАЯ БЕЗНА́ТРОВАЯ ПО́ЧВА //non-sodium solonetzic soil //sol solonetzoïde non-sodium //nichtnatriumhaltiger solonetzartiger Boden - см. Остаточносолонцеватая п.

2288. СОЛОНЦО́ВАЯ ПО́ЧВА //solonetzic soil //sol solonetzique //solonetzischer Boden (от русск. солонец) - термин канадской школы (1968) для порядка почв, имеющих в профиле солонцовый горизонт B, подстилаемый солевым горизонтом C; включает большие группы солонцов и солодей.

2289. СОЛОНЧА́К //solonchak //solonchak, sol salin blanc //Solontschak (от русск.народного названия) - 1) сильно засолённая почва, характеризующаяся содержанием солей в поверхностном горизонте более 1% и обычно имеющая на поверхности белые солевые выцветы и прожилки или гнезда; син.: белая засоленная почва (франц.); 2) термин русск.шк. (1967) для типа гидроморфных почв, содержащих с поверхности легкорастворимые соли (более 0,7% при содовом, более 1% при хлоридном и сульфатно-хлоридном и более 2% при сульфатном и хлоридно-сульфатном засолении); 3) термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв имеющих солевой[x)] горизонт и/или проводимость насыщенного экстракта при 25°C в каком-либо из горизонтов в пределах 125 см от поверхности более 16 mmhos /см.

2290. СОЛОНЧА́К БОЛО́ТНЫЙ //swamp solonchak //solonchak marecageux //Moorsolontschak - термин русск.шк. (1967) для подтипа гидроморфных солончаков депрессий рельефа, представляющих собой засоленные лугово-болотные или болотные низинные торфяно-глеевые почвы.

2291. СОЛОНЧА́К ВТОРИ́ЧНЫЙ //secondary solonchak //solonchak secundaire //sekundär Solontschak - термин для солончаков, образовавшихся на исходно незасолённых почвах в результате резкого изменения их водного режима (ирригация, подтопление и т.п.).

2292. СОЛОНЧА́К ГЛЕ́ЕВЫЙ //gleyic solonchak //solonchak gleyique //gleyischer Solontschak (от русск. солончак и глей) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для солончаков (см.), имеющих солевой[x)] и глеевый[x)] горизонты в пределах 125 см от поверхности.

2293. СОЛОНЧА́К ГРЯ́ЗЕВО-ВУЛКАНИ́ЧЕСКИЙ //mud volcanic solonchak //solonchak de boue volcanique //schlammvulkanischer Solontschak

- термин для солончаков, формирующихся в результате излияния на поверхность глубинных солевых грязей (содержание солей до 4% и более) или минерализованных вод с образованием солевых поверхностных кор.

2294. СОЛОНЧА́К КО́РКОВЫЙ //crust solonchak //solonchak én croûte // Krustsolontschak - термин для солончаков, имеющих с поверхности плотную белую корку солей, что имеет место при преобладании в их составе хлорида натрия.

2295. СОЛОНЧА́К ЛУГОВО́Й //meadow solonchak //solonchak de prairie a nappe phréatique //Wiesensolontschak - термин русск.шк. (1967) для подтипа гидроморфных солончаков, распространенных в депрессиях рельефа при уровне грунтовых вод 1-3 м и представляющих собой засолённые луговые почвы.

2296. СОЛОНЧА́К МЕРЗЛО́ТНЫЙ //cryomorphic solonchak //solonchak cryomorphé //Frostsolontschak - термин для солончаков, формирующихся в результате криогенных процессов при наличии многолетней мерзлоты на небольшой глубине в почве.

2297. СОЛОНЧА́К МО́КРЫЙ //wet solonchak //solonchak humide //Nasolontschak - термин для солончаков, имеющих с поверхности постоянно влажную корку сильно гигроскопических солей, преимущественно хлоридов кальция и магния.

2298. СОЛОНЧА́К МО́ЛЛЕВЫЙ //mollic solonchak //solonchak mollique // mollischer Solontschak (от русск. солончак и лат.mollis - мягкий) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для солончаков (см.), имеющих с поверхности моллевый[x)] горизонт А и солевой[x)] го́ризонт в пределах 125 см от поверхности.

2299. СОЛОНЧА́К НИТРА́ТНЫЙ //nitrate solonchak //solonchak à nitrates //Nitratsolontschak - термин для солончаков наиболее аридных бессточных областей суши, в составе солей которых преобладают нитраты.

2300. СОЛОНЧА́К ОТАКЫРЕ́ННЫЙ //takyriferous solonchak //solonchak takyrifère //takyrartiger Solontschak- термин русск.шк. (1967) для подтипа солончаков, представляющих начальную стадию рассоления пустынного солончака, на которой поверхность их теряет вспученность и становится выровненной, а над пухлым солевым горизонтом образуется очень маломощная (до 2 см) хрупкая относительно рассоленная корочка, разбитая на мелкие полигоны.

2301. СОЛОНЧА́К ПРИМО́РСКИЙ //coastal solonchak //solonchak côtier // Küstensolontschak - термин для солончаков, формирующихся на наиболее молодом прибрежном аллювии морских и океанических побережий при его постепенном или периодическом обсыхании.

2302. СОЛОНЧА́К ПУ́ХЛЫЙ //fluffy solonchak, puffed solonchak //solonchak duveté, solonchak pulvérulent, solonchak gonflé //flauming Solontschak, leicht Solontschak, verteubend Solontschak, geschwellter Solontschak - термин для солончаков, имеющих в поверхностном слое большое количество кристаллов сульфата натрия, что создаёт пушистый рыхлый горизонт.

2303. СОЛОНЧА́К РЕЛИ́КТОВЫЙ //relict solonchak //solonchak relicte // Restsolontschak, Reliktsolontschak - термин для законсервированных в аридном климате остаточных солончаков, сформированных в прошлом при гидроморфном режиме и существующих сейчас при отсутствии грунтовых вод.

2304. СОЛОНЧА́К СО́ДОВЫЙ //sodic solonchak //solonchak sodique //sodischer Solontschak - термин для засолённых почв, содержащих в поверхностном горизонте более 0,1% свободной соды.

2305. СОЛОНЧА́К СО́РОВЫЙ //shor solonchak //solonchak de chor // Schorsolontschak - термин русск.шк. (1967) для подтипа гидроморфных солончаков, формирующихся на днищах периодически высыхающих бессточных солёных озёр и характеризующихся наличием близких к поверхности (50-100 см) сильно минерализованных (100-150 г/л) грунтовых вод, солевой корочкой на поверхности, сильным оглеением всей почвенной толщи, высоким (3-10%) содержанием солей во всём профиле.

2306. СОЛОНЧА́К СУЛЬФА́ТНЫЙ //sulphate-solonchak //sol salin à sulfates //Sulfat-Solontschak - термин для солончаков, в солевом составе которых преобладают сульфаты.

2307. СОЛОНЧА́К ТАКЫРОВИ́ДНЫЙ //takyr-like solonchak//solonchak takyriforme //takyrartiger Solontschak - термин для глинистых солончаков, имеющих растрескивающуюся полигональную поверхность.

2308. СОЛОНЧА́К ТАКЫ́РОВЫЙ //takyric solonchak //solonchak takyrique //takyrischer Solontschak (от русск. солончак и тюркск. такыр) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для солончаков (см.), имеющих с поверхности полигональную трещиноватость с отслаивающейся корочкой и солевой[x)]

горизонт в пределах 125 см от поверхности.

2309. СОЛОНЧА́К ТИПИ́ЧНЫЙ //typic solonchak //solonchak typique // typischer Solontschak - термин русск.шк. (1967) для подтипа гидроморфных солончаков выпотного режима, распространенных на юге степной зоны на незаливаемых террасах соленых озёр или на повышениях среди лиманов и формирующихся при глубине соленых грунтовых вод 2-3 м с капиллярной каймой у поверхности.

2310. СОЛОНЧА́К ТИПИ́ЧНЫЙ //orthic solonchak //solonchak orthique // orthischer Solontschak (от русск. солончак и греч. orthos - обычный) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для солончаков (см.), имеющих с поверхности светлый[x)] горизонт А и солевой[x)] горизонт в пределах 125 см от поверхности.

2311. СОЛОНЧА́К ХЛОРИ́ДНЫЙ //chlorid solonchak //sol salin à chlorure, solonchak à chlorure //Chlorid-Solontschak - термин для солончаков, имеющих преобладание хлоридов в анионной части водорастворимых солей.

2312. СОЛОНЧА́К ЧЕРНЫЙ //black solonchak //solonchak noire //schwarz Solontschak - термин для содовых солончаков, обычно имеющих интенсивно черную окраску.

2313. СОЛОНЧА́К ЭО́ЛОВО-БУГРИ́СТЫЙ //aeolian knobby solonchak //solonchak éolien de bosse //äolischer Höckersolontschak - термин для сухих солончаков аридных районов, сформировавшихся в результате навевания ветром песчаного и солевого материала.

2314. СОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //solonchak-like soil //sol solonchakoïde //solontschakartiger Boden- 1) термин для почв, засоленных в разной степени и на разной глубине, не достигших стадии солончака, т.е. имеющих менее 1% солей в поверхностном горизонте; 2) термин для почв, содержащих максимум солей на глубине 30-80 см.

2315. СОЛОНЧАКО́ВАЯ ПО́ЧВА //solonchak soil //sol solonchakoïde // solontschakrtiger Boden,Solontschakboden- 1) термин для почв, содержащих на разной глубине в профиле горизонт солевой аккумуляции с более чем 1% легкорастворимых солей; 2) термин для почв, содержащих горизонт максимальной солевой аккумуляции на глубине 5-30 см.

2316. СО́МБРИГУМО́КС //sombrihumox //sombrihumox //Sombrihumox (от франц.sombre - тёмный, лат.humus - гумус и порядкового кор-

ня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (1960-70) для большой группы гумоксов (см.), которые имеют окисный[x)] горизонт с подгоризонтом, который темнее и гумусированнее, чем вышележащий горизонт.

2317. СО́МБРИГУМУ́ЛЬТ //sombrihumult //sombrihumult //Sombrihumult (от франц.sombre - тёмный, лат.humus - гумус и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы гумультов (см.), имеющих тёмный второй горизонт в пределах 1 м от поверхности.

2318. СО́МБРИОРТО́КС //sombriorthox //sombriorthox //Sombriorthox (от франц.sombre - тёмный, греч.orthos - настоящий и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортоксов (см.), имеющих второй темноокрашенный горизонт в профиле.

2319. СО́МБРИТРОПЕ́ПТ //sombritropept //sombritropept //Sombritropept (от франц.sombre - тёмный, греч. tropicos - круг поворота и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы тропептов (см.), характеризующихся тёмной окраской благодаря высокой гумусированности, часто имеющих второй гумусовый горизонт, формирующихся во влажных прохладных горных районах.

2320. СО́МБРИУСТО́КС //sombriustox //sombriustox //Sombriustox (от франц. sombre - тёмный, лат. ustus - обожженный и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США,1960-70) для большой группы устоксов (см.), имеющих второй темноокрашенный горизонт в профиле.

2321. СОР - см. Шор.

2322. СПО́ДОСО́ЛЬ //spodosol //spodosol //Spodosol (от греч. spodos - древесная зола и лат. solum - почва) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для порядка минеральных почв, имеющих в профиле сподовый[x)] горизонт, либо слоистый горизонт, цементированный железом и лежащий над фраджипэном[x)] и отвечающий всем требованиям к сподовому горизонту за исключением мощности. В пределах этого порядка почв выделяются 4 подпорядка: 1) акводы, 2) ферроды, 3) гумоды и 4) ортоды (см.).

2323. СРЕДИЗЕ́МНОМО́РСКАЯ ПО́ЧВА //Mediterranean soil //sol méditerranéen //Mediterranboden - термин Г.Штремме (1937), введенный для красных, желтых и бурых почв, формирующихся в условиях

субтропического средиземноморского климата на карбонатных или бескарбонатных породах, имеющих профиль ABC, в котором горизонт B имеет явные признаки иллювиирования глины в виде глинистых корочек и натеков на гранях структурных отдельностей, выщелоченные от карбонатов горизонты A и большую часть B, насыщенность основаниями горизонта B более 35%. Поскольку под этим термином понимаются разные почвы, то в настоящее время он употребляется всё меньше в мировой литературе, а объединявшиеся им почвы разделены на несколько самостоятельных групп под разными названиями в разных системах классификации. Согласно Кубиене (1953) термин объединяет три разных типа: терра-фуска, терра-росса и терра-кальци.

2324. СРЕ́ДНЕЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА //moderately saline soil, medium saline soil, moderate saliniferous soil, medium saliniferous soil //sol saliniférе moderée, sol saline moderée //mässig-salzhaltig Boden - термин русск.шк. для почв, содержащих в слое 0-50 см или в слое максимального соленакопления 0,3-0,6% (при хлоридном и сульфатно-хлоридном), 0,4-1,0% (при сульфатном и хлоридно-сульфатном) и 0,3-0,5% (при содовом и смешанном засолении) легкорастворимых солей.

2325. СРЕ́ДНЕМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //medium deep soil //sol semi-profond //halbtiefer Boden - общеупотребительный термин для почв умеренной мощности, относящийся к мощности всего профиля или к мощности гумусовых горизонтов, имеющий различные количественные критерии по глубине для разных типов почв.

2326. СРЕ́ДНЕ-ОГЛЕ́ЕННАЯ ПО́ЧВА //moderately gleyed soil //sol gleyifié modérée //mässig vergleyter Boden- устаревший термин русск.шк. См. Глееватая п.

2327. СРЕ́ДНЕОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //moderately podzolized soil //sol modérément podzolisé //mässig podsolierter Boden - 1) термин русск.шк. для почв, имеющих среднюю степень оподзоленности в верхней части профиля; в этом широком понимании термин включает в себя как среднеподзолистые почвы, имеющие достаточно четкие критерии выделения степени оподзоленности в каждом из подтипов, так и средне оподзоленные почвы других типов, например среднеоподзоленные черноземы, причем в последнем случае четких критериев выделения степени оподзоленности не существует; 2) общеупотребительный термин для почв разных типов (черноземов, краснозёмов, бурозёмов и т.д.), имеющих морфоло-

гические или аналитические признаки средней оподзоленности; однако, четких критериев выделения этой степени оподзоленности нет.

2328. СРЕ́ДНЕПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //moderately podzolic soil //sol podzolique modérée //Mässigpodsolboden, mässig podsoliger Boden - 1) термин русск.шк. для вида подзолистых почв, имеющих сплошной подзолистый горизонт A_2 плитчатой или плитчато-комковатой структуры; 2) термин русск.шк. для вида подзолистых почв, имеющих сплошной подзолистый горизонт A_2 мощностью менее 30 см при умеренной дифференциации профиля по глине и R_2O_3.

2329. СРЕ́ДНЕПОДЗО́ЛИСТАЯ КА́РЛИКОВАЯ ПО́ЧВА //dwarf moderately podzolic soil //sol podzolique modérée nain //Mässigpodsolzwergboden, mässig podsoliger Zwergboden - термин русск.шк. для вида подзолистых почв тёплой западно-европейской фации, характеризующихся малой мощностью генетических горизонтов и профиля в целом и имеющих сплошной подзолистый горизонт A_2 плитчатой или плитчато-комковатой структуры.

2330. СРЕ́ДНЕ-СМЫ́ТАЯ ПО́ЧВА //moderately eroded soil //sol érodé modérée //mässig erodierter Boden - термин для почв, у которых полностью или частично уничтожен поверхностной эрозией горизонт A_1 и начинает смываться горизонт B; разные авторы для разных типов почв дают различные критерии степени смытости.

2331. СРЕ́ДНЕСОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //moderate solonetzic soil, medium solonetzic soil //sol solonetzoïde modérée //mässig-solonetzartiger Boden - термин русск.шк. для почв степей и полупустынь, имеющих в профиле подгоризонт с уплотнением, призмовидной структурой и содержанием обменного натрия 10-15% от емкости поглощения.

2332. СРЕ́ДНЕСОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА - см. Среднезасоленная почва.

2333. СТА́ГНОГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //stagnogley soil //sol à stagnogley //stagnogley Boden - термин, распространенный в Зап.Европе для почв, имеющих избыточное поверхностное увлажнение и поверхностное оглеение в результате обилия атмосферных осадков в гумидном климате.

2334. СТА́ГНОГЛЕ́Й //stagnogley //stagnogley //Stagnogley - термин Кубиены для почв, сильно оглеенных с поверхности вследствие избыточного атмосферного поверхностного переувлажнения.

2335. СТА́РООРОША́ЕМАЯ ОСТА́ТОЧНО-СЕРОЗЁМНАЯ ПО́ЧВА //residually sierozemic long irrigated soil //sol sierozemique residuel de longue irrigation //restsierosemischer Langbewässerungsboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа орошаемых остаточно-серозёмных почв древнего орошения, характеризующихся мощным агроирригационным горизонтом серого цвета с содержанием гумуса 1-2% и подгумусовым горизонтом без карбонатных новообразований и гипса.

2336. СТА́РООРОША́ЕМАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //long-irrigated desert soil //sol désertique de longue irrigation //Langbewässerungswüstenboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа орошаемых пустынных почв, характеризующихся наличием мощного (более 30 см) агроирригационного горизонта.

2337. СТЕПНА́Я ПО́ЧВА //steppe soil, heath soil //sol de bruyère,sol de steppe //Steppenboden, Heideboden - общеупотребительный термин, не имеющий строгого определения, применяемый для группы разнообразных почв, формирующихся под степной травянистой растительностью в автоморфных условиях.

2338. СТЕПНА́Я БУ́РАЯ ПО́ЧВА //steppe brown soil //sol brun de steppe //brauner Steppenboden - термин немецкой школы для реликтовых бурокрашенных почв степной зоны.

2339. СТЕПНА́Я ОСВЕТЛЁННАЯ ПО́ЧВА //steppe bleached earth, steppe bleached soil //sol salin lessivé de steppe //ausgelaugter Steppenalkaliboden, ausgelaugter Alkaliboden - устаревший термин западно-европейских школ. См. Солодь.

2340. СТЕПНО́Й ВО́ЙЛОК - см. Войлок степной.

2341. СУБАЛЬПИ́ЙСКАЯ ГО́РНО-ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА //mountain-meadow subalpine soil //sol de pré de montagne subalpique //subalpiner Gebirgsweideboden - см. Горно-луговая субальпийская п.

2342. СУБАРКТИ́ЧЕСКАЯ БУ́РАЯ ПО́ЧВА - см. Бурая субарктическая п.

2343. СУБАРКТИ́ЧЕСКАЯ ДЕРНО́ВАЯ ПО́ЧВА - см. Дерновая субарктическая почва.

2344. СУ́БАЭРА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //subaerial soil //sol subaerien //subaerischer Boden (от лат. sub - под и aer - воздух) - термин для почв, формирующихся под влиянием растительного покрова в условиях атмосферного увлажнения. Син.: сухопутная п., растительноназемная п.

2345. СУБАЭРА́ЛЬНАЯ КИ́СЛАЯ УЛЬМА́ТНО-ФУЛЬВА́ТНАЯ ПО́ЧВА //ulmic-fulvic acid subaerial soil //sol subaerien acide ulmique-fulvique // ulmo-fulvischer saurer subaerischer Boden - термин М.А.Глазовской (1972) для геохимической ассоциации почв, имеющих кислую реакцию по всему профилю, ульматно-фульватный ненасыщенный гумус и не имеющих грунтового увлажнения.

2346. СУБАЭРА́ЛЬНАЯ КИСЛО́ТНО-ЩЕЛОЧНА́Я ГУМА́ТНО-ФУЛЬВА́ТНАЯ ПО́ЧВА // humic-fulvic acid-alkaline subaerial soil //sol subaerien acide-alcaline humique-fulvique //humo-fulvischer saure-alkalischer subaerischer Boden - термин М.А.Глазовской (1972) для геохимической ассоциации почв, имеющих кислую реакцию в верхней и слабощелочную - в нижней части профиля, гуматно-фульватный ненасыщенный гумус и не имеющих грунтового увлажнения.

2347. СУБАЭРА́ЛЬНАЯ НЕЙТРА́ЛЬНО-ЩЕЛОЧНА́Я ГУМА́ТНАЯ ПО́ЧВА //humic neutral-alkaline subaerial soil //sol subaerien neutre-alcalin humique //humischer neutrale-alkalischer subaerischer Boden - термин М.А.Глазовской (1972) для геохимической ассоциации почв, имеющих близкую к нейтральной реакцию в верхней части профиля и щелочную - в нижней, гуматный насыщенный гумус и не имеющих грунтового увлажнения.

2348. СУБАЭРА́ЛЬНАЯ ЩЕЛОЧНА́Я ФУЛЬВА́ТНО-КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //fulvic-calcaric alkaline subaerial soil //sol subaerien alcalin fulvique calcaire //kalkischer fulvischer alkalischer subaerischer Boden - термин М.А.Глазовской (1972) для геохимической ассоциации почв, имеющих щелочную реакцию по всему профилю, фульватный насыщенный (может быть с натрием) гумус и не имеющих грунтового увлажнения.

2349. СУ́БГИДРА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //subhydric soil //sol subhydrien //subhydrischer Boden - термин для почв, формирующихся при постоянном или периодическом затоплении, особенно распространенный в немецкой школе. Син.: подводная п.

2350. СУБТРОПИ́ЧЕСКАЯ ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //podzolic subtropical soil //sol podzolique subtropical //subtropischer Podsolboden - устаревший термин С.А.Захарова (М.Н.Сабашвили, В.А.Ковды) для подзолисто-желтозёмных почв (см.) субтропических районов СССР.

2351. СУБТРОПИ́ЧЕСКАЯ ПОДЗО́ЛИСТО-БОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА //podzolic-swampy subtropical soil //sol podzolique marecageux subtropicaux //

subtropischer Podsolmoorboden - термин С.А.Захарова для подзолисто-желтозёмно-глеевых почв (см.).

2352. СУБТРОПИ́ЧЕСКАЯ ПОДЗО́ЛИСТО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //podzolic-gley subtropical soil //sol podzolique subtropicaux à gley //subtropischer Podsolgleyboden - термин С.А.Захарова, М.Н.Сабашвили, В.А.Ковды для подзолисто-желтозёмно-глеевых почв (см.).

2353. СУБТРОПИ́ЧЕСКАЯ ЧЁРНАЯ ГЛИ́НА //subtropical black clay //argile noire subtropicale //subtropischer Schwarzton - устаревший термин для темных слитых трещиноватых глинистых почв типа вертисолей, употреблявшийся в Африке.

2354. СУ́ЛЬФАКВЕ́НТ //sulfaquent //sulfaquent //Sulfaquent (от лат. sulfur - сера, лат.aqua - вода и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквентов (см.), которые содержат сульфидный материал в пределах 50 см от поверхности и которые интенсивно подкисляются при аэрации.

2355. СУ́ЛЬФАКВЕ́ПТ //sulfaquept //sulfaquept //Sulfaquept (от лат. sulfur - сера, лат.aqua - вода и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквептов (см.), включающих кислые сульфатные почвы (cat clays), которые когда-то были дренированы и окислены, характеризующиеся высокой кислотностью и токсичностью, тёмносерой окраской с соломенножелтыми пятнами сульфата железа (ярозита) в пределах 50 см от поверхности; обычно встречаются на дренированных прибрежных маршах близ устьев рек,несущих бескарбонатный аллювий.

2356. СУ́ЛЬФИХЕМИ́СТ //sulfihemist //sulfihemist //Sulfihemist (от лат.sulfur - сера, греч.hemi - половина и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы хемистов (см.), имеющих горизонт аккумуляции сульфидов в пределах 1 м от поверхности; это потенциально кислые торфяные почвы пребрежных маршей приустьевых районов.

2357. СУ́ЛЬФОХЕМИ́СТ //sulfohemist //sulfohemist //Sulfohemist (от лат.sulfur - сера, греч.hemi - половина и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы хемистов (см.), имеющих в профиле горизонт аккумуляции сульфатов с верхней границей в пределах 50 см от поверхности; это очень кислые торфянистые "кошачьи глины",

содержащие кислые сульфаты в результате дренирования и окисления сульфидов; имеют черную окраску низинного торфа с соломенножелтыми пятнами ярозита (сульфата железа); распространены в дренированных приморских маршах близ устьев рек.

2358. СУ́ПЕРАКВА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //superaquatic soil, superaqualic soil //sol superaquatique //superaquatischer Boden (от лат.supra - выше и aqua - вода) - общеупотребительный термин для почв грунтового увлажнения, нижняя часть которых избыточно увлажняется грунтовыми водами.

2359. СУ́ПЕРАКВА́ЛЬНАЯ КИ́СЛАЯ УЛЬМА́ТНО-ФУЛЬВА́ТНАЯ ПО́ЧВА //ulmic-fulvic acid superaquatic soil //sol superaquatique acide ulmique-fulvique //ulmo-fulvischer saurer superaquatischer Boden - термин М.А.Глазовской (1972) для геохимической ассоциации почв, имеющих кислую реакцию по всему профилю, ульматно-фульватный ненасыщенный гумус и грунтовое переувлажнение нижней части профиля.

2360. СУ́ПЕРАКВА́ЛЬНАЯ КИСЛО́ТНО-ЩЕЛО́ЧНА́Я ПО́ЧВА //acid-alkaline superaquatic soil //sol superaquatique acide-alcaline//saurer-alkalischer superaquatischer Boden - термин М.А.Глазовской (1972) для геохимической ассоциации почв, имеющих кислую реакцию в верхней части профиля и слабощелочную в нижней и грунтовое переувлажнение нижней части профиля.

2361. СУ́ПЕРАКВА́ЛЬНАЯ СЛА́БОЩЕЛО́ЧНА́Я ПО́ЧВА //slightly alkaline superaquatic soil //sol superaquatique peu alcaline//schwach alkalischer superaquatischer Boden - термин М.А.Глазовской (1972) для геохимической ассоциации почв, имеющих близкую к нейтральной реакцию в верхней части профиля и щелочную в нижней и грунтовое переувлажнение нижней части профиля.

2362. СУ́ПЕРАКВА́ЛЬНАЯ ЩЕЛО́ЧНА́Я ПО́ЧВА //alkaline superaquatic soil //sol superaquatique alcaline//alkalischer superaquatischer Boden - термин М.А.Глазовской (1972) для геохимической ассоциации почв, имеющих щелочную реакцию по всему профилю и грунтовое переувлажнение нижней части профиля.

2363. СУ́ХОЕ О́ЗЕРО //dry lake //lac sec, lac temporaire //Trockensee - устаревший термин австралийской школы для такыров. Син.: такыр.

2364. СУ́ХОЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //dry forest soil //sol sec forestier //Trockenwaldboden - устаревший термин, иногда встречающийся в

литературе для почв сухих кустарниковых лесов средиземноморских районов. Син.: Коричневая п.

2365. СУХОПУ́ТНАЯ ПО́ЧВА // terrestrial soil // sol terrestre // Landboden, terrestrischer Boden - термин для почв, формирующихся под растительным покровом в условиях атмосферного увлажнения без затопления. Син.: Растительноназемная п., Субаэральная п.

2366. СУ́ХОТОРФЯ́НИСТАЯ ПО́ЧВА // dry-peat soil // sol de tourbe sec // Trockentorfboden - термин для хорошо дренированных, преимущественно высокогорных почв под травянистой или древесной растительностью, имеющих с поверхности слой слабо разложившегося торфа.

2367. СФА́ГНОФИБРИ́СТ // sphagnofibrist // sphagnofibrist // Sphagnofibrist (от лат. sphagnum - белый мох, лат. fibra - ткань и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы фибристов (см.), имеющих более трёх четвертей сфагнового материала в составе торфа; в пределах этой большой группы выделяются 10 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) флюваквентные (fluvaquentic), 3) криогенные (cryic), 4) переходные (hemic), 5) водонасыщенные (hydric), 6) озёрные (limnic), 7) скальные (lithic), 8) мерзлотные (pergelic), 9) перегнойные (sapric) и 10) землистые (terric) сфагнофибристы.

2368. ТАЁЖНАЯ ПО́ЧВА // taiga soil // sol de taiga // Taigaboden (от тюркск.) - устаревший термин, не имевший строгого определения для группы почв таёжных областей Сибири и Сев. Америки, отличающихся отсутствием или слабой выраженностью оподзоленности.

2369. ТАЁЖНОМЕРЗЛО́ТНАЯ ОЖЕЛЕЗНЁННАЯ ПО́ЧВА - см. Мерзлотно-таёжная ожелезненная п.

2370. ТАЁЖНЫЙ ПОДБУ́Р - см. Подбур таёжный.

2371. ТАКЫ́Р // takyr, takyr-soil // takyr // Takyr, Takyrboden (тюрк. - гладкий, ровный) - термин для почв плоских понижений в пустынных районах, покрытых глинистыми отложениями и иногда заливаемых паводковыми или ливневыми водами; формирующаяся здесь почва имеет разбитую трещинами на полигональные отдельности поверхность, маломощный (2-3 см) корковый и слоевато-чешуйчатый подкорковый горизонты, обычно солеиосные, в то время как нижележащая толща не засолена и не дифференцирова-

на; син.: Кавир, Плайя, сухое озеро, щелочное дно; в русск. шк. (1967) такыры выделяются в самостоятельный тип почв пустынь.

2372. ТАКЫР ЛИШАЙНИКОВЫЙ //lichen takyr //takyr de lichen //Flechtentakyr - см. Такыр опустыненный.

2373. ТАКЫР ОБЫЧНЫЙ //ordinary takyr //takyr ordinaire //gewöhnlicher Takyr - термин русск.шк. (1967) для рода такыров с плотной разбитои на правильные многоугольники коркой, слоевато-пластинчатым слабозасоленным подкорковым горизонтом, сменяемым комковатым горизонтом с выцветами солей.

2374. ТАКЫР ОПЕСЧАНЕННЫЙ //sand-covered takyr //takyr sableux superficiel //sandiger Takyr - термин русск.шк. (1967) для рода такыров, формирующихся после нанесения песка на влажную поверхность такыра и закрепления на ней высшей растительности.

2375. ТАКЫР ОПУСТЫНЕННЫЙ //desertified takyr //takyr désertifié //verwüstener Takyr - термин русск.шк. (1967) для подтипа такыров, имеющих с поверхности черные слоевища лишайников, что придаёт поверхности такыров черный цвет, характеризующихся слабо уплотненной коркой, значительным засолением.

2376. ТАКЫР СОЛОНЦЕВАТЫЙ //solonetzic takyr //takyr solonetzoïde //solonetzartiger Takyr - термин русск.шк. (1967) для рода такыров, имеющих солонцеватость в подкорковом слое (уплотнение, глянцевитость, содержание обменного натрия более 10% от ёмкости поглощения).

2377. ТАКЫР СОЛОНЦЕВАТЫЙ СЛИТОЙ //compact solonetzic takyr //takyr solonetzoïde compact //kompakter solonetzartiger Takyr - термин русск.шк. (1967) для рода такыров, имеющих очень крупные выпуклые поверхностные полигоны с глубокими (10-20 см) трещинами между ними, имеющих слитую грубую мелкопористую корку, плохо отделяющуюся от нижележащих горизонтов, крупную призмовидно-глыбистую структуру в подкорковом горизонте, не содержащих легкорастворимых солей до 0,5-1 м.

2378. ТАКЫР СОЛОНЧАКОВЫЙ //saliniferous takyr //takyr salifère //salzhaltig Takyr - термин русск.шк. (1967) для рода такыров, в которых непосредственно под коркой выявляется сильное засоление (более 2% солей).

2379. ТАКЫР СТАРОЗА́ЛЕЖНЫЙ //takyr of brise, brise takyr //takyr de friche //Brachentakyr - термин русск.шк. (1967) для рода такыров, формирующихся на старых залежах после прекращения орошения и имеющих слитную малопористую корку, убывающее содержание карбонатов по профилю.

2380. ТАКЫР ТИПИ́ЧНЫЙ //typic takyr //takyr typique //typischer Takyr - термин русск.шк. (1967) для подтипа такыров с полигонально-трещиноватой поверхностью и плотной ячеисто-пористой коркой с палево-серой окраской, блестящей на солнце, имеющих на поверхности слоевища водорослей.

2381. ТАКЫР ХА́КОВЫЙ - см. Такыр солонцеватый слитой.

2382. ТАКЫ́РНАЯ ПО́ЧВА //takyr soil, takyric soil, takyr //sol takyrique, takyr //Takyrboden, Takyr - 1) термин для почв такыров, имеющих поверхностный маломощный (2-3 см) корковый горизонт, разбитый трещинами на полигональные отдельности, и слоевато-чешуйчатый подкорковый горизонт, содержащие легкорастворимые соли; нижележащая толща почвы не засолена и не дифференцирована; син.: такыр; 2) см. Такыровидная пустынная п.

2383. ТАКЫРОВИ́ДНАЯ ПО́ЧВА //takyr-like soil //sol takyriforme //takyrartiger Boden - 1) общеупотребительный термин для почв, имеющих поверхностный корковый горизонт мощностью 1-3 см, разбитый трещинами на полигональные отдельности; 2) см. Такыровидная пустынная п.

2384. ТАКЫРОВИ́ДНАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ПО́ЧВА //takyr-like desert soil //sol takyriforme désertique //takyrartiger Wüstenboden - термин русск.шк. (1967) для типа молодых почв пустынь с неполноразвитым профилем, различно засоленных, формирующихся на слоистых глинистых отложениях аллювиальных равнин с глубокими (более 5 м) грунтовыми водами, являющихся первой стадией развития серо-бурых пустынных почв; они характеризуются наличием рыхлой растрескивающейся корки, отсутствием перемещения карбонатов, низкой гумусностью, малой емкостью поглощения, узким отношением C:N, отсутствием уплотненного горизонта B, сильной карбонатностью во всём профиле; син.: такырная п., такыровидная п., серозём примитивный.

2385. ТАКЫРОВИ́ДНАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ОБЫ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //ordinary takyr-like desert soil //sol takyriforme désertique ordinaire //gewöhnlicher takyrartiger Wüstenboden - термин русск.шк. (1967)

для рода такыровидных пустынных почв нетяжелого механического состава, средне- и слабозасолённых, без следов повышенной (остаточной) гумусности или солонцеватости.

2386. ТАКЫРОВИ́ДНАЯ ПУСТЫ́ННАЯ КО́РКОВО-СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //crust-solonetzic takyr-like desert soil //sol takyriforme désertique solonetzoïde en croûte superficiel //krustsolonetzartiger takyrartiger Wüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода такыровидных пустынных почв, характеризующихся плотной сплошной коркой с такыровидной трещиноватостью, наличием уплотненного грубокомковатого горизонта на глубине 10-15 см с содержанием обменного натрия более 5% от ёмкости поглощения.

2387. ТАКЫРОВИ́ДНАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ОСТА́ТОЧНО-ГУ́МУСНАЯ ПО́ЧВА //residually humusified takyr-like desert soil //sol takyriforme desertique humifère residuel //resthumushaltig takyrartiger Wüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода такыровидных пустынных почв областей сравнительно недавних пойменных разливов под пустынной с элементами тугая растительностью; характеризующихся тёмной серой окраской, наличием хрупкой корочки на поверхности, содержанием гумуса в темном горизонте 1,5-2%, наличием следов прошлого оглеения в слоистой глинисто-песчанистой породе с глубины 20-40 см; грунтовые воды сейчас на глубине более 5 м; луговой процесс здесь прекратился и происходит опустынивание почвы; син.: такыровидная пустынная остаточно-луговая п., серозём тугайный, луговая темноцветная п.

2388. ТАКЫРОВИ́ДНАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ОСТА́ТОЧНО-ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА - см. Такыровидная пустынная остаточно-гумусовая п.

2389. ТАКЫРОВИ́ДНАЯ ПУСТЫ́ННАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //solonetzic takyr-like desert soil //sol takyriforme désertique solonetzoïde //solonetzartiger takyrartiger Wüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода такыровидных пустынных почв, характеризующихся плотной сплошной коркой с такыровидной трещиноватостью, наличием уплотненного грубокомковатого горизонта на глубине 30-40 см с содержанием обменного натрия более 5% от ёмкости поглощения.

2390. ТАКЫРОВИ́ДНАЯ ПУСТЫ́ННАЯ СОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //saliniferous takyr-like desert soil //sol takyriforme désertique salifère //salzhaltig takyrartiger Wüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода такыровидных пустынных почв, характеризующихся высоким засолением в верхней части профиля.

2391. ТАКЫРОВИ́ДНАЯ ПУСТЫ́ННАЯ СТАРОЗА́ЛЕЖНАЯ ПО́ЧВА //takyre-like desert soil of brise //sol takyriforme désertique de friche // takyrartiger Brachewüstenboden - термин русск.шк. (1967) для рода такыровидных пустынных почв с остаточными признаками орошения на староорошаемых землях.

2392. ТАКЫРОВИ́ДНАЯ ПУСТЫ́ННАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typic takyr-like desert soil //sol takyriforme désertique typique // typischer takyrartiger Wüstenboden - термин русск.шк. (1967) для единственного подтипа такыровидных пустынных почв, имеющих все основные признаки данного типа.

2393. ТЁМНАЯ ГЛИ́НА //dark clay //argile foncé //dunkler Ton - устаревший термин для тёмных слитых трещиноватых глинистых почв; см. Вертисоль.

2394. ТЁМНАЯ СЛИТА́Я ПО́ЧВА //dark compacted soil //sol foncé compact //kompakter dunkel Boden - устаревший термин для темных слитых трещиноватых глинистых почв; см. Вертисоль.

2395. ТЁМНО-БУ́РАЯ ПО́ЧВА //dark brown soil //sol brun foncé //dunkelbraune Boden - устаревший термин А.Н.Розанова для горно-лесных черно-бурых почв (см.) ореховых лесов Киргизии.

2396. ТЁМНО-БУ́РАЯ ГО́РНО-ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //dark brown mountain forest soil //sol brun foncé forestier de montagne //dunkelbrauner Gebirgswaldboden - термин С.В.Зонна для кислых неоподзоленных многогумусовых почв верхнего пояса горных хвойных лесов; син.: Темно-бурая кислая горно-лесная п.; Темно-бурая неоподзоленная горно-лесная п.

2397. ТЁМНО-БУ́РАЯ КИ́СЛАЯ ГО́РНО-ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //acid dark brown mountain forest soil //sol brun foncé acide forestier de montagne //saurer dunkelbrauner Gebirgswaldboden - термин М.А.Глазовской (1972) для кислых неоподзоленных многогумусовых почв верхнего пояса горных хвойных лесов; син.: Темно-бурая неоподзоленная горно-лесная п., Темно-бурая горно-лесная п.

2398. ТЁМНО-БУ́РАЯ НЕОПОДЗО́ЛЕННАЯ ГО́РНО-ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //non-podzolized dark brown mountain-forest soil //sol brun foncé non-podzolisé forestier de montagne //nichtpodsolierter dunkelbrauner Gebirgswaldboden - термин Е.Н.Рудневой (1960) для кислых неоподзоленных многогумусовых почв верхнего пояса горных хвойных лесов; син.: Темно-бурая кислая горно-лесная п., Темно-бурая горно-лесная п.

2399. ТЁМНОКАШТА́НОВАЯ ПО́ЧВА //dark chestnut soil //sol châtain foncé //dunkelkastanienfarbiger Boden - 1) термин русск.шк. для подтипа каштановых почв, содержащих в верхнем 15-см слое 3,5-4,5% гумуса в глинистых и суглинистых разновидностях и 2,5-3,0% - в супесчаных; 2) термин русск.шк. (1967) для подтипа каштановых почв умеренной восточно-европейской и казахстанской фации, имеющих указанную выше гумусированность.

2400. ТЁМНОКАШТА́НОВАЯ ГЛУБИ́ННО-ХОЛО́ДНАЯ МУЧНИ́СТОКАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //meal-carbonated deep-cold dark chestnut soil //sol châtain foncé calcaire en gruau èn froid profond //tieferkalt mehlkalkischer dunkelkastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа каштановых почв глубинно-холодной восточносибирской фации, характеризующихся малой мощностью профиля ($A+B_1$ до 25 см), высокой для каштановых почв гумусированностью (3,5-4,5% в горизонте A_1), мучнистой формой карбонатных выделений и отсутствием выделений гипса и солей.

2401. ТЁМНОКАШТА́НОВАЯ ТЁПЛАЯ МИЦЕЛЯ́РНО-КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //carbonate-mycelial warm dark chestnut soil //sol châtain foncé chaude calcaire de mycelium //warm Myzel-Kalk dunkelkastanienfarbiger Boden - термин русск.шк. (1967) для подтипа каштановых почв тёплой южно-европейской фации, характеризующихся мощностью горизонтов $A+B_1$ 50-60 см, содержанием гумуса 3,5-4,5% в горизонте A_1, мицеллярной формой карбонатных выделений в верхней части карбонатного горизонта и белоглазкой в нижней, вскипанием с глубины 50-60 см.

2402. ТЁМНО-КРА́СНАЯ ЛАТЕРИ́ТНАЯ ПО́ЧВА //dark red lateritic soil//sol lateritique rouge foncé //dunkelrotfarbiger Lateritboden - см. Тёмно-красная ферраллитная п.

2403. ТЁМНО-КРА́СНАЯ ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ ПО́ЧВА //dark red ferrallitic soil //sol ferrallitique rouge foncé //dunkelrotfarbiger Ferrallitboden - термин для ферраллитных почв влажнотропических лесов, формирующихся на богатых ферримагнезиальными минералами основных породах, имеющих темную красную окраску и высокую гумусированность.

2404. ТЁМНОСЕ́РАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //calcareous dark gray soil //sol gris foncé calcaire //kalkhaltiger Dunkelgrauboden - термин канадской школы (1968) для темносерых почв (см.); в профиле которых вскипание от карбонатов отмечается в горизонте B

непосредственно под горизонтом А; признаки деградации в горизонте А этих почв ослаблены.

2405. ТЁМНОСЕ́РАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ОГЛЕ́ЕННАЯ ПО́ЧВА //gleyed calcareous dark gray soil //sol gris foncé calcaire gleyifié //vergleyter kalkhaltiger Dunkelgrauboden - термин канадской школы (1968) для модификации подгруппы тёмносерых карбонатных почв (см.), в которых отмечены признаки слабого оглеения.

2406. ТЁМНОСЕ́РАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ОКАРБОНА́ЧЕННАЯ ПО́ЧВА //carbonated calcareous dark gray soil //sol gris foncé calcaire calcique// kalkischer kalkhaltiger Dunkelgrauboden - термин канадской школы (1968) для модификации подгруппы темносерых карбонатных почв (см.), вскипающих с поверхности вследствие перепахивания, перерытости или др.причин.

2407. ТЁМНОСЕ́РАЯ ПО́ЧВА //dark gray soil //sol gris foncé //Dunkelgrauboden - 1) термин канадской школы (1968) для большой группы темноокрашенных почв, включенных в порядок черноземных почв (см.) и характерных для лугово-лесных ассоциаций; (ранее эти почвы в Канаде называли черными деградированными); они характеризуются черноземным горизонтом A_1, но с признаками деградации, в целинном состоянии обычно имеют слой лесной подстилки A_0, в горизонте A_1 обнаруживают наличие белёсой присыпки в виде пятен или жилок; горизонт А обычно разделяется на два подгоризонта, из которых нижний является элювиальным, но его мощность не превышает 6 см. 2) см. Темно-серая лесная п.

2408. ТЁМНО-СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //dark gray forest soil //sol gris foncé forestier //dunkelgrauer Waldboden - термин русск.шк. для подтипа серых лесных почв, в профиле которых оподзоленность выражена слабо, а гумусированность высокая; эти почвы являются переходными к чернозёмам, от которых отличаются меньшей гумусированностью и меньшей мощностью гумусового профиля, четкой ореховатой структурой.

2409. ТЁМНО-СЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА - см. Серая лесная глеевая многогумусная п.

2410. ТЁМНОСЕ́РАЯ ЛЕСНА́Я ОСТА́ТОЧНО-ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА //residually meadow dark gray forest soil //sol gris foncé de forêt à pré residuel //dunkelgrauer wiesenresiduelle Waldboden - термин Л.П. Рубцовой (1970) для серых лесных почв микропонижений Владимир-

ского ополья, имеющих второй гумусовый горизонт реликтового лугового (по мнению автора) происхождения. Син.: ополица (А.Н.Тюрюканов, 1956).

2411. ТЁМНО-СЕ́РАЯ ЛЕ́СО-СТЕПНА́Я ПО́ЧВА //dark gray forest-steppe soil //sol gris foncé de steppe à forêt //dunkelgrauer Waldsteppenboden - см. Тёмно-серая лесная п.

2412. ТЁМНОСЕ́РАЯ ОСОЛОДЕ́ЛАЯ ПО́ЧВА //solodic dark gray soil //sol gris foncé solodique //solodischer Dunkelgrauboden - термин канадской школы (1968) для подгруппы тёмносерых почв (см.), имеющих в профиле признаки осолодения.

2413. ТЁМНО-СЕ́РАЯ ОСОЛОДЕ́ЛАЯ ОГЛЕ́ЕННАЯ ПО́ЧВА //gleyed solodic dark gray soil //sol gris foncé solodique gleyifié //vergleyter solodischer Dunkelgrauboden - термин канадской школы (1968) для модификации подгруппы тёмносерых осолоделых почв (см.), в профиле которых отмечаются признаки слабого оглеения.

2414. ТЁМНО-СЕ́РАЯ РЕ́ГОВАЯ ПО́ЧВА //rego dark gray soil //sol gris foncé regique //regischer Dunkelgrauboden (от гр.rhegos - покров) - термин канадской школы (1968) для подгруппы тёмносерых почв (см.), в которых горизонты А подстилаются непосредственно горизонтом С, обычно умеренно или сильно карбонатным, причем признаки деградации в почве обычно выражены слабо; при длительном пользовании их очень трудно отличить от чёрных реговых почв.

2415. ТЁМНО-СЕ́РАЯ РЕ́ГОВАЯ ОГЛЕ́ЕННАЯ ПО́ЧВА //gleyed rego dark gray soil //sol gris foncé regique gleyifié //vergleyter regischer Dunkelgrauboden - термин канадской школы (1968) для модификации подгруппы тёмносерых реговых почв (см.), в профиле которых отмечаются признаки слабого оглеения.

2416. ТЁМНО-СЕ́РАЯ РЕ́ГОВАЯ ОКАРБОНА́ЧЕННАЯ ПО́ЧВА //carbonated rego dark gray soil //sol gris foncé regique calcique //kalkischer regischer Dunkelgrauboden - термин канадской школы (1968) для модификации подгруппы тёмносерых реговых почв (см.), вскипающих от карбонатов с поверхности (под подстилкой) вследствие перерытости или др.причин.

2417. ТЁМНО-СЕ́РАЯ СКА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //lithic dark gray soil //sol gris foncé lithique //lithischer Dunkelgrauboden - термин канадской школы (1968) для модификации любой из подгрупп группы тёмносерых почв (см.), в профиле которых плотная порода лежит

на глубине от 10 до 50 см от поверхности.

2418. ТЁМНО-СЕ́РАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //solonetzic dark gray soil // sol gris foncé solonetzique //solonetzartiger Dunkelgrauboden - термин канадской школы (1968) для подгруппы темносерых почв (см.), имеющих признаки солонцеватости в профиле.

2419. ТЁМНО-СЕ́РАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ОГЛЕ́ЕННАЯ ПО́ЧВА //gleyed solonetzic dark gray soil //sol gris foncé solonetzique gleyifié //vergleyter solonetzartiger Dunkelgrauboden - термин канадской школы (1968) для модификации подгруппы темносерых солонцеватых почв (см.), в профиле которых есть признаки слабого оглеения.

2420. ТЁМНО-СЕ́РАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //orthic dark gray soil //sol gris foncé orthique //orthischer Dunkelgrauboden (от гр. orthos - нормальный, типичный) - термин канадской школы (1968) для подгруппы тёмносерых почв (см.), в которых гумусовый горизонт подстилается бурым бескарбонатным камбиевым[x)] или аргиллювым[x)] горизонтом; осветленный горизонт имеет мощность менее 6 см и залегает в пределах верхних 15 см профиля; структура горизонта В ореховатая до грубозернистой; реакция в горизонте В слабо кислая.

2421. ТЁМНО-СЕ́РАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ОГЛЕ́ЕННАЯ ПО́ЧВА //gleyed orthic dark gray soil //sol gris foncé orthique gleyifié //vergleyter orthischer Dunkelgrauboden - термин канадской школы (1968) для модификации подгруппы тёмносерых типичных почв (см.), имеющих в профиле признаки слабого оглеения.

2422. ТЁМНОЦВЕ́ТНАЯ ПО́ЧВА //fuscous soil, dark-coloured soil //sol foncé //dunkelfarbiger Boden, dunkler Boden - термин Н.М.Сибирцева (1895) для темноокрашенных почв Владимирского ополья, имеющих более темную нижнюю часть гумусового горизонта, впоследствии распространенный М.М.Филатовым на луговые (полуболотные) почвы, формирующиеся под воздействием жестких грунтовых вод, обогащенных кальцием и встречающихся в зонах распространения дерново-подзолистых или серых лесных почв.

2423. ТЁМНОЦВЕ́ТНАЯ ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА - см. Дерново-глеевая почва.

2424. ТЁМНОЦВЕ́ТНАЯ ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //black forest earth //sol noir humifére de forêt //schwarzer Waldhumusboden - термин западноевропеиских школ для сильно гумусированных темноокрашенных почв широколиственных лесов, не имеющий строгого определения.

2425. ТЁМНОЦВЕ́ТНО-БОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА //dark-coloured swamp soil //sol foncé marécageux //dunkler Moorboden - термин для почв с профилем A-G, формирующихся при участии жестких грунтовых вод.

2426. ТЕ́РРА-КА́ЛЬЦИ //terra-calci //terra-calci //Terra-calci (от итал. - известковая земля) - термин Кубиены (1953) для красных и бурых средиземноморских почв на карбонатных породах, имеющих остаточное содержание карбонатов в почвенном профиле.

2427. ТЕ́РРА-РО́ССА //terra-rossa //terra-rossa //Terra-rossa (от итал. - красная земля) - 1) красноцветная обескарбоначенная глина на выходах известняков в средиземноморских субтропиках, подвергшаяся рубефикации за счет почти полной дегидратации железа и образовавшаяся в условиях климата с чертами тропического, более жаркого, чем современный и с контрастными сухим и влажным сезонами (Дюшофур, 1965); 2) любая красная почва на известняках; 3) красноцветная кора выветривания известняков; 4) современная красная почва, формирующаяся в условиях субтропического влажного с сухим сезоном средиземноморского климата на чистых обычно окристаллизованных известняках; почва не вскипает, но может содержать обломки карбонатной породы.

2428. ТЕ́РРА-ФУ́СКА //terra-fusca //terra-fusca //Terra-fisca (от итал. - земля) - термин Кубиены (1953) для бурых суглинков, формирующихся на известняке, доломите, мергеле, гипсе, и испытавших, согласно современным представлениям, обескарбоначивание и накопление гидратированных окислов железа в фазу жаркого и влажного климата, затем криотурбацию с образованием глинистых карманов в фазу ледникового климата и, наконец, эволюцию в бурую кальцеморфную почву с моллем под современным лиственным лесом (Дюшофур, 1965). Син.: бурый карбонатный суглинок, бурая средиземноморская почва.

2429. ТЕРРАСИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //terracified soil //sol en terrasses //Terrassenkulturboden, Weinbergboden - см. Ригосоль.

2430. ТИ́Н СУ́ДА //teen suda //teen suda //Teen Suda - местное название темных слитых трещиноватых глинистых почв типа вертисолей, распространенное в Судане и отражающее их черную окраску.

2431. ТИ́РС //tirs //tirs //Tirs - местное название темных слитых трещиноватых глинистых почв типа вертисолей, распространенное

в странах северо-западной Африки (Алжир, Тунис, Марокко).

2432. ТИ́РС ГИДРОМО́РФНЫЙ //hydromorphic tirs //tirs hydromorphé // hydromorphischer Tirs (от гр.hýdor - вода и morphe - форма) - устаревший термин франц.шк. для темных слитых почв депрессий рельефа. См.: вертисоль поверхностно недренированная или слабодренированная.

2433. ТИ́РС СТЕПНО́Й //steppic tirs // tirs steppique, tirs de steppe/ Steppentirs - устаревший термин франц.шк. для вертисолей дренированных склонов. См.: Вертисоль поверхностно дренированная.

2434. ТОРРЕ́РТ //torrert //torrert //Torrert (от лат.torridus - жаркий и сухой и порядкового корня ert для вертисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка вертисолей (см.), которые обычно сухие и имеют открытые трещины в течение всего года большинство лет; при затоплении трещины могут закрыться на разное время; при распашке трещины остаются только в подпахотных горизонтах; в пределах этого подпорядка выделяется только одна большая группа с тем же названием и тем же определением, а в пределах этой группы выделяются три подгруппы: 1) типичные торрерты (typic), 2) моллевые торрерты (mollic) и 3) палеустоллевые торрерты (paleustollic).

2435. ТО́РРИОРТЕ́НТ //torriorthent //torriorthent //Torriorthent (от лат.torridus - жаркий и сухой, греч.orthos - настоящий и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортентов (см.), которые 1) имеют почвенную температуру теплее, чем криортенты (см.); 2) обычно пересыхают большинство лет во всех частях между 18 и 50 см или выше контакта с плотной породой, если она ближе 50 см. В пределах этой группы выделяется 4 подгруппы: 1) типичные торриортенты (typic), 2) дурипэновые торриортенты (durorthidic), 3) маломощные торриортенты (lithic) и 4) трещиноватые торриортенты (vertic).

2436. ТО́РРИПСАММЕ́НТ //torripsamment //torripsamment //Torripsamment (от лат.torridus - жаркий и сухой, греч.psammos - песок и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы псаментов (см.), которые: 1) имеют почвенную температуру выше, чем криопсаменты (см.); 2) обычно пересыхают большинство лет во всей части почвы между 18 и 50 см или до контакта с плотной породой, ес-

ли он ближе 50 см; 3) имеют в песчаной фракции менее 95% кварца, циркона, турмалина, рутила или других трудно выветриваемых минералов, не освобождающих при выветривании железо или алюминий. В пределах этой группы выделяются 2 подгруппы: 1) типичные торрипсамменты (typic) и 2) маломощные торрипсамменты (lithic).

2437. ТО́РРИФЛЮВЕ́НТ //torrifluvent //torrifluvent //Torrifluvent (от лат. torridus - жаркий и сухой, лат. fluvius - река и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы флювентов (см.), которые: 1) теплее, чем криофлювенты (см.); 2) обычно сухие в большинство лет на глубине от 18 до 50 см во всей почвенной массе. В пределах этой группы выделяются 3 подгруппы: 1) типичные торрифлювенты (typic), 2) дурипэновые торрифлювенты (durorthidic) и 3) трещиноватые торрифлювенты (vertic).

2438. ТОРРО́КС //torrox //torrox //Torrox (от лат. torridus - жаркий и сухой и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка оксисолей (см.), которые: 1) обычно сухие большинство лет во всех частях почвы между $A_{пах}$ или 18 см и 2 м или контактом с породой, если он ближе 2 м; 2) имеют светлый[x)] гумусовый горизонт желтой окраски во всех подгоризонтах.

2439. ТО́РФ //peat, turf, divot //tourbe //Torf (от нем. торф) - органогенная горная порода или почвенный горизонт, образующийся в результате неполного разложения растений в болотах и болотных почвах в условиях сильного увлажнения при недостаточном доступе воздуха.

2440. ТОРФЯ́НАЯ ПО́ЧВА //peat soil, peat bog soil, bog soil// sol tourbeux, sol organique humifére, sol de marais tourbeux// Moorboden, Torfboden, Torfmoorboden - 1) термин в широком понимании для всех болотных и полуболотных почв, имеющих на поверхности слой торфа той или иной мощности; 2) термин в узком, более строгом понимании для болотных почв, имеющих на поверхности слой торфа мощностью более 50 см; син.: торфяник.

2441. ТОРФЯ́НАЯ КИ́СЛАЯ ПО́ЧВА //acid peat soil //sol organique humifié acide //saurer Torfboden - сборный термин для почв верховых и переходных болот, обладающих кислой реакцией среды в торфяном горизонте.

2442. ТОРФЯНА́Я МАЛОМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //shallow peat soil //sol tourbeux mincé //dünner Torfboden, dünner Moorboden - торфяная почва с мощностью торфа от 50 до 100 см. Син.: торфяник маломощный.

2443. ТОРФЯНА́Я МО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //thick peat soil, deep peat soil // sol tourbeux profond //tiefer Moorboden, tiefer Torfboden - торфяная почва с мощностью торфа более 200 см. Син.: торфяник мощный.

2444. ТОРФЯНА́Я СРЕ́ДНЕМО́ЩНАЯ ПО́ЧВА //medium thick peat soil, medium deep peat soil //sol tourbeux d'épaisseur moyen //mittelmächtigkeiter Moorboden, mittelmächtigkeiter Torfboden - торфяная почва с мощностью торфа от 100 до 200 см. Син.: торфяник среднемощный.

2445. ТОРФЯ́НИК //moorland, peat bog //lande, marécage, tourbière, marais tourbeux //Moor, Moorland, Heide, Torfmoor - 1) избыточно увлажненный участок поверхности, имеющий торфяной слой и поросший влаголюбивой торфообразующей растительностью; син. торфяное болото; 2) иногда используемый в почвоведении термин для обозначения болотных почв, имеющих торфяной слой с поверхности; син.: торфяная почва.

2445а. ТОРФЯ́НИК ВЕРХОВО́Й //high moor, peat bog, upland moor //marais haut, fagne, marais tourbeux, tourbiére, tourbiére haute // Hochmoor, Heidemoor - термин для торфяников олиготрофного питания. Син.: болото верховое.

2446. ТОРФЯ́НИК ЛЕСНО́Й //carr //sol marécageux de transition //Übergangsmoorboden - термин для торфяников мезотрофного питания, формирующихся под пологом лесных насаждений и имеющих преимущественно древесный торф в своей основе.

2447. ТОРФЯ́НИК НИЗИ́ННЫЙ //low moor, fen, black bog, lowland bog // tourbière de depression, tourbiere basse, marais de depression //Niedermoor, Niederungsmoor, Flachmoor, organischer Grundwasserboden - термин для торфяников эутрофного питания. Син.: болото низинное.

2448. ТОРФЯ́НИК ПЕРЕХО́ДНЫЙ //transitional moor, transitional peat land //tourbière de transition, tourbière intermédiaire // Übergangsmoor, Zwischenmoor - термин для торфяников мезотрофного питания. Син.: болото переходное.

2449. ТОРФЯ́НИК ТОПОГЕ́ННЫЙ //topogenic moor, topogenic peat bog //

marecage topogéne, tourbiére topogéne //topogener Moor - термин немецкой школы для торфяников, образование которых связано с депрессиями рельефа. Син.: торфяник низинный.

2450. ТОРФЯ́НИК ТУ́НДРОВЫЙ //tundra moorland, tundra peat bog //marecage de toundra, tourbiére de toundra //Tundra-Moor - термин для специфических маломощных торфяников тундровой зоны, формирующихся в условиях наличия длительномерзлого слоя на некоторой глубине.

2451. ТОРФЯ́НИСТО-БОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА //peaty bog soil, peaty swamp soil //sol tourbeuse à gley, sol marécageux à gley //Anmoorgley - устаревший термин. См.: Торфянисто-глеевая почва.

2452. ТОРФЯ́НИСТО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //peaty gley soil //sol tourbeuse à gley //Anmoorgley, Anmoor - термин для болотных почв, имеющих с поверхности горизонт торфа мощностью до 30 см (в немецкой школе и с содержанием органического вещества около 15-30%), подстилаемый глеевым горизонтом. Син.: торфянисто-болотная почва.

2453. ТОРФЯ́НИСТО-ГЛУБОКОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //deep peaty podzolic soil //sol podzolique tourbeux profond //tiefer Anmoorpodsolboden - термин русск.шк. для торфянисто-подзолистых почв, имеющих подзолистый горизонт A_2 мощностью более 30 см.

2454. ТОРФЯ́НИСТО-ЖЕЛЕ́ЗИСТО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //peaty-gley ferruginous soil //sol gley-tourbeux ferrugineuse //eisenhaltiger Anmoorgleyboden - термин русск.шк. для болотных почв с профилем T-G, имеющих мощность торфа менее 30 см и содержащих прослой болотной руды или ожелезненный горизонт в профиле.

2455. ТОРФЯ́НИСТО-МЕ́ЛКОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //shallow peaty podzolic soil //sol podzolique tourbeux mincé //dünner Anmoorpodsolboden - термин русск.шк. для торфянисто-подзолистых почв, имеющих подзолистый горизонт A_2 мощностью 5-20 см.

2456. ТОРФЯ́НИСТО-НЕГЛУБОКОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //non-deep peaty podzolic soil //sol podzolique tourbeux semi-profond //halbtiefer Anmoorpodsolboden - термин русск.шк. для торфянисто-подзолистых почв, имеющих подзолистый горизонт A_2 мощностью 20-30 см.

2457. ТОРФЯ́НИСТО-ПЕРЕГНО́ЙНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //peat-muck-gley soil //sol muck-tourbeux gleyique //Torfmuckgleyboden - термин русск.шк. для болотных почв с профилем T-A_1-G, в которых под

слоем торфа (степень разложения органического вещества менее 25%) идёт перегнойно-аккумулятивный горизонт (степень разложения органического вещества более 45%), ниже сменяемый глеевым горизонтом.

2458. ТОРФЯНИСТО-ПЕРЕГНОЙНО-ПОДЗОЛИСТО-ГЛЕЕВАЯ ПОЧВА //peaty-humus-podzolic-gley soil //sol tourbeux-humique-podzolique-gleyique //Anmoorhumuspodsolgleyboden - термин русск.шк. для болотно-подзолистых почв с профилем $T-A_1-A_2-(B_g)-G$, у которых под поверхностным торфянистым горизонтом Т мощностью менее 25 см лежит перегнойный горизонт A_1, сменяемый подзолистым горизонтом A_2 и ещё ниже глеевым.

2459. ТОРФЯНИСТО-ПОВЕРХНОСТНОПОДЗОЛИСТАЯ ПОЧВА //peaty surface podzolic soil //sol podzolique superficiel tourbeux //oberflachen Anmoorpodsolboden - термин русск.шк. для торфянисто-подзолистых почв, мощность подзолистого горизонта которых не превышает 5 см или он выражен отдельными пятнами.

2460. ТОРФЯНИСТО-ПОДЗОЛИСТАЯ ПОЧВА //peaty podzolic soil //sol de podzol tourbeux //Anmoorpodsolboden - термин для подзолистых почв, имеющих с поверхности маломощный (до 30 см) торфяной слой, ниже которого идёт подзолистый горизонт A_2, сменяемый далее иллювиальным горизонтом В; син.: подзол торфянистый.

2461. ТОРФЯНИСТО-ПОДЗОЛИСТАЯ ГРУНТОВО-ГЛЕЕВАТАЯ ПОЧВА //ground water gleyic peaty podzolic soil //sol de podzol tourbeux gleyique à eau de fond //grundwasser-gleyischer Anmoorpodsolboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа болотно-подзолистых почв с профилем $T-A_2-B_g-C_g$, оглеенных в нижней части профиля в результате грунтового заболачивания и имеющих торфяный поверхностный слой мощностью менее 20 см.

2462. ТОРФЯНИСТО-ПОДЗОЛИСТАЯ ПОВЕРХНОСТНО-ГЛЕЕВАТАЯ ПОЧВА //surface gleyic peaty podzolic soil //sol de podzol tourbeux gleyique superficiel //oberflachen gleyischer Anmoorpodsolboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа болотно-подзолистых почв с профилем $T-A_{2g}-B_g-C$, оглеенных в верхней части профиля в результате поверхностного заболачивания и имеющих торфяный поверхностный слой мощностью менее 20 см.

2463. ТОРФЯНИСТО-ПОДЗОЛИСТО-ГЛЕЕВАЯ ПОЧВА //peaty-podzolic-gley soil //sol tourbeux-podzolique-gleyique //Anmoorpodsolgleyboden - термин русск.шк. для болотно-подзолистых почв с про-

филем T-A_2-(B_g)-G, у которых под торфянистым поверхностным горизонтом T мощностью менее 25 см лежит подзолистый горизонт A_2, ниже сменяемый глеевым.

2464. ТОРФЯ́НИСТО-СИ́ЛЬНОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //peaty strongly podzolic soil //sol podzolique forte tourbeux //Anmoorstarkpodsolboden - термин русск.шк. для вида торфянисто-подзолистых почв, имеющих сплошной подзолистый горизонт A_2, превышающий по мощности вышележащий торфянистый горизонт.

2465. ТОРФЯ́НИСТО-СЛА́БОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //peaty slightly podzolic soil //sol podzolique faible tourbeux //Anmoorschwachpodsolboden - термин русск.шк. для вида торфянисто-подзолистых почв, подзолистый горизонт которых выражен отдельными белёсыми пятнами под торфянистым поверхностным слоем.

2466. ТОРФЯ́НИСТО-СРЕ́ДНЕПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //peaty moderately podzolic soil //sol podzolique modérée tourbeux //Anmoormässigpodsolboden - термин русск.шк. для вида торфянисто-подзолистых почв, сплошной подзолистый горизонт A_2 которых по своей мощности меньше торфянистого слоя.

2467. ТОРФЯ́НО-БОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА //peat bog soil, peat swamp soil // sol tourbeux à gley, sol marecageux à gley //Torfgleyboden, Moorgley - устаревший термин. См.: Торфяно-глеевая почва.

2468. ТОРФЯ́НО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //peat gley soil //sol tourbeux à gley //Torfgleyboden, Moorgley - термин для болотных почв, имеющих с поверхности горизонт торфа мощностью 30-50 см (в немецкой школе 20-50 см), подстилаемый глеевым горизонтом. Син.: торфяно-болотная почва.

2469. ТОРФЯ́НО-ЖЕЛЕ́ЗИСТО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //peat-gley ferruginous soil //sol gley-tourbeux ferrugineuse //eisenhaltiger Torfgleyboden - термин русск.шк. для болотных почв с профилем T-G, имеющих мощность торфа 30-50 см и содержащих прослой болотной руды или ожелезненный горизонт в профиле.

2470. ТОРФЯНОЗЁМ //peaty earth //terre tourbeuse //Moorerde, Torferde - термин немецкой школы (от народного северогерманского) для обозначения торфянисто-глеевых и торфяно-глеевых почв. Син.: торфянисто-глеевая п., торфяно-глеевая п.

2471. ТОРФЯ́НОЙ ОЧЁС - см. Очес торфяной.

2472. ТОРФЯ́НО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ГРУНТО́ВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //ground water

gley peaty podzolic soil //sol de podzol tourbeux gley à eau de fond //grundwassergley Torfpodsolboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа болотно-подзолистых почв с профилем $T-A_2-B_g-C_g$, сильно оглеенных в нижней части профиля в результате грунтового заболачивания и имеющих торфяный поверхностный слой мощностью более 20 см.

2473. ТОРФЯНО-ПОДЗОЛИСТАЯ ПОВЕРХНОСТНО-ГЛЕЕВАЯ ПОЧВА //surface gley peaty podzolic soil //sol de podzol tourbeux gley superficiel //oberflachen gley Torfpodsolboden - термин русск.шк. (1967) для подтипа болотно-подзолистых почв с профилем $T-A_{2g}-B_g-C$, сильно оглеенных в верхней части профиля в результате поверхностного заболачивания и имеющих торфяный поверхностный слой мощностью более 20 см.

2474. ТОРФЯНО-ПОДЗОЛИСТО-ГЛЕЕВАЯ ПОЧВА //peaty-podzolic-gley soil //sol tourbeux-podzolique-gleyique //Torfpodsolgleyboden - термин русск.шк. для болотно-подзолистых почв с профилем $T-A_2-(B_g)-G$, у которых под торфянистым поверхностным горизонтом T мощностью более 25 см лежит подзолистый горизонт A_2, ниже сменяемый глеевым.

2475. ТРОПАКВАЛЬФ //tropaqualf //tropaqualf //Tropaqualf (от греч. tropikos - круг поворота, лат. aqua - вода и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквальфов (см.), которые: 1) имеют среднегодовую температуру почвы выше $8^{\circ}C$ и разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или над контактом с плотной породой менее $5^{\circ}C$; 2) не имеют фраджипэна[x], натриевого горизонта[x] или дурипэна[x]. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 5 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) аэральные (aeric), 3) аэральные моллевые (aeric mollic), 4) моллевые (mollic) и 5) трещиноватые (vertic) тропаквальфы.

2476. ТРОПАКВЕНТ //tropaquent //tropaquent //Tropaquent (от греч. tropikós - круг поворота (в смысле - постоянно тёплый), лат. aqua - вода и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквентов (см.), которые: 1) имеют среднегодовую температуру почвы $8^{\circ}C$ или более и имеют среднюю летнюю температуру и среднюю зимнюю температуру на глубине 50 см различающиеся менее, чем на $5^{\circ}C$; 2) имеют величину N 0,5 или менее в каком-либо из подгоризон-

тов между 20 и 50 см. Большая группа тропаквентов включает две подгруппы: 1) типичные тропаквенты (typic) и 2) аэральные тропаквенты (aeric).

2477. ТРО́ПАКВЕ́ПТ //tropaquept //tropaquept //Tropaquept (от греч. tropikos - круг поворота (в смысле постоянно теплый), лат. aqua - вода и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквептов (см.), которые: 1) имеют среднегодовую температуру почвы 8°С и разницу между среднелетней и среднезимней температурами менее 5°С на глубине 50 см или на контакте с плотной породой, если она выше; 2) имеют менее 15% обменного натрия в верхних 50 см либо постоянное или увеличивающееся с глубиной ниже 50 см содержание обменного натрия; 3) имеют величину N менее 0,5 в каком-либо слое между 20 и 50 см; 4) не имеют сплошного или составляющего более половины матрицы плинтита[x)] в пределах 125 см от поверхности. В пределах этой группы выделяются 8 подгрупп: 1) типичные тропаквепты (typic), 2) аэральные тропаквепты (aeric), 3) аэральные флювентные тропаквепты (aeric fluventic), 4) флювентные тропаквепты (fluventic), 5) торфянистые тропаквепты (histic), 6) маломощные тропаквепты (lithic), 7) погребенно-торфяные тропаквепты (thaptohistic) и 8) трещиноватые тропаквепты (vertic).

2478. ТРО́ПАКВОД //tropaquod //tropaquod //Tropaquod (от греч. tropikos - круг поворота, лат. aqua - вода и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы акводов (см.), которые имеют среднегодовую температуру выше 8°С и разницу между среднелетними и среднезимними температурами на 50 см менее 5°С; не имеют белёсого горизонта с цементированным или уплотненным подгоризонтом, фрагмент которого не распадается при погружении в воду; не имеют слоеватого горизонта выше сподового[x)] горизонта. В пределах этой большой почвенной группы выделяются две подгруппы почв: 1) типичные (typic) и 2) торфянистые (histic) тропаководы.

2479. ТРО́ПАКВУ́ЛЬТ //tropaquult //tropaquult //Tropaquult (от греч. tropicos - круг поворота, лат. aqua - вода и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквультов (см.), которые: 1) не имеют сплошного плинтита[x)] в пределах 1,25 м от поверхности; 2) име-

ют среднегодовую почвенную температуру выше 8°С и разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с породой, если он ближе 50 см, менее 5°С. В пределах этой большой почвенной группы выделяются две подгруппы почв: 1) типичные (typic) и 2) аэральные тёмные (aeric umbric).

2480. ТРОПЕ́ПТ // tropept // tropept // Tropept (от греч. tropikos - круг поворота и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка инсептисолей (см.), которые имеют среднегодовую температуру почвы выше 8°С, а разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с плотной породой менее 5°С, не имеют поверхностного плаггенового[x)] горизонта и имеют либо: 1) темный[x)] горизонт, либо 2) моллевый[x)] горизонт с одним из следующих признаков: а) более 35% глины монтмориллонитового состава, а верхний горизонт подстилается материалом, содержащим менее 40% $CaCO_3$; б) подстилающий камбиевый горизонт имеет степень насыщенности основаниями менее 50%; в) окраска его не темнее подстилающих горизонтов; либо 3) светлый[x)] и камбиевый[x)] горизонты. В пределах этого подпорядка выделяются 4 большие почвенные группы: 1) дистропепты, 2) эутропепты, 3) гумитропепты и 4) устропепты (см.).

2481. ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ЧЁРНАЯ ГЛИ́НА // tropical black clay//argile noire tropicale // tropischer Schwarzton - устаревший термин для тёмных слитых трещиноватых глинистых почв типа вертисолей, использовавшийся в Африке.

2482. ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ЧЁРНАЯ ЗЕМЛЯ́ // tropical black earth // terre noire tropicale // tropischer Schwarzerde - устаревший термин для тёмных слитых трещиноватых глинистых почв типа вертисолей, использовавшийся в Анголе, Гане и др. африканских странах.

2483. ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ЧЁРНАЯ ПО́ЧВА // tropical black soil // sol noire tropicale // tropischer Schwarzboden - см. Черная тропическая почва.

2484. ТРОПИ́ЧЕСКИЙ ЧЕРНОЗЕМ // tropical black earth, tropical chernozem // sol noire tropical, chernozem tropical // tropischer Schwarzerde, tropischer Tschernosem - устаревший термин для тропических слитых черных глинистых трещиноватых почв типа вертисолей, использовавшийся в Индии и Африке.

2485. ТРО́ПОГУМО́Д // tropohumod // tropohumod // Tropohumod (от греч. tropikos - круг поворота, лат. humus - гумус и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы гумодов (см.), которые имеют среднегодовую температуру выше 8°С, а разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с плотной породой (что ближе) менее 5°С. В пределах этой большой почвенной группы выделяются две подгруппы почв: 1) типичные (typic) и 2) феррудальфовые (ferrudalfic) тропогумоды.

2486. ТРО́ПОГУМУ́ЛЬТ // tropohumult // tropohumult // Tropohumult (от греч. tropicos - круг поворота, лат. humus - гумус и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы гумультов (см.), которые: 1) имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с породой, если он ближе, менее 5°С; 2) имеют такое распределение глины, что ее содержание уменьшается более, чем на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, а слои, в котором происходит уменьшение содержания глины, не обнаруживает признаков элювиирования глины; 3) имеют аргилловый[x)] горизонт, содержащий более 10% способных к выветриванию минералов во фракции 20-200 μ в пределах верхнего метра; 4) не имеют фраджипэна[x)]. В пределах этой большой почвенной группы выделяются три подгруппы почв: 1)типичные (typic), 2) гумоксовые (humoxic) и 3) ортоксовые (orthoxic) тропогумульты.

2487. ТРО́ПОПСАММЕ́НТ // tropopsamment // tropopsamment // Tropopsamment (от греч. tropicos - круг поворота, греч. psammos - песок и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы псаментов (см.), которые: 1) имеют в песчаной фракции менее 75% кварца, циркона, турмалина, рутила или других нормально нерастворимых кристаллических минералов, которые не выветриваются с освобождением железа или алюминия; 2) достаточно влажные; 3) имеют тёплый изотермический режим.

2488. ТРО́ПОРТЕ́НТ // troporthent // troporthent // Troporthent (от греч. tropicós - круг поворота (в смысле постоянно тёплый), греч. orthos - настоящий и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой

группы ортентов (см.), которые: 1) имеют среднегодовую почвенную температуру 8°С и выше и разницу между среднелетней и среднезимней температурой на глубине 50 см менее 5°С; 2) не пересыхают в каких-либо подгоризонтах между 18 и 50 см на три кумулятивных месяца большинство лет. В пределах группы тропортентов выделяются 5 подгрупп: 1) типичные тропортенты (typic), 2) вулканические тропортенты (andic), 3) гидроморфные тропортенты (aquic), 4) маломощные тропортенты (lithic) и 5) трещиноватые тропортенты (vertic).

2489. ТРО́ПОРТО́Д //troporthod //troporthod //Troporthod (от греч. tropicos - круг поворота, греч.orthos - настоящий и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортодов (см.), распространенных в тропическом и субтропическом поясе.

2490. ТРО́ПОСАПРИ́СТ //troposaprist //troposaprist //Troposaprist (от греч.tropicos - круг поворота, греч.sapros - гнилой и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы сапристов (см.), имеющих среднегодовую температуру выше 8°С и разницу между среднелетней и среднезимней температурами на глубине 30 см менее 5°С; в пределах этой большой почвенной группы выделяются 9 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) торфянистые (fibric), 3) торфянистые землистые (fibric terric), 4) флюваквентные (fluvaquentic), 5) переходные (hemic), 6) переходные землистые (hemic terric), 7) озёрные (limnic), 8) скальные (lithic), и 9) землистые (terric) тропосапристы.

2491. ТРО́ПОФИБРИ́СТ //tropofibrist //tropofibrist //Tropofibrist (от греч.tropicos - круг поворота, лат.fibra - ткань и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы фибристов (см.) тропиков и субтропиков, имеющих среднегодовую температуру почвы выше 8°С и разницу между среднелетней и среднезимней температурами на глубине 30 см менее 5°С и содержащих менее трех четвертей сфагнового материала в составе торфа; в пределах этой большой почвенной группы выделяются 10 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) флюваквентные (fluvaquentic), 3) переходные (hemic), 4) переходные землистые (hemic terric), 5) водонасыщенные (hydric), 6) озёрные (limnic), 7) скальные (lithic), 8) перегнойные (sapric), 9) перегнойные землистые (sa-

pric terric) и 10) землистые (terric) тропофибристы.

2492. ТРО́ПОФЛЮВЕНТ //tropofluvent //tropofluvent //Tropofluvent (от греч. tropikos - круг поворота (в смысле - постоянно тёплый), лат. fluvius - река и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы флювентов (см.), которые: 1) имеют среднегодовую температуру почвы более 8°С, а среднелетнюю и среднезимнюю температуры на глубине 50 см различающиеся менее, чем на 5°С; 2) не являются сухими более 7 из 10 лет во всех подгоризонтах между 18 и 50 см минимум в течение двух последовательных месяцев и не пересыхают в некоторых подгоризонтах на этой глубине больше, чем на три куммулятивных месяца в большинство лет. В пределах этой группы выделяются 5 подгрупп: 1) типичные тропофлювенты (typic), 2) вулканические тропофлювенты (andic), 3) гидроморфные тропофлювенты (aquic), 4) дурипэновые тропофлювенты (durorthidic) и 5) трещиноватые тропофлювенты (vertic).

2493. ТРО́ПОФОЛИ́СТ //tropofolist //tropofolist //Tropofolist (от греч. tropicos - круг поворота, лат. folia - листва и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы фолистов (см.) тропического и субтропического поясов.

2494. ТРО́ПОХЕМИ́СТ //tropohemist //tropohemist //Tropohemist (от греч. tropicos - круг поворота, греч. hemi - половина и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы хемистов (см.), имеющих среднегодовую температуру почвы выше 8°С и разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 30 см менее 5°С, не имеющих гумусоиллювиального горизонта в профиле, не имеющих аккумуляции в профиле сульфатов или сульфидов; в пределах этой большой почвенной группы выделяются 10 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) торфянистые (fibric), 3) торфянистые землистые (fibric terric), 4) фловаквентные (fluvaquentic), 5) водонасыщенные (hydric), 6) озёрные (limnic), 7) скальные (lithic), 8) перегнойные (sapric), 9) перегнойные землистые (sapric terric) и 10) землистые (terric) тропехемисты.

2495. ТРО́ПУДА́ЛЬФ //tropudalf //tropudalf //Tropudalf (от греч. tropicos - круг поворота, лат. udus - влажный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США,

1960 70) для большой группы удальфов (см.), которые: 1) имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с породой, если он ближе, менее 5°С; 2) не имеют натриевого[x)] или антропового[x)] горизонта или фраджипэна[x)]; 3) имеют красноватый аргилловый[x)] горизонт с таким распределением глины, что её содержание уменьшается более, чем на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются две подгруппы почв: 1) типичные (typic) и 2) маломощные (lithic) тропудальфы.

2496. ТРО́ПУДУ́ЛЬТ //tropudult //tropudult //Tropudult (от греч. tropicos - круг поворота, лат. udus - влажный и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960- 70) для большой группы удультов (см.), которые: 1) не имеют фраджипэна[x)]; 2) не имеют сплошного плинтита[x)] в пределах 1,25 м от поверхности; 3) имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с породой, если он ближе, менее 5°С; 4) обнаруживают уменьшение содержания глины более чем на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, а слой, в котором наблюдается это уменьшение, не имеет признаков элювиирования глины; 5) имеют аргилловый[x)] горизонт с содержанием способных к выветриванию минералов более 10% во фракции 20-200 μ в пределах верхнего метра; 6) имеют желтую окраску профиля. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 7 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) песчаные (arenic), 4) дистропептовые (dystropeptic), 5) окисные (oxic), 6) плинтитовые (plinthic) и 7) трещиноватые (vertic) тропудульты.

2497. ТРО́ПУСТУЛЬТ //tropustult //tropustult //Tropustult (от греч. tropicos - круг поворота, лат. ustus - обожженный и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устультов (см.), которые: 1) не имеют фраджипэна[x)], 2) не имеют плинтита[x)] в пределах 1,25 м от поверхности; 3) имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с породой, если он ближе, менее 5°С; 4) обнаруживают уменьшение содержания глины более чем на 20% от максимального в пределах 1,5 м от поверхности, а слой, в котором уменьшается содержание глины, не имеет признаков элювиирования глины; 5) имеют аргилловый[x)] горизонт с содержанием способных к выветриванию минера-

лов более 10% во фракции 20-200 μ в метровой верхней части; 6) имеют желтую окраску профиля. В пределах этой большой почвенной группы выделяются четыре подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) песчаные (arenic), 3) окисные (oxic) и 4) плинтитовые (plinthic) тропустульты.

2498. ТРУМА́О //trumao //trumao //Trumao - термин южноамериканских почвоведов для вулканических пепловых почв (см.).

2499. ТУГА́ЙНАЯ ПО́ЧВА //tugai soil //sol de tugai //Tugaiboden - термин для пойменных почв пустынной зоны, формирующихся под пойменными лесами из лоха, тамарикса, джиды, тополя в низкой пойме и на прирусловых валах при уровне грунтовых вод от 0,7 до 2,0 м на сильно слоистом грубом аллювии; характеризуются профилем A-G; син.: Пойменная пустынно-луговая слоистая п.

2500. ТУ́НДРАГЛЕ́Й //tundra gley //gley de toundra //Tundragley (от финск. tunturi - горы и русск. глей) - термин немецкой школы для всех тундровых и альпийских почв, имеющих глеевый горизонт под гумусовым или торфянистым.

2501. ТУ́НДРОВАЯ ПО́ЧВА //tundra soil //sol de toundra //Tundraboden (от финск. tunturi - горы) - общеупотребительный термин для сборной группы различных почв тундровой зоны.

2502. ТУ́НДРОВАЯ ПО́ЧВА //tundra soil //tundra //Tundraboden (от финск. tunturi - горы) - термин франц.шк. (1965) для группы слабо развитых почв климатического происхождения (см.), формирующихся в условиях мерзлоты бо́льшую часть года и характеризующихся слабо гумифицированным органическим веществом в горизонте A.

2503. ТУ́НДРОВАЯ АРКТИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА - см. Арктo-тундровая п.

2504. ТУ́НДРОВАЯ БОЛО́ТНАЯ ПО́ЧВА //swampy tundra soil //sol marecageux de toundra //Tundramoorboden - термин для торфяно-глеевых и торфяных почв низинных болот тундровой зоны.

2506. ТУ́НДРОВАЯ ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //gley tundra soil //sol gley de toundra //Tundragleyboden - 1) термин русск.шк. для типа тундровых почв с хорошо выраженной торфянистой подстилкой и глеевым горизонтом под ней; 2) термин русск.шк. для подтипа тундровых глеевых почв, формирующихся на суглинистых породах и имеющих под торфянистой подстилкой маломощный грубогумусовый горизонт A_1, под которым лежит глеевый горизонт; 3) термин русск.шк.

для рода тех же почв, не имеющих гумусо-иллювиального горизонта.

2507. ТУ́НДРОВАЯ ГЛЕ́ЕВАЯ ИЛЛЮВИА́ЛЬНО-ГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //humus-illuvial gley tundra soil //sol gley humus-illuvial de toundra // humus-illuvialer Tundragleyboden - термин русск.шк. для рода тундровых глеевых почв на песчаных породах, имеющих под торфянистым горизонтом гумусо-иллювиальный горизонт темно-бурого цвета, постепенно переходящий в породу, при слабых признаках оглеения.

2508. ТУ́НДРОВАЯ ГЛЕ́ЕВАЯ ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //podzolized gley tundra soil//sol gley podzolisé de toundra //podsolierter Tundragleyboden - 1) термин русск.шк. для подтипа тундровых глеевых почв, имеющих слабо выраженный оподзоленный осветлённый горизонт в верхней части глеевого горизонта под торфянистой подстилкой; 2) термин русск.шк. для рода тех же почв, формирующихся на суглинистых породах и не имеющих гумусо-иллювиального горизонта в профиле.

2509. ТУ́НДРОВАЯ ГЛЕ́ЕВАЯ ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ИЛЛЮВИА́ЛЬНО-ГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА // humus-illuvial podzolized gley tundra soil //sol gley podzolisé humus-illuvial de toundra //podsolierter humus-illuvialer Tundragleyboden - термин русск.шк. для рода тундровых глеевых оподзоленных почв на песчаных породах, имеющих четко дифференцированный профиль A_0-A_1A_2-A_2-B_h-BG-G.

2510. ТУ́НДРОВАЯ ГЛЕ́ЕВАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА // typic gley tundra soil // sol gley typique de Tundra // typischer Tundragleyboden - см. Тундровая глеевая п.

2511. ТУ́НДРОВАЯ ПОВЕ́РХНОСТНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //surfacely gleyed tundra soil //sol de toundra en gley superficiel // obervergleyter Tundraboden - термин для тундровых почв, имеющих с поверхности под торфянистым слоем сильное оглеение, которое постепенно пропадает с глубиной при переходе в породу.

2512. ТУ́НДРОВАЯ ПОВЕ́РХНОСТНО-ГЛЕ́ЕВАЯ ОПОДЗО́ЛЕННАЯ ПО́ЧВА //surfacely gleyed tundra podzolized soil //sol podzolisé de tundra en gley superficiel //podsolierter obervergleyter Tundraboden - термин для тундровых почв, имеющих с поверхности под торфянистым слоем сильное оглеение, которое постепенно пропадает с глубиной при переходе в породу; в верхней части глеевого горизонта под торфом выделяется осветленный прерывистый оподзоленный горизонт.

2513. ТУ́НДРОВАЯ ТОРФЯ́НО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //peaty-gley tundra soil // sol tourbeux à gley de toundra //Torfgleytundraboden - термин для тундровых почв, имеющих с поверхности торфяный слой мощностью 30-50 см, под которым лежит глеевый горизонт, сменяемый слоем многолетней мерзлоты.

2514. ТУ́НДРОВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА - см. Тундровая глеевая п.

2515. ТУ́НДРОВО-ГЛЕ́ЕВАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА - см. Тундровая глеевая типичная п.

2516. ТУ́НДРОВЫЙ ПОДБУ́Р - см. Подбур тундровый.

2517. ТУ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //fat soil // terre grasse, sol grasse //fetter Boden - термин для высокоплодородных почв, богатых гумусом, имеющих мощный сильно гумусированный верхний горизонт.

2518. УДА́ЛЬФ //udalf //udalf //Udalf (от лат. udus - влажный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка альфисолей (см.), которые: 1) имеют среднелетнюю температуру на 50 см или на контакте с породой, если он выше, более 15°С для пахотных или не имеющих подстилки почв и более 8°С для почв с подстилкой; 2) обычно влажные и не пересыхают большинство лет на столь долго как два месяца подряд во всех горизонтах или на три месяца в сумме в каком-либо горизонте между 18 и 50 см и не имеют кальциевого[x)] горизонта или горизонта с порошковидной вторичной известью в или ниже 50 см под основанием аргиллового[x)] горизонта; 3) не насыщены водой в какой-либо период или не имеют характеристик переувлажнения, описанных для аквальфов (см.); 4) не имеют сплошного белёсого горизонта, входящего языками или затеками в аргиллювый или натриевый[x)] горизонт, либо имеют среднегодовую температуру почвы выше 8°С. В пределах этого подпорядка выделяются 8 больших почвенных групп: 1) агрудальфы, 2) феррудальфы, 3) фраджиудальфы, 4) глоссудальфы, 5) гаплудальфы, 6) натрудальфы, 7) палеудальфы и 8) тропудальфы.

2519. УДЕ́РТ //udert //udert //Udert (от лат. udus - влажный и порядкового корня ert для вертисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка вертисолей (см.), которые обычно влажные в некоторой части большинство лет и имеют трещины, которые открываются и закрываются раз или более в год, но не остаются открытыми на так много как 3 кумулятивных месяца в течение года большинство лет или на столь много как 2

последовательных месяца в более чем 7 лет из 10, а в некоторые годы почвы могут и не растрескиваться. В пределах этого подпорядка выделяются две большие группы: 1) хромудерты и 2) пеллудерты (см.).

2520. УДИПСАММЕ́НТ //udipsamment //udipsamment //Udipsamment (от лат.udus - влажный, греч. psammos - песок и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы псаментов (см.), которые: 1) имеют почвенную температуру теплее, чем криопсаменты (см.) и разницу между среднелетней и среднезимней температурами на глубине 50 см более 5°С; 2) не пересыхают во всех подгоризонтах между 18 и 50 см или до контакта с плотной породой, если он ближе 50 см, более 7 лет из 10 на 2 последовательных месяца и не пересыхают в некоторых подгоризонтах на этих глубинах на три кумулятивных месяца большинство лет; 3) имеют в песчаной фракции менее 95% кварца, циркона, турмалина, рутила или других трудновыветриваемых минералов, которые не освобождают при выветривании железо и алюминий. В пределах этой группы выделяются 6 подгрупп: 1) типичные удипсаменты (typic), 2) альфовые удипсаменты (alfic), 3) гидроморфные удипсаменты (aquic), 4) маломощные удипсаменты (lithic), 5) подзолистые удипсаменты (spodic) и 6) ультовые удипсаменты (ultic).

2521. У́ДИФЛЮВЕ́НТ //udifluvent //udifluvent //Udifluvent (от лат. udus - влажный, лат.fluvius - река и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы флювентов (см.), которые: 1) имеют температуру почвы теплее, чем криофлювенты (см.), а среднелетние и среднезимние температуры отличаются на глубине 50 см более, чем на 5°С; 2) не являются сухими во всех подгоризонтах между 18 и 50 см в течение минимум 7 из 10 лет в продолжение двух последовательных месяцев и не пересыхают в каких-либо подгоризонтах на этой глубине по крайней мере на три кумулятивных месяца в большинство лет. В пределах этой группы выделяются 6 подгрупп: 1) типичные удифлювенты (typic), 2) вулканические удифлювенты (andic), 3) гидроморфные удифлювенты (aquic), 4) удифлювенты с погребенной акволлевой почвой (thapto-aquollic), 5) удифлювенты с погребенной моллевой почвой (thapto-mollic) и 6) трещиноватые удифлювенты (vertic).

2522. УДО́ЛЛЬ //udoll //udoll //Udoll (от лат.udus - влажный и по-

рядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка моллисолей (см.), которые: 1) имеют либо среднегодовую температуру выше 8°С, либо яркую влажную окраску в какой-либо части верхних 15 см моллевого[x] горизонта и среднелетнюю температуру на 50 см или на контакте с плотной породой более 15°С, если нет A_0 или более 8°С, если есть A_0; 2) не имеют белёсого горизонта с признаками переувлажнения, т.е. пятнистостью или железо-марганцевыми конкрециями; 3) никогда не насыщены водой или не имеют признаков переувлажнения, характерных для акволлей (см.); 4) не имеют карбонатного горизонта непосредственно под моллевым на глубине менее 50 см с содержанием $CaCO_3$ более 40%; 5) длительно влажные в любом камбиевом[x] или аргилловом[x] горизонте, либо почва не пересыхает 7 из 10 лет на так много как два месяца подряд во всех горизонтах между 18 и 50 см и не пересыхает на столь долго как 3 месяца в сумме в любом горизонте на этих глубинах большинство лет; 6) не имеют кальциевого[x] горизонта и аккумуляции порошковидной извести в форме белоглазки, припудренности на гранях или дисперсных частиц в пределах 1,5 м от поверхности или в пределах 50 см ниже основания камбиевого или аргиллового горизонта; 7) если имеется контакт с плотной породой в пределах 50 см, то имеют степень насыщенности менее 80% в некоторых или всех подгоризонтах. В пределах этого подпорядка выделяются 4 большие почвенные группы: 1) аргиудолли, 2) гаплудолли, 3) палеудолли и 4) вермудолли (см.).

2523. УДОРТЕ́НТ //udorthent //udorthent //Udorthent (от лат. udus - влажный, греч. orthos - настоящий и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортентов (см.), которые: 1) имеют почвенную температуру теплее, чем криортенты (см.) и разницу между среднелетней и среднезимней температурами на глубине 50 см 5°С или более; 2) не пересыхают во всех подгоризонтах между 18 и 50 см в более чем 7 лет из 10 в продолжение двух последовательных месяцев или не пересыхают в каком-либо подгоризонте на этих глубинах в продолжение трех кумулятивных месяцев большинство лет. В пределах группы удортентов выделяются 6 подгрупп: 1) типичные удортенты (typic), 2) вулканические удортенты (andic), 3) гидроморфные удортенты (aquic), 4) маломощные удортенты (lithic), 5) вермикулярные удортенты (vermic) и 6) трещиноватые удортенты (vertic).

2524. УДУ́ЛЬТ //udult //udult //Udult (от лат. udus - влажный и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка ультисолей (см.), которые: 1) никогда не насыщены водой и имеют более красную и яркую окраску, чем аквульты (см.); 2) имеют менее 1,5% органического в-ва в верхних 15 см аргиллового[x)] горизонта или имеют менее 20 кг/м^2 органического вещества в метровой толще ниже основания A_o; 3) всегда влажные во всех горизонтах, либо пересыхают 7 из 10 лет менее, чем на два месяца подряд во всех горизонтах между 18 и 50 см и менее чем на три месяца в сумме в каком-либо горизонте на этих глубинах большинство лет. В пределах этого подпорядка выделяются 6 больших почвенных групп: 1) фраджиудульты, 2) гаплудульты, 3) палеудульты, 4) плинтудульты, 5) родудульты и 6) тропудульты.

2525. У́ЛЬТИСОЛЬ //ultisol //ultisol //Ultisol (от лат. ultimus - последний и лат. solum - почва) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для порядка минеральных почв, которые: 1) имеют одну из следующих комбинаций признаков: а) имеют аргиллювый[x)] горизонт, но не имеют фраджипэна[x)], и имеют насыщенность основаниями (по сумме катионов) менее 35% на 1,25 м ниже верхней границы аргиллового горизонта или на 1,8 м ниже поверхности почвы либо над контактом с породой, если он выше; б) имеют фраджипэн, который отвечает всем требованиям к аргилловому горизонту или имеет глинистые плёнки толщиной более 1 мм в некоторой части, и имеет насыщенность основаниями менее 35% на глубине 75 см ниже верхней границы фраджипэна; 2) имеют среднегодовую почвенную температуру выше 8°С и, если разница между среднелетней и средней зимней температурами на 50 см или на контакте с породой, если она ближе 50 см, превышает 5°С, то имеют среднелетнюю температуру выше 15°С при отсутствии подстилки или выше 8°С при наличии подстилки; 3) не имеют сподового[x)] горизонта и окисного[x)] горизонта, если только последний не лежит под аргилловым горизонтом; 4) не имеют сплошного плинтита в пределах 30 см от поверхности. В пределах этого порядка почв выделяются 5 подпорядков: 1) аквульты, 2) гумульты, 3) удульты, 4) устульты и 5) ксерульты.

2526. У́МБРАКВАЛЬФ //umbraqualf //umbraqualf //Umbraqualf (от лат. umbra - тень, темнота, лат. aqua - вода и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70)

для большой группы аквальфов (см.), которые: 1) имеют тёмный[x] верхний гумусовый горизонт, но не имеют фраджипэна[x], натриевого горизонта[x] или дурипэна[x]; 2) не имеют белёсого горизонта, входящего языками в аргилловый[x] горизонт и резкого перехода по мех.составу между белёсым и аргилловым горизонтами; 3) имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см более 5°С. В пределах этой большой почвенной группы выделяются две подгруппы почв: 1) типичные (typic) и 2) вулканические (andic) умбраквальфы.

2527. УМБРАКВО́КС //umbraquox //umbraquox// Umbraquox (от лат. umbra - тень, темнота, лат. aqua - вода и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквоксов (см.), которые: 1) имеют тёмный[x] или торфянистый[x] гумусовый горизонт; 2) не имеют плинтита[x], образующего сплошной слой в пределах 1,25 м от поверхности; 3) не имеют агрегатов размером гравия, цементированных гиббситом, или прослоев гиббсита в пределах 1 м от поверхности.

2528. УМБРАКВУ́ЛЬТ //umbraqualt //umbraqualt //Umbraqualt (от лат. umbra - тень, темнота, лат. aqua - вода и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквультов (см.), которые: 1) имеют тёмный[x] или моллевый[x] верхний гумусовый горизонт; 2) не имеют фраджипэна[x]; 3) не имеют сплошного плинтита[x] в пределах 1,25 м от поверхности; 4) имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с породой, если он ближе 50 см, более 5°С. В пределах этой большой почвенной группы выделяется подгруппа типичных (typic) умбраквультов.

2529. УМБРЕ́ПТ //umbrept //umbrept //Umbrept (от лат. umbra - тень, темнота и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка инсептисолей (см.), которые: 1) имеют преобладание в обменном комплексе кристаллических алюмосиликатных глинистых минералов и содержат менее 60% стекловатого вулканического пепла или иного пирокластического материала во фракциях пыли, песка и гравия; 2) не насыщены водой в любой сезон или не имеют характеристик переувлажнения, описанных для аквептов (см.); 3) имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с плотной породой выше 5°С; 4) не имеют плаггенового[x] горизонта; 5) имеют одну из следующих характери-

стик: а) если среднегодовая температура выше 8°С, то имеют либо тёмный[x)], либо антроповый[x)] верхний горизонт более 25 см мощности, либо моллевый[x)] горизонт мощнее 25 см, если он подстилается камбиевым[x)] горизонтом с насыщенностью основаниями менее 50% в какой-либо части; б) если среднегодовая температура ниже 8°С, то имеют либо тёмный[x)], либо моллевый[x)] верхний горизонт, если моллевый горизонт подстилается камбиевым горизонтом с насыщенностью основаниями менее 50% в какой-либо части. В пределах этого подпорядка выделяются 5 больших почвенных групп: 1) антрумбрепты, 2) криумбрепты, 3) фраджиумбрепты, 4) гаплумбрепты и 5) ксерумбрепты (см.).

2530. УМБРИОРТОКС //umbriorthox//umbriorthox//Umbriorthox (от лат. umbra - тень, темнота, греч. orthos - настоящий и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортоксов (см.), которые: 1) имеют ёмкость поглощения катионов (по NH_4Cl) более 1 мэкв на 100 г глины (или более 1 мэкв обменных оснований плюс обменный алюминий на 100 г глины) во всех подгоризонтах окисного[x)] горизонта; 2) не имеют прослоев гиббсита или агрегатов размера гравия, цементированных гиббситом в пределах 1,25 м от поверхности; 3) имеют либо тёмный[x)] верхний гумусовый горизонт, либо светлый[x)] гумусовый горизонт, содержащий более 1% органического углерода во всех подгоризонтах до глубины 75 см от поверхности; 4) имеют насыщенность основаниями менее 35% в каком-либо подгоризонте окисного[x)] горизонта в пределах 1,25 м от поверхности.

2531. УСТАЛЬФ //ustalf//ustalf//Ustalf (от лат. ustus - обожженный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка альфисолей (см.), которые: 1) имеют почвенные температуры выше, чем боральфы (см.); 2) не насыщены водой и не имеют признаков переувлажнения, описанных для аквальфов (см.); 3) не являются продолжительно сухими во всех частях почвы между 18 и 50 см или до контакта с породой, если он ближе 50 см, или в подгоризонте непосредственно над контактом с породой, лежащим ближе 18 см, на столь длительный срок как два месяца подряд в течение семи из десяти лет, если только среднегодовая температура почвы не выше 22°С или разница между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с породой, если он ближе, не менее 5°С, и имеют один из следующих признаков: а) пересы-

хают более чем на 3 месяца в сумме большинство лет в каком-либо подгоризонте между 18 и 50 см или выше контакта с породой, если он ближе; б) степень насыщенности выше 80% во всех частях почвы выше контакта с породой в пределах 50 см от поверхности; в) в пределах 1,5 м от поверхности или 50 см от основания аргиллового[x)] горизонта либо кальциевый[x)] горизонт либо горизонт с аккумуляцией мягкой порошковатой извести в виде белоглазки или припудренности; г) нет натриевого[x)] горизонта, но увеличивается насыщенность Na плюс K в пределах 125 см от поверхности при песчаном, 90 см при суглинистом и 75 см при глинистом составе. В пределах этого подпорядка выделяются 6 больших почвенных групп: 1) дурустальфы, 2) гаплустальфы, 3) натрустальфы, 4) палеустальфы, 5) плинтустальфы, 6) родустальфы.

2532. УСТЭРТ //ustert //ustert //Ustert (от лат.ustus - обожженный и порядкового корня ert для вертисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка вертисолей (см.), которые имеют трещины остающиеся открытыми на 3 кумулятивных месяца или более ежегодно, но не весь год в большинство лет и имеют один или несколько следующих признаков: а) трещины открываются и закрываются более одного раза в год в большинство лет; б) среднегодовую температуру почвы 22°C или более; в) разницу между среднелетней и среднезимней температурами на глубине 50 см менее 5°C. В пределах этого подпорядка выделяются две большие группы: 1) хромустерты и 2) пеллустерты (см.).

2533. УСТИПСАММЭНТ //ustipsamment //ustipsamment //Ustipsamment (от лат.ustus - обожженный, греч.psammos - песок и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы псаментов (см.), которые: 1) имеют почвенную температуру выше криопсаментов (см.); 2) обычно влажные, но пересыхают на 3 кумулятивных месяца или более большинство лет в каком-либо подгоризонте между 18 и 50 см или выше контакта с плотной породой, если она ближе 50 см, но не постоянно сухие во всех подгоризонтах на этих глубинах в продолжение двух последовательных месяцев более 7 лет из 10, если только среднегодовая почвенная температура не выше 22°C либо разница между среднелетней и среднезимней температурами на глубине 50 см не менее 5°C; 3) имеют в песчаной фракции менее 95% кварца, циркона, турмалина, рутила или дру-

гих трудно выветриваемых минералов, не освобождающих при выветривании железо и алюминий. В пределах этой группы выделяются 4 подгруппы: 1) типичные устипсамменты (typic), 2) альфовые устипсамменты (alfic), 3) гидроморфные устипсамменты (aquic) и 4) маломощные устипсамменты (lithic).

2534. УСТИФЛЮВЕ́НТ //ustifluvent //ustifluvent //Ustifluvent (от лат.ustus - обожженный, лат.fluvius - река и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы флювентов (см.), которые: 1) имеют почвенную температуру теплее, чем криофлювенты (см.); 2) обычно увлажнены, но пересыхают на три кумулятивных месяца или более в большинство лет в каком-либо подгоризонте между 18 и 50 см, но не постоянно пересохшие во всех подгоризонтах на этой глубине в течение двух последовательных месяцев минимум 7 из 10 лет, если только среднегодовая температура почвы не 22°С и более либо среднелетние и среднезимние температуры на глубине 50 см не отличаются менее, чем на 5°С. Эта группа включает 5 подгрупп: 1) типичные устифлювенты (typic), 2) гидроморфные устифлювенты (aquic), 3) гидроморфные трещиноватые устифлювенты (aquic vertic), 4) дурипэновые устифлювенты (durorthidic) и 5) трещиноватые устифлювенты (vertic).

2535. УСТО́КС //ustox //ustox //Ustox (от лат.ustus - обожженный и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка оксисолей (см.), которые: 1) имеют какой-либо подгоризонт глубже 18 см, который сухой более двух месяцев подряд большинство лет; 2) имеют среднегодовую температуру почвы выше 15°С; 3) либо имеют красноватую окраску в какой-либо части гумусового горизонта A_1 или $A_{пах}$, либо обычно влажные. В пределах этого подпорядка выделяются три большие почвенные группы: 1) акрустоксы, 2) эутрустоксы и 3) гаплустоксы.

2536. УСТО́ЛЛЬ //ustoll //ustoll //Ustoll (от лат.ustus - обожженный и порядкового корня oll для моллисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка моллисолей (см.), которые: 1) имеют слишком высокие температуры или слишком светлую окраску для бороллей (см.); 2) не имеют белесого горизонта с признаками переувлажнения (пятна, конкреции); 3) не насыщены водой в какой-либо период или не имеют признаков переувлажнения, описанных для акволлей (см.); 4) не являются

постоянно сухими во всей части почвы между 18 и 50 см или до контакта с плотной породой ближе 50 см столь долго как два месяца подряд более 7 лет из 10, если только среднегодовая температура почвы не выше 22°С либо разница между среднелетними и среднезимними температурами на 50 см или на контакте с плотной породой не менее 5°С, и имеют один или более из следующих признаков: а) пересыхают в сумме не менее чем на три месяца большинство лет в некоторых подгоризонтах между 18 и 50 см или выше контакта с плотной породой, если он выше 50 см; б) имеют насыщенность основаниями более 80% во всех частях почвы между 18 и 50 см; в) в пределах 1,5 м от поверхности или 50 см ниже основания камбиевого[x)] или аргиллового[x)] горизонта имеют либо кальциевый[x)] горизонт, либо горизонт с концентрациеи порошковидной извести в виде белоглазки, припудренности и т.п.; г) имеют увеличивающуюся насыщенность натрием плюс калием в пределах 1,25 м от поверхности при песчаном мех.составе, 90 см - при суглинистом и 75 см - при глинистом; 5) не имеют карбонатного горизонта в моллевом[x)] горизонте или сразу под ним на глубине менее 50 см, который содержал бы более 40% $CaCO_3$, если это только не кальциевый горизонт (плотный известняк - это не почвенный горизонт). В пределах этого подпорядка выделяются 7 больших почвенных групп: 1) аргиустолли, 2) кальциустолли, 3) дурустолли, 4) гаплустолли, 5) натрустолли, 6) палеустолли и 7) вермустолли (см.).

2537. УСТОРТЕНТ //ustorthent //ustorthent //Ustorthent (от лат. ustus - обожженный, греч. orthos - настоящий и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортентов (см.), которые: 1) имеют почвенную температуру выше, чем криортенты (см.); 2) обычно влажные, но пересыхают на 3 кумулятивных месяца или более в большинство лет в некоторых подгоризонтах между 18 и 50 см или выше контакта с плотной породой, но не постоянно сухие на этих глубинах во всей массе почвы в продолжение 2 последовательных месяцев более чем 7 лет из 10, если только среднегодовая почвенная температура не 22°С или выше или разница между среднелетней и среднезимней температурой на глубине 50 см или на контакте с плотной породой не более 5°С. В пределах этой группы выделяются 6 подгрупп: 1) типичные устортенты (typic), 2) гидроморфные устортенты (aquic), 3) дурипэновые устортенты (durorthidic), 4) маломощные устортенты (lithic), 5) вермику-

лярные устортенты (vermic) и 6) трещиноватые устортенты (vertic).

2538. УСТОХРЕ́ПТ //ustochrept //ustochrept //Ustochrept (от лат. ustus - обожженный, греч. ochros - светлый и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы охрептов (см.), которые: 1) пересыхают на 3 кумулятивных месяца или более большинство лет в слое от 18 до 50 см или выше контакта с плотной породой, но не постоянно сухие во всей части почвы между этими глубинами столь долго как 2 последовательных месяца более 7 из 10 лет, если только среднегодовая температура почвы не выше 22°С; 2) не имеют фраджипэна[x)] или дурипэна[x)] в пределах 1 м от поверхности; 3) имеют среднегодовую температуру почвы выше 8°С, а среднелетнюю температуру на 50 см или на контакте с плотной породой выше 15°С, если распаханы или не имеют A_0 или выше 8°С, если нет A_0. В пределах этой группы выделяются 6 подгрупп: 1) типичные (typic), 2) флювентные (fluventic), 3) маломощные (lithic), 4) маломощно-трещиноватые (lithic-vertic), 5) рендоллевые (rendollic) и 6) трещиноватые (vertic) устохрепты.

2539. УСТРОПЕ́ПТ //ustropept //ustropept //Ustropept (от лат. ustus - обожженный, греч. tropikos - круг поворота и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы тропептов (см.), которые: 1) имеют насыщенность основаниями более 50% в верхнем и камбиевом[x)] горизонтах и 2) либо пересыхают минимум на три кумулятивных месяца большинство лет в каком-нибудь горизонте, либо имеют горизонт мягкой порошковатой вторичной извести в пределах 1,5 м от поверхности. В пределах этой группы выделяются 9 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные флювентные (aquic fluventic), 3) флювентные (fluventic), 4) флювентные окисные (fluventic oxic), 5) маломощные (lithic), 6) маломощные окисные (lithic oxic), 7) маломощные трещиноватые (lithic vertic), 8) окисные (oxic) и 9) трещиноватые (vertic) устропепты.

2540. УСТУ́ЛЬТ //ustult //ustult //Ustult (от лат. ustus - обожженный и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка ультисолей (см.), которые: 1) никогда не насыщены водой и имеют более красную и

яркую окраску, чем аквульты (см.); 2) пересыхают более чем на 3 месяца в сумме большинство лет в каких-либо подгоризонтах между 18 и 50 см или до контакта с породой, если он ближе, но не постоянно сухие во всех частях почвы на этой глубине столь долго как два месяца подряд, если только среднегодовая температура почвы не выше 22°С либо разница между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с породой, если он ближе, не менее 5°С; 3) имеют менее 1,5% органического в-ва в верхних 15 см аргиллового[x)] горизонта, исключая $A_{пах}$; 4) имеют менее 20 кг/м^2 органического в-ва в метровом слое ниже основания A_0 или минеральной поверхности. В пределах этого подпорядка выделяются 5 больших почвенных групп: 1) гаплустульты, 2) палеустульты, 3) плинтустульты, 4) родустульты и 5) тропустульты.

2541. ФАЙОЗЁМ //phaeozem //phaeozem //Phaeosem (от греч.phaeos - серый, темный и русск. земля) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв чернозёмовидного облика с поверхностным моллевым[x)] горизонтом, но без аккумуляции мягкой порошковидной извести в профиле и не обнаруживающих увеличения обменных Na и K с глубиной до 125 см от поверхности или в пределах 50 см от основания горизонта B.

2542. ФАЙОЗЁМ ГЛЕЕВЫЙ //gleyic phaeozem //phaeozem gleyique //gleyischer Phaeosem (от греч.phaeos - серый, темный, русск.земля и глей) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для файозёмов (см.), имеющих моллевый[x)] и аргиллювый[x)] горизонты, не имеющих горизонта аккумуляции мягкой порошковатой извести, не обнаруживающих увеличения обменных Na и K с глубиной до 125 см от поверхности или в пределах 50 см от основания горизонта B, имеющих глеевый[x)] горизонт или обнаруживающих признаки переувлажнения в некоторый период года; степень насыщенности основаниями в горизонте B, по крайней мере в его нижней части, превышает 35%.

2543. ФАЙОЗЁМ КАРБОНАТНЫЙ //calcaric phaeozem //phaeozem calcaire //kalkarischer Phaeosem (от греч.phaeos - серый, тёмный, русск. земля и лат.calxic - известь) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для файозёмов (см.), имеющих в профиле моллевый[x)] и камбиевый[x)] горизонты и карбонатных (по вскипанию) с поверхности без образования специфического горизонта аккумуляции мягкой порошковатой извести.

2544. ФАЙОЗЁМ ЛЮВИКОВЫЙ //luvic phaeozem //phaeozem luvique //luvischer Phaeosem (от греч.phaeos - серый, тёмный, русск. земля и лат.luo - вымывать) - термин легенды к повенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для файозёмов (см.), имеющих в профиле аргилловый[x)] горизонт непосредственно под моллевым[x)] горизонтом, не имеющих горизонта аккумуляции мягкой порошковатои извести и не обнаруживающих увеличения обменных Na и K с глубиной до 125 см от поверхности или в пределах 50 см от основания горизонта B; степень насыщенности основаниями в горизонте B, по крайней мере, в его нижней части, превышает 35%.

2545. ФАЙОЗЁМ НОРМАЛЬНЫЙ //haplic phaeozem //phaeozem haplique // haplischer Phaeosem (от греч.phaeos - серый, тёмный, русск. земля и греч.haplous - простой, обычный) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для файозёмов (см.), имеющих в профиле моллевый[x)] и, возможно, камбиевый[x)] горизонты и характеризующихся отсутствием аккумуляции мягкой порошковатои извести.

2546. ФЕРРАЛЛИТ //ferrallit //ferrallit //Ferrallit (от лат.ferrum - железо, aluminium - алюминий и греч.lithos - камень) - сборный термин, распространенных в западно-европейских школах, для почв и кор выветривания, формирующихся в условиях промывного водного режима при выносе оснований и кремнекислоты, в результате чего остаточный продукт относительно обогащается железом и алюминием с образованием вторичных глинистых минералов группы гидратов окислов железа и алюминия и каолинита.

2547. ФЕРРАЛЛИТНАЯ ПОЧВА//ferrallitic soil //sol ferrallitique // ferrallitischer Boden - термин Робинзона, широко распространенный в литературе для почв, формирующихся на ферраллитных корах выветривания и имеющих в своем составе значительную остаточную аккумуляцию соединений железа и алюминия (при преобладании последнего) вследствие выноса оснований и кремнезёма; такие почвы характерны для элювиальных ландшафтов влажных тропиков и субтропиков. Во французской школе (1967) термин относится к классу почв, характеризующихся полной выветрелостью первичных минералов, за исключением наиболее устойчивых (ильменит, циркон); наличием остаточного кварца; выносом большей части щелочеи и щелочных земель и значительной части кремния; усиленным вторичным минералообразованием с синтезом као-

линита, гидроокисей алюминия и железа; незначительной емкостью катионного обмена; малой степенью насыщенности основаниями; кислой реакцией. Син.: латосоль, латеритная почва, хромосоль, ферральсоль, оксисоль.

2548. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ ГЛЕ́ЕВАЯ ПО́ЧВА //gley ferrallitic soil //sol ferrallitique à gley //gleyischer Ferrallitboden - термин для полугидроморфных и гидроморфных ферраллитных почв влажнотропических лесов, формирующихся при близком уровне грунтовых вод и имеющих признаки оглеения в нижней части профиля и обычно латеритный слой из слабо сцементированных железистых конкреций.

2549. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ ЛЕССИВИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //lessive ferrallitic soil //sol ferrallitique lessivé //lessive ferrallitischer Boden - термин франц.шк. (1967) для группы ферраллитных сильно ненасыщенных почв (см.), имеющих текстурный горизонт В с индексом лессивирования более 1,4, содержащий натёки ориентированных глин по граням агрегатов, каналам и порам; органическое вещество обычно слабо или средне гумифицированное, часто образует комплексы с окислами металлов; в этой группе выделяют подгруппы почв: 1) нормальных, 2) оподзоленных (грубогумусные, с очень светлым горизонтом A_2 зольного цвета), 3) уплотненных и 4) гидроморфных.

2550. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ ПСЕ́ВДОПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //pseudopodzolic ferrallitic soil //sol ferrallitique pseudopodzolique //pseudopodsolischer Ferrallitboden - термин С.В.Зонна для ферраллитных почв тропиков с дифференцированным по илу (а иногда и по R_2O_3 профилем.

2551. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СИ́ЛЬНО НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА //strongly unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallitique fortement désaturé // stark ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц.шк. (1967) для подкласса ферраллитных почв (см.), имеющих в горизонте В около 1 мэкв/100 г почвы обменных оснований, степень насыщенности основаниями менее 20%, мощный в целом профиль, pH ниже 5,5, pH горизонта А ниже, чем pH гор.В.

2552. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СИ́ЛЬНО НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //humic strongly unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallitique fortement désaturé humifère //humus stark ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц.шк. (1967) для группы фер-

раллитных сильно ненасыщенных почв (см.), содержащих до 7% гумуса в верхнем 20-см слое или более 1% в метровом слое; в пределах этой группы выделяют две подгруппы почв: 1) нормальных и 2) сильно кислых темно-бурых гиббситовых.

2553. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СИ́ЛЬНО НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ МЕТАМОРФИЗИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // reworked strongly unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallitique fortement désaturé remanié //aufarbeiten stark ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц.шк. (1967) для группы ферраллитных сильно ненасыщенных почв (см.), у которых горизонт А представлен слабо сортированным по механическому составу материалом по сравнению с горизонтом В, а в основании горизонта А или реже в горизонте В встречается галька и гравий; в пределах этой группы выделяют подгруппы почв: 1) нормальных, 2) желтых, 3) гидроморфных и 4) слабо омоложенных.

2554. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СИ́ЛЬНО НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ОБЕДНЁННАЯ ПО́ЧВА //impoverished strongly unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallitique fortement désaturé appauvri //verarmter stark ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц.шк. (1967) для группы ферраллитных сильно ненасыщенных почв (см.), у которых горизонт А обеднен глиной по сравнению с горизонтом В, который ещё не является настоящим глинистоаккумулятивным горизонтом; в пределах этой группы выделяют подгруппы почв: 1) нормальных, 2) желтых, 3) уплотненных, 4) гидроморфных и 5) слабо метаморфизированных.

2555. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СИ́ЛЬНО НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ОМОЛО́ЖЕННАЯ ПО́ЧВА //rejuvenated strongly unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallitique fortement désaturé rajeuni ou pénévolué //erneurner stark ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц.шк.(1967) для группы ферраллитных сильно ненасыщенных почв (см.), имеющих все признаки данного подкласса, но слишком богатых выветриваемыми минералами, особенно вследствие эрозионных процессов.

2556. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СИ́ЛЬНО НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical strongly unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallitique fortement désaturé typique //typischer stark ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц.шк. (1967) для группы ферраллитных сильно ненасыщенных почв (см.), имеющих однообразный механический состав по всему профилю и небольшую сте-

пень гумусированности; в пределах этой группы выделяют подгруппы почв: 1) нормальных, 2) желтых, 3) уплотненных, 4) гидроморфных, 5) слабо омоложенных, 6) слабо обедненных и 7) гумусовых.

2557. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СЛА́БО НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА //slightly unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallitique faiblement désaturé // schwach ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц. шк. (1967) для подкласса ферраллитных почв (см.), имеющих в горизонте В сумму обменных оснований 2-8 мэкв/100 г почвы, степень насыщенности основаниями 40-80% и pH 5,5-6,5.

2558. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СЛА́БО НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ МЕТАМОРФИЗИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // reworked slightly unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallitique faiblement désaturé remanié //aufarheiten schwach ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц.шк.(1967) для группы ферраллитных слабо ненасыщенных почв (см.), у которых горизонт А представлен слабо сортированным по механическому составу материалом по сравнению с горизонтом В, а в основании горизонта А или реже в горизонте В встречается галька и гравий; в пределах данной группы выделяют подгруппы почв: 1) нормальных, 2) уплотненных (с панцырем в горизонте В), 3) гидроморфных (с глеевым или псевдоглеевым горизонтом в нижней части А или в верхней части В), 4) слабо омоложенных (несколько обогащенных выветриваемыми минералами) и 5) элювированных (имеющих на границе между горизонтами А и В сильно обогащенный крупным песком, гравием или конкрециями слой).

2559. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СЛА́БО НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ОБЕДНЁННАЯ ПО́ЧВА //impoverished slightly unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallitique faiblement désaturé appauvri// verarmter schwach ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц.шк. (1967) для группы ферраллитных слабо ненасыщенных почв (см.), у которых горизонт А обеднён глиной по сравнению с горизонтом В, который еще не является настоящим глинистоаккумулятивным горизонтом; в пределах данной группы выделяются подгруппы почв: 1) нормальных, 2) уплотненных (с панцырем в горизонте В), 3) гидроморфных (с глеевым или псевдоглеевым горизонтом в нижней части А или в верхней части В) и 4) метаморфизированных (с сильным обеднением глиной и опесчаниванием горизонта А).

2560. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СЛА́БО НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ОМОЛО́ЖЕННАЯ ПО́ЧВА //rejuvena-

ted slightly unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallitique faiblement désaturé rajeuni ou pénévolué//erneuerner schwach ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц.шк. (1967) для группы ферраллитных слабо ненасыщенных почв (см.), имеющих все признаки данного подкласса, но слишком богатых выветриваемыми минералами, особенно вследствие эрозионных процессов.

2561. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СЛА́БО НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical slightly unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallitique faiblement désaturé typique //typischer schwach ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц.шк. (1967) для группы ферраллитных слабо ненасыщенных почв (см.), имеющих однообразный механический состав по всему профилю и небольшую гумусированность; в пределах данной группы выделяются подгруппы почв: 1) нормальных, 2) уплотненных (с панцырем в горизонте В), 3) гидроморфных (с глеевым или псевдоглеевым горизонтом в нижней части А или в верхней части В), 4) омоложенные (относительно обогащенные выветриваемыми минералами) и 5) гумусовые (содержащие более 3% гумуса).

2562. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СРЕ́ДНЕ НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ПО́ЧВА //moderately unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallitique moyennement désaturé //mittel ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц. шк. (1967) для подкласса ферраллитных почв (см.), имеющих в горизонте В сумму обменных оснований 1-3 мэкв/100 г почвы, степень насыщенности основаниями 20-40% и pH 4,5-6.

2563. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СРЕ́ДНЕ НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //humic moderately unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallitique moyennment désaturé humifère //humus mittel ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц.шк. (1967) для группы ферраллитных средне ненасыщенных почв (см.), содержащих в среднем до 7% гумуса в 20-см верхнем слое или более 1% в среднем в метровом слое, бедных аллофанами даже при образовании на вулканических породах, имеющих комковатую или зернистую структуру в гумусовом горизонте; в пределах этой группы выделяют три подгруппы почв: 1) с контрастным гумусовым горизонтом (резко отличающимся от красного или буро-красного горизонта В), 2) с глубоким гумусовым горизонтом (мощным и постепенно сменяемым нижеследующим) и 3) омоложенных (в частности эоловыми отложениями), обогащенных выветриваемыми минералами.

2564. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СРЕ́ДНЕ НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ МЕТАМОРФИЗИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА // reworked moderately unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallitique moyennment désaturé remanié //aufarbeiten mittel ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц.шк. (1967) для группы ферраллитных средне ненасыщенных почв (см.), у которых горизонт А представлен слабо сортированным по механическому составу материалом по сравнению с горизонтом В, а в основании горизонта А или реже в горизонте В встречается галька и гравий; в пределах этой группы выделяют подгруппы почв: 1) нормальных, 2) желтых, 3) уплотненных, 4) гидроморфных, 5) слабо омоложенных и 6) элювиированных.

2565. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СРЕ́ДНЕ НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ОБЕДНЁННАЯ ПО́ЧВА //impoverished moderately unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallitique moyennment désaturé appauvri //verarmter mittel ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц.шк. (1967) для группы ферраллитных средне ненасыщенных почв (см.), у которых горизонт А обеднен глиной по сравнению с горизонтом В, который еще не является настоящим глинистоаккумулятивным горизонтом; в пределах этой группы выделяются подгруппы почв: 1) нормальных, 2) желтых, 3) уплотненных, 4) гидроморфных, 5) слабо метаморфизованных.

2566. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СРЕ́ДНЕ НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ОМОЛО́ЖЕННАЯ ПО́ЧВА //rejuvenated moderately unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallique moyennment désaturé rajeuni ou pénévolué //erneuerner mittel ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц. шк. (1967) для группы ферраллитных средне ненасыщенных почв (см.), имеющих все признаки данного подкласса, но слишком богатых выветриваемыми минералами, особенно вследствие эрозионных процессов.

2567. ФЕРРАЛЛИ́ТНАЯ СРЕ́ДНЕ НЕНАСЫ́ЩЕННАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical moderately unsaturated ferrallitic soil //sol ferrallitique moyennment désaturé typique //typischer mittel ungesättigter ferrallitischer Boden - термин франц.шк. (1967) для группы ферраллитных средне ненасыщенных почв (см.), имеющих однообразный механический состав по всему профилю и небольшую гумусированность; в пределах этой группы выделяют подгруппы почв: 1) нормальных, 2) желтых, 3) уплотненных, 4) гидроморфных, 5) слабо омоложенных, 6) слабо обедненных, 7) гумусовых.

2568. ФЕРРА́ЛЬСО́ЛЬ //ferralsol //ferralsol //Ferralsol (от лат.fer-

rum - железо, aluminium - алюминий и лат. solum - почва) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв тропиков, имеющих высокое содержание полуторных окислов в глинистой фракции, то-есть имеющих в профиле окисный[x)] горизонт В и обычно окрашенных в яркие желтые или красные тона.

2569. ФЕРРА́ЛЬСОЛЬ ГУ́МУСОВАЯ //humic ferralsol //ferralsol humique //humus Ferralsol (от лат. humus - перегной, гумус) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих окисный[x)] горизонт В с относительно высоким содержанием гумуса (почва имеет в профиле средневзвешенное содержание гумуса более 1,35% до глубины 100 см) и не имеющих плинтитового[x)] горизонта в пределах 125 см от поверхности.

2570. ФЕРРА́ЛЬСОЛЬ ЖЕ́ЛТАЯ //xantic ferralsol //ferralsol xantique //xantischer Ferralsol (от гр. xantos - желтый) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих желтый до светло-желтого окисный[x)] горизонт В, в бо́льшей части которого отношение SiO_2/Fe_2O_3 более 13 и степень насыщенности основаниями менее 35%; плинтитового[x)] горизонта нет в пределах 125 см от поверхности.

2571. ФЕРРА́ЛЬСОЛЬ КИ́СЛАЯ //acric ferralsol //ferralsol acrique //akrischer Ferralsol (от лат. acric - очень кислый) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих окисный[x)] горизонт В с очень низкой, порядка нескольких мэкв (до 10) на 100 г глины ёмкостью поглощения и не имеющих плинтитового[x)] горизонта в пределах 125 см от поверхности.

2572. ФЕРРА́ЛЬСОЛЬ КРА́СНАЯ //rhodic ferralsol //ferralsol rhodique //rhodischer Ferralsol (от гр. rhodon - темнокрасная роза) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих красный до темно-красного окисный[x)] горизонт В и не имеющих плинтитового[x)] горизонта в пределах 125 см от поверхности.

2573. ФЕРРА́ЛЬСОЛЬ ЛАТЕРИ́ТНАЯ //lateritic ferralsol //ferralsol lateritique //lateritischer Ferralsol - иногда встречающийся в современной литературе термин для красных и красно-желтых ферраллитных почв, имеющих в профиле слой железистых конкреций (латеритный слой).

2574. ФЕРРА́ЛЬСОЛЬ ПЛИНТИ́ТОВАЯ //plinthic ferralsol //ferralsol plinthique //plinthischer Ferralsol (от гр. plinthos - кирпич) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих в профиле

окисный[x] горизонт В и/или плинтитовый[x] горизонт в пределах 125 см от поверхности и, возможно, признаки избыточного периодического увлажнения.

2575. ФЕРРА́ЛЬСОЛЬ ТИПИ́ЧНАЯ //orthic ferralsol //ferralsol orthique //orthischer Ferralsol (от гр. orthos - настоящий) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих желтый до желтовато-красного окисный[x] горизонт В, в котором отношение SiO_2/Fe_2O_3 менее 13 и степень насыщенности основаниями менее 35% по крайней мере в некоторых подгоризонтах; плинтитового[x] горизонта нет в пределах 125 см от поверхности.

2576. ФЕРРО́Д //ferrod //ferrod //Ferrod (от лат. ferrum - железо и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка сподосолей (см.) и единственной в этом подпорядке большой почвенной группы сподосолей, которые: 1) имеют во всех подгоризонтах сподового[x] горизонта отношение процента свободного железа (Fe) к проценту углерода более 6 и 2) никогда не насыщены водой или не имеют признаков переувлажнения, описанных для акводов (см.). В пределах этой большой почвенной группы выделяются три подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) альфовые (alfic) и 3) гидроморфные (aquic) ферроды.

2577. ФЕРРОЗЁМ //ferrozem //ferrozem //Ferrosem (от лат. ferrum - железо и русск. земля) - термин М.А.Глазовской (1972) для семейства ожелезненных почв с дифференцированным профилем, включающего красные сиаллитно-ферритные почвы саванн и сухих тропических редколесий; син.: красная сиаллитно-ферраллитная п., железистая тропическая п.

2578. ФЕ́РРУДА́ЛЬФ //ferrudalf //ferrudalf //Ferrudalf (от лат. ferrum - железо, лат. udus - влажный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удальфов (см.), которые: 1) не имеют антропового[x] горизонта в профиле; 2) не имеют натриевого[x] горизонта или фраджипэна[x]; 3) не имеют сплошного белёсого горизонта над аргилловым[x]; 4) имеют прерывистую верхнюю границу аргиллового горизонта; 5) имеют в аргилловом горизонте отдельные конкреции размером от 2,5-5 до 30 см, которые во внешних частях более обогащены железом, сильнее уплотнены и ярче окрашены, чем во внутренних; 6) имеют разницу между среднелетней и среднезимней температурами на 50 см или на контакте с породой,

если он ближе, более 5°С. Обычно это песчаные почвы, а аргиллювый горизонт состоит из железистых конкреции, сгруппированных в разорванные прослойки.

2579. ФЕ́РСИАЛЛИ́Т //fersiallit //fersiallit //Fersiallit (от лат. ferrum - железо, silicium - кремний, aluminium - алюминий и греч. lithos - камень) - термин, широко распространенный особенно в западно-европейских школах, для почв и кор выветривания, характеризующихся относительной или абсолютной аккумуляцией железа (ожелезнение) на фоне общего процесса сиаллитизации, т.е. для сиаллитных материалов, обогащенных железом.

2580. ФЕ́РСИАЛЛИ́ТНАЯ ПО́ЧВА //fersiallitic soil //sol fersiallitique //Fersiallitboden (от лат.ferrum - железо, silicium -кремний, aluminium - алюминий и греч.lithos - камень) - термин франц.шк. (1965,1967) для подкласса железосодержащих почв, в которых окиси железа аккумулируются вместе с глиной и равномерно распределяются по профилю, имеющих яркую красноватую окраску в горизонте В, выщелоченных от карбонатов в горизонтах А и В, но часто с карбонатной аккумуляцией в С, имеющих преимущественно иллитную илистую фракцию и высокую насыщенностью основаниями (от 65 до 100%).

2581. ФЕ́РСИАЛЛИ́ТНАЯ БЕСКА́ЛЬЦИЕВАЯ ПО́ЧВА //non-calcic fersiallitic soil //sol fersiallitique non-calcique //kalkfreier Fersiallitboden - термин франц.шк. (1967) для группы ферсиаллитных почв (см.), имеющих профиль АВС, не имеющих достаточного запаса щелочных земель для компенсации выноса, несколько ненасыщенных основаниями, имеющих ясно выраженный горизонт A_2, индекс лессивирования менее 1,4.

2582. ФЕ́РСИАЛЛИ́ТНАЯ КА́ЛЬЦИЕВАЯ ПО́ЧВА //calcic fersiallitic soil // sol fersiallitique calcique //Kalkfersiallitboden - термин франц.шк. (1967) для группы ферсиаллитных почв (см.), имеющих профиль А(В)С с большим резервом щелочных земель в форме карбонатов или силикатов, способным компенсировать вынос и содержащемся в мелкозёме всего профиля или на небольшой глубине в горизонте C_{ca}; степень насыщенности в горизонте (В) около 100%, pH от 7 до 7,5; индекс лессивирования выше 1,4.

2583. ФЕ́РСИАЛЛИ́ТНАЯ КА́ЛЬЦИЕВАЯ БУ́РАЯ ПО́ЧВА //brown calcic fersiallitic soil //sol fersiallitique calcique brun //braun Kalk-

fersiallitboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы ферсиаллитных кальциевых почв (см.), не имеющих карбонатного горизонта, признаков оглеения и трещиноватости.

2584. ФЕ́РСИАЛЛИ́ТНАЯ КА́ЛЬЦИЕВАЯ ГИ́ДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //hydromorphic calcic fersiallitic soil //sol fersiallitique calcique à caractére d'hydromorphie //hydromorphischer Kalkfersiallitboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы ферсиаллитных кальциевых почв (см.), имеющих пятна оглеения в горизонте (B).

2585. ФЕ́РСИАЛЛИ́ТНАЯ КА́ЛЬЦИЕВАЯ ОКАРБОНА́ЧЕННАЯ ПО́ЧВА //carbonated calcic fersiallitic soil //sol fersiallitique calcique recalcifié //kalkischer Kalkfersiallitboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы ферсиаллитных кальциевых почв (см.), характеризующихся вторичной аккумуляцией карбонатов.

2586. ФЕ́РСИАЛЛИ́ТНАЯ КА́ЛЬЦИЕВАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //typical calcic fersiallitic soil //sol fersiallitique calcique modal //typischer Kalkfersiallitboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы ферсиаллитных кальциевых почв (см.), имеющих карбонатный горизонт C_{Ca} в нижней части профиля.

2587. ФЕ́РСИАЛЛИ́ТНАЯ КА́ЛЬЦИЕВАЯ ТРЕЩИНОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //vertic calcic fersiallitic soil //sol fersiallitique calcique à caractère vertique //vertischer Kalkfersiallitboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы ферсиаллитных кальциевых почв (см.), имеющих крупную структуру в нижней части профиля и трещиноватость.

2588. ФЕ́Х //fech //fech //Fech - распространенное в некоторых североафриканских странах местное название глинисто-каменисто-песчаных пустынь.

2589. ФИБРИСО́ЛЬ //fibrisol //fibrisol //Fibrisol (от гр.fibra - ткань и лат.solum - почва) - термин канадской школы (1968) для большой группы почв, входящей в порядок органических почв (см.), средняя треть профиля которых (от 60 до 120 см) преимущественно торфяного характера, т.е. состоит из растительных остатков различимого строения, либо для почв, верхняя (0-60 см) и средняя (60-120 см) трети которых носят преимущественно торфяной характер при наличии земляного, породного, водного или мерзлотного контактов в средней трети.

2590. ФИБРИСО́ЛЬ ВО́ДНАЯ //hydric fibrisol //fibrisol hydrique //hydrischer Fibrisol (от гр.hýdor - вода) - термин канадской

школы (1968) для фибрисолей (см.), имеющих слой воды ниже 40 см вплоть до 160 см и глубже.

2591. ФИБРИСОЛЬ ГИПНОВАЯ //hypno-fibrisol //hypno-fibrisol //hypno-Fibrisol (от лат. hypnum - зеленый мох) - термин канадской школы (1968) для фибрисолей (см.), имеющих однородный торфяной материал, происходящий преимущественно из гипновых мхов, в пределах нижней и средней третей (60-160 см) профиля.

2592. ФИБРИСОЛЬ ГУМУСОВАЯ //humic fibrisol //fibrisol humique // humus Fibrisol (от лат. humus - гумус, перегной) - термин канадской школы (1968) для фибрисолей (см.), имеющих торфянистую среднюю треть профиля (60-120 см) и гумифицированный слой в остальной части органического профиля.

2593. ФИБРИСОЛЬ ЗЕМЛИСТАЯ //terric fibrisol //fibrisol terrique // terrischer Fibrisol (от лат. terrae - земля) - термин канадской школы (1968) для фибрисолей (см.), имеющих землистый слой (с содержанием органического вещества менее 30%) в пределах от 60 до 160 см от поверхности.

2594. ФИБРИСОЛЬ КРИОГЕННАЯ //cryic fibrisol //fibrisol cryique // kryischer Fibrisol (от гр. cryos - холод) - термин канадской школы (1968) для фибрисолей (см.), имеющих слой многолетней мерзлоты в пределах 160 см от поверхности.

2595. ФИБРИСОЛЬ КУМУЛЯТИВНАЯ //cumulo fibrisol //fibrisol cumulique //kumulischer Fibrisol (от лат. accumulatio - накопление) - термин канадской школы (1968) для фибрисолей (см.), имеющих наносный (аллювиальный) слой или несколько прослоек толщиной от 5 до 30 см под верхней третью (0-60 см) профиля.

2596. ФИБРИСОЛЬ ОЗЁРНАЯ //limno fibrisol //fibrisol limnique //limnischer Fibrisol (от гр. limne - озеро) - термин канадской школы (1968) для фибрисолей (см.), имеющих озёрный торф под верхней третью (0-60 см) профиля.

2597. ФИБРИСОЛЬ ПЕРЕХОДНАЯ //mesic fibrisol //fibrisol mesique // mesischer Fibrisol (от гр. mésos - средний) - термин канадской школы (1968) для фибрисолей (см.), имеющих торфянистую среднюю треть (60-120 см) и переходный полуторфянистый слой в остальной части органического профиля.

2598. ФИБРИСОЛЬ СКАЛЬНАЯ //lithic fibrisol //fibrisol lithique // lithischer Fibrisol (от гр. lithos - камень) - термин канадской школы (1968) для фибрисолей (см.), имеющих плотную поро-

ду в пределах от 10 до 160 см от поверхности.

2599. ФИБРИСО́ЛЬ СФА́ГНОВАЯ //sphagno-fibrisol //sphagno-fibrisol // sphagno-Fibrisol (от лат.sphagnum - белый мох) - термин канадской школы (1968) для фибрисолей (см.), имеющих однородный торфяной материал, происходящий преимущественно из сфагновых мхов, в пределах нижней и средней третей (60-160 см) профиля.

2600. ФИБРИСО́ЛЬ ФЕ́ННОВАЯ //fenno-fibrisol //fenno-fibrisol //fenno-Fibrisol (от англ.fen - низинное болото) - термин канадской школы (1968) для фибрисолей (см.), имеющих однородный торфяной материал, происходящий преимущественно из рогоза, тростника или осок, в пределах нижней и средней третей профиля (60-160 см) профиля.

2601. ФИБРИ́СТ //fibrist //fibrist //Fibrist (от лат.fibra - волокно и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка гистосолей (см.), которые: 1) имеют в верхней части профиля столь слабо разложенный торф, что отдельные растительные остатки не разрушаются при растирании и могут быть легко определены; преимущественно это сфагновый торф; среди этого подпорядка выделяется 6 больших почвенных групп: 1) сфагнофибрист, 2) криофибрист, 3) борофибрист, 4) тропофибрист, 5) медифибрист и 6) ловифибрист.

2602. ФИЗИ́ЧЕСКИ-СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //physically solonetzic soil // sol solonetzoïde physical //physikalischer solonetzartiger Boden - см. Остаточносолонцеватая п.

2603. ФИ́РКИ //firki //firki //Firki - местное название тёмных слитых трещиноватых глинистых почв типа вертисолей, распространенное в Нигерии.

2604. ФЛЮВАКВЕ́НТ //fluvaquent //fluvaquent //Fluvaquent (от лат. fluvius - река, лат.aqua - вода и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквентов (см.), которые: 1) имеют среднегодовую температуру почвы выше 8°С; 2) содержат менее 8% глины во всех или некоторых подгоризонтах на глубине 20-50 см; 3) имеют мех.состав тяжелее супеси во всех или некоторых подгоризонтах ниже $A_{пах}$ или ниже 25 см, но выше 1 м; 4) имеют нерегулярное снижение органического углерода с глубиной ниже 25 см; 5) не содержат сульфидов в пределах 50 см от поверхности;

в пределах этой большой почвенной группы выделяются 9 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) аэральные (aeric), 3) аэральные тропические (aeric tropic), 4) моллевые (mollic), 5) сернистые (sulfic), 6) погребенно-торфянистые (tapto-hystic), 7) погребенно-торфянистые тропические (tapto-hystic tropic), 8) тропические (tropic) и 9) трещиноватые (vertic) флюваквенты.

2605. ФЛЮВЕ́НТ //fluvent //fluvent //Fluvent (от лат. fluvius - река и порядкового корня ent для энтисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка энтисолей (см.), которые: 1) имеют мех.состав тяжелее супеси в каком-либо горизонте ниже пахотного или 25 см (что ниже), но выше 1 м или контакта с плотной породой на глубине от 50 см до 1 м; 2) не имеют фрагментов диагностических горизонтов, которые могли бы быть идентифицированы и залегали бы без видимого порядка в профиле под пахотным слоем; 3) формируются при уклонах менее 25%; 4) имеют неравномерное уменьшение содержания органического вещества с глубиной или оно остается выше 0,35% до глубины 125 см или до глубины 25 см ниже верхней границы любого слоя, который остаётся мёрзлым через два месяца после летнего потепления; тонкие прослои песка могут содержать меньше органического вещества, если более тяжелые слои на 125 см или ниже имеют более 0,35%; 5) не насыщены постоянно водой и не имеют характеристик переувлажнения, описанных для аквентов (см.); имеют среднегодовую температуру почвы более 0^{o}C. В пределах этого подпорядка выделяются 6 больших почвенных групп: 1) криофлювенты, 2) торрифлювенты, 3) тропофлювенты, 4) удифлювенты, 5) устифлювенты и 6) ксерофлювенты (см.).

2606. ФЛЮВИСО́ЛЬ //fluvisol //fluvisol //Fluvisol (от лат. fluvius - река и лат. solum - почва) - термин легенды почвенной карты Мира ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, развитых на современных аллювиальных отложениях речных долин и приморских низменностей, не имеющих диагностических горизонтов за исключением светло-го[x)] горизонта А и, возможно, глеевого[x)], что отделяет их от иных почв формирующихся на современном аллювии в речных долинах.

2607. ФЛЮВИСО́ЛЬ БЕ́ДНАЯ //dystric fluvisol //fluvisol dystrique //dystrischer Fluvisol (от лат. fluvius - река, лат. solum - почва и греч. dystrophe - отсутствие питания) - термин леген-

ды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв на современных аллювиальных отложениях, не имеющих диагностических горизонтов за исключением светлого[x)] горизонта А и имеющих pH (KCl) ниже 4,2 в верхней 50-см толще.

2608. ФЛЮВИСОЛЬ БОГАТАЯ //eutric fluvisol //fluvisol eutrique // eutrischer Fluvisol (от лат. fluvius - река, лат. solum - почва и греч. eutrophe - хорошее питание) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв на современных аллювиальных отложениях, не имеющих диагностических горизонтов за исключением светлого[x)] горизонта А и имеющих pH (KCl) 4,2 или выше в верхней 50-см толще.

2609. ФЛЮВИСОЛЬ КАРБОНАТНАЯ //calcaric fluvisol //fluvisol calcaire //kalkarischer Fluvisol (от лат. fluvius - река, лат. solum - почва и лат. calxic - известь) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв на современных аллювиальных карбонатных отложениях, не имеющих диагностических горизонтов за исключением светлого[x)] горизонта А, имеющих pH (KCl) выше 4,2 в верхней 50-см толще и содержащих в этой же толще достаточное количество карбонатов для видимого вскипания при действии 10% HCl.

2610. ФЛЮВИСОЛЬ СЕРНАЯ //thionic fluvisol //fluvisol thionique // thionischer Fluvisol (от лат. fluvius - река, лат. solum - почва и греч. theion - сера) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв на современных аллювиальных отложениях, не имеющих диагностических горизонтов за исключением светлого[x)] горизонта А и глеевого[x)] и содержащих значительное количество соединений серы, дающих нейтральную или слабощелочную реакцию почвы при переувлажнении и кислую - при высыхании и окислении почвы.

2611. ФОЛИСТ //folist //folist //Folist (от лат. folia - листва и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка гистосолей (см.), более или менее свободно дренированных и состоящих только из лежащего на скальной или щебенчатой породе горизонта торфа, образованного из подстилки и ветвей в очень влажном климате; они никогда не насыщены водой более, чем несколько дней после сильного дождя, имеют мощность до породы менее 1 м, не имеют минерального почвенного слоя более 10 см на контакте с породой; в пределах этого подпорядка выделяются 3 большие почвен-

ные группы: 1) криофолисты, 2) борофолисты и 3) тропофолисты.

2612. ФРАГЛОССУДА́ЛЬФ //fraglossudalf //fraglossudalf //Fraglossudalf (от лат.fragilis - хрупкий, греч.glossa - язык, лат. udus - влажный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удальфов (см.), которые имеют фраджипэн[x)] и перекрывающий его аргиллювый[x)] горизонт, обнаруживающий признаки разрушения в виде глубоких белых языков; верхняя граница аргиллового горизонта разорванная, но на ней нет цементации железом; верхний гумусовый горизонт тёмный[x)].

2613. ФРА́ДЖИАКВА́ЛЬФ //fragiaqualf //fragiaqualf //Fragiaqualf (от лат.fragilis - хрупкий, лат.aqua - вода и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквальфов (см.), которые имеют в профиле фраджипэн[x)], но не имеют натриевого[x)] горизонта. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 4 подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) аэральные (aeric), 3) плинтитовые (plinthic) и 4) умбровые (umbric) фраджиаквальфы.

2614. ФРА́ДЖИАКВЕ́ПТ //fragiaquept //fragiaquept //Fragiaquept (от лат.fragilis - хрупкий, лат.aqua - вода и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквептов (см.), которые: 1) имеют фраджипэн[x)], 2) имеют температуру почвы выше криаквептов (см.), 3) имеют менее 15% поглощенного натрия в верхних 50 см или имеют постоянное или возрастающее с глубиной содержание поглощенного натрия глубже 50 см, 4) не имеют сплошного или составляющего более половины матрицы плинтита в пределах 125 см от поверхности. В пределах этой группы выделяются 3 подгруппы: 1) типичные фраджиаквепты (typic), 2) аэральные фраджиаквепты (aeric) и 3) гумусовые фраджиаквепты (humic).

2615. ФРА́ДЖИАКВО́Д //fragiaquod //fragiaquod //Fragiaquod (от лат. fragilis - хрупкий, лат.aqua - вода и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы акводов (см.), которые имеют фраджипэн[x)] под сподовым[x)] горизонтом, но не имеют дурипэна[x)] или слоеватого горизонта выше фраджипэна. В пределах этой большой почвенной группы выделяются две подгруппы: 1) типичные (typic) и 2) криогенные (cryic) фраджиакводы.

2616. ФРА́ДЖИАКВУ́ЛЬТ //fragiaquult //fragiaquult //Fragiaquult (от

лат.fragilis - хрупкий, лат.aqua - вода и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы аквультов (см.), которые имеют фраджипэн[x], но не имеют плинтита[x] в пределах 1,25 м от поверхности. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 3 подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) плинтитовые (plinthic) и 3) плинтитовые влажные (plinthudic) фраджиаквульты.

2617. ФРАДЖИБОРАЛЬФ //fragiboralf //fragiboralf //Fragiboralf (от лат.fragilis - хрупкий, греч.boreas - северный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы боральфов (см.), которые: 1) имеют фраджипэн[x], но не имеют натриевого[x] горизонта; 2) имеют аргиллювый[x] горизонт с верхней границей в пределах 60 см от минеральной поверхности, если только мех.состав не легче супеси во всех подгоризонтах выше аргиллового горизонта. В пределах этой большой почвенной группы выделяются три подгруппы почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic) и 3)фраджиудовые (fragiudic) фраджиборальфы.

2618. ФРАДЖИГУМОД //fragihumod //fragihumod //Fragihumod (от лат. fragilis - хрупкий, лат.humus - гумус и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы гумодов (см.), которые имеют фраджипэн[x] ниже сподового[x] горизонта в профиле.

2619. ФРАДЖИОРТОД //fragiorthod //fragiorthod //Fragiorthod (от лат.fragilis - хрупкий, греч.orthos - настоящий и порядкового корня od для сподосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортодов (см.), которые имеют фраджипэн[x] ниже сподового[x] горизонта и не имеют слоеватого горизонта над или в сподовом. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 8 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) альфовые (alfic), 3) гидроморфные (aquic), 4) гидроморфные энтовые (aquic entic), 5) криогенные (cryic), 6) криогенно-гумусовые (cryohumic), 7) энтовые (entic) и 8) гумусовые (humic) фраджиортоды.

2620. ФРАДЖИОХРЕПТ //fragiochrept //fragiochrept //Fragiochrept (от лат.fragilis - хрупкий, греч.ochros - светлый и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы охрептов (см.), которые: 1) имеют фраджипэн[x] и 2) не имеют дурипэна[x] в пределах 1 м

от поверхности. В пределах этой группы выделяются 3 подгруппы: 1) типичные (typic), 2) вулканические (andic) и 3) гидроморфные (aquic) фраджиохрепты.

2621. ФРА́ДЖИПЭН //fragipan, brittle pan //fragipan, couche dure friable //Fragipan, zerreibbare harte Schicht (от лат. fragilis - хрупкий и англ. pan - плотный слой в почве) - термин американской школы для суглинистых внутрипочвенных прослоев, часто подстилающих горизонт В и характеризующихся низким содержанием гумуса, высоким объемным весом (по сравнению с остальным профилем), видимой цементированностью в сухом состоянии, высокой твердостью, умеренной или слабой хрупкостью глыб или структурных отдельностей, обычно пятнистостью, низкой водопроницаемостью и обилием осветленных плоскостей сдвига, образующих полигоны.

2622. ФРАДЖИПЭНОВАЯ ПО́ЧВА //fragic soil //sol fragique //fragischer Boden (от лат. fragilis- хрупкий и англ. pan - прослойка в почве - термин ФАО/ЮНЕСКО (1968) для почв, содержащих в профиле горизонт фраджипэна (см.) в пределах 100 см от поверхности.

2623. ФРА́ДЖИУДА́ЛЬФ //fragiudalf //fragiudalf //Fragiudalf (от лат. fragilis - хрупкий, лат. udus - влажный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удальфов (см.), которые: 1) имеют в профиле фраджипэн[x)] и 2) не имеют антропового[x)] горизонта. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 9 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) белёсые гидроморфные (albaquic), 3) аквептовые (aqueptic), 4) гидроморфные (aquic), 5) дистрандептовые (dystrandeptic), 6) языковатые (glossic), 7) моллевые (mollic), 8) охрептовые (ochreptic) и 9) умбрептовые (umbreptic) фраджиудальфы.

2624. ФРА́ДЖИУДУ́ЛЬТ //fragiudult //fragiudult //Fragiudult (от лат. fragilis - хрупкий, лат. udus - влажный и порядкового корня ult для ультисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удультов (см.), которые имеют фраджипэн[x)] в или под аргилловым[x)] горизонтом. В пределах этой большой почвенной группы выделяются 7 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) аквептовые (aqueptic), 3) гидроморфные (aquic), 4) песчаные плинтитовые (arenic plinthic), 5) охрептовые (ochreptic), 6) плинтаквептовые (plinthaqueptic) и 7) плинтитовые охрептовые (plinthic ochreptic) фраджиудульты.

2625. ФРА́ДЖИУМБРЕ́ПТ //fragiumbrept //fragiumbrept //Fragiumbrept (от лат.fragilis - хрупкий, лат.umbra - тёмная тень и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы умбрептов (см.), которые имеют фраджипэн[x)] и не имеют антропового[x)] горизонта.

2626. ФРЕАТИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА //phreatic soil //sol phreatique //phreatischer Boden (от гр. phréatos - колодец) - термин ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, формирующихся под влиянием грунтовых вод, капиллярно питающих нижнюю часть почвенного профиля или корневые системы растений, и соответствующий понятию луговости русской школы (как, например, в названиях лугово-каштановая или лугово-черноземная почва).

2627. ФУ́ЛЬВОФЕРРАЛЛИ́Т //fulvoferrallite //fulvoferrallite //Filvoferrallit - термин М.А.Глазовской (1972) для семейства почв, входящих в генерацию кислых оглиненных почв ассоциации субаэральных кислых ульматно-гуматных почв и характеризующихся ферралитизацией минеральной части, кислой реакцией, фульватным гумусом; син.: фульватно-каолинитовая п., ферраллитная п.

2628. ХА́К //hak //hac //Chak (тюркск.) - народный термин, употребляемый в двух значениях: 1) солёная грязь, в которой рапа не обособлена от рассола; 2) грязевая лужа, возникающая на выходах глин из-за скопления атмосферных осадков.

2629. ХАМА́ДА - см. Гамада.

2630. ХА́МРА //hamra //hamrà //Hamra (от еврейск.народного названия) - термин, введенный израильскими почвоведами и распространившийся в некоторых западно-европейских школах, особенно в немецкой, для почв зоны сухих лесов и кустарников средиземноморья, характеризующихся значительным оглинением, аккумуляцией карбонатов в нижней части профиля. Син.: Коричневая почва.

2631. ХАРДПЭ́Н //hardpan //hardpan, horizon compacifié, horizon durci, couche durcie //Hardpan, Verdichtungshorizont (от англ. hard - твердый и pan - твердый прослой) - термин западных школ для внутрипочвенных уплотненных цементированных прослоев различного состава и происхождения.

2632. ХЕМИ́СТ //hemist //hemist //Hemist (от греч.hemi - половина и порядкового корня ist для гистосолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для подпорядка гистосолей (см.), в которых органический материал разложен в такой степени, что бо-

танический состав до двух третей его не может быть легко определён, а ткани легко разрушаются растиранием пальцами; объёмный вес обычно между 0,1 и 0,2 г/см^3; грунтовые воды обычно близ поверхности более 6 месяцев ежегодно и редко опускаются ниже 60 см; в пределах этого подпорядка выделяются 7 больших почвенных групп: 1) сульфохемисты, 2) сульфихемисты, 3) лювихемисты, 4) криохемисты, 5) борохемисты, 6) тропохемисты и 7) медихемисты.

2633. ХЕТУ́ //chetu //hetou //Chetu (от китайск. хету - черная почва) - термин китайск.почвоведов для чернозёмовидных или лугово-чернозёмных почв с длительной сезонной мерзлотой и близкими грунтовыми водами; син.: черноземовидная почва прерий,брюнизём, лугово-чернозёмная почва.

2634. ХО́РТИСОЛЬ //hortisol //hortisol //Hortisol (от англ.horticulture - садоводство) - введенный недавно в западно-европейских школах термин для глубоко измененных культурой почв садов и виноградников. Син.: садовая почва.

2635. ХРО́МОКСЕРЕ́РТ //chromoxerert //chromoxerert //Chromoxerert (от греч.chroma - окраска, греч.xeros - сухой и порядкового корня ert для вертисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ксерертов (см.), которые имеют яркую окраску (не черную) в верхних 30 см более чем в половине каждого разреза. В пределах этой группы выделяются 4 подгруппы: 1) типичные хромоксереры (typic), 2) гидроморфные хромоксереры (aquic), 3) гидроморфные энтовые хромоксереры (aquic entic) и 4) энтовые хромоксереры (entic).

2636. ХРО́МОСО́ЛЬ //chromosol //chromosol, sol vivement coloré // Chromosol, stark farbiger Boden (от греч.chroma - окраска и лат.solum - почва) - термин Денисова для желтых и красных ферраллитных почв тропиков. Син.: ферраллитная почва, латосоль, ферральсоль, оксисоль, латеритная почва.

2637. ХРО́МУДЕ́РТ //chromudert //chromudert //Chromudert (от греч. chroma - окраска, лат.udus - влажный и порядкового корня ert для вертисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы удертов (см.), которые имеют яркую окраску (не черную) в верхних 30 см в более чем половине каждого разреза. Среди этой группы выделяются 4 подгруппы: 1) типичные хромудерты (typic), 2) гидроморфные хромудерты (aquic),

3) гидроморфные энтовые хромудерты (aquic entic) и 4) энтовые хромудерты (entic).

2638. ХРО́МУСТЕ́РТ //chromustert //chromustert //Chromustert (от греч.chroma - окраска, лат.ustus - обожженный и порядкового корня ert для вертисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устертов (см.), которые имеют яркую окраску (не черную) в верхних 30 см в более чем половине каждого разреза. В пределах этой группы выделяются 5 подгрупп: 1) типичные хромустерты (typic), 2) энтовые хромустерты (entic), 3) палеустоллевые хромустерты (paleustollic), 4) влажные хромустерты (udic) и 5) удортентовые хромустерты (udorthentic).

2639. ЦЕЛИ́ННАЯ ПО́ЧВА //virgin soil //sol vierge, sol jeune //Neuland, jungfräulicher Boden - общеупотребительный термин для нераспаханных, но пригодных для земледелия почв, которые никогда не пахались.

2640. ЧЁРНАЯ ПО́ЧВА //black soil //sol noir //schwarz Boden - термин канадской школы (1968) для большой группы степных почв с черноокрашенным гумусовым горизонтом (чернозёмов), входящих в порядок чернозёмных почв (см.).

2641. ЧЁРНАЯ АДО́БЕ ПО́ЧВА //black adobe soil //sol noir adobé// schwarzer Adobeboden - см. Адобе почва.

2642. ЧЁРНАЯ ВУЛКАНИ́ЧЕСКАЯ ПЕ́ПЛОВАЯ ПО́ЧВА //black ash volcanic soil //sol noir volcanique en couches de cendre //schwarz aschen vulkanischer Boden - устаревший термин японских почвоведов для вулканических пепловых почв (см.).

2643. ЧЁРНАЯ ГЛИ́НА //black clay //argile noire //schwarzer Ton - устаревший термин для тёмных слитых трещиноватых глинистых почв, относящихся к вертисолям, ранее использовавшийся в Южной Африке и Австралии.

2644. ЧЁРНАЯ ГЛИ́НИСТАЯ ПО́ЧВА //black clay soil //sol noir argilleux //schwarzer Tonboden - термин немецкой школы для тёмных слитых трещиноватых глинистых почв тропических и субтропических районов. Син.: вертисоль, чёрная тропическая почва, черная хлопковая почва и т.д.

2645. ЧЁРНАЯ ГРУ́МОВАЯ ПО́ЧВА //grumic black soil //sol noir grumique //grumischer schwarz Boden - термин канадской школы (1968) для модификации любой из подгрупп группы степных чер-

ных (чернозёмных) почв, в которых обнаруживается самомульчирование и трещиноватость с поверхности при тяжелом мех.составе.

2646. ЧЁРНАЯ ГУМУСОВАЯ ЗЕМЛЯ́ //black humus earth //sol noir humifère //schwarze Humuserde - устаревшее западно-европейское название чернозёма.

2647. ЧЁРНАЯ ДЕГРАДИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //degraded black soil //sol noir dégradé //degradierter schwarz Boden - устаревший термин канадской школы, сейчас заменённый термином Темно̀серая почва (см.).

2648. ЧЁРНАЯ ДЕРНО́ВАЯ ПО́ЧВА //black turf soil //sol argileux noir de gazon //schwarzer Rasenboden - 1) термин западно-европейских школ для черных сильно гумусированных глинистых дерновых (луговых) почв, обычно имеющих аккумуляцию карбонатов в нижней части профиля. Син.: темноцветная почва; 2) устаревший термин для тёмных слитых трещиноватых глинистых почв типа вертисолеи, использовавшийся в Южной Африке.

2649. ЧЁРНАЯ ЗАСОЛЁННАЯ ПО́ЧВА //black saline soil //sol salin noir //schwarzer Salzboden - термин французской школы для группы почв, переходных между солонцами и солончаками, включая солончак (Обер, 1941). Син.: щелочная почва.

2650. ЧЁРНАЯ ЗЕМЛЯ́ //black earth //terre noire //Schwarzerde - термин, распространенный в бывших французских колониях Африки, а также встречающийся в Австралии, для тёмных слитых глинистых трещиноватых почв. Син.: вертисоль.

2651. ЧЁРНАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //black calcareous soil //sol calcaire noir //Kalksteinschwarzerde - устаревший термин западно-европейских школ для гумусо-карбонатных почв.

2652. ЧЁРНАЯ КАРБОНА́ТНАЯ ПО́ЧВА //calcareous black soil //sol noir calcaire //kalkhaltigerschwarz Boden (от лат. calx - известь) - термин канадской школы (1968) для подгруппы степных черных (чернозёмных) почв, в которых карбонаты обнаруживаются в горизонте В непосредственно под гумусовым горизонтом А.

2653. ЧЁРНАЯ КИ́СЛАЯ ПО́ЧВА ПРЕРИ́Й //black acid prairie soil //sol noir acide de prairie //saure schwarze Wiesenboden - устаревший термин америк.шк. для лугово-чернозёмных почв прерий типа брюниземов.

2654. ЧЁРНАЯ КОМКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //crumbing black soil //sol noir grumeleux //krümeliger Schwarzboden - термин западно-европейских школ для чернозёмовидных почв прерий, имеющих, в отличие от чернозёма, комковатую структуру. Син.: брюнизём.

2655. ЧЁРНАЯ ЛУГОВА́Я ПО́ЧВА //black meadow soil //sol noir de pré // dunkler Aueboden - см. Луговая почва.

2656. ЧЁРНАЯ ОГЛЕ́ЕННАЯ ПО́ЧВА //gleyed black soil //sol noir gleyifié //vergleyter schwarz Boden - термин канадской школы (1968) для модификации любой из подгрупп группы степных черных (чернозёмных) почв, в профиле которых выражены признаки слабого оглеения.

2657. ЧЁРНАЯ ОКАРБОНА́ЧЕННАЯ ПО́ЧВА //carbonated black soil //sol noir calcique //kalkischer schwarz Boden - термин канадской школы (1968) для модификации любой из подгрупп группы степных черных (чернозёмных) почв, вскипающих с поверхности вследствие перепаханности, перерытости или др.причин.

2658. ЧЁРНАЯ ОСОЛОДЁЛАЯ ПО́ЧВА //solodic black soil //sol noir solodique //solodischer schwarz Boden (от русск. солодь) - термин канадской школы (1968) для подгруппы степных черных (чернозёмных) почв, имеющих в профиле явные признаки осолодения (элювиальный горизонт A_2, переходный горизонт AB, призмовидный или глыбистый твердый горизонт B с небольшим содержанием обменного натрия и с ясными тёмными корочками по граням); почвы переходные от черных элювиированных почв к черным солодям (см.).

2659. ЧЁРНАЯ ПЕ́ПЛОВАЯ ПО́ЧВА //black ash soil //sol noir en couches de cendre //schwarz aschen Boden - термин почвоведов Индии для вулканических пепловых почв (см.).

2660. ЧЁРНАЯ РАСТРЕ́СКИВАЮЩАЯСЯ ГЛИ́НА //black cracking clay //argile noire de crevassement //schwarzer Risston, schwarzer Risstonboden, schwarzer Spalterton - устаревший термин для тёмных слитых трещиноватых глинистых почв типа вертисолей, использовавшийся в Уганде и др.странах Африки.

2661. ЧЁРНАЯ РЕ́ГОВАЯ ПО́ЧВА //rego black soil //sol noir regique // regischer schwarz Boden (от гр. rhegos - покров) - термин канадской школы (1968) для подгруппы степных черных (чернозёмных) почв, в которых гумусовый горизонт A лежит непосредственно на горизонте C.

2662. ЧЁРНАЯ СКА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //lithic black soil //sol noir lithique //lithischer schwarz Boden (от гр.lithos - камень) - термин канадской школы (1968) для модификации любой из подгрупп группы степных черных (чернозёмных) почв, в профиле которых наблюдается плотная порода в пределах от 10 до 50 см от поверхности.

2663. ЧЁРНАЯ СОЛОНЦЕВА́ТАЯ ПО́ЧВА //solonetzic black soil //sol noir solonetzique //solonetzartig schwarz Boden (от русск.солонец) - термин канадской школы (1968) для подгруппы черных степных (чернозёмных) солонцеватых почв, в горизонте В которых содержится заметное (но меньшее, чем в солонцах) количество обменного натрия; эти почвы переходные между черными типичными почвами (см.) и черными солонцами (см.).

2664. ЧЁРНАЯ СОЛОНЧАКОВА́ТАЯ ПО́ЧВА //saline black soil //sol noir salin //salzhaltiger schwarz Boden (от русск.солончак) - термин канадской школы (1968) для модификации любой из подгрупп группы степных черных (черноземных) почв, в профиле которых имеются видимые или обнаруживаемые полевой пробой скопления водорастворимых солей.

2665. ЧЁРНАЯ ТИПИ́ЧНАЯ ПО́ЧВА //orthic black soil //sol noir orthique //orthischer schwarz Boden (от гр. orthos - настоящий) - термин канадской школы (1968) для подгруппы степных черных (чернозёмных) почв, в которых гумусовый горизонт подстилается бескарбонатным бурым камбиевым[x)] или слабо выраженным аргиллювым[x)] горизонтом В; почва имеет нейтральную реакцию и призмовидную структуру в горизонте В; горизонт карбонатной аккумуляции лежит между В и С.

2666. ЧЁРНАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ПО́ЧВА //black tropical soil //sol noir tropical //tropisher Schwarzboden - термин, часто встречающийся в литературе и общеупотребительный для тёмных слитых глинистых трещиноватых почв субтропиков и тропиков. Син.: вертисоль, черная глинистая почва, черная хлопковая почва и т.п.

2667. ЧЁРНАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ГИДРОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //hydromorphic black tropical soil //sol noir tropical hydromorphé //hydromorphischer tropischer Schwarzboden - термин для чёрных тропических трещиноватых слитых почв, оглеенных в нижней части профиля вследствие современного или древнего гидроморфизма.

2668. ЧЁРНАЯ ТРОПИ́ЧЕСКАЯ ГЛИ́НА //black tropical clay //argile noire tropicale //schwarz tropischer Ton - устаревший термин для тёмных слитых глинистых трещиноватых почв; см. Вертисоль.

2669. ЧЁРНАЯ ХЛО́ПКОВАЯ ПО́ЧВА //black cotton soil //sol noir de coton //schwarze Baumwollerde - устаревший термин для тёмных глинистых почв тропических районов, первоначально использовавшийся как синоним индийских регуров, и иногда применяемый более широко для почв тропиков и субтропиков. Син.: вертисоль, черная тропическая почва, черная глинистая почва и т.п.

2670. ЧЁРНАЯ ЩЕЛОЧНА́Я ПО́ЧВА //black alkali soil //sol noir alcalin, sol à alcalis noir //schwarzer Alkaliboden, Schwarzalkaliboden, Sodaboden - устаревший термин западно-европейских школ для солонцов. Син.: солонец.

2671. ЧЁРНАЯ ЭЛЮВИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //eluviated black soil //sol noir éluvial //eluvial schwarz Boden (от лат. eluo - вымывать) - термин канадской школы (1968) для подгруппы степных черных (чернозёмных) почв, в которых имеется небольшой осветленный горизонт A_2 и переходный горизонт AB, подстилаемый умеренно развитым аргилловым[x)] горизонтом B; в элювиированных горизонтах почва имеет слабо кислую реакцию.

2672. ЧЁРНОЕ БОЛО́ТО //black bog //marais de dépression, tourbiere de dépression //Senkesumpf, Senke-Torfmoor - устаревший термин западно-европейских школ для низинного болота или низинного торфяника.

2673. ЧЕРНОЗЁМ //chernozem, black earth //chernozem, terre noire de steppe //Tschernosem, Schwarzerde (от русского народного названия) - 1) общеупотребительный традиционный термин, введенный в науку ещё М.В.Ломоносовым (1763), для темноокрашенных и сильно гумусированных степных почв со слабодифференцированным по механическому и валовому составу профилем, имеющим обычно горизонт вторичной аккумуляции карбонатов в той или иной части профиля; профиль делится на горизонты A-B-C, причем горизонт B, в отличие от других почв является не аккумулятивным, а лишь переходным по гумусированности от A к C; 2) термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для почв, имеющих с поверхности моллевый[x)] горизонт A мощностью не менее 15 см с черной или темносерой окраской; возможно, камбиевый[x)] горизонт B и горизонт аккумуляции мягкой порошковатой извести

в разных формах (пудра, белоглазка, прожилки, псевдомицелий); 3) термин современной канадской школы для степных почв, включающих как чернозёмы собственно, так и каштановые почвы; 4) термин франц.шк. (1965,1967) для группы изогумусовых насыщенных почв, имеющих более 5% гумуса в верхнем 20-см слое, зернистую или ореховатую структуру в гумусовом горизонте, с аккумуляцией $CaCO_3$ в нижней части профиля.

2674. ЧЕРНОЗЁМ БЕСКАРБОНА́ТНЫЙ //non-calcareous chernozem //chernozem non-calcaire //nichtkalkischer Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для рода чернозёмов, развитых на бедных кальциевыми минералами породах и характеризующихся отсутствием вскипания и выделений карбонатов.

2675. ЧЕРНОЗЁМ-БУ́РАЯ ЛЕСНА́Я ПО́ЧВА //chernozem - brown forest soil //chernozem - sol brun forestier //Tschernosem - braune Waldboden - термин европейских школ для почв, переходных от чернозёма к бурой лесной почве, имеющих черноземный облик, но формирующихся под лесом и обладающих рядом неясных признаков бурых лесных почв.

2676. ЧЕРНОЗЁМ БУ́РЫЙ //brown chernozem //chernozem brun //verbraunter Schwarzerde - термин немецкой школы для переходных от черноземов к бурозёмам почвам чернозёмного в целом облика.

2677. ЧЕРНОЗЁМ ВЫ́ЩЕЛОЧЕННЫЙ //leached chernozem //chernozem lévigé //ausgelaugter Tschernosem - 1) термин русской школы для подтипа чернозёма, характеризующегося наличием бескарбонатного горизонта В между гумусовоаккумулятивным горизонтом А+АВ и карбонатным горизонтом $B_к$, некоторой ненасыщенностью в верхней части профиля (10-20%), иллювиированием глины в среднюю часть профиля, слабо кислой (pH 6-6,5) реакцией гумусового горизонта; 2) термин русск.шк. (1967) для подтипа чернозёмов умеренной восточно-европейской фации, характеризующихся черно-серым зернистым горизонтом А+АВ без белёсой присыпки; бурым комковатым горизонтом В; вскипанием с глубины 70-110 см; выделением карбонатов в виде журавчиков, а в верхней части карбонатного горизонта в виде жилок с максимумом аккумуляции карбонатов в верхней части карбонатного горизонта; нейтральной реакцией (pH 6,5-7); дифференциацией ила и R_2O_3 по профилю; содержанием гумуса 6-10% в верхнем горизонте и запасом гумуса 600-700 т/га.

2678. ЧЕРНОЗЁМ ВЫ́ЩЕЛОЧЕННЫЙ ГЛУБОКО́МИЦЕЛЯ́РНО-КАРБОНА́ТНЫЙ //deep carbonate-mycelial leached chernozem // chernozem lévigé calcaire de mycelium profond // tiefer Myzel-Kalk ausgelaugter Tschernosem - см. Чернозём выщелоченный тёплый.

2679. ЧЕРНОЗЁМ ВЫ́ЩЕЛОЧЕННЫЙ ГЛУБОКО́ПРОМЕРЗА́ЮЩИЙ //deeply freezen leached chernozem // chernozem lévigé de congélation profond // tiefer gefrierter ausgelaugter Tschernosem - термин русск. шк. (1967) для подтипа чернозёмов восточносибирской фации, глубокопромерзающих и длительно-сезонномерзлотных, характеризующихся небольшим гумусовым горизонтом А+АВ мощностью 30-45 см с содержанием гумуса 5-7% в верхней части; запасом гумуса 200-300 т/га; либо полным отсутствием карбонатов в профиле либо их присутствием глубже 120 см в виде мучнистых выделений на отдельных участках; слабо-кислой реакцией (pH 5,5-6,5).

2680. ЧЕРНОЗЁМ ВЫ́ЩЕЛОЧЕННЫЙ ТЁПЛЫЙ //warm leached chernozem // chernozem lévigé chaude //warm ausgelaugter Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа чернозёмов теплой южноевропейской фации, характеризующихся комковато-зернистым рыхлым горизонтом А+АВ мощностью 80-150 см с содержанием гумуса с поверхности 4-7%; слабо уплотненным зернисто-комковатым бурым горизонтом В; вскипанием с глубины 90-150 см; выделением карбонатов в виде псевдомицелия на 5-10 см ниже линии вскипания и в виде белоглазки ниже 150-200 см; дифференциацией ила по профилю; запасом гумуса 400-600 т/га; слабо-кислой реакцией (pH 6,2-6,8).

2681. ЧЕРНОЗЁМ ВЫ́ЩЕЛОЧЕННЫЙ ХОЛО́ДНЫЙ //cold leached chernozem // chernozem lévigé froid //kalte ausgelaugter Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа чернозёмов холодной западно- и среднесибирской фации, характеризующихся тёмно-серым комковатым или зернисто-комковатым горизонтом А+АВ мощностью 40-60 см с языковатой нижней границей; содержанием гумуса в поверхностном слое 7-12% при быстром падении с глубиной; запасом гумуса 400-500 т/га; вскипанием с глубины 80-100 см; слабым перемещением ила вниз по профилю; степенью насыщенности основаниями 80-90% в гумусовом горизонте.

2682. ЧЕРНОЗЁМ ГЛУБОКОВСКИПА́ЮЩИЙ //deep effervescing chernozem // chernozem effervescente profond // tiefer aufbrausender Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для рода чернозёмов легкого механического состава и пониженной гумусности, в профиле ко-

торых имеется большой разрыв между гумусовым горизонтом и карбонатным горизонтом при отсутствии белёсой присыпки и нейтральной реакции бескарбонатного горизонта.

2683. ЧЕРНОЗЁМ ГЛУБОКОСОЛОНЦЕВАТЫЙ //deep solonetzic chernozem // chernozem solonetzoïde profond //tiefer solonetzartiger Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для рода чернозёмов, имеющих в нижней части профиля уплотненный грубоструктурный горизонт с содержанием обменного натрия более 5% от емкости поглощения.

2684. ЧЕРНОЗЁМ ГОРНЫЙ - см. Горный чернозём.

2685. ЧЕРНОЗЁМ ГОРОВОЙ //upland chernozem //chernozem de haute terre //Hochlandtschernosem - термин В.В.Докучаева (1883) для степных чернозёмов, покрывающих водораздельные пространства.

2686. ЧЕРНОЗЁМ ДЕГРАДИРОВАННЫЙ //degraded chernozem //chernozem dégradé //degradierter Tschernosem - устаревший термин для подтипа оподзоленных чернозёмов. Син.: чернозём северный, чернозём оподзоленный.

2687. ЧЕРНОЗЁМ ДОЛИННЫЙ //valley chernozem //chernozem de vallée // Taltschernosem - термин В.В.Докучаева (1883) для степных чернозёмов, покрывающих высокие речные террасы. Син.: чернозём террасовый.

2688. ЧЕРНОЗЁМ ИЗВЕСТКОВЫЙ //calcic chernozem //chernozem calcique //kalkischer Tschernosem (от русск. чернозём и лат. calcium - кальций) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для чернозёмов (см.), имеющих в профиле наряду с моллевым[x)] и, возможно, камбиевым[x)] горизонтами кальциевый[x)] или гипсовый[x)] горизонт в пределах 100 см от поверхности.

2689. ЧЕРНОЗЁМ КАРБОНАТНЫЙ //calcaric chernozem //chernozem calcaire //kalkarischer Tschernosem (от русск. чернозём и лат. calxic - известь) - 1) общеупотребительный термин для чернозёмов, характеризующихся наличием карбонатов (определяемых по вскипанию) во всём почвенном профиле вследствие особенностей породы, перерытости землероями или других причин; 2) термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для чернозёмов (см.), не имеющих никаких диагностических горизонтов кроме моллевого[x)] и, возможно, камбиевого[x)] в их обычной форме, но содержащих карбонаты, определяемые по вскипанию, во всём профиле вследствие особенностей породы, перерытости землеро-

ями или иных причин.

2690. ЧЕРНОЗЁМ КАРБОНА́ТНЫЙ ВЫСОКОВСКИПА́ЮЩИЙ //high effervescing calcaric chernozem //chernozem calcaire haute effervescente //hocher aufbrausender kalkarischer Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для рода чернозёмов, характеризующихся устойчивым поверхностным вскипанием и высоким содержанием карбонатов у поверхности, причем карбонатные выделения прослеживаются в нижней части гумусового горизонта или под ним.

2691. ЧЕРНОЗЁМ КАРБОНА́ТНЫЙ ПЕРЕРЫ́ТЫЙ //broken-up calcaric chernozem //chernozem calcaire défoncé, chernozem calcaire brisé //umgebrochen kalkarischer Tschernosem, zerbröckelt kalkarischer Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для рода чернозёмов, характеризующихся высоким, часто поверхностным вскипанием в связи с активной деятельностью роющих животных.

2692. ЧЕРНОЗЁМ КОНТА́КТНО-ЛУГОВА́ТЫЙ //contactly-meadowish chernozem //chernozem én gley contact //Berührunggleytschernosem - термин русск.шк. (1967) для рода чернозёмов, развитых на двучленных и слоистых породах, обусловливающих появление устойчивого переувлажнения на контакте пород, повышающего общие запасы продуктивной влаги в почве и приводящего к слабому оглеению.

2693. ЧЕРНОЗЁМ КОРИ́ЧНЕВОТЁМНЫЙ //dark-brown chernozem //chernozem brun foncé //dunkelbrauner Tschernosem - устаревший термин Н.М.Сибирцева (1895) для подтипа чернозёмов, содержащих 4-5% гумуса и распространенная в северной полосе Средней России, позднее (1901) названного им же северным. Син.: чернозём северный, чернозём деградированный, чернозём оподзоленный.

2694. ЧЕРНОЗЁМ КРОТОВИ́ННЫЙ //crotovine chernozem //chernozem crotovinaire //krotovinehaltiger Tschernosem - термин для чернозёмов, в профиле которых встречается особенно много кротовин, создающих пестроту горизонтов B и C.

2695. ЧЕРНОЗЁМ КСЕРА́ЛЬНЫЙ //xeric chernozem //chernozem xerique //xerischer Tschernosem (от русск. чернозём и греч. xeros - сухой) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для чернозёмов (см.), переходных к каштанозёмам (см.), т.е. характеризующихся появлением буроватых или коричневатых тонов в окраске моллевого[x)] горизонта, комковатой, а не зернистой структурой, уменьшением мощности гумусового горизонта

и более высоким расположением карбонатного (в нижней части гумусового).

2696. ЧЕРНОЗЁМ ЛИТОГЕ́ННОКИ́СЛЫЙ //lithogenically acid chernozem // chernozem acide lithogené //lithogenensaurer Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для рода чернозёмов, развитых на кислых сланцах, содержащих менее 1% кальция, характеризующихся бескарбонатностью, кислой реакцией в нижних горизонтах и нейтральной в верхних.

2697. ЧЕРНОЗЁМ ЛУГОВО́Й //meadow chernozem, wet chernozem //chernozem humide, chernozem de prairie, chernozem de pré (de fauche) //Wiesentschernosem, Feuchtschwarzerde - общеупотребительный термин для чернозёмов, имеющих слабое избыточное грунтовое увлажнение при близких грунтовых водах, имеющих признаки оглеения в нижней части профиля.

2698. ЧЕРНОЗЁМ ЛЮВИКО́ВЫЙ //luvic chernozem //chernozem luvique // luvischer Tschernosem (от русск. чернозём и лат. luo - вымывать) - термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для чернозёмов (см.), имеющих в профиле под моллевым[x)] горизонтом аргилловый[x)] диагностический горизонт.

2699. ЧЕРНОЗЁМ МА́ЛОГУ́МУСНЫЙ //low-humus chernozem //chernozem peu humifére //humusarmer Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для вида чернозёмов, содержащих 4-6% гумуса в верхнем горизонте.

2700. ЧЕРНОЗЁМ МА́ЛОМО́ЩНЫЙ //schallow chernozem //chernozem peu profond //dünner Tschernosem - 1) термин франц.шк. (1965) для подгруппы чернозёмов, имеющих профиль глубиной до 60 см и слабую, в большинстве случаев, гумусированность; 2) термин русской школы для вида чернозёма разных подтипов, имеющего мощность гумусового горизонта A+AB менее 40 см.

2701. ЧЕРНОЗЁМ МАНЧЖУ́РСКИЙ //Manchzurian chernozem //chernozem de Manchzoria //Tschernosem der Mantschuria - устаревший термин для лугово-чернозёмных почв Дальнего Востока.

2702. ЧЕРНОЗЁМ МИЦЕЛЯ́РНО-КАРБОНА́ТНЫЙ //carbonate-mycelial chernozem //chernozem calcaire de mycelium //Myzel-Kalk Tschernosem - термин русск.шк. для чернозёмов разных подтипов, имеющих выделение карбонатов в карбонатном горизонте в виде разных форм псевдомицелия (жилки, паутинки, налёты и т.д.).

2703. ЧЕРНОЗЁМ МО́ЩНЫЙ //deep chernozem //chernozem profond //tiefer

Tschernosem –
1) устаревший термин для подтипа чернозёма, соответствовавшего сибирцевскому подтипу тучного чернозёма (см.); 2) термин русской школы для вида чернозёма разных подтипов, имеющего мощность гумусового горизонта A+AB 80–120 см.

2704. ЧЕРНОЗЁМ НЕПО́ЛНОРА́ЗВИТЫЙ //non-complete chernozem //chernozem non-complet //nichtgeschlossener Tschernosem – термин русск. шк. (1967) для рода чернозёмов на плотных породах, характеризующихся маломощным профилем с неполным набором генетических горизонтов, часто фрагментарного характера, и сильной щебнистостью.

2705. ЧЕРНОЗЁМ НОРМА́ЛЬНЫЙ //haplic chernozem //chernozem haplique //haplischer Tschernosem (от русск. чернозём и греч. haplous – простой, обычный) – термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для чернозёмов (см.), не имеющих никаких иных диагностических горизонтов кроме моллевого[x)] и, возможно, камбиевого[x)] в их обычной форме.

2706. ЧЕРНОЗЁМ ОБЫКНОВЕ́ННЫЙ //ordinary chernozem //chernozem ordinaire //gewöhnlicher Tschernosem – 1) термин Н.М.Сибирцева (1895) для подтипа среднегумусных (6–10%) чернозёмов Центральной России; 2) термин современной систематики СССР для подтипа чернозёма, характеризующегося интенсивным выделением карбонатов в нижней части гумусового горизонта и ниже в виде белоглазки, средней гумусированностью и средней мощностью; 3) термин русск.шк. (1967) для подтипа чернозёмов умеренной восточноевропейской фации, характеризующихся темно-серым, постепенно буреющим книзу гумусовым горизонтом зернисто-комковатой структуры мощностью 50–80 см; вскипанием в нижней части гумусового горизонта (40–60 см); выделением карбонатов в виде жилок и белоглазки; обилием кротовин; содержанием гумуса с поверхности 6–8%; запасом гумуса 500–600 т/га.

2707. ЧЕРНОЗЁМ ОБЫКНОВЕ́ННЫЙ ГЛУБОКО́ПРОМЕРЗА́ЮЩИЙ //deeply freezen ordinary chernozem //chernozem ordinaire de congélation profond //tiefer gefrierter gewöhnlicher Tschernosem – термин русск.шк. (1967) для подтипа чернозёмов восточносибирской фации, характеризующихся гумусовым горизонтом мощностью 35–45 см с содержанием гумуса 5–7%; запасом гумуса 200–250 т/га; плохо выраженной структурой гумусового горизонта; наличием мучнисто-белёсого карбонатного горизонта с резкой верхней и

неясной нижней границами, залегающего на различной глубине в профиле.

2708. ЧЕРНОЗЁМ ОБЫКНОВЕ́ННЫЙ МИЦЕЛЯ́РНО-КАРБОНА́ТНЫЙ //carbonate-mycelial ordinary chernozem //chernozem ordinaire calcaire de mycelium //Myzel-Kalk gewöhnlicher Tschernosem - см. Чернозём обыкновенный тёплый.

2709. ЧЕРНОЗЁМ ОБЫКНОВЕ́ННЫЙ МУЧНИ́СТО-КАРБОНА́ТНЫЙ //meal-carbonated ordinary chernozem //chernozem ordinaire calcaire en gruau //mehlkalkischer gewöhnlicher Tschernozem - см. Чернозём обыкновенный глубокопромерзающий.

2710. ЧЕРНОЗЁМ ОБЫКНОВЕ́ННЫЙ ТЁПЛЫЙ //warm ordinary chernozem //chernozem ordinaire chaude //warm gewöhnlicher Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа чернозёмов тёплой южноевропейской фации, характеризующихся тёмно-серым или буровато-серым постепенно светлеющим книзу рыхлым сильно перерытым гумусовым горизонтом с неясно-зернистой структурой мощностью 80-140 см; вскипанием с поверхности или в верхней части гумусового горизонта выше 30 см; выделением карбонатов в виде налётов, затем в виде жилок, а с глубины 100-120 см в виде нечеткой белоглазки; содержанием гумуса с поверхности 4-6%; запасом гумуса 350-400 т/га.

2711. ЧЕРНОЗЁМ ОБЫКНОВЕ́ННЫЙ ХОЛО́ДНЫЙ //cold ordinary chernozem //chernozem ordinaire froid //kalter gewöhnlicher Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа чернозёмов холодной западно- и среднесибирской фации, характеризующихся языковатым гумусовым горизонтом мощностью 35-50 см, комковатой или реже зернисто-комковатой структуры; содержанием гумуса с поверхности 7-9% при его быстром падении с глубиной; запасом гумуса 350-400 т/га; вскипанием в нижней части гумусового горизонта на глубине 30-60 см.

2712. ЧЕРНОЗЁМ ОПОДЗО́ЛЕННЫЙ //podzolized chernozem //chernozem podzolisé //podsolierter Tschernosem - 1) термин Л.И.Прасолова для подтипа чернозёма, имеющего выщелоченный бескарбонатный горизонт В между гумусовым (А+АВ) слоем и карбонатным горизонтом $B_к$ в нижней части профиля и пепельный оттенок гумусового горизонта из-за обилия кремнезёмистой присыпки; син.: чернозём северный, чернозём деградированный; 2) термин русск. шк. (1967) для подтипа чернозёмов умеренной восточноевропей-

ской фации, характеризующихся темно-серым зернистым гумусовым горизонтом А; темно-серым с седоватым оттенком горизонтом АВ с зернистой, переходящей вниз в ореховатую структурой и белёсой присыпкой, особенно обильной в нижней части; бурым ореховатым горизонтом В с белёсой присыпкой в верхней части, мощностью гумусового слоя А+АВ 50-70 см; вскипанием в горизонте С на глубине 100-125 см; дифференцированным по илу и R_2O_3 профилем; выделением карбонатов в карбонатном горизонте в виде жилок и конкреций; содержанием гумуса в поверхностном горизонте 5-8% и запасом гумуса 500-600 т/га.

2713. ЧЕРНОЗЁМ ОПОДЗО́ЛЕННЫЙ ГЛУБОКОМИЦЕЛЯ́РНО-КАРБОНА́ТНЫЙ //deep carbonate-mycelial podzolized chernozem //chernozem podzolisé calcaire de mycélium profond //tiefer Myzel-Kalk podsolierter Tschernosem - см. Чернозём оподзоленный тёплый.

2714. ЧЕРНОЗЁМ ОПОДЗО́ЛЕННЫЙ МИЦЕЛЯ́РНО-КАРБОНА́ТНЫЙ - см. Чернозём оподзоленный глубокомицелярно-карбонатный.

2715. ЧЕРНОЗЁМ ОПОДЗО́ЛЕННЫЙ ТЁПЛЫЙ //warm podzolized chernozem // chernozem podzolisé chaude //warm podsolierter Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа чернозёмов тёплой южноевропейской фации, характеризующихся мощным (70-100 см) тёмно-серым зернисто-комковатым гумусовым горизонтом, нижняя часть которого окрашена светлее и имеет белёсую присыпку; буровато-серым крупнопризматическим уплотненным слабо водопроницаемым горизонтом В; глубоким вскипанием (на 100-170 см); слабо-кислой реакцией (pH 6-6,5); содержанием гумуса 7-10% в поверхностном горизонте при общем запасе гумуса в горизонте А+АВ 350-500 т/га; дифференциацией ила в профиле; мицелярной формой карбонатных выделений в нижней части профиля.

2716. ЧЕРНОЗЁМ ОПОДЗО́ЛЕННЫЙ ХОЛО́ДНЫЙ //cold podzolized chernozem // chernozem podzolisé froid //kalte podsolierter Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа чернозёмов холодной западно- и среднесибирской фации, характеризующихся тёмно-серым зернистым горизонтом А; тёмно-серым, внизу с белесоватым оттенком, языковатым горизонтом АВ; бурым слабо уплотненным ореховатым горизонтом В; мощностью гумусового горизонта А+АВ 30-50 см; содержанием гумуса в поверхностном горизонте 7-13% при его быстром падении с глубиной и запасом гумуса 400-450 т/га; вскипанием с 80-120 см; выделением карбонатов в горизонте С в виде жилок и конкреций; дифференциацией ила по про-

филю; степенью насыщенности основаниями в гумусовом горизонте 80-85%; слабо кислой реакцией (pH 5,5-6).

2717. ЧЕРНОЗЕМ ОСОЛОДЁЛЫЙ //solodic chernozem, solodized chernozem //chernozem solodoïde, chernozem solodisé, chernozem solodique //solodartiger Tschernosem, solodierter Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для рода чернозёмов, имеющих белёсую присыпку в гумусовом горизонте, потечность гумуса, дифференцированный по илу и R_2O_3 профиль; относительно высокое вскипание, щелочную реакцию.

2718. ЧЕРНОЗЕМ ОСТАТОЧНОКАРБОНАТНЫЙ //residually calcaric chernozem //chernozem calcaire résiduel //restkalkarischer Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для рода чернозёмов, развитых на плотных карбонатных породах и имеющих в профиле наряду с вторичными выделениями карбонатов щебень карбонатных пород; обычно почвы вскипают с поверхности, имеют малую мощность гумусового горизонта и профиля в целом и натёки карбонатов на щебне породы.

2719. ЧЕРНОЗЕМ ОСТАТОЧНОЛУГОВАТЫЙ //residually meadowish chernozem //chernozem à gley residuel //restgleyischer Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для рода чернозёмов древних высоких террас, обнаруживающих признаки древнего большего увлажнения в виде повышенной гумусированности, большей мощности гумусового горизонта, более темной окраски нижних горизонтов, отдельных железистых конкреций.

2720. ЧЕРНОЗЕМ ОСТАТОЧНОСОЛОНЦЕВАТЫЙ //residually solonetzic chernozem //chernozem solonetzoïde résiduel //restsolonetzartiger Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для рода чернозёмов, имеющих морфологические и физические свойства солонцеватых почв в каком-либо горизонте, но не содержащих в нём обменного натрия либо содержащих его менее 5% от емкости поглощения; син.: физически солонцеватый чернозём, чернозём солонцеватый безнатровый.

2721. ЧЕРНОЗЕМ-ПАРАБУРОЗЕМ //chernozem - parabrownearth //chernozem - parabraunerde //Schwarzerde-Parabraunerde - термин немецкой школы для почв, переходных между чернозёмом и парабурозёмом.

2722. ЧЕРНОЗЕМ ПЕРЕРЫТЫЙ //broken-up chernozem //chernozem défoncé, chernozem brisé //umgebrochen Tschernosem, zerbröckelt Tscher-

nosem - термин для чернозёмов, характеризующихся высоким, часто поверхностным вскипанием, нарушенной структурой, рыхлостью в результате активной деятельности роющих животных.

2723. ЧЕРНОЗЕМ ПРЕДКАВКА́ЗСКИЙ // **sub-Caucasus chernozem // chernozem de sub-Caucasie // Tschernosem der sub-Caucasus** - термин Л.И.Прасолова для подтипа чернозёма, распространенного в Предкавказье и характеризующегося мицелярной карбонатностью, большой мощностью гумусового горизонта, относительно небольшим содержанием гумуса, значительной перерытостью, высокой карбонатностью, часто с поверхности; в настоящее время термин используется для названия провинциальной группы подтипов чернозёмов, включая все основные пять зональных подтипов, но часто используется термин и в его первоначальном толковании.

2724. ЧЕРНОЗЕМ ПРИАЗО́ВСКИЙ // **sub-Azov chernozem // chernozem de sub-Azov // Tschernosem der sub-Asov** - термин Л.И.Прасолова (1905) для подтипа чернозёма, распространенного на Северном Кавказе и в Нижне-Донской области и характеризующегося мицеллярной карбонатностью профиля, большой мощностью гумусового горизонта при относительно небольшом содержании гумуса, значительной перерытостью, высокой карбонатностью; в настоящее время термин используется для названия провинциальной группы подтипов чернозёмов.

2725. ЧЕРНОЗЕМ ПРОГРАДИ́РОВАННЫЙ // **prograded chernozem // chernozem pogradée // progradierter Tschernosem** - термин русск.шк. (1967) для рода чернозёмов, имеющих типичный гумусовый и карбонатный профиль, но в пределах гумусового горизонта обнаруживающих остатки подзолообразования в виде уменьшения в нижней части гумусового горизонта ёмкости обмена, а с поверхности ила и R_2O_3; обычно такие почвы встречаются среди оподзоленных чернозёмов лесостепи.

2726. ЧЕРНОЗЕМ ПРОГРАДИ́РОВАННЫЙ ВТОРИ́ЧНО НАСЫ́ЩЕННЫЙ // **secondary saturated prograded chernozem // chernozem pogradée saturée secondaire // sekundär gesättigter progradierter Tschernosem** - термин русск.шк. (1967) для рода оподзоленных чернозёмов, отличающихся полной насыщенностью основаниями при наличии белёсой присыпки, что обусловлено миграциями карбонатов, периодически доходящих до поверхности в пахотных почвах.

2727. ЧЕРНОЗЕМ-ПСЕ́ВДОГЛЕ́Й //chernozem-pseudogley //chernozem-pseudogley //Schwarzerde-Pseudogley - термин немецкой школы для почв, переходных между чернозёмом и псевдоглеем.

2728. ЧЕРНОЗЕМ РЕГРАДИ́РОВАННЫЙ //regraded chernozem //chernozem regradé //regradierter Tschernosem - термин для чернозёмов полициклического генезиса, испытавших обогащение гумусом, карбонатами, обменными основаниями, питательными веществами в результате процесса регрессации (восстановления) под целинной растительностью степи.

2729. ЧЕРНОЗЁМ СВЕ́РХМО́ЩНЫЙ //super-deep chernozem //chernozem super-profond //super-tiefer Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для чернозёмов с мощностью гумусового горизонта A+AB более 120 см.

2730. ЧЕРНОЗЁМ СЕ́ВЕРНЫЙ //northern chernozem //chernozem de nord //Nordtschernosem - устаревший термин Н.М.Сибирцева (1901) для малогумусных (4-5%) мощных чернозёмов северной части черноземной зоны Центральной России. Син.: чернозём деградированный, чернозём оподзоленный.

2731. ЧЕРНОЗЁМ СИ́ЛЬНОВЫ́ЩЕЛОЧЕННЫЙ //strongly leached chernozem //chernozem lévigé forte //stark ausgelaugter Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для вида выщелоченных чернозёмов, имеющих разрыв между гумусовым и карбонатным горизонтами более 40 см.

2732. ЧЕРНОЗЁМ СИ́ЛЬНО ГУМУСИ́РОВАННЫЙ //strongly humusified chernozem //chernozem très humifère //starkhumusischer Tschernosem - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы чернозёмов, содержащих в пределах верхнего 20-см слоя более 10% гумуса.

2733. ЧЕРНОЗЁМ СКЛО́НОВЫЙ //slope chernozem //chernozem de pente //Hangtschernosem - термин В.В.Докучаева (1883) для степных чернозёмов, покрывающих склоны водораздельных пространств на переходе к речным долинам.

2734. ЧЕРНОЗЁМ СЛА́БОВЫ́ЩЕЛОЧЕННЫЙ //weakly leached chernozem //chernozem peu lévigé //schwach ausgelaugter Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для вида выщелоченных чернозёмов, имеющих разрыв между гумусовым и карбонатным горизонтами менее 20 см.

2735. ЧЕРНОЗЁМ СЛА́БОГУМУСИ́РОВАННЫЙ //slightly humucified chernozem //chernozem plus peu humifére//schwach humusierter Tschernо-

sem - термин русск.шк. (1967) для вида чернозёмов, содержащих менее 4% гумуса в верхнем горизонте.

2736. ЧЕРНОЗЁМ СЛАБОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ //weakly differentiated chernozem //chernozem peu differentié //shwach differentierter Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для песчаных и супесчаных чернозёмов, характеризующихся отсутствием вскипания и карбонатного горизонта.

2737. ЧЕРНОЗЁМ СЛИТОЙ //vertic chernozem, compact chernozem //chernozem vertique, chernozem compact //vertischer Tschernosem, kompakter Tschernosem (от русск. чернозём и лат. vertero - оборачивать) - 1) общеупотребительный термин для мощных, но не сильно гумусированных чернозёмов, гумусовый горизонт которых очень твердый, трещиноватый (вертикально) и глыбистый в сухом состоянии (слитой); 2) термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для чернозёмов (см.), моллевый горизонт которых очень твердый, трещиноватый и глыбистый в сухом состоянии и которые по своим свойствам приближаются к тёмным вертисолям (см.); 3) термин русск.шк. (1967) для рода чернозёмов тёплой фации на иловато-глинистых породах, переживших в прошлом гидроморфную стадию, обусловившую их слитость.

2738. ЧЕРНОЗЁМ СОЛОНЦЕВАТЫЙ //alkalized chernozem, solonetzic chernozem, solonetz-like chernozem //chernozem à alcalis, chernozem solonetzoïde //Alkalitschernosem, solonetzartiger Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для рода чернозёмов, имеющих в гумусовом горизонте уплотненный грубоструктурный слой с содержанием обменного натрия более 5% от ёмкости поглощения.

2739. ЧЕРНОЗЁМ СРЕДНЕВЫЩЕЛОЧЕННЫЙ //moderately leached chernozem //chernozem lévigé modérée //mässig ausgelaugter Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для вида выщелоченных чернозёмов, имеющих разрыв между гумусовым и карбонатным горизонтами 20-40 см.

2740. ЧЕРНОЗЁМ СРЕДНЕГУМУСНЫЙ //moderate-humus chernozem //chernozem moderée en humus //mässig-humus Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для вида чернозёмов, содержащих 6-9% гумуса в верхнем горизонте.

2741. ЧЕРНОЗЁМ СРЕДНЕМОЩНЫЙ //medium deep chernozem //chernozem semi-profond //halbtiefer Tschernosem - термин русск.шк.(1967) для вида чернозёмов с мощностью гумусового горизонта A+AB 40-80 см.

2742. ЧЕРНОЗЁМ ТЕКСТУ́РНЫЙ //textural chernozem //chernozem à B textural //Texturtschernozem - термин франц.шк. (1965,1967) для подгруппы чернозёмов, характеризующихся наличием иллювиальной глины в горизонте В.

2743. ЧЕРНОЗЁМ ТЁМНОШОКОЛА́ДНЫЙ //dark chocolate chernozem //chernozem foncé chocolat //dunkelschokoladfarbiger Tschernosem - устаревший термин Н.М.Сибирцева (1895) для подтипа маломощных и малогумусных чернозёмов, имеющих шоколадный оттенок и распространенных на юге России (Молдавия, юг Украины, Азово-Донской край), впоследствии названных им же (1901) южными чернозёмами. Син.: чернозём южный.

2744. ЧЕРНОЗЁМ ТЕРРА́СОВЫЙ //terrace chernozem //chernozem de terrasse //Terrassentschernosem - общеупотребительный термин, не имеющий точного содержания, для степных чернозёмов, покрывающих высокие речные террасы. Син.: Чернозём долинный, чернозём остаточнолуговатый.

2745. ЧЕРНОЗЁМ ТИПИ́ЧНЫЙ //typic chernozem, typical chernozem // chernozem typique, chernozem modal //typischer Tschernosem - 1) термин русск.шк. для подтипа чернозёмов, характеризующихся мощным зернистым сильногумусированным горизонтом А, наличием карбонатов непосредственно под гумусовым горизонтом; 2) термин русск.шк. (1967) для подтипа чернозёмов умеренной восточноевропейской фации, характеризующихся тёмно-серым комковатозернистым гумусовым горизонтом мощностью 70-130 см; вскипанием с глубины 50-100 см; нейтральной реакцией; выделением карбонатов вверху пятнами, а внизу журавчиками; равномерным распределением ила и R_2O_3 по профилю; содержанием гумуса с поверхности 8-10%; запасом гумуса 600-750 т/га; 3) термин французск.шк. (1965,1967) для подгруппы чернозёмов, содержащих в верхнем 20-см слое менее 10% гумуса.

2746. ЧЕРНОЗЁМ ТИПИ́ЧНЫЙ МИЦЕЛЯ́РНО-КАРБОНА́ТНЫЙ //carbonate-mycelial typical chernozem //chernozem typique calcaire de mycelium// Myzel-Kalk typischer Tschernosem - см. Чернозём типичный тёплый.

2747. ЧЕРНОЗЁМ ТИПИ́ЧНЫЙ ТЁПЛЫЙ //warm typic chernozem //chernozem typique chaude //warm tipischer Tschernosem - термин русск. шк. (1967) для подтипа чернозёмов тёплой южноевропейской провинции, характеризующихся интенсивно-темно-серым в верхней

части и буровато-серым в нижней гумусовым горизонтом мощностью 100-190 см зернистой структуры; вскипанием с глубины 20-60 см, выделением карбонатов сразу под линией вскипания сначала в виде налётов (паутинок, плесени), ниже со 120-150 см в виде жилок, а ниже 140-200 см в виде редкой белоглазки; содержанием гумуса 5-8% в верхнем горизонте; запасом гумуса 450-650 т/га.

2748. ЧЕРНОЗЁМ ТИПИ́ЧНЫЙ ХОЛО́ДНЫЙ //cold typical chernozem //chernozem typique froid //kalter typischer Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа чернозёмов холодной западно- и среднесибирской фации, характеризующихся небольшим (40-70), но интенсивно гумусированным (10-12% гумуса) горизонтом A+AB с языковатой нижней границей; вскипанием в нижней части гумусового горизонта и выделением карбонатов в виде псевдомицелия; запасом гумуса 450-500 т/га.

2749. ЧЕРНОЗЁМ ТУ́ЧНЫЙ //fat chernozem //chernozem grasse //fetter Tschernosem - 1) термин Н.М.Сибирцева (1895) для степных чернозёмов Средней России, содержащих более 10% гумуса; 2) термин русск.шк. (1967) для вида чернозёмов, содержащих в верхнем горизонте более 9% гумуса.

2750. ЧЕРНОЗЁМ ФИЗИ́ЧЕСКИ-СОЛОНЦЕВА́ТЫЙ //physically solonetzic chernozem //chernozem solonetzoïde physical //physikalischer solonetzartiger Tschernosem - см. Чернозём остаточносолонцеватый.

2751. ЧЕРНОЗЁМ ЩЕ́ЛЬНЫЙ //crevasced chernozem //chernozem crevassé //spaltiger Tschernosem - термин русск.шк. (1967) для рода чернозёмов холодной фации на иловато-глинистых загипсованных или закарбоначенных породах очень плотного слитого сложения, характеризующихся образованием глубоких трещин и засыпанием в них мелкозёма из гумусовых горизонтов, вскипающих с поверхности или в пределах гумусового горизонта, имеющих выделения гипса на глубине около 100 см.

2752. ЧЕРНОЗЁМ ЮЖНЫЙ //southern chernozem //chernozem de sud //Südentschernosem - 1) термин Н.М.Сибирцева (1901) для подтипа маломощных и малогумусных чернозёмов, имеющих шоколадный оттенок и распространенных на юге России, сохранивший своё содержание в современной систематике почв; 2) термин русск.шк. (1967) для подтипа чернозёмов умеренной восточноевропейской

фации, характеризующихся зернисто-комковатым гумусовым горизонтом мощностью 30-60 см; призматически-ореховатым горизонтом В; вскипанием с глубины 30-50 см; выделением карбонатов в виде белоглазки несколько ниже линии вскипания; содержанием гумуса с поверхности 4-6%; запасом гумуса 300-450 т/га; наличием водорастворимых солей и гипса на глубине 200-300 см.

2753. ЧЕРНОЗЁМ ЮЖНЫЙ ГЛУБОКОПРОМЕРЗАЮЩИЙ //deeply freezen southern chernozem //chernozem de sud de congélation profond //tiefer gefrierter Südentschernosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа чернозёмов восточносибирской фации, характеризующихся гумусовым горизонтом мощностью 30-40 см; содержанием гумуса с поверхности 3,5-5%; вскипанием с глубины 20-100 см; наличием мучнисто-карбонатного горизонта ниже линии вскипания.

2754. ЧЕРНОЗЁМ ЮЖНЫЙ МИЦЕЛЯРНО-КАРБОНАТНЫЙ //carbonate-mycelial southern chernozem //chernozem de sud calcaire de mycelium // Myzel-Kalk Südentschernosem - см. Чернозём южный тёплый.

2755. ЧЕРНОЗЁМ ЮЖНЫЙ МУЧНИСТО-КАРБОНАТНЫЙ //meal-carbonated southern chernozem //chernozem de sud calcaire en gruau //mehlkalkischer Südentschernosem - см. Чернозём южный глубокопромерзающий.

2756. ЧЕРНОЗЁМ ЮЖНЫЙ ТЁПЛЫЙ //warm southern chernozem //chernozem de sud chaude //warm Südentschernosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа чернозёмов тёплой южноевропейской фации, характеризующихся тёмно-серым, постепенно буреющим книзу гумусовым горизонтом с зернистой структурой мощностью 70-100 см; содержанием гумуса с поверхности 3-5%; запасом гумуса 270-300 т/га; вскипанием с поверхности; выделением карбонатов с глубины 30-40 см сначала в виде налетов, затем в виде жилок, а с глубины 90-120 см в виде нечеткой белоглазки; наличием гипса и водорастворимых солей на глубине 250-300 см.

2757. ЧЕРНОЗЁМ ЮЖНЫЙ ХОЛОДНЫЙ //cold southern chernozem //chernozem de sud froid //kalter Südentschernosem - термин русск.шк. (1967) для подтипа чернозёмов холодной западно- и среднесибирской фации, характеризующихся языковатым гумусовым горизонтом мощностью 25-45 см (глубина языков может быть до 100 см); содержанием гумуса с поверхности 4-6% при резком падении с глубиной; запасом гумуса 200-350 т/га; вскипанием с глубины 20-40 см; выделением карбонатов несколько ниже линии вскипания в виде псевдомицелия и белоглазки; уплотнением и комкова-

той структурой горизонта A+AB; слабой дифференциацией ила по профилю.

2758. ЧЕРНОЗЁМ ЮРЬЕВСКИЙ //Juriev chernozem // chernozem de Juriev //Tschernosem der Juriev (от города Юрьев Владимирской обл.) - устаревший термин для темноцветных хорошо дренированных почв Владимирского ополья, в настоящее время относимых к типу серых лесных.

2759. ЧЕРНОЗЕМ ЯЗЫКОВАТЫЙ //glossic chernozem // chernozem glossique //glossischer Tschernosem (от русск. чернозём и греч.glossa - язык) - 1) общеупотребительный термин для чернозёмов, характеризующихся резко выраженной языковатостью и за счет этого растянутостью гумусового горизонта; 2) термин легенды к почвенной карте Мира ФАО/ЮНЕСКО (1970) для чернозёмов (см.), характеризующихся резко выраженной языковатостью гумусового горизонта; 3) см. Чернозём щельный.

2760. ЧЕРНОЗЁМНАЯ ПОЧВА //chernozemic soil //sol chernozemique // chernosemischer Boden (от русск. черная земля) - 1) термин канадской школы (1968) для порядка тёмноокрашенных степных почв (объединяющих чернозёмы и каштановые почвы), имеющих чернозёмовидный горизонт A, горизонты B и C с высокой насыщенностью двухвалетными катионами при преобладании кальция, распространенных в ксерофитных и мезофитных степях семиаридного и субгумидного прохладного континентального (бореального) климата; 2) общеупотребительный термин для сборной группы степных или луговых темноокрашенных и сильногумусированных почв.

2761. ЧЕРНОЗЁМОВИДНАЯ ПОЧВА //chernozem-like soil //sol chernozémiforme //tschernosemartiger Boden - общеупотребительный термин для различных почв, напоминающих по своему профилю или некоторым свойствам чернозёмы, но по какому-либо важному признаку отличающихся от них.

2762. ЧЕРНОЗЁМОВИДНАЯ ПОЧВА ЗАПАДИН //chernozem-like soil of depression //sol chernozémiforme de depression //Depression tschernosemartiger Boden - устаревший термин для лугово-чернозёмных почв (см.).

2763. ЧЕРНОЗЁМОВИДНАЯ ПОЧВА ПРЕРИЙ //chernozem-like prairie soil // sol chernozemiforme de prairie //tschernosemartiger Prärieboden - термин русск.шк. для почв северо-американских пре-

рий, характеризующихся темнокоричневой до черной окраской, содержанием гумуса 3-8%, слабокислой до нейтральной реакцией, зернисто-ореховатой структурой, отсутствием карбонатно-аккумулятивного горизонта, значительным по сравнению с чернозёмами увлажнением (осадки до 1000 мм, относительно близкие грунтовые воды), следами оглеения в профиле; син.: брюнизём.

2764. ШИК //szik soil, szik, clay szik soil //sol szik, sol à alcalis noir, sol de szik argileux //Szik-Boden, schwarzer Alkaliboden, toniger Szik-Boden - местное название черных глинистых солонцов, распространенное в некоторых странах Ю.Европы и С.Африки. Син.: солонец.

2765. ШИЦЗЯНТУ́ //shizjantu //chizjantu //Schizsjantu (от народн. китайск.) - местное название мощных карбонатных кор (1-3 м) в профиле почв, распространенное в Центральном и Западном Китае. См.: Калише.

2766. ШО́Р //shor //chor //Schor (тюркск.) - солончак в аридных и семиаридных районах, обычно с глинистым грунтом, обогащенный в верхних слоях хлоридами и сульфатами, образующими с поверхности белую корку солей; образуется на днищах высыхающих водоёмов в депрессиях рельефа с близкими сильно минерализованными грунтовыми водами. Син.: сор, солончак соровый.

2767. ШО́ТТ //shott //shott //Schott (арабск.) - термин, распространенный в Сев.Африке и во французской школе для солончаков замкнутых депрессий, днища которых покрыты рыхлым слоем солей и трещиноватой коркой ила; после дождей превращаются в солёные озёра.

2768. ШОХ //shoch //choh //Schoch (от арабск.нар.назв.) - распространенный в среднеазиатских республиках термин для карбонатных кор делювиально-гидроморфного происхождения, выделяемых в нижней части сазовых (см.) почв.

2769. ЩЕБНИ́СТАЯ ПО́ЧВА - см. Каменистая почва.

2770. ЩЕЛОЧНА́Я ПО́ЧВА //alkaline soil, alkali soil //sol alcalin, sol à alcalis //Alkaliboden - 1) широкий термин для почв, имеющих щелочную реакцию профиля, включая солонцы, солонцы-солончаки и содовые солончаки; 2) в узком понимании, особенно в западно-европейских школах, синоним солонца; 3) во французской системе термин для самостоятельной группы почв, включающий переходные между солонцами и солончаками образования

(черные засоленные почвы), соответствующие понятию солонец-солончак русской школы (Обер, 1941).

2771. ЩЕЛОЧНО́Е ДНО́ //alkaliflat //plaine alcaline //alkalische Flachland - 1) устаревший американский термин для щелочных такыровых почв днищ пересохших солёных озёр; син.: такыр, плайя; 2) термин американской и западноевропейских школ для плоской низменной равнины с солонцовыми комплексами.

2772. ЩЕЛОЧНО́Й ПОДЗО́Л //alkaline podzol //podzol alcaline//Alkali-podsol - устаревший термин западно-европейских школ. См.: Солодь.

2773. ЭЙЛА́ЖНАЯ ПО́ЧВА //ailage soil //sol ailage //Eilageboden (от тюрк. яйла́ - летнее пастбище) - термин В.В.Докучаева (1900) для высокогорных почв Кавказа, имеющих профиль АС, сильную гумусированность, щебнистость и формирующихся под субальпийскими лугами. Син.: Горно-луговая почва.

2774. ЭКЗОДИНА́МОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //ectodynamomorphic soil, ectodynamomorphous soil//sol ectodynamomorphe //ektodynamomorpher Boden (от греч. écton - внешний, греч. dýnamis - сила и греч. morphe - форма) - термин К.Д. Глинки (1908) для почв , развитие которых связано с воздействием внешних по отношению к почве сил, прежде всего климата.

2775. ЭЛЮВИА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //eluvial soil //sol éluvial //Eluvialboden (от лат. eluo - вымываю) - термин для почв, формирующихся в условиях нисходящего промывного водного режима, при котором имеет место вынос в нижнюю часть профиля или за его пределы продуктов выветривания и почвообразования при одновременно идущей биологической аккумуляции веществ.

2776. ЭЛЮВИЗЁМ //eluvizem //eluvizem //Eluvisem (от лат. eluo - вымываю и русск. земля) - термин М.А.Глазовской (1972) для почв с дифференцированным по глине профилем без образования подзолистого горизонта; син.: Лювисоль.

2777. ЭЛЮВИЗЁМНАЯ ПО́ЧВА - см. Элювизём.

2778. ЭЛЮВИЗЁМНАЯ ОЖЕЛЕЗНЕННАЯ ПО́ЧВА //ferrimorphic eluvizem soil //sol eluvizemique ferrugineux //eisenhaltiger Eluvisemboden - термин М.А.Глазовской (1972); см. Феррозём.

2779. ЭЛЮВИЗЁМНО-КА́ЛЬЦИЙ-ГУ́МУСОВАЯ ПО́ЧВА //eluvizem-calce-humic

soil //sol eluvizem-calce-humique //eluvisem-kalk-humischer Boden - термин М.А.Глазовской (1972) для семейства почв прерий, луговых степей и лесостепей с профилем A_{hf}-A_{fhEpl}-$B_{thCa}B_{msial}$-B_{msial}-C_{sial}-$C_{sialCaCO_3}$, включающих серые лесные почвы, и оподзоленные чернозёмы.

2780. ЭЛЮВИЗЁМНО-ПОДЗО́ЛИСТАЯ ПО́ЧВА //eluvizem-podzolic soil //sol eluvizem-podzolique //eluvisem-podsolischer Boden - термин М.А.Глазовской (1972) для семейства почв, входящих в генерацию кислых элювиально-иллювиальных почв ассоциации субаэральных кислых ульматно-фульватных почв и характеризующихся элювиально-иллювиальной дифференциацией профиля в отношении ила, R_2O_3 и гумуса; профиль почвы состоит из горизонтов A_o-A_{uf}-E-E_{pl}-$B_{tsialFe}$-C_{sial}; семейство включает типичные подзолистые почвы, дерново-подзолистые и светло-серые лесные почвы, бурозёмно-подзолистые почвы (лессиве, серо-бурые оподзоленные), оподзоленные краснозёмы и желтозёмы, оподзоленные ферраллитные и аллитные почвы (с дифференцированным профилем); син.: подзолозём.

2781. ЭЛЮВИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //eluviated soil //sol éluvial //eluvial Boden - термин для почв, профиль которых дифференцирован на элювиальную (обедненную) и аккумулятивную части по глине или полуторным окислам.

2782. ЭМБРИОНА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА - см. Первичная почва.

2783. ЭНДОДИНА́МОМО́РФНАЯ ПО́ЧВА //endodynamomorphic soil, endodynamomorphous soil //sol endodynamomorphe //endodynamomorpher Boden (от греч. éndon - внутри, греч. dýnamis - сила и греч. morphé - форма) - термин К.Д. Глинки(1908) для почв, развитие которых определяется внутренним по отношению к почве факторами и , прежде всего, почвообразующей породой.

2784. Э́НТИСО́ЛЬ //entisol //entisol //entisol (от созданного слога ent и лат. solum - почва) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для порядка почв, не имеющих иных диагностических горизонтов кроме светлого[x)] либо антропового[x)] горизонта А; почва может иметь кроме того белёсый или пахотный горизонт либо любой из следующих горизонтов: 1) солевой горизонт, за исключением случая когда почва насыщена водой в пределах 1 м от поверхности на 1 месяц или более либо орошается, причем верхняя граница солевого горизонта должна быть не выше 75 см

от поверхности; 2) если мех.состав тяжелее супеси, то насыщение натрием может превышать 15% в какой-либо части в пределах верхних 50 см, но только в случае, если насыщение натрием остается постоянным или увеличивается ниже 50 см и почва насыщена водой в пределах 1 м от поверхности на 1 месяц или более в незамерзшем состоянии; 3) кальцевый[x)] или гипсовый[x)] горизонт либо дурипэн[x)], лежащие не выше 1 м от поверхности; 4) плинтит[x)] при залегании не выше 125 см от поверхности; 5) если мех.состав легче супеси до глубины 1 м, то плинтит[x)] в форме дискретных конкреций или отдельных мягких красных пятен, составляющих менее половины объема во всех горизонтах; 6) погребенные диагностические горизонты, за исключением погребенного светлого[x)] горизонта, если поверхность погребенного профиля глубже 50 см или между 30 и 50 см, а мощность погребенного профиля вдвое меньше мощности перекрывающего наноса; 7) железистые конкреции или панцыри на любой глубине. Порядок Энтисолей включает 5 подпорядков: 1) Аквенты, 2) Аренты, 3) Фловенты, 4) Ортэнты и 5) Псамменты (см.).

2785. ЭО́ЛОВАЯ ПО́ЧВА //aeolian soil //sol éolien //Äolischer Boden (от греч.Aiolos - повелитель ветров) - термин для почв, формирующихся под постоянным воздействием эоловых процессов перемещения почвообразующего материала в аридных условиях.

2786. ЭПИПЕДО́Н //epipedon //epipedon //Epipedon (от греч.epi - сверху и pedon - почва) - термин 7-го Приближения (США,1960) для поверхностных горизонтов почв, окрашенных в темный цвет благодаря органическому веществу, включающих гумусоаккумулятивные и элювиальные подгоризонты.

2787. ЭРГ //erg //èrg //Erg, Sandwüste (от арабского народного названия) - песчаный массив в Северной Африке, обычно в депрессиях среди пустыни.

2788. ЭРОДИ́РОВАННАЯ ПО́ЧВА //eroded soil //sol érodé //erodierter Boden - общеупотребительный сборный термин для почв в разной степени и в разной форме подвергающихся поверхностной эрозии. Син.: смытая почва.

2789. ЭРОЗИО́ННАЯ ПО́ЧВА //erosion soil //sol d'érosion //Erosionsboden (от лат.erosio - разъедание) - термин франц.шк. (1967) для группы почв, входящих в подкласс слаборазвитых неклиматических почв (см.), характеризующихся профилем AC или AR и формирующихся на поверхностях, обнаженных современной эрозией.

2790. ЭРОЗИО́ННАЯ РЕГОСО́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //regosolic erosion soil //sol d'érosion regosolique //regosolischer Erosionsboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы эрозионных почв (см.), формирующихся на рыхлых породах и имеющих профиль AC.

2791. ЭРОЗИО́ННАЯ СКА́ЛЬНАЯ ПО́ЧВА //lithic erosion soil //sol d'érosion lithique //lithischer Erosionsboden - термин франц.шк. (1967) для подгруппы эрозионных почв (см.), формирующихся на плотных коренных породах и имеющих профиль AC

2792. ЭУРЕНДЗИ́НА //eurendzina //eurendzine //Eurendsina - термин Кубиены (1953) для настоящих рендзин, сформированных на плотных карбонатных породах (известняк, мел).

2793. ЭУТРАНДЕ́ПТ //eutrandept //eutrandept //Eutrandept (от греч. eutrophic - плодородный, яп. an - тёмный, яп. do - почва и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы андептов (см.), которые: 1) имеют моллевый[x)] верхний горизонт и тиксотропны в каком-либо горизонте либо имеют влагоемкость более 20% при 15 барах в среднем для почвы между 25 и 100 см; 2) имеют температуру почвы теплее, чем криандепты (см.); 3) не имеют глин, переходящих при дегидратации необратимо в агрегаты размера гравия; 4) не имеющие дурипэна[x)] в пределах 1 м или фраджипэна[x)]. В пределах этой группы выделяются 6 подгрупп почв: 1) типичные эутрандепты (typic), 2) гидроморфные эутрандепты (aquic), 3) энтовые эутрандепты (entic), 4) маломощные эутрандепты (lithic), 5) маломощные устоллевые эутрандепты (lithic ustollic) и 6) устоллевые эутрандепты (ustollic).

2794. ЭУТРОБОРА́ЛЬФ //eutroboralf //eutroboralf //Eutroboralf (от греч.eutrophic - плодородный, греч.boreas - северный и порядкового корня alf для альфисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70)для большой группы боральфов (см.), которые: 1) имеют температуры выше криобораль фов (см.), 2) имеют насыщенность основаниями (по сумме катионов) выше 60% во всех подгоризонтах аргиллового[x)] горизонта; 3) имеют сухой горизонт в какой-то период года большинство лет; 4) не имеют фраджипэна[x)] или натриевого[x)] горизонта; 5) имеют аргилловый горизонт с верхней границей в пределах 60 см от минеральной поверхности, если только мех.состав не легче супеси во всех подгоризонтах выше аргиллового горизонта. В пределах этой

большой почвенной группы выделяются 7 подгрупп почв: 1) типичные (typic), 2) гидроморфные (aquic), 3) песчаные (arenic), 4) гаплудовые (hapludic), 5) гаплудовые маломощные (hapludic lithic), 6) маломощные (lithic) и 7) моллевые (mollic) эутроборальфы.

2795. ЭУТРОПЕ́ПТ //eutropept //eutropept //Eutropept (от греч. eutrophic - плодородный, греч. tropikos - круг поворота и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы тропептов (см.), которые: 1) имеют насыщенность основаниями более 50% в верхнем и камбиевом[x)] горизонтах; 2) не пересыхают на столь долго как 3 кумулятивных месяца большинство лет в любом горизонте; 3) не имеют горизонта, содержащего мягкую рассыпчатую вторичную известь в пределах 1,5 м от поверхности. В пределах этой группы выделяются 10 подгрупп: 1) типичные (typic), 2) вулканические (andic), 3) гидроморфные (aquic), 4) гидроморфные флювентные (aquic fluventic), 5) флювентные (fluventic), 6) флювентные окисные (fluventic oxic), 7) маломощные (lithic), 8) маломощно-трещиноватые (lithic-vertic), 9) окисные (oxic) и 10) трещиноватые (vertic) эутропепты.

2796. ЭУТРОРТО́КС //eutrorthox //eutrorthox //Eutrorthox (от греч. eutrophic - плодородный, греч. orthos - настоящий и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы ортоксов (см.), которые: 1) имеют во всех подгоризонтах окисного[x)] горизонта ёмкость катионного поглощения (по NH_4Cl) более 1 мэкв на 100 г глины (или более 1 мэкв обменных оснований плюс обменный алюминий на 100 г глины); 2) имеют насыщенность основаниями более 35% в верхнем горизонте и во всех подгоризонтах окисного горизонта до глубины минимум 1,25 м; 3) не имеют антропового[x)] горизонта. В пределах этой большой почвенной группы выделяются две подгруппы почв: 1) типичные (typic) и 2) тропептовые (troeptic) эутроргоксы.

2797. ЭУТРОХРЕ́ПТ //eutrochrept //eutrochrept //Eutrochrept (от греч. eutrophic - плодородный, греч. ochros - светлый и порядкового корня ept для инсептисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы охрептов (см.), которые: 1) карбонаты в камбиевом горизонте или в С в пределах профиля и/либо насыщенность основаниями более 60% в каком-ли-

бо подгоризонте в пределах 75 см от поверхности; 2) не пересыхают на столь долго как 3 кумулятивных месяца большинство лет на глубине от 18 до 50 см или выше контакта с плотной породой и не пересыхают на столь много как 2 последовательных месяца более 7 лет из 10 на этих глубинах; 3) имеют среднегодовую температуру почвы выше 8°С или среднелетнюю температуру на 50 см или на контакте с плотной породой выше 15°, если распаханы или не имеют A_0 либо выше 8°С если имеют A_0; 4) не имеют фраджипэна[x] или дурипэна[x]. В пределах этой группы выделяются 17 подгрупп: 1) типичные эутрохрепты (typic), 2)вулканические (andic), 3) вулканические бедные (andic dystric), 4) гидроморфные (aquic), 5) гидроморфные бедные (aquic dystric), 6) гидроморфные флювентные (aquic fluventic), 7) песчаные (arenic), 8) бедные (dystric), 9) бедные флювентные (dystric fluventic), 10) бедные маломощные (dystric lithic), 11) флювентные (fluventic), 12) маломощные (lithic), 13) маломощные комплексно-альфовые (lithic ruptic-alfic), 14) маломощно-трещиноватые (lithic-vertic), 15) рендоллевые (rendollic), 16) комплексно-альфовые (ruptic-alfic), 17) трещиноватые (vertic).

2798. ЭУТРУСТО́КС //eutrustox //eutrustox //Eutrustox (от греч. eutrophic - плодородный, лат. ustus - обожженный и порядкового корня ox для оксисолей) - термин 7-го Приближения (США, 1960-70) для большой группы устоксов (см.), которые: 1) имеют моллевый[x] или темный[x] гумусовый горизонт, который темнее окисного[x] горизонта, и имеют насыщенность основаниями более 50% в окисном горизонте при глинистом мех.составе и более 35% при суглинистом; 2) имеют ёмкость катионного поглощения (по NH_4Cl) более 1 мэкв на 100 г глины (или более 1 мэкв обменных оснований плюс обменный алюминий на 100 г глины) во всех подгоризонтах окисного горизонта.

2799. ЯЧЕ́ИСТАЯ ПО́ЧВА //cellular soil //sol cellulaire, sol alvéolaire //Zellenboden - термин для почв, имеющих пеструю окраску и ячеистое строение, то-есть регулярное чередование участков различного состава и цвета в пределах какого-либо горизонта.

2800. ЯЧЕ́ИСТЫЙ ЛАТЕРИ́Т - см. Латерит ячеистый, Латерит вермикулярный.

Содержание

стр.

Предисловие 4

Foreword 8

Почвенный словарь на русском языке .....IO

ПОЧВЕННАЯ НОМЕНКЛАТУРА

на русском и иностранном языках

(рекомендации к материалам X Международного конгресса почвоведов)

Составитель Б.Г.Розанов

книга первая

Отпечатано с оригинала, представленного Научным советом по проблемам почвоведения и мелиорации почв Академии наук СССР, в Тульской типографии "Союзполиграфпрома" при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г.Тула, проспект им. Ленина, 109. Зак. № 72 Цена I руб.60 коп.