505p 8892

Sycmoly Tymalobury opour Goor or 100 10 10 10

МАТЕРІАЛЫ

для

ome abmopa.

медицинской географіи и санитарнаго описанія

ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

В. І. Кушелевскаго.

томъ і.

nab)

Изданіе Ферганскаго Областнаго Статистическаго Комитета.

Г. Новый Маргеланъ.

1890 r.


- Типогр. Ферган. Области. Правленія.

Печатать разръшается.

Военный Губернаторъ, Генеральнаго

Штаба Генералъ-Мајоръ Корольковъ.

182089 г.



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Бывшее Кокандское ханство присоединено къ Россійской Имперіи въ 1876 г. подъ названіемъ Ферганской области, но еще не составлено описанія этого края въ медицинскомъ отношеніи, что ставить въ весьма затруднительное положеніе нашихъ врачей, прибывающихъ сюда изъ Европейской Россіи и вовсе незнакомыхъ съ различными условіями жизни и патологіей здъшней страны.

При современномъ направленіи медицины и въ особенности гигіэны, тщательное изученіе мъстности въ геологическомъ, климатическомъ и прочихъ отношеніяхъ, становится вопросомъ первой необходимости. Безъ основательнаго знакомства со всъми естественными условіями страны и гигіэнической обстановкой жителей, мы не въ состояніи судить объ извъстномъ вліяніи различныхъ этіологическихъ моментовъ, относительно развитія и распространенія болъзненности между населеніемъ.

Не на всёхъ точкахъ земнаго шара, говоритъ Ж. Буденъ, человъкъ рождается, живетъ, страдаетъ и умираетъ одинаковымъ образомъ. Рожденіе, жизнь, бользпь и смерть видоизмѣняются съ климатомъ, почвой, племенемъ, національностью и многими другими вліяніями.

Эти разнообразныя проявленія жизни и смерти, здоровья и бользни, эти непрерывныя перемьны въ пространствъ, видоизмъняемыя происхожденіемъ людей и различными условіями, въ какихъ они находятся, составляютъ предметъ медицинской географіи.

Для нашей Области, изучение топографии и геологическихъ пластовъ, залегающихъ какъ въ долинъ, такъ и въ окружающихъ горахъ, ознакомление во всъхъ подробностяхъ съ флорой, фауной, климатомъ, гидрографісй, а равно съ бытовыми и гигіэническими условіями, представляется весьма важнымъ для уразумънія и объясненія различныхъ вліяній на жизнь челов'вка и на происхождение тъхъ болъзней, которымъ онъ подвергается; но подобное изучение и описание здъшняго края, съ выводами, могущими имъть какое либо значение въ санитарномъ отношеніи, - представляетъ собою трудъ непосильный одному лицу, необладающему притомъ спеціальными свідініями по всімъ отраслямъ тіхъ знаній, по которымъ затронуты вопросы въ настоящемъ очеркъ. Кромъ того, необходимо собрать по возможности больше матеріала по физической географіи, естественной исторіи, патологіи, а равно относительно образа жизни, пищи и всёхъ прочихъ условій, въ какихъ находится населеніе, какъ мъстное, такъ и пришлое, и тогда уже, на основаніи встхъ этихъ данныхъ, черезъ сопостановленіе различныхъ фактовъ и критической оценке возможно будеть составить требуемое описание. Но cars longa, vita brevis», а потому, чтобы облегчить прибывающимъ сюда врачамъ ознакомление съ вышеупомянутыми условіями и дать возможность продолжать начатое въ этомъже направленіи, я рішился поділиться тіми свідініями, которыя мий удалось почерпнуть въ теченіи 8-ми лътней службы въ Ферганской Области. Выпускаю въ свътъ этотъ трудъ подъ заглавіемъ матеріаловъ, такъ какъ это только канва, съ намъченными узорами, по которой мои сотоварищи, исправляя ошибки и пополняя разными недостающими свъдъніями, доставятъ возможность создать болье полное и обстоятельное медико-географическое и санитарное описаніе края, основанное на прочныхъ научныхъ данныхъ.

Ферганскій Областной врачь В. І. Кушелевскій.

22 Марта 1890 г.

Новый Маргеланъ.

ИСТОЧНИКИ.

- 1) Фергана, по «запискамъ» Султана Бабура. Н. Н. Пантусова. 1884 г.
- 2) Путешествіе по Средней Азін въ 1862 г. А. Вамбери. Изд. 1874 г.
 - 3) Очерки Средней Азін. А. Вамбери. Изд. 1868 г.
- 4) Путешествіе въ Туркестанъ. А. II. Федченко. Т. І. ч. 2. въ Кокандскомъ ханствъ. Изд. 1875 г.
- 5) Русскій Туркестанъ. Сборникъ изданный по поводу политехнической выставки. 2 выпуска, подъ редакціей Н. А. Маева и В. Н. Троцкаго. 1872 г.
- 6) Путешествіе по Туркестанскому краю и пасл'єдованіе горной страны Тянь-Шаня. Н. С'єверцова. 1873 г.
- 7) Вертикальное и горизонтальное распредёленіе Туркестанскихъ животныхъ. Н. А. Сѣверцова. Москва. 1873 г.
- 8) Отчеты о путешествіяхъ на Памиръ. Н. А. Сѣверцова (Извл. И. Р. Г. Общ. 1879 г. Вып. 2 стр. 66).
- 9) Орографическій очеркъ Пампрской горной системы. Н. А. Съверцова. 1886 г.
- 10) Замътки о фаунъ позвоночныхъ Памира. Н. А. Съверцова.
- 11) Матеріалы для геологіи Туркестанскаго края. Г. Д. Романовскаго. Вып. І. 1878 г. вып. ІІ. 1884 г.
- 12) Nouvelle geographie universelle par Elisèe Reclus. L'Asie russe. 1881.
 - 13) De Paris à Samarkand par M-me Uifalvy-Bourdon. 1880.
 - 14) Очерки Ферганской долины. А. ф. Миддендорфа. 1882 г.
- 15) Туркестанъ. Геологическое и орографическое описаніе. И. В. Мушкетова. 1886 г.

16) Памиръ и Алай. И. В. Мушкетова. (Живописная Россія.

Т. Х. изд. 1885 г.).

17) Геологическая карта Туркестанскаго края, составленная въ 1881 г. горными инженерами Г. Д. Романовскимъ и И. В. Мушкетовымъ.

18) О зобъ вообще и объ эндемическомъ зобъ въ Кокандъ.

Д-ра. К. Шалыгина. (В. М. Журналь 1878 г.).

19) Военно-научная экспедиція на Алай и Памиръ Л. О.

Костенко. (Воен. Сборн. 1877 г.).

- 20) Туркестанскій край. Опыть военно-статистическаго обозрѣнія Туркестанскаго военнаго округа. Л. Ө. Костенко 1880 г.
- 21) Нѣсколько словъ о горной долинѣ Алая и Памирѣ. Коростовцевъ (Извл. И. Р. Г. Общ. 1877 г. Вып. 4 стр. 249—292).

22) Ученыя экспедиціп, занимавшіяся изслѣдованіемъ Туркестанскаго края въ 1878 г. В. Ф. Ошанина.

23) На верховьяхъ Мукъ-Су. В. Ф. Ошанина. (Турк. Вѣд. 1879 г.).

24) Путешествіе на Памиръ. Д. Л. Иванова. 1884 г.

25) Краткій отчеть о геологическихъ изслѣдованіяхъ на Памирѣ Д. Л. Иванова.

26) О нефтяныхъ источникахъ въ Кокандскомъ ханствъ.

Г. И. Краузе. (Русскій Туркестанъ).

27) Нефтяные источники въ Ферганской Области. Гилева. (Турк. Вѣд. 1876 г.).

28) Нефтяные источники Ферганской Области. Д. Л. Ива-

нова. Ташкентъ. 1882 г.

29) Очеркъ экспедицін Ген. Штаба Канптана Путята въ Намиръ, Сарыколъ, Ваханъ и Шугнанъ въ 1883 г.

30) Сартовская бользиь. Д-ра Сатпискаго. (В. М. Жури.

1878 г.).

31) Записки о Джалабадъ-Аюбскихъ водахъ. И. Бунина. (В. М. Журн. 1883 г.).

32) Замѣтка о Хазрэтъ-Аюбскихъ минеральныхъ источни-

кахъ. П. Сакирича. (Турк. Вѣд. 1882 г. № 30).

33) О наркотическихъ и нѣкоторыхъ другихъ ядовитыхъ веществахъ, употребляемыхъ населеніемъ Ферганской Области. С. Моравицкаго. Казань. 1886 г.

VIII.

- 34) Описаніе Ферганской Области. В. С. (Туркестанская справочная книга на 1885 г.).
- 35) Горные л'яса Ферганской Области, Очеркъ В. И. Лисневскаго, 1884 г.
- 36) Очеркъ экономическаго состоянія Наманганскаго увзда. И. А. 1884 г.
- 37) Краткая Исторія Кокандскаго ханства. В. Наливкина. 1885 г.
- 38) Очеркъ быта женщины осъдлаго туземнато населенія Ферганы. В. Наливкина п М. Наливкиной. 1886 г.
- 39) Опытъ изслѣдованія песковъ Ферганской Области. В. Наливкина. 1887 г.
- 40) Опытъ медицинской географіи и статистики Туркестана. И. Яворскаго. часть І. 1889 г.
 - 41) Годовые отчеты уёздныхъ и войсковыхъ врачей.

Примичаніе: здісь не поміжщены сочиненія разныхъ автеровь, которыми я тоже пользовался при составленіи этого очерка, такъ какъ они трактують о другихъ странахъ, а не о Ферганіъ. О подобныхъ сочиненіяхъ цитируется въ соотвітствующихъ містахъ.

МАТЕРІАЛЫ

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕОГРАФІИ И САНИТАРНАГО ОПИСАНІЯ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ГЛАВА І.

Границы, пространство, административное дѣленіе, высота надъ уровнемъ моря.

Ферганская область образована въ 1876 г. изъ Границы. бывшаго Кокандскаго ханства. Лежитъ между 38 и 420 С. ш. и между 39½ и 44½ В. д. (отъ Пулкова). Граничитъ къ С. Сыръ-Дарьинской и Семиръченской областями, къ В. Китайскими владъніями (Кашгаріей), къ Ю. Шугнаномъ, Дарвазомъ, Каратегиномъ и Самаркандскою областью, къ З. Самаркандскою и Сыръ-Даръчинскою областями.

Площадь всей Ферганской области простирается пространдо 90.000 квадр. версть (1), изъ которыхъ незначитель- ство. ная часть, около 10.975 кв. версть, обработывается осъдлымъ населеніемъ, а остальная часть, удобная для ско-

товодства, занята кочевниками.

^{(&#}x27;) Приложеніе къ всеподданнійшему отчету по Ферганской Области за 1888 г.

Административное д±леніе.

Вся область дълится на 5 убадовъ, а каждый убадъ на волости. Въ Маргеланскомъ убадъ 18 волостей, въ Кокандскомъ 23, въ Андижанскомъ 20, въ Наманганскомъ 24, въ Ошскомъ 6, а всего въ Области 91 волость.

Высота надъ уровн. моря.

Высота надъ уровнемъ моря весьма различная, смотря по ивстоположенію извъстнаго пункта. Въ долинъ есть мъста, возвышающіяся н. у. м. только на 900 футовъ, тогда какъ въ горахъ многія вершины достигають болье 20.000 футовъ. При такихъ крайнихъ цифрахъ, средняя высота для всей Области не можетъ быть опредълется въ 1500 футовъ н. у. м., но многіе города и кишлаки лежатъ значительно выше.

Существуеть уже много пунктовь, для которыхъ опредълена абсолютная высота; но еще предстоить произвести болье точныя измъренія, которыя замынили-бы
имьющіяся нынь нькоторыя опредъленія высоть, сдыланныя посредствомь малонадежныхъ барометрическихъ
наблюденій, исходящихъ изъ фиктивной средней высоты
и простыхъ вычисленій, извлеченныхъ изъ вида растительности и высоты сныговъ. Въ нькоторыхъ мыстахъ,
приводимыя разными путешественниками высоты горъ,
разнятся между собою на ньсколько соть и даже тысячи футовъ.

Чтобы имъть нъкоторое понятіе о различныхъ высотахъ, привожу имъющіяся измъренія, какъ въ долинъ, такъ и въ окружающихъ горахъ.

Въ долинъ и въ предгорьяхъ:

Г. Кокандъ 1.300 фут. н. у. м., въ его увздв: Сохъ—3600 ф., Чарку 3100 ф., Варухъ 4530 ф. Г. Новый Маргеланъ 1880 ф., Старый Маргеланъ 1480 ф.; въ его увздв: Вуадиль 2820 ф., Чиміонъ 2200 ф., Учь-Курганъ 2960 ф., Шахимарданъ 4500 ф.

Г. Наманганъ 1340 фут., въ его увздъ: Чустъ —2100 ф., Касанъ 2800 ф., Нанай 4340 ф.

Г. Андижанъ 1500 ф., Узгенъ 3220 ф.

 Γ . Ошъ 3300 ф., Γ ульча 4850 ф., озеро Капланъ-Куль 5530 фут.

Горы, окружающія долину, тоже имѣютъ различную высоту. Ограничивающія въ С. В. нѣкоторыя вершины достигаютъ 16000 ф., а съ Ю. еще выше:

			- 1			School Street, School	(0.55,000)	0000	
Гоу .					•	26000	Φ.	н.	V. M.
Гурумды						24000			
Пикъ Ка	уфмана		7 17200			23000			
Mypay y				ы		18000			
Конецъ г						10730			
Конецъ г						14000			
Глетчеръ									
					•	16000	Φ.	-	1 100 100
Вершины	между	глет	черам	и Щу	7-				
ровс	каго и	Зера	авшав	скимт	,	19000	Φ.	-	-
Вершина	къ С.	В. от	ъ пос	пъдня	ro.	21700	Φ.	-	-
Озеро Бол	ьшой Б	арак	VЛЬ Н2	і Паму	aren	13200	Ф	-	2015
Урочище	Сары-	Ташт	ь на	Алак		10300			
Перевалъ	Kapa-	Казы	K'E			14500			
Перевалъ									
Дараутъ-Р				•		11800			
Habay 1 B-1	турган	ь на	ндав			7990			
Перевалъ	Терек	ь-Дав	анъ			12230	Φ.	-	_
Перевалъ						11600	Φ.		_
Перевалъ	Терсъ-	Arap	ъ.			12600	Φ.		_
алтынъ-Мазаръ (русло р. Мука на Алаъ) 9370 ф. — —									
Соляпая к	опь на	Ала	Ť.			9600	m.		
Низовье д	одины	Алая		AL TO	16				
				960		1020	Ψ.	-	-

ГЛАВА ІІ.

Топографія, орографія и геологія Ферганской Области.

Топографичесаніе.

Ферганская Область-это долина, окаймленная веское и орограютъ часть горной системы Тянь-Шаня и Алайскаго хребта. Долина эта миндалевидной формы, занимая средину Области, тянется съ В. на З. на протяженіи около 300 верстъ, при наибольшей 100 верстной ширинъ. Она представляеть такимъ образомъ замкнутую ложбину, сообщающуюся съ Туранскою низменностью лишь на западъ узкимъ проходомъ у г. Ходжента.

Дно долины ровное, только мъстами волнистое, имъетъ наклонъ съ съверо-востока на юго-западъ. Кромъ этого продольнаго наклона, усматриваются еще два поперечныхъ, идущихъ отъ съверныхъ и южныхъ предгорій. Продольный наклонъ дна долины не превышаетъ въ общемъ одного градуса и почти таковы-же поперечные наклоны, которые становятся только круче, по мъръ приближенія къ предгоріямъ.

Въ этой долинъ главнымъ образомъ сосредоточилось осъдлое населеніе Области; въ ней расположены всъ города съ административными учрежденіями и всёми служащими въ нихъ лицами; тутъ-же размъщены и наши войска.

Если слъдовать по продольной оси Ферганской долины отъ Ходжента, то взору путешественника представится справа и слъва великолъпный пейзажъ изъ окружающихъ горъ, которыя, по сравненію А.-ф. Миддендорфа, являются подъ видомъ тройного ряда кулись; съ большей отчетливостью онѣ представляются съ правой стороны, т. е. на Ферганскомъ склонѣ Алайскаго хребта. Кулисы эти состоять изъ болѣе или менѣе нараллельныхъ грядъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга продольными долинами. Увеличиваясь въ размѣрахъ, по мѣрѣ приближенія къ гребню хребта, онѣ кажутся какъбы возстающими одна за другой; а будучи сложенными изъ различныхъ перодъ, онѣ отчетливо различаются, какъ но цвѣту, такъ и по формѣ очертаній.

Ограничивающія горизонть предгорья, представляють первый рядь кулись, иміющія сморщенный видь глубоко врізывающихся и низбітающих внизь бороздь, образовавшихся отъ спітовой воды, проділавшей въ мягкихь образованіяхъ правильныя размоины. Эти предгорья, въ особенности ихъ верхушки, отливають красноватыми, переходящими въ фіолетовый цвіть оттінками.

Позади предгорій возвышаєтся второй рядъ кулисъ, состоящій изъ ряда зубчатыхъ, мрачныхъ, скалистыхъ цъней. Онъ, вслъдствіе смъны свъта и тъни, представляются болье темнымъ фономъ для красноватаго цвъта предгорій.

Третій рядь, поднимающійся до самых туманных облаковь, представляють высочайнія горы, съ скалистымь, зубчатымь гребнемь, съ блестящимь бълымь покровомь вычных спытовь,—онь завершаєть эту величественную и вийсты съ тымь дикую картину.

Такой характеръ Алайскаго хребта лучше всего наблюдается изъ Вуадиля и Чиміона.

Первая, самая низкая кулиса, сложена изъ разпоцвътныхъ породъ: третичной, мъловой и юрской спстемъ; вторая состоитъ изъ палеозойскихъ известняковъ, сланцевъ и, накопецъ, третья, самая высокая состоитъ изъ метаморфическихъ сланцевъ, гранитовъ, гнейсовъ и

проч.

Территорія Туркестанскаго края вся базируєтся на великомъ Тянь-Шаньскомъ нагорьѣ, которое широкою полосою окаймляєть его юго-восточную границу, гдѣ именно расположена Ферганская Область.

Горная система Тянь-Шаня принадлежить къ одной изъ величайшихъ на земномъ шарв, какъ по длинв, такъ и по высотв, которая въ магистральномъ кряжв вездв переходитъ линію въчнаго снъга, почему хребетъ этотъ и названъ еще китайскими географами Тянь-Шанемъ, что въ переводв значитъ пебесныя горы.

Въ горномъ узлѣ Суіокъ (суякъ) происходитъ самое капитальное раздѣленіе Тянь-Шаня. Это развѣтвленіе начинается у истоковъ Сыръ-Дарьи тамъ, гдѣ Кара-Кульджа беретъ свое начало. Здѣсь главный хребетъ направляется вдоль южной окраины долины Ферганы, а другой—на сѣверо-западъ вдоль сѣверо-восточной ея окраины и затѣмъ сливается съ горами Алатау и Чат-кальскими, составляющими правый берегъ обширной долины Сыръ-Дарьи (¹).

Южная развилина Тянь-Шаня начинается отъ упомянутаго узла Суюкъ (близъ перевала тото же имени, или иначе Карабель) и тянется сперва подъ именемъ Алайскаго хребта, составляющаго прямое продолжение Кокъ-Шаала и Кашгаръ-Тау, т. е. идетъ въ юго-западномъ направлении и замыкаетъ долину Ферганы съ юга.

Приблизительно на меридіант Кокана, у горнаго узла Кокт-су, гдт спускается громадный Зеравшанскій ледникт, происходить новое разділеніе, а именно: отсюда прямо на западь отділяется широкою полосою

^{(&#}x27;) Туркестанскій край. Л. Ө. Костенко. Т. І. стр. 25.

Туркестанскій хребеть, ограничивающій Ферганскую долину съ юго-запада; нѣсколько западнѣе отдѣляется отъ главнаго Зеравшанскій хребеть. Главный-же, самый массивный и высокій, отъ горнаго узла Кокъ-су получаеть названіе Гиссарскаго. Оба послѣдніе хребта паходятся внѣ предѣловъ Ферганской Области.

Къ югу отъ Алайскаго хребта тянется Заалайскій хребеть, ограничивающій Алайскую долину съ южной стороны. Онъ тянется параллельно ей съ востока на западь съ легкимъ уклономъ къ югу. Отъ Заалайскаго хребта къ югу находится Памиръ, который замыкается большими хребтами Гиндукушемъ и Каракорумомъ, находящимися внъ предъловъ Области.

Итакъ Ферганскую долину окружають съ съвера цълые ряды параллельныхъ хребтовъ, средняя высота которыхъ превышаетъ снъжную линію, но во всякомъ случав опи гораздо ниже южныхъ горъ. Ближайшими къ долинъ слъдуетъ считать Ферганскій хребеть, ограничивающій Фергану съ съверо-востока и Чаткальскій— съ съверо-запада. За ними идутъ параллельно, пачиная съ запада, горные хребты: Алатау, Александровскій, Сусамыръ, Джаманъ-Даванъ и др., окружающіе верховья р. Нарына и Иссыкъ-Кульскую котловипу. Всъ эти горные хребты, равно какъ и съверные склоны Чаткала и Ферганскаго хребта входятъ въ составъ сосъднихъ Областей: Сыръ-Дарьинской и Семиръченской.

Съ юга Ферганскую долину окружаютъ: Алайскій хребетъ съ западнымъ продолженіемъ, именуемымъ Туркестанскимъ кряжемъ, далѣе слъдуютъ Алайская долина, Заалайскій хребетъ и часть Памира, входящаго въ составъ Области, такъ какъ граница на послъднемъ до настоящаго времени опредълена не точно.

Н. А. Съверцовъ, на основаніи орографическихъ изслъдованій, Алайскій и Заалайскій хребты, вмъстъ съ Памиромъ не причисляєть къ Тянь-Шаньской горной системъ, а относить къ отдъльной Намирской системъ. Алайскій хребеть, съ его подраздъленіями и продолженіями, онъ называеть Фергано-бухарскимъ нагорьемъ, которое, начиная съ востока, расчленяется на 6 частей: Терекъ-даванское, Кчи-алайское, Верхне-зеравшанское, Магіанское, Ширабадское и Нуратинское (1).

Горы, окружающія долину, въ нёкоторыхъ мёстахъ имьють съдловины и проходы, возвышающіеся надъ дномъ долины на 10 и болъе тысячъ футовъ. Эти горы, преимущественно южная двойная цёпь Алайскаго и Заалайскаго хребтовъ, увънчаны вершинами, значительно превышающими высоту горныхъ проходовъ и покрыты въчными спътами, потому что снъжная линія въ этихъ мъстахъ находится на высотъ 14.000 фут. надъ ур. моря. Въ этихъ горахъ залегаетъ нѣсколько грандіозныхъ глетчеровъ, быть можеть остатки бывшаго ледниковаго періода, дающихъ въ настоящее время начало многимъ горнымъ рѣчкамъ, несущимъ свои воды въ долины Аму и Сыръ-Дарьи. Горы, окружающія долину съ съвера, ниже южныхъ; сивгъ на нихъ держится летомъ лишь въ немногихъ мъстахъ, а глетчеры несравненно менъе значительны, чемъ на южныхъ горахъ.

Въ горахъ, окружающихъ Ферганскую долину, какъ съ съвера, такъ и съ юга, нътъ вовсе вулкановъ; не замъчается и потухшихъ. За то землетрясенія бывають очень часто, хотя за все время, какъ Фергана принадлежитъ Россіи, онъ проявлялись въ долинъ въ умъ-

⁽⁴⁾ Орографическій очеркъ Памирской горной системы. Н. А. Сѣверцова. 1886 г. стр. 181.

ренной степени; только въ 1883 году въ г. Ошт землетрясеніе продолжалось довольно долго; а въ 1888 г. въ юго-западномъ углу долины произошло значительное сотрясеніе почвы, всявдствіе чего разрушилось много тувемныхъ сакель и вновь выстроенная почтовая станція въ Костакозв. Въ болве отдаленныя времена, по преданіямъ туземцевъ, землетрясенія въ Ферганъ про-

изводили страшныя опустошенія.

Между грядами горъ, окружающими долину Ферганы, тянутся продольныя долины, изъ которыхъ нъкоторыя достигають значительной длины и ширины. Особенно поражаетъ своими размърами долина верхняго теченія западной Кизыль-су, самаго севернаго истока Аму-Дарьи, извъстная подъ именемъ Алая. Она находится на 9-10 тысячь о. н. у. м., тянется на 150 версть, отъ Таумуруна почти прямо къ W, съ весьма незначительнымъ уклоненіемъ къ W S W, до уроч. Большой Карамукъ, гдъ Кизылъ-су вливается въ тъсное ущелье, отдъляющее Алай отъ его западнаго продолженія—Каратегинской долины. Шярина Алая у подошвы Тау-Муруна 8 верстъ, у устья р. Катынъ-артъ-16 верстъ; отсюда до низовья Талдыкъ-су, тянется на 12 в. вдоль праваго берега Кизылъ-су, гдъ долина сразу разширяется отъ 10 до 18 верстъ и потомъ постепенно съуживается до 8 в. у Дараутъ-Кургана, близъ устья р. Коксу и менъе одной вер. передъ устьемъ р. Катта-Карамукъ (1).

Кром'в продольныхъ долинъ, мы видимъ еще много поперечныхъ трещинъ, очевидно образовавшихся при ноднятім горной массы. Трещины эти идуть всегда въ поперечномъ направленій къ грядамъ и проразывають

⁽⁴⁾ Н. А. Сфверцовъ. Тамъ-же. стр. 165.

горы до самаго водораздѣльнаго хребта. По этимъ трещинамъ стекаютъ съ горъ рѣчки, направляющіяся къ Сыръ-Дарьѣ. Какъ долина Алая, такъ и прочія небольшія горныя долины, не смотря на свою плодоносную почву, не заняты осѣдлымъ населеніемъ, по причинѣ короткаго лѣта; но опѣ посѣщаются кочевниками, во время джайляу (лѣтовокъ), вслѣдствіе находящихся тамъ богатыхъ пастбищъ.

Ферганская Область, по своему топографическому положенію, не можеть быть причислена къ какому либо разряду отдъльныхъ мѣстностей. На такой незначительной территоріи, какую она занимаеть, мы встрѣчаемъ всевозможнаго характера мѣстности: горныя, гористыя, волнистыя, равнинныя, степныя, лѣсистыя, болотистыя и песчаныя, и вездѣ идеть своего рода жизнь.

Фергана вовсе не представляеть собою такого сплошного сада, какимъ привыкли считать ее, на основаніи древнихъ писателей, подъ вліяніемъ которыхъ, вѣроятно, находились первые корреспонденты 1875 г., оповъстившіе міръ, что Фергана—райская долина, забывъ прибавить, что въ ней между райскими оазисами, находится много мъстъ, которымъ можно дать названіе совершенно противоположное.

Въ центрѣ ея находится безводная, солончаковатопесчаная степь, пеобитаемая, накаливаемая жгучими лучами полуденнаго солнца до неимовѣрно высокой температуры. Это въ миніатюрѣ настоящая пустыня Сахара, среди прелестнѣйшей, культивированной страны, богатой различными породами фруктовыхъ и другихъ деревьевъ, роскошными полями и садами, оглашаемыми пѣніемъ тысячи пернатыхъ и гдѣ на каждомъ шагу кипитъ дѣятельная человѣческая жизнь. И всею этою роскошью, всёмъ этимъ великолёпіемъ, человёкъ обязанъ водё, струящейся серебристыми лентами по его полямъ и усадьбамъ, и своему неусыпному труду, превратившему пустынныя степи въ плодороднъйшую страну. При содъйствіи воды здёсь царитъ жизнь, а тамъ, безъ нея—смерть.

Изъ долины, въ какую сторону не направимся, вездъ встрътимся съ предгорьями; дальше—пойдутъ уже пастоящія горы, ущелья и перевалы. Во многихъ ущельяхь и горахъ, особенно въ окружающихъ Ферганскую долину съ С. и С. В. растутъ хвойные и лиственные лъса. Алайская долина, на высотъ 9—10 тысячъ футовъ н. у. м. имъстъ степной характеръ и покрыта богатою, травянистою растительностью, пригодною для прокормленія большихъ стадъ кочевниковъ. Въ Ферганской долинъ, большая часть растительности искусственная,—дъло человъческихъ рукъ; а на Алаъ и прочихъ горныхъ долинахъ она возникла и продолжаетъ свое существованіс, при посредствъ естественныхъ силъ природы.

Поднимаясь еще выше, мы очутимся въ мъстности покрытой въчными льдами и снъгомъ, на границъ, какъ бы между жизнью и смертью, такъ какъ этотъ ледяной покровъ сковываетъ и прекращаетъ жизнь, какъ растительную, такъ и животную. Но это кажущееся отсутствіе жизни, есть начало ея. Изъ подъ этихъ мощныхъ глыбъ льда и снъга, вырываются стремительные потоки пънящейся воды, дающіе начало безчисленнымъ горнымъ ръчкамъ, орошающимъ долину и превращающимъ ее въ плодороднъйшую страну, питающую милліоннос населеніе и огромное количество скота. Съ исчезновеніемъ этихъ ледниковъ и снъжныхъ залежей, дающихъ начало оросительно-живительнымъ артеріямъ, вся эта

страна погибнетъ и превратится въ мертвую пустыню. Горныя довалы.

Хотя выше было сказано, что Ферганская долина роги и пере- замкнута со всъхъ сторонъ, за исключениемъ лишь узкаго прохода около Ходжента, по эга замкнутость относится лишь къ проъзду въ колесномъ экипажъ. Для верховаго и пъшехода, въ извъстное время года, представляется возможность пройти черезъ цёпи горъ изъ долины въ сосъднія страны и обратно. Правда, что черезъ эти цъпи горъ ведуть лишь крайне затруднительныя и по временамъ даже опасныя горныя тропы, которыя въ продолженіи большей части года вовсе непроходимы, по случаю снъжныхъ заносовъ и обваловъ. И въ благопріятное время года, большая часть этихъ проходовъ и переваловъ, доступны только опытному путешественнику верхомъ, или пъшкомъ; а объ экипажъ, даже самаго первобытнаго устройства, какимъ является туземная арба,—не можеть быть и ръчи. Во многихъ мъстахъ, узкая тропинка вьется по отвъсному склону горы надъ пропастью, какъ по карнизу, велъдетвие чего эти тропы носять название карнизовь, по туземному -кія, сакретма. Мъстами устроены утлые, висячіе мостики и балкончики, сдъланные изъ жердочекъ, перекипутыхъ надъ пропастью съ одного камня на другой, съ положеннымъ поверхъ хворостомъ, камышемъ, камнями и т. п. Лошадь съ большимъ трудомъ переступаетъ по этимъ ненадежнымъ сооруженіямъ и достаточно одного невърнаго шага, чтобы она вмъстъ съ всадникомъ полетъла стремглавъ въ глубокую пропасть, на днъ которой не найти и слъдовъ ихъ. Эти жалкіе пути сообщенія были приведены въ годное состояніе, или втрите въ возможно-доступное, лишь усиліями человъческихъ рукъ, работавшихъ для этого съ древнъйшихъ временъ и продолжающихъ работать по настоящее время, потому что каждую весну, отъ таянія снѣга и горныхъ потоковъ, эти импровизированные дороги и мостики размываются и разрушаются, вслѣдствіе чего становятся непроходимыми, даже для горца пѣшехода.

Въ экстренныхъ случаяхъ, когда нужно было пройти нашимъ войскамъ на Алай, эти дороги, насколько возможно, исправлялись администраціей и солдатами. Въ теченіе послъднихъ 3-хъ лътъ, разработывалась горная дорога, на протяженіи 60 верстъ, черезъ перевалъ Тенгизъ-Бай, къ Дараутъ-Кургану на Алаъ, на казенныя средства. Эта дорога, главнымъ образомъ, имъетъ значеніе для военныхъ цълей, такъ какъ въ 4 перехода, наши войска изъ Маргелана могутъ быть на Алаъ.

Эти примитивныя дороги служать единственными путями сообщенія между различными горными мъстноетями; по нимъ-же проходятъ караваны въ сосъднія съ Ферганой владънія, такъ какъ другихъ дорогъ, для подобныхъ сообщеній—не существуєть. Вся эта горная страна, въ самой глубокой древности, принадлежала бродячимъ племенамъ, которыя перекочевывали отъ пастбища къ пастбищу, отъ подошвы къ вершинъ горъ. Такимъ образомъ кочевники противоположныхъ покатостей ветупали между собой въ сношенія и для этого прінскивали возможно-доступные и кратчайшіе проходы и перевалы. Племена, поселившіяся въ долинъ, само собою вступали въ сношенія съ кочевниками, для обмъна своихъ произведеній; а потомъ, уб'єдившись въ возможности подобныхъ сообщеній черезъ горы, посредетвомъ этихъ тропъ, проникли и въ сосъднія владенія. Послъ этого и другіе народы начали избирать этотъ путь, какъ кратчайшій, для разныхъ цълей. Но очень немногіе изъ путешественниковъ оставили описаніе своихъ маршрутовъ. На однообразномъ, пустынномъ пространствѣ, слѣды путниковъ терялись такъ же скоро, какъ и слѣды корабля въ океанѣ. Никакія точныя указанія, въ древнихъ сочиненіяхъ о путешествіи, не могутъ помочь отыскать прежніе пути каравановъ и только новѣйшія изслѣдованія путешественниковъ, тщательно напосившихъ на карту маршруты, дали возможность составить общее понятіе какъ о путяхъ, такъ и о рельефѣ этихъ горныхъ странъ. Само собою разумѣется, что съ занятіемъ края Русскими, эта невѣдомая страна, годъ отъ году обогащается новыми свѣдѣніями.

Въ настоящее время, по этимъ горнымъ дорогамъ и переваламъ, пробъжаютъ не только кочевники и путешественники, но и административныя лица, которымъ весьма часто приходится бывать въ горахъ, по разнымъ служебнымъ надобностямъ. Чиновникамъ и врачамъ, служащимъ въ здёшнемъ краѣ, выносливость въ горныхъ путешествіяхъ и умѣніе ѣздить верхомъ, такъ-же пеобходимы, какъ морякамъ привычка къ качкѣ и умѣніе плавать.

Переваловъ и проходовъ въ горахъ, окружающихъ Ферганскую долину, множество; но большая часть изъ нихъ пе имъетъ особаго значенія, или по непроходимости, или потому, что служитъ только сообщеніемъ между смежными урочищами.

Въ виду того, что перевалы и проходы представляютъ для насъ интересъ, не только въ торговомъ отношеніи, но и въ гигіэническомъ, считаю необходимымъ перечислить и сдълать краткій очеркъ тъмъ изъ нихъ, чрезъ которые направляются горныя дороги въ сосъднія владънія и по которымъ проходять торговые караваны.

Большая часть переваловъ бывають открытыми лишь въ течение нъсколькихъ лътнихъ мъсяцевъ; во все же остальное время они заносятся настолько глубокимъ енъгомъ, что ни верхомъ, ни пъшкомъ пройти невозможно. При этомъ въ зимнее время года, вблизи этихъ переваловъ нътъ кочевниковъ, вслъдствіе чего нельзя достать ни топлива, ни корма для вьючныхъ и верховыхъ животныхъ. Продовольствіемъ для людей, еще возможно запастись заранье, но брать съ собою топливо и кормъ немыслимо, такъ какъ каждое вьючное животное, въ продолжении нъсколькихъ дней, съъсть по въсу гораздо больше, нежели въ состояніи пести на себъ. И въ то время, когда перевалы бываютъ открытыми, т. е. когда возможно по нимъ пройти, нфкоторые изъ нихъ представляютъ много затрудненій и опасностей, вслъдствіе чего бывають несчастные случаи, какъ съ людьми, такъ и съ животными. Иомимо трудности подъемовъ и спусковъ, причемъ требуются неимовърныя усилія, номимо случайных опасностей, являющихся на каждомъ шагу, еще весьма важную роль играетъ абсолютная высота перевала, имъющая вліяніе на человъческій организмъ. Далеко не всякій въ состояніи подняться до высоты 14 тысячь футовь н. у. м. безъ того, чтобы не испытать припадковъ горнаго недуга. Для путешествій по высокимъ горамъ нужно обладать здоровыми легкими и нормально функціонирующимъ сердцемъ. Кромъ того, пужно быть привычнымъ въ этого рода путешествіяхъ, и обладать извъстнаго рода храбростью, т. е. не трусить, въ противномъ случат даже не на столь значительной высот' можеть появиться головокружение, упадокъ силь и обморокъ, который можетъ кончиться весьма плачевно, если онъ приключится на такомъ мъстъ,

на которомъ трудно удержаться. Болѣе подробно о припадкахъ горнаго недуга будетъ мною сказано въ главѣ V; а теперь перейду къ описанію болѣе, или менѣе извѣстныхъ переваловъ.

1) Перевалы Кокандскаго уфзда.

Всв перевалы южной границы Кокандскаго увзда ведуть въ Каратегинское бекство, подвластное Бухаръ, а также на верховья р. Матча, истока Зеравшана. Дороги на эти перевалы идуть по ръкамъ Исфаръ и Сохъ, поднимаясь по ихъ верховьямъ. Дороги эти ни торговаго, ни стратегического значенія не иміноть, потому что пролегають по берегу ръчекъ, которыя льтомъ, въ половодье не всегда проходимы, вслъдствіе быстраго теченія и глубины воды; кром'в того, перевалы эти очень высоки, дорожки, ведущія на вершины ихъ, тянутся по узкимъ ущельямъ, зимою запосятся глубокимъ енъгомъ, а потому въ течение зимнихъ мъсяцевъ трудно проходимы даже для привычныхъ каратегинцевъ. Если такимъ образомъ исключить зимніе и лътніе мъсяцы, когда дорога на эти перевалы бываетъ, или совершенно закрытой, или крайне опасной, то оставшееся затёмъ время настолько непродолжительно, что сообщенія по этимъ дорогамъ не могутъ имъть важнаго значенія. Болье другихт извъстенъ переваль Кара-Гушъ-хана расположенный на верховьяхъ р. Соха.

2) Перевалы Маргеланскаго увзда.

Перевалы эти слъдуетъ раздълить на двъ категоріи: а) соединяющіе Фергану съ долиною большаго Алая, по которымъ дороги на западъ ведутъ въ Каратегинъ и на востокъ въ Кашгаръ и б) перевалы соединяющіе долину Алая съ Памиромъ.

Перевалы первой категоріи: Кара-Казыкъ, расположенъ на верховьяхъ р. Шахимардана; абсолютная высота болъе 14.000 фут.; сообщение прекращается въ теченіи 7 місяцевь, не столько вслідствіе высоты и трудности подъема, сколько велёдствіе того, что окрестныя мъста въ это время необитаемы и путнику трудно добыть себъ пропитаніе. Кромъ того на переваль свиръпствують сивжные бураны, нередко даже и летомъ, препятствующіе свободному сообщенію, а подчась бывающіе гибельными для путешественниковъ. Спускъ съ Кара-Казыка идетъ внизъ, по теченію р. Кокъ-су, впадающей въ Кизылъ-су, западнъе Дараутъ-Кургана. Во время Алайскаго похода въ 1880 г., послъ нъкотораго исправленія этой горной дороги, наши войска съ конпо-горной батареей, хотя и съ большими затрудненіями, но перевалили Кара Казыкъ.

Перевалъ Тенгизъ-Бай, расположенъ на верховьяхъ Исфайрамъ-сая; абсолютная высота его 11.800 ф. Перевалъ этотъ открытъ въ теченіе цѣлаго года и находится на единственномъ зимнемъ пути изъ Ферганы въ Каратегинъ. Перевалъ этотъ настолько не трудный, что даже зимою, во время снѣжныхъ заваловъ, проходимъ одинокими путниками. Спускъ съ перевала идетъ внизъ по теченію р. Дараутъ, впадающей въ Кизылъ-су.

Остальные затёмъ перевалы, какъ-то: Джанъ-Джаръ, Каукъ и Тузъ-Ашу значенія не имѣютъ и служатъ только для лётнихъ перекочевокъ мѣстныхъ киргизовъ.

Переваны второй категоріи вообще мало изслѣдованы. Болѣе другихъ извѣстенъ намъ перевалъ Терсъ-Агаръ, высотою 12.160 ф.; онъ соединяетъ системы р. Кизылъ-су и Мукъ-су. Подъемъ на перевалъ идетъ по р. Тузъ, впадающей въ Кизылъ-су, противъ Дараутъ-Кур-

гана. 3) Перевалы Ошскаго увзда: черезъ Заалайскій хребетъ имъется только одинъ перевалъ Кизылъ-Артъ (14.000 ф.), удобопроходимый во всякое время года. Черезъ Алайскій хребеть перевалы расположены на верховьяхъ ръчекъ Акъ-Буры, Куршаба и Тара. Изъ числа переваловъ, расположенныхъ на верховьяхъ Акъ-Буры, только два доступны для движенія съ выоками, по и то съ невъроятными затрудненіями-это Сарыкъ-Моголъ и и Джиптыкъ. Абсолютная высота этихъ переваловъ достигаеть 14.000 фут., но крутизна склоновъ настолько велика и ущелья настолько узки, что по нимъ двигаются только кочевники и то только въ лътніе мъсяцы. Оба перевала ведутъ въ долину большаго Алая. Отъ Оша дорога на эти перевалы идетъ вверхъ по теченію р. Акъ-Буры, по дикимъ скалистымъ ущельямъ и узкимъ карнизамъ до урочища Шаль-Кильдакъ, гдф дорога на пер. Сарыкъ-Моголъ идетъ вверхъ по теченио р. Кичикъ-Алая и дальше по Сарыкъ-Моголу, а на пер. Джинтыкъ, вверхъ по р. Джинтыкъ. Спускъ съ этихъ переваловь по ръчкамъ Сарыкъ-Моголъ и Джиптыкъ въ долину большого Алая.

Перевалы, расподоженные на верховьяхъ р. Куршаба, слъдующіе: Талдыкъ 11.600 ф., Арчатъ-Даванъ 11.760 ф., Шартъ 12.800 ф., Терекъ-Даванъ 12.700 ф. и Биляули 15.000 ф.; изъ нихъ первые три ведутъ въ долину большого Алая, а послъдніе два на р. Кокъ-су, внадающую въ Кизылъ-су (истокъ Кашгаръ-Дарьи или Тарима) немногимъ выше нашего Иркештамскаго укръпленія. Дорога по р. Куршабу составляетъ главное сообщеніе между Ферганой и Кашгаріей. По ней двигаются всъ торговые караваны и большинство кочевниковъ, которые ежегодно съ десятками тысячъ кибитокъ и не-

смътными стадами избираютъ этотъ путь, какъ самый удобный для переселенія на лътовки, въ долину Алая. Изъ всяхъ указанныхъ здёсь переваловъ, несомнённо самый легкій, это Талдыкъ 11.600 ф., по которому наши войска двигались не только съ тяжестями, но и съ полевой артиллеріей. Однако переваль этоть зимою непроходимъ, велъдствіе того, что подступы къ нему со стороны Алая, на большомъ протяженіи, лишены топлива и корма. Лътомъ за то всъ караваны избираютъ преимущественно этотъ путь, такъ какъ, кромъ удобопроходимости, выочныя лошади, послъ переходовъ по горамъ Кашгаріи, быстро поправляются на пастбищахъ Алая. Перевалъ Арчатъ трудиће для движенія и служитъ исключительно для перекочевокъ киргизъ. Персвалъ Шартъ выше предыдущихъ и значительно трудиве ихъ, тъмъ не менъе, какъ лежащій на кратчайшемъ пути, съ восточной части долины Алая въ Фергану, часто избирается не только для перекочевокъ мъстныхъ киргизъ, но и для торговыхъ каравановъ. Последние чаще пользуются этой дорогой при сладованіи изъ Кашгара въ Фергану, нежели обратно. Причиною этому служитъ отчасти то обстоятельство, что подъемъ на пер. Шартъ значительно легче со стороны Алая, чёмъ со стороны Ферганы; а главное, что караваны, елъдующіе изъ Кашгара, въ теченіи многихъ дней хода, идуть по мъстности совершенно лишенной подножнаго корма, вслъдствіе чего лошади истощаются и возчики для поправления ихъ направляются на Алай, предпочитая этотъ кружный путь болье близкому, черезъ Терекъ-Даванъ, который тоже лишенъ подножнаго корма. Вышеупомянутые три перевала: Талдыкъ, Шартъ и Арчатъ-Даванъ зимою непроходимы всявдствіе заноса снігами, а также по отсутствію топлива и безлюдію въ окрестностяхъ.

Перевалъ Терекъ-Даванъ имъетъ самое важное значеніе для Ферганы, какъ единственный проходимый въ теченій цілаго года на пути въ Кашгаръ. Не смотря на свою высоту, онъ не закрывается зимою, или върнъе сказать, снъжные завалы протаптываются соединенными усиліями людей и вьючныхъ животныхъ, двигающихся безпрерывно по Ошско-Кашгарскому караванному пути, связывающему Кашгарію съ Ферганой. Переваль этогь быль извёстень въ глубокой древности, но впервые объ немъ упоминается за сто лътъ до Р. Х. Подъемъ на пер. Терекъ-Даванъ одинъ изъ самыхъ трудныхъ, но дорога черезъ него избирается караванами какъ самая кратчайшая и кромъ того пролегающая вблизи киргизскихъ зимовокъ, гдв путники могутъ находить проводниковъ, топливо и кормъ. Зимою переходъ черезъ переваль опасенъ, вслъдствіе страшныхъ снъжныхъ бурановъ и обваловъ, зарывающихъ иногда цълые караваны съ людьми и товарами. О трудности пути свидътельствуютъ кости погибшихъ животныхъ, густо покрывающія оба склона перевала. Дорога на этотъ переваль идеть по р. Гульчъ (Куршабъ) до урочища Суфи-Курганъ, а отгуда вверхъ по р. Терекъ на перевалъ. Подъемъ на главный перевалъ и спускъ чрезвычайно круты, по галькъ и осыпи. Спускъ съ перевала идеть по р. Терекъ до р. Кокъ-су; оттуда дорога пересфиаеть два параллельныхъ хребта, съ перевалами Экизякъ и Керманкуль, высота которыхъ 11.000 ф. и выходить къ нашему Иркештамскому укрвиленію, построенному въ 1885 г. на берегу р. Кизылъ су, на границъ съ Китаемъ.

Перевалы, соединяющіе Фергану съ Кашгаріей, на восточной границѣ и пересѣкающіе горныя выси Тянь-

Шаня, расположены въерообразно на ръчкахъ, составляющихъ верховья р. Тара, одного изъ истоковъ Кара-Дарьи. Всъ эти ръчки соединяются на ур. Алайку, которое такимъ образомъ можетъ считаться узломъ всъхъ дорогъ этой системы. Начиная съ С. на Ю. въ Тянь-Шаньскомъ хребтъ расположены слъдующіе перевалы: Суякъ (12.740 ф.), Джитымъ-Ашу, Кугартъ, Тузъ-Ашу, Талгый, Кара-Гаты, Сіидамъ, Савоярдынъ, Тартъ-Куль (13.000 ф.) и Наурусъ (14.500 ф.). Всъ эти перевалы торговаго значенія не имъютъ, вслъдствіе трудности движенія вверхъ по р. Таръ, а потому служатъ исключительно для перекочевокъ нашихъ киргизъ. Наурусъ очень высокъ, бываетъ открытъ для движенія только въ теченіе З-хъ лѣтнихъ мѣсяцевъ и чрезвычайно труденъ, такъ что избѣгается даже киргизами.

Перевалы Чаткальскаго и Ферганскаго хребта, въ особенности послъдняго, для торговли значенія не имъютъ, а служатъ для перекочевокъ окрестныхъ киргизъ, а также для прогона скота и преимущественно барановъ, которые, въ количествъ нъсколькихъ десятковъ тысячъ головъ, ежегодно пригоняются изъ Семиръчья въ Фергану. Исключеніе составляетъ перевалъ Кандыръ-Даванъ (5.500 ф.), находящійся въ крайнихъ западныхъ склонахъ Чаткальскаго хребта и черезъ который поддерживается прямое сообщеніе Ферганы съ Ташкентомъ. Дорога на этотъ перевалъ идетъ отъ Чиль-Махрамской переправы на Сыръ-Даръѣ, черезъ клидакъ Шайданъ, на пер. Кандыръ-Даванъ, а оттуда въ сел. Теляу, Ташкентскаго уъзда, и Ташкентъ.

Кромъ указанныхъ переваловъ, болъе извъстны слъдующіе:

¹⁾ Пер. Кичигутъ 10.500 ф., расположенный па

верховьяхъ р. Гава. 2) Перевалы Кара-Терекъ-Даванъ и Кочъ-Кара-Ата, расположенные на верховьяхъ р. Касанъ. Они ведутъ къ могилѣ мусульманскаго святаго Идрисъ-Пайгамбера, ежегодно посѣщаемой тысячами богомольцевъ. 3) Пер. Чаначъ, въ верховьяхъ р. того же имени. 4) Перевалы Афлантунъ и Сары-Чилякъ на верховьяхъ р. Афлантунъ. 5) Пер. Ашу-Туръ, на верховьяхъ одного изъ истоковъ р. Кара-су, на высотѣ 11.700 ф. 6) Пер. Юркеръ-Бель 8.600 ф., расположенъ на р. Бута-Бекъ, одного изъ притоковъ р. Нарына.

Въ Ферганскомъ хребтъ:

- 1) Перевалы: Кукъ-Биль, Кумышъ-Биль и Майчакъ; черезъ нихъ идетъ сообщеніе съ вновь присоединенной къ Ферганъ Кетмень-Тюбинской волостью. Перевалъ Куратмесъ, на верховьяхъ р. Чарвака; черезъ него идетъ сообщеніе съ Семиръченской Областью.
- 2) Перевалы: Кара-Алма, Урумъ-Бель и Кугартъ расположены на верховьяхъ р. Кугартъ и его притоковъ. Черезъ эти перевалы сообщаются съ Семиръчьемъ. Система р. Кугарта и въ особенности одного изъ притоковъ Кара-Алма замъчательно богата древесною растительностью и преимущественно оръховыми рощами.
- 3) Перевалы: Яссы, Читты и Кара-Шура расположены на верховьяхъ р. Яссы и ея притоковъ, которые тоже замъчательны по богатству лъсной растительности. Здъсь оръховыя рощи съ въковыми деревьями, въ перемежку съ дикими грушами, яблонями, сливами и другими фруктовыми деревьями, составляютъ непроходимыя чащи, дающія убъжище тиграмъ и другимъ хищнымъ животнымъ.
 - 4) Перевалы: Шиль-Бели и Терекъ расположены на

верховьяхъ Кара-Кульджи. Второй изъ этихъ переваловъ, вивств съ пер. Суякъ, ведутъ черезъ долину Арна, мимо озера Чатыръ-Куль въ долину Атъ-Башъ, въ Семирвчьи, гдв ежегодно бываеть ярмарка въ продолжении мъсяца. На этой ярмаркъ производятся сдълки на сотни тысячь головь различнаго скота, который продается потомъ въ Кашгарія и Ферганъ. Такимъ образомъ перевалы Суякъ и Терекъ служатъ главнымъ сообщениемъ для прогона скота изъ долины Ать-Башъ въ Фергану.

Жизнь человека, во многихъ отношенияхъ зависитъ Геологичеотъ ночвы, на которой онъ живетъ. Нигдъ съ такою ское описаніе. очевидностью, говоритъ К. Риттеръ, не проявляется та связь, или, лучше сказать, та зависимость человъка отъ окружающей физической природы, какъ во внутренности материковъ, а къ этой категоріи странъ принадлежить безспорио Ферганская Область. Основной принципъ современной геологіи гласить, что прошлая жизнь земли можетъ быть правильно истолкована только на основаніи изученія явленій современной жизни, а потому знаніе дъйствующихъ геологическихъ агентовъ, производящихъ многоразличныя измёненія въ мірё неорганическомъ и органическомъ, положительно необходимо для пониманія бывшихъ геологическихъ процессовъ. Основательное изучение внутреннихъ частей материковъ можетъ привести къ болъе правильному уразумънію тъхъ безкопечныхъ измъненій, которыя испытывала земля въ теченіе своей долгой жизни; а эти измѣненія не могли не отразиться на бывшемъ и современномъ царствъ раетительномъ и животномъ, на которыхъ зиждется существованіе человъка.

Отъ свойства почвы, на которой поселился чело-

въкъ, зависитъ его благосостояніе и въ тоже время бользии ею порождаемыя. Химическій составъ воды, атмосферной пыли и качество вдыхаемаго воздуха,—всецью зависять отъ свойствъ покрывающей или подстилающей почвы. Не увлекаясь теоріями, приписывающими почвъ главную роль въ происхожденіи перемежающихся лихорадокъ, каменной бользии, зоба и нъкоторыхъ другихъ,—мы тъмъ не менъе не можемъ отказать ей, въ этомъ отношеніи, извъстнаго рода вліянія.

Человъкъ во многихъ отношеніяхъ служить выраженіемъ почвы, на которой живетъ. Мягкія страны, говоритъ Геродотъ, производять мягкихъ людей (кн. ІХ гл. 22), а Кювье замъчаетъ, что опытный путешественникъ, по обычаямъ народа, по виду его жилищъ и одежды узнаетъ составъ почвы каждаго округа; точно также, по составу почвы, минералогъ-философъ выводитъ заключеніе о правахъ, степени зажиточности и образованіи народа.

Растенія, какъ дикорастущія, такъ и культивированныя, доставляющія человъку пропитаніе, а равно исцъленіе отъ различныхъ недуговъ, могутъ произрастать только на извъстной почвъ. Этими-же растеніями питаются и животныя, употребляемыя человъкомъ въ пищу. На безплодной почвъ немыслимо существованіе и подобныя мъста въ Ферганъ остаются безлюдными.

Климатическія условія, въ бельшей ижи меньшей степени, находятся въ зависимости отъ почвы.

Въ виду подобнаго значенія почвы, подробное изученіе геологическихъ пластовъ, залегающихъ въ нашей странъ, является необходимостью для уразумънія и объясненія различнаго рода вліяній обусловливаемыхъ ею. Хотя при современномъ состояніи науки, еще весьма недоста-

точно выяснена связь различныхъ жизненныхъ процессовъ и бользнениыхъ явленій, съ физико-химическими свойствами почвы и воды, по тъмъ не менъе масса уже добытыхъ фактовъ указываетъ намъ, во многихъ случаяхъ, на пеоспоримую между ними связь. Точныя наблюденія, въ этомъ направленіи, можетъ быть современемъ дадутъ возможность подмѣтить и констатировать различные факты, которые, при раціональной оцѣнкъ, освѣтятъ темную область этіологическихъ моментовъ бользней Ферганы. Но подобные наблюденія и выводы могутъ производиться лишь въ такихъ пунктахъ, въ которыхъ подробно изслѣдованы почва и болье глубокіе слои, а равно окрестныя мѣстности, изъ которыхъ притекаютъ рѣчки и дуютъ вѣтры, приносящіе извѣстнаго состава воду и атмосферную пыль.

Благодаря трудамъ Г. г. Романовскаго, Мушкетова, Съверцова и Иванова—геологическое строеніе Ферганской Области изучено гораздо подробнъе многихъ мъстностей Европейской Россіи, а потому этотъ отдълъ мною всецьло скомпилированъ по ихъ сочиненіямъ (¹). Будучи дилеттантомъ въ области геологическихъ изслъдованій, я не беру на себя дълать какіе либо выводы и заключенія относительно этого предмета.

Ферганская долина составляеть рукавь, или заливъ Туранскаго бассейна, заполненный мѣловыми, третичными и плейстоценовыми образованіями. На меридіанѣ г. Ходжента, эта долина съуживается до 40 версть, считая отъ палеозойскихъ известняковъ р. Исфанэ до сіенитовъ Моголъ-Тау; этимъ рукавомъ осадки Ферганы сливаются съ аналогичными образованіями степей. Другой рукавъ, играющій ту же роль, проходить между

^{(&#}x27;) Сочиненія эти приведены въ началь, при перечив источниковъ.

тау, обособляя этоть последній въ палеозойскій, кристаллическій островь. Этоть рукавт уже перваго, иметь около 15 версть ширины. Къ востоку отъ Ходжента долина Ферганы, или площадь распространенія мёловыхъ и третичныхъ осадковъ, постепенно разширяется и на линіи Касанъ-Вуадиля, тахітита ширины иметь около 130 версть. Восточиве этой линіи она снова съуживается, достигая тіпітита на меридіань Узгена. Отъ меридіана Узгена и въ особенности на меридіань Гульчи, Фергана утрачиваеть равнинный характеръ, горы поднимаются выше 6000 футовъ, а мёловые и третичные осадки, прерываясь болье древними образованіями, раздробляются на отдёльныя узкія полосы.

Отъ центральнаго поля вторичныхъ и третичныхъ осадковъ отделяются многочисленныя вътви, которыя расходятся лучеобразно во всё стороны и располагаются среди древнихъ образованій. Между ними наибольшій интересъ представляютъ два рукава: юговосточный и съверовосточный. Первый соединяетъ вторичные осадки Ферганы съ аналогичными образованіями бассейна Тарима, раздёляя палеозойскія и кристаллическія породы Алайскаго и Ферганскаго хребта; второй-же, отдъляющій Ферганскій хребеть оть Чаткальскаго, простирается по долинъ Нарына и соединяетъ Фергану съ центральнымъ Тянь-Шанемъ. Такимъ образомъ, на востокъ Ферганы мы имъемъ такіе-же два рукава, какъ и на западъ, съ твиъ только различіемъ, что на востокв тв же отложенія, какъ-бы въ противоположность спокойному пластованію ихъ на западъ, претерпъли громадную дислокацію, которая съ одной стороны нарушила правильность ихъ залеганія, а съ другой, поднявъ до горизонта, обильнаго

атмосферическими осадками, способствовала сильному размытію и даже уничтоженію нъкоторыхъ ихъ члеповъ.

Вслёдствіе вышеупомянутыхъ вѣтвей, границы Ферганскихъ отложеній весьма пеправильны и представляютъ чрезвычайно ломанную липію, всѣ изгибы которой можно опредѣлить только детальной геологической съемкой, если таковая когда либо осуществится.

Осповной массивъ горъ, окружающихъ Ферганскую долину, или такъ сказать остовъ ихъ, представляють древнія полево-шпатовыя породы: граниты, гранито-сісниты и сіенитовые порфиры. Посл'в гранитовъ и гранито-сіенитовъ, болъе распространенными кристаллическими породами являются: ортоклазовый и кварцевый или фельзитовый порфиры; они очевидно вытёснены и какъ бы приподняты гранитами, которымъ сопутствуютъ въ видв массивныхъ зальбандъ, прикрытыхъ осадочными горными породами. Порфировыя образованія замічательны здісь твиъ, что почти всегда представляютъ слоистыя съ ромбическими отдёльностями массы, которыя нерёдко переходять или въ сплошные фельзиты, или въ фельзитовые сланцы. Породы зелено-каменныя (діориты, порфириты, афаниты и проч.) обнажаются спорадически и проръзываютъ исключительно гранитныя образованія. Медафиры и вообще миндально-каменныя образованія являются сравнительно рѣдко и располагаются среди древнихъ известняковъ и метаморфическихъ сланцевъ, съ которыми массы мелафира, иногда замвчательнымъ образомъ, согласно пластуются и перемежаются. Между измъненными горными образованіями особенно распространены азойскіе мраморовидные известняки и сланцы: кремнистый, глинистый, слюдяной и хлоритовый; змвевикъ и тальковый сланецъ встръчаются гораздо ръже. Всъ эти метаморфическія породы нерѣдко сопровождаются древними пуддингами, кварцитомъ и слюдистымъ песчаникомъ.

По какой бы долинъ мы не спускались съ прилегающихъ горъ въ Фергану, почти вездъ мы найдемъ одно и тоже чередованіе породъ, следующихъ въ такомъ порядкъ: на древнихъ породахъ залегаютъ темноцвътные тріасовые и юрскіе песчаники, конгломераты и глинистые сланцы; за ними следують красноцветные рухляки, песчаники, зеленыя глины, устричные известняки меловой системы, пластующеся иногда согласно, но въ большинствъ случаевъ несогласно съ юрскими; на нихъ согласно налегаютъ третичные известняки, глины, песчаники, переходящие въ крупный конгломератъ, сливающійся съ потретичнымъ конгломератомъ, лёссомъ и пескомъ. Слъдовательно по мъръ приближенія къ срединъ Ферганской долины, выступають болье новые осадки, заканчивающіеся потретичными, которые въ срединной части получають исключительное развитіе, скрывають подъ собою всѣ другіе и придають поверхности ея однообразный, мъстами пустынный видъ. Правильное чередование и смъна породъ нарушаются только въ немногихъ мъстахъ появленіемъ небольшихъ палеозойскихъ, или кристаллическихъ острововъ среди третичныхъ отложеній, какъ напр. гряда Караташъ, или Кочкаръ-ата около Узгена, священная и прославленная гора Сулейманъ-Тахтъ возлъ Оша и др., или-же, что ръже, третичными островами, выступающими среди плейстоценовыхъ образованій, какъ напр. около Ассаке, Чуста, Самгара и проч.

Не принимая во вниманіе этихъ острововъ, какъ производящихъ незначительныя нарушенія въ общей правильности, а также тъхъ прорывовъ, или рукавовъ,

которые соединяють осадки Ферганы съ востокомъ и западомъ, можно сказать, что эти осадки располагаются концентрически, окружая долину какъ бы кольцами, состоящими изъ породъ различной древности, уменьшающіяся отъ периферіи къ центру, гдъ самые новые осадки образують лучистое ядро долины Ферганы.

Въ тъсной связи съ измъненіемъ породъ отъ центра къ периферіи находится измъненіе ихъ стратиграфическаго характера, которое, въ свою очередь, обусловливаетъ различіе орографическихъ особенностей центра и

периферіи.

Въ частности, распредъленіе различныхъ формацій и породъ въ Ферганской Области можно изобразить слъдующимъ образомъ: вдоль всей съверо западной окраины съ Ю. З. на С. В. по водораздълу ръкъ Сыръ-Дарьи, Чаткала и Таласа, тянется полоса гранито-сіенита и порфира, съ признаками свинцовыхъ и мъдныхъ рудъ, почти до 420 в. д., т. е. до соединенія, съ Ферганскимъ хребтомъ. Не доходя до этого соединенія начиная съ 410 в. д, южиће вышеупомянутой полосы и параллельно гребню Чаткальскаго хребта, лежить полоса горнаго известняка. Въ западной сторонъ къ С. В. отъ Махрама, полоса гранито-сіенитовъ и порфировъ, прорывается узкою полосою кристаллическихъ, или мраморовидныхъ известняковъ, изобилующихъ свинцовыми и желъзными рудами. Точно такіе-же известняки наблюдаются къ С. отъ Андижана, по правую сторону р. Нарына, при впаденіи въ него Кара-су. По теченію Нарына они, прорываясь узкою полосою юрской формаціи, распространяются по гребню Ферганскаго хребта, окаймляя такимъ образомъ съверо-восточную часть Области.

Къ югу отъ кристаллическихъ известияковъ, въ параллельномъ съ ними направленіи, наблюдается узкій пластъ юрской формаціи, имѣющій весьма большое практическое значеніе, по содержанію мощныхъ залежей бураго каменнаго угля. За нею къ югу, въ томъ-же направленіи, лежитъ ограниченный пластъ мѣловой почвы, изобилующей нефтяными источниками, пластами гипса и сѣры. Между р. р. Падша-Ата и Нарыномъ, на плоскомъ увалѣ много трещинъ, по которымъ выходятъ на поверхность минеральныя воды и нефть. Нѣкоторыя трещины заполнились известковымъ шпатомъ и озокеритомъ, который составляетъ предметъ разработки.

Къ югу отъ вевхъ предыдущихъ формацій до Сыръ-Дарьи, тянутся до самой восточной границы долины, широкою полосою, третичная и послѣтретичная формаціи, изъ которыхъ послѣдняя составляетъ почву до-

лины.

По всему протяженію наклоненій отпрысковъ горъ, окружающихъ Фергану съ юга, т. е. Алайскаго хребта, тянется тоже нолоса третичной и послѣтретичной формаціи. Здѣсь встрѣчается цѣлый рядъ приподнятыхъ морскихъ осадковъ, съ восточно-западнымъ направленіемъ, съ довольно крутымъ паденіемъ на сѣверъ. Къ югу отъ предыдущихъ формацій, въ параллельномъ съ ними направленіи, большею частью по предгорьямъ, лежитъ мѣловая формація, близко подходящая къ сенопскому ярусу и назвапная Г. Д. Романовскимъ, Ферганскимъ ярусомъ. Онъ тянется по направленію отъ Ходжента къ Исфаръ, Риштану и Маргеланскимъ горамъ; далѣе является къ Ю. В. отъ Оша, къ В. Отъ Андижана и къ С. отъ Намангана—окружая такимъ образомъ большую часть Ферганской долины. Послѣ этого

пласты мъловой формаціи обнажаются къ С. отъ Ходжента и идуть по Сыръ-Дарьинской Области, образуя западный, или Сыръ-Дарынскій ярусъ. Ферганскій ярусъ, или восточный, представляетъ верхній отдълъ мъловой системы, съ обильными источниками нефти, пластами гинса и съ значительнымъ количествемъ сфры. Онъ состоить изъ разноцвътныхъ рухляковыхъ глинъ, съ огромными отложеніями гипса и желтовато-бълыхъ известняковъ. Характеризуется мяріадами грифей и вообще устричными раковинами. Ниже этихъ пластовъ сявдують отложенія кремнистыхъ конгломератовъ и пуддинговъ. Ферганскій ярусъ, по времени образованія, новъе Сыръ-Дарьинскаго. Въ промежуточномъ пространствъ, между Исфарой и Сохомъ, предыдущая формація прорывается въ двухъ мѣстахъ гранито-сіенитомъ и порфиромъ, въ двухъ мѣстахъ юрскою формаціей и въ одномъ третичною.

Далве къ югу отъ Ферганскаго яруса и параллельно съ нимъ, по югозападной окраинъ, тянется узкая полоса юрской формаціи, съ пластами бураго каменнаго угля и горючаго сланца. Еще далве къ Ю. З. въ такомъ же направленіи, какъ и предыдущая, лежатъ горные, или мраморовидные известняки. Они-же довольно широкою полосою занимаютъ пространство по отрогамъ Алайскихъ горъ, до кишлака Курпа (недалеко отъ Оша) и далве къ Ю. отъ Оша продолжаются на востокъ. Окрестности Оша представляютъ: мѣловую, третичную и послѣтретичную формаціи, но въ промежуточномъ пространствъ, между послѣдними формаціями и означенными мраморовидными известняками, на Ю. В. наблюдаются въ незначительномъ количествъ гранито-сіенитъ съ порфиромъ; а на В. большею частью мѣловая почва,

съ пластами гипса и съ присутствіемъ съры. Изъ этихъ палеозойскихъ известняковъ сложена гора возлѣ Оша Сулейманъ-Тахтъ (тронъ Соломона) и сосъднія съ ней горы Ташъ-Ата, въ которыхъ около Аравана находится знаменитая сталактитовая пещера.

Въ сланцевыхъ породахъ и известнякахъ Исфары находится тоже нъсколько сталактитовыхъ пещеръ и вамъчательный зеркальный камень (Айна-Ташъ). Послъдній лежить въ 9-ти верстахъ къ SS О. отъ кишлака Исфары и состоить изъ слюдяно хлоритоваго сланца, съ гладкою зеркальною поверхностью, вслъдствіе чего у туземцевъ сложились по поводу его разныя легенды.

У озера Капланъ-Куль выходять палеозойские известняки, черные глинисто-слюдяные сланцы, проръзанные жилами плотнаго діабаза. Они образують мрачный скапистый островъ, среди моря пестроцевтныхъ породъ, вытянутый по направленію простиранія Капланъ-Кульской гряды, на съверномъ концъ которой выходитъ другой-же подобный островъ, по большихъ размфровъ. Этотъ послъдній, благодаря черному цвъту и большей обособленности, называется горами Кара-Ташъ. Онъ состоять, какъ и Каплань-кульскій островь, изъ палеозойскаго известняка, глинисто-слюдяныхъ и слюдяныхъ сланцевъ, кварцитоваго песчаника и плотнаго діабаза. Нъсколько ръкъ, какъ-то: Чигты, Таръ, Куршабъ, слившись передъ этою грядою въ одну большую ръку Кара-Дарья, соединенными усиліями прорвали горы Кара-Ташъ и образовали поперечное, глубокое, съ отвъсными склонами ущелье, раскрывающее внутренній составъ гряды.

Страна, лежащая въ верховьяхъ Аму-Дарьи и Тарима, представляетъ высокое вздутіе, ограниченное съ съвера Заалайскими горами, съ востока Кашгарскими, съ юга Гиндукушемъ; на западъ мы не имъемъ столь яркой границы и громадная высь понижается, хотя и замътно, но въ общемъ довольно постепенно, спускаясь къ пизинъ ръки въ томъ мъстъ, отъ котораго послъдняя получаетъ названіс Аму-Дарьи. Значительную восточную часть этой выси, гдъ ея средняя высота равняется $12^{1}/_{2}$ тысячамъ футовъ,—занимаетъ классическая страна Памиръ.

Съ геологической точки зрѣнія, эта интересная страна есть огромный массивъ, въ основѣ котораго лежатъ гранитныя и гнейсовыя породы (1). Развитіе послѣднихъ наблюдается главнѣйшимъ образомъ въ южной половинѣ, гдѣ онѣ являются преобладающими. Сѣверная половина занята осадочными, часто сильно метаморфизованными породами, среди которыхъ лишь мѣстами обнажаются граниты.

Гранитныя породы проявляются, какъ въ видъ среднезернистыхъ, такъ и крупныхъ порфировыхъ разностей. Мъстами они переходятъ въ типическіе сісниты, богатые роговой обманкой.

Гнейсы тоже имъютъ многочисленныхъ представителей разныхъ варьететовъ, начиная отъ крупнаго порфироваго, очковаго гнейса, до пезамътныхъ переходовъ въ типичные слюдяные сланцы.

Метаморфическія породы, въ видѣ различныхъ сланцевъ, доломитовъ, кристаллическихъ известняковъ, аркозовъ и т. и. тъсно сливаются съ болѣе поздними осадочными образованіями, претерпъвшими въ большей или меньшей степени тоже сильную метаморфизацію.

Крайняя бъдность окаменълостей въ послъднихъ

^{(&#}x27;) Д. Л. Ивановъ.

породахъ и сильная складчатость весьма затрудняетъ разборъ послъдовательныхъ напластованій, а также опредъленіе ихъ геологическаго возраста. На основаніи собраннаго палеонтологическаго матеріала, ихъ слъдуетъ отнести къ палеозойскому періоду.

Изъ числа преобладающихъ породъ особенное значеніе въ строеніи Памира имѣютъ известняки (большею частью доломитизованные), песчаники и тонкослоистые сланцы. Среди известняковъ исключительнаго вниманія заслуживаютъ оолитовые, вѣроятно относящіеся къ девону и отличающіеся значительной мощностью (¹). Красные желѣзистые песчаники, съ такой-же брекчіей, тянутся яркой и длинной полосой въ сѣверо-западномъ Памирѣ. Напротивъ, сѣверо-восточная его часть отличается особымъ развитіемъ тонкослоистыхъ сланцевъ, къ которымъ относится и мѣсторожденіе каменной соли, на Рянгъ-Кулѣ.

Въ Заалайской окраиной цъпи, при крутомъ и глубокомъ поднятіи слагающихъ ея породъ, наблюдаются тоже налеозойскія образованія; на внѣшней-же сторонъ они прикрываются вторичными и третичными отложеніями, также въ значительной степени метаморфизованными.

Въ архитектоническомъ отношеніи Памирскій массивъ представляєть рядь болѣе или менѣе параллельныхъ поднятій, образующихъ складки и сдвиги. Направленіе линій простиранія породъ главнѣйшее западное, съ колебаніями въ ту и другую сторону; орографическія же линіи хребтовъ горныхъ цѣпей преимущественно совпадаютъ съ З. Ю. З. направленіемъ, т. е. согласно общей линіи восточнаго Гиндукуша. Это-же отразилось и на

⁽¹) Докторъ Столичко упоминаетъ внѣ Памъра (въ Кашгаріи) объ оэлитовыхъ известнякахъ тріасоваго періода.

главныхъ направленіяхъ продольныхъ долинъ Памирскаго массива. Другое ясное направленіе, выведенное изъ многочисленныхъ измѣреній простиранія породъ, есть сѣверо-западное.

Слѣды, оставленные на Намирскомъ массивѣ бывшими ледниками, позволяютъ безошибочно утверждать, что явленія ледниковаго періода были здѣсь необыкновенно грандіозны и безъ сомнѣнія выразились въ видѣ сплошнаго ледянаго покрова, изъ подъ котораго выступали лишь линіи высочайшихъ гребней, придавая пейзажу полное сходство съ современными картинами Гренландіи.

Слёды эти выражаются въ слёдующемъ: всюду долины заполнены моренными отложеніями необыкновенной мощности. Высокія горы, которыя служили ледораздълами, во время наибольшаго развитія ледниковъ, сильно утонены, острозубчаты, кругосклонны. Напротивъ, низкія, чрезъ которыя двигалась ледяная масса, оглажены, округлены, какт на вершинахъ и хребтахъ, такъ и на склонахъ. Въ этомъ убъждаетъ, помимо гипсометрическихъ измъреній, еще самое направленіе моренъ, переходящихъ иногда черезъ горныя гряды и оставившихъ множество большихъ валуновъ на пребтахъ, весьма значительно возвышающихся надъ долинами у ихъ подошвы. Шрамы, царапины, шлифованныя скалы, roches moutonnées, представляють мѣстами чудно-поучительныя картины работы ледниковъ, на протяжении десятковъ верстъ, въ ширину цълаго ущелья и часто до половины его высоты. Наконецъ, продолжающаяся въ настоящее время ледниковая деятельность, выражена множествомъ ледниковъ Иамира.

Видя массу вынесеннаго крупнаго матеріала ледни-

коваго происхожденія и отложеннаго въ долинахъ, становится понятнымъ и вліяніе ледниковаго періода на рельефъ мѣстности, вліяніе выразившееся въ сильномъ разрушеніи и измѣненіи внѣшняго вида горъ, въ содѣйствіи къ образованію поперечныхъ долинъ, въ переносѣ матеріала въ долины и котловины, т. е. извѣстное нивелированіе мѣстности. Наступившій за ледниковымъ періодомъ озерный, еще болѣе повліялъ въ томъ-же направленіи, затянувши моренныя отложенія озерными осадками значительной мощности. Что прежнія озера были гораздо значительнѣе современныхъ, мы имѣемъ мпогочисленныя тому доказательства, въ формѣ теперешнихъ обсохшихъ котловинъ и въ распространеніи озерныхъ образованій.

Алайская долина тянется съ В. на З. правильною, ровною степью и кончается у устья большого Карамука; здъсь-же проходить и наша граница съ Каратегиномъ, какъ разъ по срединъ маленькаго отрога, образующаго какъ-бы перемычку, поперегъ долины, между правыми и лъвыми горами. Отрогъ этотъ у самой подошвы лъвыхъ горъ прорванъ ръкою и съ этого пункта она оставляетъ широкую долину Алая и вступаетъ въ узкую теснину, вдоль которой тянется конная тропипка, льпясь высоко надъ ръкою. Тъснина эта тянется версть около 30, въ видъ затъйливой, глубокой трещины, составляя какъ-бы переходъ отъ просторнаго и степнаго Алая къ горному, тъсному Каратегину. У перемычки ясно видны древнія террасы, происхожденіе которыхъ слъдуетъ отнести къ озерному Алаю. Террасы эти весьма немного возвышаются надъ современной широкой площадью долины (нижняя на 300 ф.) и соотвътствуютъ последнему періоду озерныхъ разливовъ въ конце Алая.

Высота этихъ разливовъ опредъляется высотою съдловяны перемычки. Но надъ этой террасой замътны слъды другой, высота которой отвъчала полной высотъ перемычки, если только не превосходила ее. Очевично, что ранъе того періода, когда наступиль размывь современной тъснины, теперешній отрогь служиль дьйствительной перемычкой и загораживаль воды Алая до разливовъ, во всю ширину долины. По строенію долины Алая, она несомнённо относится къ типу продольныхъ долипъ, обусловленныхъ геологическимъ строєніемъ образовавшихъ ее поднятій, но въ тоже время, изследованіе положенія слагающихъ ее породъ, не указываетъ намъ пикакихъ данныхъ признать Алай за плоскогорье, въ смысле геологическомъ. Обнаженія, имъющіяся на объихъ сторонахъ долины, показываютъ ясную складчатость. Предположеніе, что пласты эти могли быть покрыты горизонтальными осадками соленоснаго яруса, впоследствій смытыми окончательно, только и будеть однимъ предположениемъ, за отсутствіемъ прямыхъ фактовъ. Поэтому для объясненія той правильности, которая наблюдается вдоль всего Алая въ строеніи поверхности долины нужно искать другихъ причинъ, которыя были-бы болве наглядны и въ тоже время согласовались-бы съ явленіями бывшаго ледянаго періода на Памирскомъ массивъ.

Сомнѣваться въ томъ, что Алай тогда представляль всѣ условія для развитія большихъ ледниковъ, врядъ-ли можно, когда мы видимъ несомнѣнные моренные остатки вдоль всего Терсъ-Агарскаго ущелья, спускающатося къ Алаю, или въ устьѣ Мука. Напротивъ, скорѣе можно предположить, что въ то время Алай представлялся правильнымъ mer de glace, во всю длину долины

(болъе 200 верстъ) и что на немъ повторилось то же, что мы видимъ на нъкоторыхъ Памирскихъ котловинахъ, т. е. что наступившій озерный періодъ выравняль моренное дно Алайской долины огромнымъ количествомъ мелкаго матеріала и темъ придаль впоследствіи этой грандіозной долинѣ видъ плоскогорья, столь характерный для Алая. Нельзя съ положительностью утверждать, что. Алай пепремънно долженъ былъ представлять одпо силошное озеро. Такое предположение требовало-бы доказательствъ, что въ низовьяхъ Алая имъются озерные осадки, на огромной абсолютной высоть (болье 10000 ф.), или что съ тъхъ поръ западная часть опустилась. Озерная илощадь могла образоваться въ видъ мелкихъ уступовъ, что въ дальнъйшемъ ходъ могло дать такую-же озерную долину, какова Памирская Аксу въ верховьяхъ.

лины.

Самую Ферганскую долину, какъ уже было скагансной до- зано, главнымъ образомъ покрываютъ: юрскія, мѣловыя, третичныя, послъ-третичныя и современныя образованія, составляющія почву и подпочвенный слой этой страны. Первыя три развиты по окраинамъ, а последнія въ срединъ долины.

> Третичныя образованія представляють: 1) мясокрасныя песчаныя глины, известняковые крупные конгломераты, иловатыя, желтыя и сърыя глины, со слоями гипса и каменной соли, перемежающіяся съ песчаниками; 2) конгломераты и пуддинги кристаллическихъ и метаморфическихъ породъ, связанныхъ известково-песчанистымъ цементомъ; отдёльныя отложенія желтыхъ и ноздреватыхъ песчанистыхъ известняковъ, съ ядрами и отпечатками раковинъ gasteropoda. Известковистые песчаники,

песчаниковатые известняки и мелкозернистые пуддинги, съ прослойками красныхъ и зеленоватыхъ мергелей и рухляковыхъ глинъ. Здъсь эти слои несогласно пластуются съ такъ называемымъ восточнымъ, или собственно Ферганскимъ мъловымъ ярусомъ.

Ферганская долина, замкнутая горпыми отнюдь не представляеть поверхности ровной. Складки земной коры продолжаются и подъ дномъ долины, хотя и не въ такой степени, какъ въ горахъ. Этими поперечными складками долина раздъляется на множество отдыловь, такъ что каждый значительный городь Ферганы расположень въ особой, или отдъльной долинъ. Расположенныя въ долинъ краевыя горныя породы, большею частью вовсе не пробиваются изъ глубины. Повсюду мы встръчаемся только съ конгломератами, которые тянутся обширными горизонтальными площадями въ долинъ, какъ подпочвенная подстилка; но и здъсь онъ поднять до очень различныхъ горизонтовъ.

Эти конгломератныя залежи обыкновенно образу- щебневыя ють обширныя ровныя поверхности, представляющія тамъ, гдъ онъ обнажены, - хрящевыя или щебневыя пуетыни. Горныя ръки прорыли свои ложа въ этихъ конгломератныхъ залежахъ, часто глубиною въ нъсколько саженъ. Такія щебневыя пустыни большей, или меньшей величины занимаютъ неръдко непрерывно соединяющіяся между собою поверхности въ 50 и болъе квадратныхъ верстъ и представляютъ собою особенность всей окраины Ферганской долины. Туземцы подобную пустыню называють "дашть". Въ этомъ конгломератъ сцементированы линь очень мелкіе круглячки. Они об-

ценовыя и современныя образованія.

пустыни.

разовались изъ глыбь кристаллическихъ горныхъ породъ всякаго рода, какъ изъ кварцевыхъ, такъ и изъ известняковъ. Чъмъ ближе къ подножію горъ, тъмъ крупнъе гальки, а чъмъ ближе къ срединъ долины, тъмъ мельче.

Первоначальное происхождение этихъ валуновъ, быть можетъ, ледниковаго періода; а потомъ гальки конгломерата образовались, если не дъйствіемъ волнъ о берегъ, нъкогда существовавшаго здъсь моря, то сформировались въ менъе крутыхъ ложахъ текучихъ водъ. Возможно допустить, что перемъщеніе валуновъ кристаллическихъ и налеозойскихъ породъ, совершалось исключительно льдами. Это могло произойти въ тотъ періодъ поднятій, когда гранитные, сіенитовые, или зернисто-известковые массивы, составляли непосредственныя береговыя окраины существовавшаго здъсь водовмъстилища.

Слъдуетъ предположить, что въ ту эпоху, когда образовались конгломераты, въ Ферганской долинъ существовало подобное-же гипсометрическое отношеніе, какъ и въ настоящее время. Она была окружена крутоподнимающимися горными выръзами, изъ которыхъ скатывались крупные валуны, а вода впослъдствіи довершала дальнъйшій процессъ образованія галекъ.

Солончановыя пустыни.

Все срединное, окруженное щебневыми пустынями, пространство Ферганской долины, ограниченное съ С. Сыръ-Дарьей, а съ Ю. круговою линіею, которая своею обширною дугою обхватываетъ почти треть Ферганской долины, занято солончаковою пустынею, тою самою, которую Султанъ Бабуръ (около 1494 г.) называетъ "Ха-Дервишъ".

Основываясь на природѣ солончаковыхъ поверхностей, можно предположить, что среди Ферганской котловины, въ древнія времена, существовало соляное озеро, въ которомъ притекающія воды испарялись прежде стока ихъ въ Сыръ-Дарью. Можетъ быть въ то время и Сыръ-Дарьи не существовало, а стекающія съ горъ рѣчки имѣли другой стокъ, чѣмъ нынѣ.

А. ф.-Миддендорфъ допускаетъ проникновеніе соли изъ глубины, откуда она поднимается давленіемъ воды, такъ какъ во многихъ мѣстахъ у окраины Ферганской долины встрѣчаются соляные ключи, указывающіе на соляные пласты. Гдѣ бы мы не поднялись, на сотни, даже на тысячи футовъ, вездѣ бросается въ глаза, что всѣ склоны, состоящіе изъ мягкихъ, въ особенности лёссовыхъ массъ, покрыты вывѣтрившеюся солью. На Алаѣ, на высотѣ горнаго кряжа, течетъ соляной горный потокъ Туссъ-Су, изъ котораго добываютъ соль. Рянгкульскія соляныя копи на Памирѣ, находятся на 12.800 ф. надъ у. м.

Основной характеръ солончаковой пустыни таковъ же, какъ и всей среднеазіатской низменности; а въ этой пустыни вкраплена, словно островъ, другая пустыня, песчаная.

Пески Ферганской долины, занимая площадь около 1500 кв. верстъ, тянутся почти непрерывной, то разширяющейся, то съуживающейся полосой, которая начинается у Ходжента, а оканчивается между Балыкчи и Шариханомъ (¹).

Общее магистральное направленіе этой полосы идеть съ Ю. З., совпадая съ направленіемъ господствующихъ здѣсь юго-западныхъ вѣтровъ. Мѣстами пе-

пустыни.

⁽⁴⁾ Подробное описаніе песковъ Ферганской Области, ихъ распространеніе, заносы и т. д. находится въ сочиненіи В. Наливкина, подъ заглавіемъ "Опыть изследованія песковъ Ферганской Области". 1887 г.

ски образують громадные наносы, въ видъ передвигающихся дюнъ или бархановъ, высота которыхъ неръдко превышаетъ 6 саженъ. Эти барханы, если не защищены растительностью, связывающею ихъ, обладають подвижностью и она тъмъ значительнъе, чъмъ меньше ихъ разміры и чімь открытье та містность, на которой они расположены. Движутся они хотя медленно, по тъмъ не менъе постоянно, по направленію господствующаго Ю. З. вътра. Подвижность ихъ находится въ непосредетвенной зависимости отъ средней скорости этого вътра; а такъ какъ онъ, по мъръ удаленія отъ юго-западнаго конца долины къ свверо-восточному, постепенно ослабъваеть, то и барханы въ тъхъ мъстахъ большею частью стоять неподвижно. Зато въ юго-западномъ концъ долины, около Махрама, Патара и др., гдъ вътеръ разражается иногда съ неимовърной силой, эти песчаные барханы, медленно, но неустанно надвигаются на встръчающіеся по пути кишлаки, которые ежегодно теряють часть своихъ садовъ и полей.

Наружный видъ песка различенъ на разныхъ пунктахъ этой песчаной полосы. Преобладающіе цвъта суть: свътлокоричневый, сърый и темносърый, который при увлажненіи кажется чернымъ.

Происхожденіе этихъ песковъ объясняють остаткомъ большаго размыва дна котловины, а также наносами съ песчаныхъ отмелей Сыръ-Дарьи. Нѣкоторая часть песка могла образоваться изъ цемента конгломератовъ въ щебневой пустынъ. Но пески Ферганской долины не составляютъ исключенія. Туранская низменность, съ которой наша долина имѣетъ сообщеніе на западѣ, представляетъ три огромныхъ песчаныхъ бассейна.

Разематривая означенные песчаные наносы въ гео-

логическомъ отношеніи, можно прійти къ следующему заключенію. Такъ какъ дно первобытнаго моря, омывавшаго нъкогда берега западнаго Тянь-Шаня, въ пліоценовый и лостъ-пліоценовый періоды, состояло исключительно изъ нынъ наблюдаемыхъ обнаженій мъловыхъ и третичныхъ, очень рыхлыхъ песчаниковатыхъ известняковъ и песчаниковъ, перемежающихся съ иластами песка, и частью изъ рухляковыхъ и песчаныхъ глинъ, то весьма естественно допустить, что это море, отступавшее на западъ, по мъръ поднятія Тянь-Шаня, оставляло за собою осадки солонцеватаго песчанаго ила и мелкаго песка, со многими лагунами, мелководными заливами и озерами, гдв насыщенные соляные растворы проникали въ рыхлую почву, или производили осадки солей. По мъръ обнаженія и высыханія дна этого первобытнаго моря, на почву его начинали вліять атмосферные двятели и особенно ввтры, которые разрушали исключительно ту часть песчано-глинистыхъ отложеній, которые не уплотнились и не сцементировались известковыми, или желъзистыми растворами. Одновременно съ дъйствіемъ вътровъ на почву, по мъръ отступленія моря къ западу, отъ прибоя волнъ, образовались послъдовательно прибрежныя песчаныя дюны, которыя доставляли вътрамъ тонкій, отмученный моремъ, песокъ для образованія бархановъ, или собственно для переносныхъ бугровъ. При періодическихъ, весьма сильныхъ вътрахъ, масса песчаной пыли персносилась съ Туранской низменности черезъ Махрамскія ворота въ Ферганскую долину. Въ течение тысячельтий этимъ путемъ, могли образоваться громадные песчаные наносы, которые движеніемъ твхъ-же ввтровъ передвигаются и теперь, съ мъста на мъсто.

Для насъ эта песчаная полоса представляетъ весьма важный интересъ, въ гигіэническомъ и бытовомъ отношеніи. Песчаная пыль, съ прим'єсью глинистыхъ, соляныхъ и известковыхъ частицъ, подымаемая періодическими вътрами, раздражаетъ глаза, дыхательные органы, а также и кожу, производя различныя страданія у людей, какъ живущихъ въ этихъ мъстностяхъ, такъ и путешествующихъ. Во время этихъ песчаныхъ бурановъ, путешествіе становится весьма затруднительнымъ, а подчасъ невозможнымъ, такъ какъ положительно нечемъ дышать, въ этомъ густомъ тумане пыли. Если ъхать, или идти на встръчу вътру, то несомыя крупныя песчинки, съ такой силой хлещутъ въ глаза и лицо, что становится немыслимымъ продолжать путь; даже лошади не въ состояніи переносить подобнаго вътра, велъдствіе чего останавливаются среди дороги и стараются повернуться, чтобы вътеръ дулъ сзади.

Но въ особенности гибельно отражаются эти нески на благосостояніи жителей, подвергающихся заносамь, противъ которыхъ они безсильны и нослѣдствія которыхъ весьма печальны; достаточные землевладѣльцы превращаются въ пролетаріевъ. Эти пески загубили и губятъ значительныя площади земли, еще недавно воздѣлывавшіяся, чѣмъ поставили владѣльцевъ въ безвыходное положеніе. Они бѣдствуютъ, песокъ добирается и до ихъ жалкихъ жилищъ. Въ нѣкоторыхъ кишлакахъ, какъ напр. въ Какырѣ, не только поля, по даже улицы и нѣкоторые дворы засыпаны пескомъ. Нѣкоторыя сакли совсѣмъ засыпаны, а у стѣнъ нѣкоторыхъ, еще уцѣлѣвшихъ, образовались наносы песка до самыхъ крышъ. При каждомъ сильномъ вѣтрѣ, изъ крыши, покрытой наносами песка, послѣдній попадаетъ въ трубу тузем-

наго камина, въ которомъ они готовятъ пищу. При продолжительныхъ вътрахъ, обитатели этихъ сакель, по нъскольку дней не могутъ варить себъ пищи, потому что во время варки песокъ сыплется черезъ трубу прямо въ котелъ.

Обитатели этихъ мѣстъ, лишившись пашень, чтобы не умереть съ голода, рубятъ колючку, камышъ и другія растенія, возятъ въ Кокандъ и продаютъ тамъ на топливо. Но уничтожая растенія, они этимъ открываютъ еще большую свободу песку, который, не имѣя передъ собою никакой преграды и освободившись отъ связывающихъ его растеній,—безпрепятственно заноситъ слѣдующіе поля и кишлаки.

Изъ числа растеній, которыя скрвиляють пески, пуская корни въ глубь бархановъ, суть слѣдующія: 3 вида Calligonum, 2 вида Ammodendron, 2 вида Aristida, Elymus arenarius, Carex arenaria и др. Но туземный скоть, а также и сами жители, пользующіеся нѣкоторыми растеніями для топлива, уничтожають ихъ съ корнями, чѣмъ приносятъ непоправимый вредъ. Нельзя сказать, чтобы туземцы не понимали этого вреда, наносимаго самимъ себъ, но нельзя ихъ и судить слишкомъ строго; они дѣлають это подъ вліяніемъ той давящей и безъпеходной нужды, когда самый благоразумный человѣкъ перестаетъ заботиться о будущемъ. Онъ слишкомъ бѣденъ для того, чтобы отказаться отъ сбора дикорастущихъ травъ и кустарниковъ, отъ продажи которыхъ можетъ выручить на хлѣбъ для себя и голодной семьи.

Засыпаніе полей и кишлаковъ песками наблюдалось и въ прежнее время. По разсказамъ туземцевъ (¹), лътъ около ста тому назадъ кишлаки Кашгаръ, Кара-Курпа,

⁽¹⁾ В. Наливкинъ. (см. стр. 215)

Ауль и Чанкенть были занесены песками, вследствие чего населеніе разошлось въ Шариханъ, Риштанъ и Бишъ-Арыкъ. Впоследствій разростаніе обширныхъ зарослей задержало притокъ новаго песка съ югозапада, а прежніе барханы стали передвигаться къ съверо-востоку, вслъдствіе чего занесенные кишлаки и поля стали постепенно очищаться отъ песка и старые хозяева, или върнъе потомки ихъ, возвратились на свои мъста. Но въ настоящее время, подобныя переселенія не такъ удобовыполнимы, какъ это было прежде. Население увеличивается, земля становится дороже, средній душевой надълъ, а слъдовательно и количество свободной земли становится меньше; а потому землевладильцы, выгнанные со своего участка песками, вынуждены вступить въ ряды пролетаріевъ. Прежде они уходили при первомъ появленіи сыпучаго песка на ихъ поляхъ; теперь они сидять до тёхъ поръ, пока песокъ не засыплеть последняго клочка его участка.

Культурная почва. Изъ числа собственно дилювіальныхъ образованій Ферганской Области заслуживають особеннаго вниманія мощныя отложенія иловатой, тонкой глины—лёсса, составляющаго плодородную почву всей страны. Эта почва, при искусственномъ орошеніи арыками, обусловливаєть не только возможность существованія ссёдлаго населенія, но составляєть также главнійшій источникъ богатства всего края; а потому вполні заслуживаєть названія культурной формаціи. Она легко обработываєтся, какъ въ сухомъ, такъ и въ сыромъ виді; долго не требуєть удобренія и быстро производить весьма разнообразную растительность.

Всв города и кишлаки края выстроены изъ лессовой глины, употребляемой въ видв сырцовыхъ кирни-

чей, а для сакель и заборовъ, въ видъ комковъ, иногда для прочности смъщанныхъ съ саманомъ (мелко изръзанной соломой).

Устройство ирригаціонныхъ системъ облегчается свойствомъ лёссовой почвы, которая трудпо пропускаетъ воду и вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ какъ цементъ при устройствѣ и выкладкѣ изъ камней наружныхъ стѣнокъ тѣхъ арыковъ, кои огибаютъ каменистые склоны горъ.

За недостаткомъ хорошаго строительнаго матеріала, кромъ трудно обработывающихся породъ гранита, порочра, діорита, кварцита и мраморовиднаго известняка, тассъ имъетъ большое значеніе для быстраго возведенія прочныхъ и устойчивыхъ фортификаціонныхъ сооруженій.

Лёссъ, это суглинистый мергель, главную составпую часть котораго составляеть чрезвычайно мелкоземлистая глина, почти столь-же мелкоземлистая известь и наконецъ песокъ, состоящій изъ угловатыхъ, обкатанныхъ, или необкатанныхъ зернушекъ. Известь и песокъ смѣшаны въ неопредѣленныхъ количествахъ. Въ обыкновенныхъ случаяхъ, по объему глина составляетъ наибольшій процентъ всей массы; по вѣсу-же, на песокъ большею частью приходится ⁷/₁₀ смѣси, на известь ²/₁₀, а на глиноземъ ¹/₁₀. Кромѣ того, почти повсемѣстно встрѣчаются въ лёссѣ соляныя вывѣтрѣлости, или налеты, такъ что вполнѣ основательно эту соль причислить къ составнымъ частямъ Ферганскаго лёсса. Кромѣ того, еще содержится желѣзо.

Здъшній лёссъ имъетъ горохово-желтый; красноватый, но чаще желтовато-сърый цвътъ; онъ не имъетъ слоистаго сложенія и только иногда полосатое расположеніе его оттънковъ и заключающіяся въ немъ мъстами прослойки конгломерата и песка, указывають на его слоевое образованіе. Большею частью онъ представляеть отвъсно обнаженныя стъны, съ вертикальными отдъльностями и такою-же трещиноватостью. Въ лёссъ почти всегда заключаются тонкіе, бураго цвъта растительные остатки и трубочки, отъ стнившихъ растеній, а также мъстами очень много наземныхъ раковинъ, весьма похожихъ на нынъ живущихъ моллюсковъ, не исключая нъкоторыхъ, впрочемъ очень ръдко встръчающихся пръсноводныхъ раковинъ.

Отложенія лёсса представляють мощныя образованія; иногда нагорныя площади покрыты толетымъ слоемъ плодороднаго лёсса.

По Рихтгофену образованіе лёсса въ здѣшней мѣстности, нужно признать за аэрическое (подвоздушное) образованіе, или какъ И. В. Мушкетовъ называеть эоловое. Движущійся воздухъ, вѣтры и бури позаботились о скопленіи этого матеріала. Эти мощныя суглинисто-мергельныя отложенія образовались изъ атмосферной пыли. Слѣдовательно тѣ же вѣтры, которые въ теченіе тысячелѣтій способствовали накопленію песчаныхъ бархановъ, дѣйствовали равнымъ образомъ на образованіе лёссовыхъ пластовъ. Это лёссъ первичный, или сухопутный. Если онъ будетъ вымытъ водою изъ своего первичнаго мѣста залстанія, перенесется въ другое мѣсто и затѣмъ снова осядетъ, то такой лёссъ называется озернымъ, или вторичнымъ лёссомъ.

Этотъ вторичный лёссь имъетъ горизонтальную слоистость, болье бъловато-желтую окраску и всегда съ большимъ содержаніемъ соли. Вторичный лёссъ есть продуктъ отмучиванія, а потому смѣшеніе въ немъ составныхъ частей измѣнилось. Утративъ нѣкоторую долю

первоначально содержащихся въ первичномъ лёссѣ, песчаныхъ составныхъ частей, опъ пріобрѣтаетъ свойства глины, смѣшанной съ известковымъ иломъ, отчего дѣлается связнѣе и сильнѣе сжимается.

Вся Ферганская долина первоначально, по всей въроятности, была выполнена лёссомъ. Измѣненія уровня долины происходили быть можетъ неоднократно. При послѣднемъ, оставившемъ явственные признаки, былъ смытъ со дна Ферганской котловины слой лёсса, оставивъ мѣстами, гдѣ потоки раздѣлялись, холмы первичнаго лёсса, высотою 6—8 саженъ. Это мнѣніе А. Миддендорфа, которое нѣкоторыми учеными оспаривается.

Очевидно лёссъ произошель отъ разложенія горныхъ породъ. Въ Ферганъ существують всъ условія для особенно сильнаго разложенія этихъ породъ, а именно: вной, дожди, морозы, образованіе угольной кислоты, въ особенности отъ унесенія извести, отчего происходитъ пористость и замерзаніе воды въ горахъ. Все это смъняется между собою, отчего распадаются самыя твердыя, горныя породы.

Въ лессовой почвъ Ферганы очень мало перегноя. Лессовый мергель уничтожаеть весь перегной при посредствъ сильно развивающейся растительности. Страшный зной, при слабомъ оттънении и ръдкомъ стоянии растений, неспособныхъ къ образованию дерна, завершаеть уничтожение гумуса тъмъ, что изсущаеть его и отдаетъ на произволъ бурь. Значительное содержание желъза въ лессъ тоже принимаетъ участие въ этомъ расхищении почвы. При содъйствии воды, окись желъза разлагаетъ растительные остатки и связываетъ образующуюся при этомъ углекислоту, превращаясь черезъ это въ болъе растворимое вещество.

Нельзя совершенно отрицать присутствія въ почвъ перегноя; онъ встрвчается какъ естественное образованіе въ предгорьяхъ, гдё при болёе влажномъ климать, продукты вывѣтриванія горныхъ породъ смѣшиваются съ лёссомъ. Съ нихъ въ нъкоторыхъ мъстахъ былъ смыть въ долину этотъ перегной и вступиль съ лёссомъ въ соединение.

Въ долинныхъ пизинахъ лёссовой полосы перегной образуется подъ водой. Эти болотистыя низменности поростають цёлыми камышевыми лесами, которые вместв съ другими водяными растеніями подготовляютъ образование перегноя. Рисовыя поля тоже доставляють матеріаль для перегноя.

При искусственномъ употребленіи навоза быткъ, перегной въ Ферганъ накопляется въ очень большомъ количествъ, представляя признакъ интенсивной старинной культуры на воздълываемой почвъ. Въ виду чрезвычайной способности перегноя удерживать влагу, въ своихъ капиллярныхъ пространствахъ, въ чемъ лёссъ много уступаетъ перегною, последній въ Ферганъ отличается особымъ плодородіемъ и менте нуждается въ орошеніи.

О происхож-

Ферганская Область, составляя часть Средней Азіи, деніи различ- претерпъвала во время геологическихъ переворотовъ изцій въ фер. м'вненія, свойственныя всей этой стран'в.

На основаніи геологическаго залеганія пластовъ разныхъ формацій и добытыхъ въ нихъ окаменълостей, возможно предположить, что въ течение горно-известковыхъ образованій, первобытный океанъ очевидно быль общимъ для всей западной части Средней Азіи и съверной Индіи, что доказывается тождествомъ многихъ

Тянь-Шаньскихъ и съверо-гималайскихъ окаменълостей каменно-угольной формаціи.

Послъ отложенія древнихъ палеозойскихъ образованій, т. е. послъ осадковъ силурійскихъ, девонскихъ и горно-известковыхъ, пространство нынфшияго среднеазіатскаго материка, въ противоположность Европъ и Съверной Америкъ, представляло исключительно сушу, при условіяхъ неблагопріятныхъ для образованія осадковъ настоящей каменно-угольной формаціи, препятствующихъ развитію растительности этого періода. Во многихъ мъстахъ Ферганской Области являются пласты стипита, или бураго каменнаго угля, залегающие подъ мѣловыми известняками, заключающими Ostrea vesicularis и множество большихъ gryphaea; содержатъ въ изобиліи: гипсъ, неоть и кристаллическую съру. Многіе прекрасные отпечатки папоротниковъ, найденные въ глинистыхъ сланцахъ и известковистыхъ песчаникахъ, сопровождающихъ здёшніе пласты каменнаго угля, въ связи со многими другими данными, указали на неоспоримую принадлежность большинства здёшнихъ каменно-угольныхъ мъсторожденій къ лейасу, или скоръе къ такъ навываемой ретійской формаціи, составляющей промежуточное образованіе между юрской и тріасовой, а не къ настоящей каменно-угольной формаціи. Геологическія и палеонтологическія изысканія въ другихъ мъстахъ Средней Азіи и на Алтат показали, что и тамъ буроугольныя образованія принадлежать исключительно къ ретійской формаціи (Rhätische gruppe).

Угленосные осадки тріасовой и юрской формаціи, во многихъ пунктахъ залегаютъ непосредственно на горномъ известнякъ, что и было причиною ложныхъ заключеній о нахожденіи въ этихъ мъстахъ настоящей

каменно-угольной формацій. Но въ Ферганской Области, какъ и во всемъ Туркестанскомъ краъ, Пермскаго, или діасоваго періода не существовало. Животныхъ и растеній, которыхъ можно было-бы причислить къ Пермской почвъ, до сихъ поръ вовсе не найдено и нахожденіе въ Туркестанскомъ краъ Пермскихъ осадковъ пока не доказано. Найденные конгломераты, красные рухляки и песчаники, считавнісся прежде за Пермскіе лишь по одному красному цвъту, лежатъ выше мъловыхъ пластовъ.

Въ продолжении юрскаго и тріасоваго періодовъ, почти вся западная и отчасти средняя полосы Тянь-Шаня, представляли низменную, отчасти прибрежную етрану, что возможно допустить на слъдующихъ основаніяхъ: окаменълости, собранныя Г. г. Романовскимъ, Мушкетовымъ и Съверцовымъ, доказываютъ, что юрская и тріасовая фауна въ Тянь-Шанъ появляется только къ востоку отъ 420 В. Д. (отъ Пулкова) и не существуеть: съвернъе Заалайскаго хребта. Слъдовательно нынъшняя Ферганская Область, за исключениемъ лишь незначительной юго-восточной части, т. е. на Памиръ, представляла въ тъ періоды, -сушу. Тъмъ не менъе при разборъ коллекцій изъ юрскихъ и тріасовыхъ осадковъ, доставленную д-ромъ Регелемъ, изъ восточной Кульджи съ р. Каша и со склоновъ хребта Богдо, къ С. В. отъ Турфана, коллекцію весьма значительную по числу и объему образцовъ, тъмъ не менъе не встрътилось ни одного остатка животныхъ, не смотря на различіе горныхъ породъ и разнообразія мъстностей. Каждый образець заключалъ лишь только ясные отпечатки, или ядра растеній, то тріасовыхъ, то ретическихъ, или-же юрскихъ, изь числа которых в многіе уже прежде были найдены;

Г. Мушкетовымъ въ восточно-Кульджинскомъ буроугольномъ бассейнъ и Г. Ромацовскимъ въ Туркестанъ; а еще ранъе юрскія растенія, были открыты при горныхъ развъдкахъ А. С. Татариновымъ и Л. Л. Никольскимъ. Изъ всего разнообразнаго палеонтологическаго матеріала лишь только на одномъ кускъ глинистаго сланца Г. Романовскимъ найдено вмъстъ съ Asplenium Whitbyense, створки пръсноводной раковины Anodonta.

Следовательно вся эта горная область, съ Ферганой, представляла тогда, какъ и теперь, сушу, которая, надо полагать, отчасти примыкала къ морю и въ тоже время была проръзана заливами и спабжена значительными лагунами, настолько опрасняемыми притокомъ большихъ рѣкъ, что здѣсь, какъ и по берегамъ моря, не могли существовать морскія раковины, столь изобильныя въ тріаст, и юрт другихъ странъ. Можно даже приблизительно означить границы распространенія суши юрско-тріасоваго періода въ западномъ Тянь-Шанъ и сопредъльныхъ съ нимъ странахъ, за которыми растенія этихъ системъ являются уже вмість съ морскими раковинами, а именно: эта граница на западъ обозначается меридіаномъ западнаго берега Аральскаго моря и южнымъ Ураломъ; на востокъ хребтомъ Боро-Хоро, или Талкинскимъ хребтомъ, гдъ являются уже юрскіе белемниты; на югъ эта граница замыкается Гиндукушемъ и съвернымъ Памиромъ; на съверъ южною полосою Западно-Сибирскихъ губерній, гдъ однако Кузнецкій юрскій бассейнъ представляль также сушу; между твмъ, какъ въ восточной Сибири южная часть Иркутской губерній, во время юрскаго періода, покрывалась моремъ.

Траницы этой суши совершенно совпадають съ

границами Туранскаго бассейна, за исключениемъ восточной, гдъ суща продолжалась несравненно дальше нашего бассейна. М. Неймайръ называетъ эту сущу Туранскимъ островомъ въ юрскомъ моръ.

Относительно окаментлостей мъловой почвы Аму-Дарьинскаго бассейна замъчательно, что въ коллекціяхъ Г. г. Регеля и Смирнова вовсе нътъ характерныхъ образцовъ изъ Ферганскаго верхне-мъловаго яруса, между тъмъ, на съверныхъ склонахъ Туркестанскаго и Алайскаго хребтовъ этотъ ярусъ развитъ неръдко въ грандіозныхъ размірахъ и всегда сопровождается миріадами грифей, какъ напримъръ gryphaea Kaufmani. Нельзя не обратить вниманія и на то, что въ ближайшихъ къ Русскому Туркестану Индейскихъ странахъ, именно въ Кашмиръ и въ другихъ, мы не встръчаемъ ни одного вида изъ числа Ферганскихъ верхне-ивловыхъ окаменълостей, которыя въ Туркестанъ заключаются въ осадкахъ, лежащихъ обыкновенно подъ верхними эоценовыми пластами и соответствующихъ въ этомъ отношеніи, нуммулитовой формаціи Индіи, весьма мощно и обширно развитой въ съверной ся части. Отсюда это образованіе, какъ извъстно, простирается на западъ черезъ Белуджистанъ, Персію, Кавказъ и Малую Азіювъ южную Европу, являясь затемъ въ северной Африке. Несмотря на такое громадное развитіе этого нижневоценоваго отложенія, оно совершенно отсутствуєть въ Русскихъ и Бухарскихъ средне-азіатскихъ владеніяхъ, гдв до сихъ поръ не найдено ни одного нуммулита.

На основаніи изложенныхъ данныхъ можно предположить, что та часть моря, или океана, изъ которой отложились столь мощные верхне-мѣловые устричные пласты въ бассейнъ Сыръ-Дарьи, отдѣлялась обширною сушею отъ Индіи, въ теченіе періода не только этихъ послѣднихъ осадковъ, по и ранѣе, т. е. во время образованія нуммулитовыхъ слоевъ. Въ этомъ случаѣ замѣчательно еще, что ни то, ни другое море не оставило по себѣ слѣдовъ въ ныпѣшней Туранской низменности.

Третичныя, или кайнозойскія осадочныя образованія въ Средней Азіи и геологическое ихъ развитіе шло болве или менве въ параллель съ геологическими явленіями Европы и Новаго Свъта до настоящаго времени. Но въ связи съ частными и общими поднятіями и опусканіями материка Стараго Свъта, происходили тоже колебанія почвы пынішняго западнаго Тянь-Шаня и Туранской низменности, включительно съ Арало-Каспійскимъ бассейномъ. Если эти, безъ сомнънія существовавшія колебанія земли, мы возьмемь въ періодъ отъ юрскихъ образованій до послъ-третичныхъ отложеній, то, на основаніи геологическихъ данныхъ, необходимо, между прочимъ, допустить, что въ течение третичнаго періода западная часть Туранской пизменности, ограниченная съ востока Мугоджарскими горами, восточною окраиною Усть-Юрта, направленіемъ Узбоя (стараго русла Аму-Дарьи) и горами Курянъ-Тагъ, — находилась подъ водою, заканчиваясь осадками Сарматскаго яруса. Эти средне-міоценовыя образованія солоноватыхъ водъ не распространяются восточиве означенной черты, докавывая вмёстё съ тёмъ, что здёсь была граница того обширнаго средиземнаго моря солоноватой воды, которое образовало пеогеновые осадки, между Дунаемь-Азіатскою Турцією, Украиною, Кавказомъ и Аральскимъ моремъ. Съ другой стороны, восточная Туранская низменность, т. е. полоса земли между Тянь-Шанемъ и примърно 590 В. Д. (отъ Парижа) въ течение Сарматскаго періода представляла сушу, сложенную изъ болѣе, или менѣе поднятыхъ пластовъ: лейаса, мѣловыхъ песчано-рухляковыхъ известняковъ, эоценовыхъ образованій и частью изъ настоящихъ морскихъ (устричныхъ) неогеновыхъ отложеній. Это положеніе касательно суши докавывается тѣмъ, что здѣсь нигдѣ не существуетъ Сарматскихъ пластовъ свойственныхъ Европѣ, Кавказу и западной Арало-Каспійской полосѣ Турана.

ГЛАВА III. ГИДРОГРАФІЯ.

Горы, опоясывающія Ферганскую долину, служать Рачныя сиводораздъломъ ръчныхъ бассейновъ, а именно: съверный горный кряжъ, между бассейномъ Сыръ-Дарьи и Таласа; южный-же между бассейномъ Сыръ-Дарьи и Аму-Дарьи. Памирская возвышенность, между бассейнами Аму-Дарьи и Тарима.

Болъе значительныя горныя ръки въ Ферганъ питаются глетчерами и сифгами. Туземцы называють воду эту, вытекающую изъ ледниковъ, въ видъ молочнаго цвѣта потоковъ, Акъ-Су (бѣлая вода) въ противоположность ей, воду берущую начало изъ ключей и болоть, называютъ Кара-Су (черная вода).

Самая большая ръка въ Области это Сыръ-Дарья, образующаяся черезъ сліяніе Кара-Дарьи съ Нарыномъ, вблизи Намангана. Сыръ-Дарья протекаетъ по продольному направленію долины нісколько дугообразно съ С. В. В. на Ю. Ю. З. на протяжении около 250 верстъ, слъдовательно 1/7 часть всего своего теченія, до впаденія въ Аральское море.

Кара-Дарья составляется главнымъ образомъ изъ рвчекъ: Кара-Кульджа и Таръ. Первая образуется изъ безчисленныхъ горныхъ ручейковъ, берущихъ начало въ восточной части области, въ горахъ Учъ-Сентъ, а вторая изъ такихъ же ручейковъ, въ горахъ Кашъ-Кулакъ, недалеко отъ переваловъ Терекъ и Суёкъ. Объ эти ръчки, берущія начало на высоть 17000 футовъ н. у. м., по пути принимаютъ множество притоковъ и въ 15 верстахъ къ Ю. В. отъ Узгена, еливаются, об-

разуя рѣку Кара-Дарью. Эта послѣдняя направляется на западъ и недалеко отъ Намангана, соединяется съ большой горной рѣкой Нарыномъ, берущимъ начало изъ ледника Петрова, въ Семирѣченской Области, образуя Сыръ-Дарью, которая поворачиваетъ къ Ю. З., прорываясь между горами Моголъ-Тау на сѣверѣ и Ширинъ-Ферхатъ на югѣ, и выше города Ходжента, она покидаетъ высохшее ложе древняго Ферганскаго озера, огибая горы Моголъ-Тау, слѣдуетъ въ сѣверозападномъ направленіи къ Аральскому морю.

Многіе принимаютъ Нарынъ за начало Сыръ-Дарьи, а Кара-Дарью считаютъ его притокомъ. Длина теченія Нарына, его богатство водою и даже характерная мутность его воды, отъ содержанія лёссоваго ила, даютъ ему право считаться началомъ рѣки Сыръ-Дарьи, такъ какъ лишь по этнографическимъ причинамъ, этой горной рѣкѣ, было дано другое названіе, чѣмъ ея продолженію, по сліяніи съ Кара-Дарьей. Паденіе Сыръ-Дарьи 1,2 сажени на версту; Нарына-же гораздо больше. Вначалѣ, горныя рѣчки имѣютъ паденіе чуть не вертикальное. Правый берегъ, какъ Сыръ-Дарьи, такъ и Нарына выше лѣваго. На рѣкѣ много отмелей и небольшихъ островковъ, покрытыхъ небогатою растительностью, которые въ половодье большею частью затопляются.

Притоки Кара-Дарьи и Нарына многочисленны; они впадають съ правой и съ лѣвой стороны, принимая множество второстепенныхъ горныхъ рѣчекъ и ручейковъ, вытекающихъ частью изъ ледниковъ, частью изъ ключей. Если посмотрѣть на подробную карту Ферганской Области, то каждая рѣка въ верховьяхъ своихъ представляетъ цѣлое дерево, съ такою вѣтвистостью, какой иѣтъ ни на одной изъ русскихъ рѣкъ, начинаю-

щихся на плоскихъ возвышенностяхъ. Многочисленность ръчекъ въ Ферганъ зависить отъ ся гористости.

Высокія горы, покрытыя глетчерами и вѣчными снѣгами, сгущають около своихъ холодныхъ вершинъ всѣ приносимыя къ нимъ испаренія, которыя падаютъ дождемъ, или чаще снѣгомъ, на тѣ же высоты, гдѣ и возникаетъ поэтому много ручейковъ, число которыхъ увеличивается въ теплое время, когда таетъ снѣгъ и ледники.

Ручейки, сливаясь, образують рвчки, которыя въ свою очередь соединяются съ такими-же, такъ что ни одна изъ нихъ не имветъ точно опредвленнаго себв начала, даже и тогда, когда вытекаетъ прямо изъ глетчера, потому что на пути къ ней присоединяется другая, третья, тоже берущія начало въ сосвіднихъ глетчерахъ. Направленіе этихъ рвкъ, въ верховомъ теченіи, подчиняется общему склону горныхъ хребтовъ и отдільныхъ группъ. Вступая въ среднее теченіе, эти рвки изміняютъ свое направленіе сообразно съ наклономъ долины и ущелій, по которымъ проходятъ.

Въ низовыхъ теченіяхъ, въ долинъ, почти ни одинъ изъ притоковъ не доходитъ до Сыръ-Дарьи, такъ какъ они раздъляются на главные арыки, эти на второстепенные и т. д., пока не разобьются на безчисленное множество мелкихъ арыковъ, орошающихъ поля. Если въ большомъ масштабъ снять какой либо многоводный притокъ Дарьи, то представится любопытный чертежъ. Начало ръки, какъ уже было сказано, походитъ на вътвистое дерево, но въ долинъ ръка дълится на такое безчисленное количество вътвей, что представляется въвидъ въера.

Притоки Сыръ-Дарьи, впадающіе съ лівой сто-

роны, т. е. берущіе начало въ Алайскомъ хребть, питаются большею частью глетчерами; а съ правой стороны, т. е. берущіе начало въ съверныхъ горахъ, пре-имущественно составляются изъ родниковъ. Сумма воды всъхъ южныхъ ручьевъ и ръчекъ, значительно превышаетъ сумму всъхъ съверныхъ. Номимо горныхъ притоковъ, ръки пополняются еще водою изъ долинныхъ ръчекъ (Кара-Су), образующихся изъ ключей и болотъ.

Притоки Сыръ-Дарьи съ правой стороны слѣдующіє: Паша-Ата, Чаначт, Кассанъ, Сумсаръ, Кокъ-Сарыкъ, Гава, Чадакъ-Су, Бабай-Ябъ, Падакъ и другіє. Съ лѣвой стороны: Араванъ, Исфайрамъ, или Учъ-Курганъ-Сай, Шахимарданъ-Сай, Сохъ, Исфара.

Притоки Нарына, въ предълахъ области: Кара-Су, Узунъ-Ахматъ, Сусамыръ. Притоки Кара-Дарьи: Яссы, Заргеръ-Су, Чангетъ-Су, Кугартъ, Базаръ-Курганъ и Майли-Сай.

По всему протяженію Алайской долины протекаеть, съ востока на западъ, рѣка Кизылъ-Су, берущая начало съ горы Гурумды въ Заалайскомъ хребтѣ и принявъ съ правой и лѣвой стороны безчисленное множество горныхъ ручейковъ, она направляется въ Бухарскія владѣпія, сначала подъ названіемъ Сурхабъ, потомъ Вахшъ и, соединившись съ р. Иянджъ, образуетъ Аму-Дарью. Слѣдовательно Кизылъ-Су, составляетъ одинъ изъ истоковъ Аму-Дарьи.

Съ той-же горы Гурумды беретъ начало вторая ръка Кизылъ-Су, на Алаъ, но направляется въ противо-положную сторону, мимо нашего укръпленія Иркештама въ Кашгарію и принявъ названіе Кашгаръ-Дарья, соединившись съ Яркентъ-Дарьей, образуетъ Таримъ.

Ширина, глубина и быстрота ръкъ и ръчекъ въ

Области весьма непостоянны и видоизмъняются по нъскольку разъ въ году, а подчасъ и въ теченіе дпя.

Получая пачало въ высокихъ горахъ, не ниже 9000 футовъ п. у. м., эти ручьи и рѣчки, въ своихъ такъ называемыхъ верховыхъ теченіяхъ, не текутъ, а песутся съ величайшею быстротою, по каменному ложу, ревутъ, пѣнятся, плещутъ, обрываютъ скалистые берега и уносятъ обломки каменныхъ породъ, округляя ихъ въ гальки и выбрасывая ихъ въ своемъ среднемъ теченіи.

Обиліе снѣговъ въ верховьяхъ притоковъ Сыръ-Дарьи, въ зависимости отъ температуры обусловливаетъ неоднократное поднятіе уровня воды въ рѣкѣ, въ продолженіи лѣта.

- 1) Въ февралъ или мартъ: таяніе спъга производить поднятіе ледянаго покрова, если только ръка замерзала. Это длится 8—14 дней; а затъмъ уровень воды понижается. По замъчанію туземцевъ, это половодье совпадаеть со временемъ цвътенія яблонь.
- 2) Къ маю, то ранте, то поздите, вторая прибыль веды обусловливается быстрымъ и внезапнымъ таяпіемъ остаточнаго сита въ горахъ, подъ вліяніемъ уже жгучаго селица. На это второе половодье вліяеть, какъ измінчивое количество сита, въ соотвітствующее время года, такъ и весенія грозы въ горахъ, а потому эта вторая полая вода не постоянна.
- 3) Въ понъ, съ ледниковыхъ фирновъ стекастъ наибольшее количество воды и ръка вздувается наиболъе сильно.
- 4) Позднею осенью, рѣже паблюдается половодье отъ осеннихъ дождей, выпадающихъ въ горахъ.

" Горныя рѣки, впадающія въ Кара и Сыръ-Дарью, берутъ начало въ горахъ, абсолютная высота которыхъ,

а также склоны бывають различны, вследствіе чего и таяніе на нихъ снъга происходить въ разное время. Въ р. р. Таръ, Кара-Кульджъ, Яссахъ и другихъ, половодье появляется не одновременно; въ одной кончается, въ другой начинается, а потому и прибыль воды въ Кара и Сыръ-Дарь в этимъ уравнов вшивается. Приблизительно р. Яссы несетъ большее количество воды обыкновенно въ концъ апръля, Куршабъ-въ первой половинъ мая, Таръ въ началъ іюня, а Кара-Кульджа въ концъ іюня. Если же прибыль воды, во всёхъ этихъ притокахъ, при большихъ снъгахъ въ горахъ, произошла-бы сразу, тогда вся Ферганская долина, или върнъе все на ней сущее, было-бы смыто ужаснъйшимъ наводненіемъ. Къ счастію обитателей этой страны, что подобная катастрофа никогда не происходила, по крайней мъръ объ этомъ нигдъ не упоминается въ исторіи новъйшаго времени.

Прибыль и убыль воды обнаруживается и въ теченіе сутокъ. По Шуйлеру (¹), въ верхней части Сыръ-Дарьи наибольшая скорость теченія (8 ф. въ секунду) въ половодье, бываеть между 10 и 11 часами утра, затъмъ до 2-хъ часовъ вода убываетъ и снова начинаетъ прибывать. Близъ Ходжента, скорость теченія была опредълена въ 3,3 ф. въ секунду (²). Но въ Ферганской долинъ, она нъсколько больше. При низкой водъ, противъ Шеидъ-Мазара 4,2 фута въ секунду, а около Аксы 4,9 (³). Для полыхъ водъ скорость теченія возрастаетъ непомърно. Въ 1886 г. въ Кара-Даръъ, возрастаеть непомърно. Въ 1886 г. въ Кара-Даръъ, воз-

⁽¹⁾ Turkistan, I. p. 51.

⁽²⁾ Туркестанскія вѣдомости 1875 г. № 18.

⁽³⁾ Опыть изследованія песковь Ферганской Области. В. Наливкина, стр. 49.

лъ кишлака Султанъ-Абадъ, откуда выведенъ громадный арыкъ Шариханъ-Сай, во время половодья, была вычислена скорость теченія около 20 ф. въ секунду. Правда, что въ это время она надълала бъдъ. Посрывала плотины и другія приспособленія, угрожала ватопить нъсколько волостей и была удержана лишь неимовърными усиліями тысячей рабочихъ силъ, руководимыхъ завъдывающимъ ирригаціей, который все лъто и жилъ на берегу этой свиръпой ръки.

предълахъ Ферганской долины, почти вся разбирается для орошенія. Эта долина, по свойству почвы, жаркому

климату и бездождью, въ теченіе лѣта, представляла-бы собою безплодную пустыню, но благодаря неутомимому труду человѣка, по проведенію искусственнаго орошенія и обработкѣ почвы въ теченіи тысячелѣтій, она стала наряду самыхъ плодородныхъ странъ земнаго шара. Количество воды въ рѣкахъ области встарину было неистощимо, но нужно было первоначально обитателямъ этой страны утилизировать ее для орошенія своихъ посѣвовъ. Здѣшнюю почву составляетъ лессъ, спекшійся отъ солнечнаго зноя въ каменную массу, которую не беретъ никакой заступъ и на которой ничего не растетъ; но разъ этотъ лессъ достаточно увлажиенъ, то превращается въ плодороднѣйшую почву. А потому

необходимость въ насущномъ кускѣ хлѣба, побуждала поселившихся людей приняться за тяжелую работу, по проведенію воды изъ горныхъ рѣчекъ, на свои поля и огороды. Упорнымъ трудомъ въ продолженіи столѣтій, проводя арыкъ за арыкомъ, земледѣлецъ отвоевывалъ подъ свои пашни все новые и новые участки. Такимъ образомъ создался обширный культурный оа-

Вода многочисленных притоковъ Сыръ-Дарыя, въ Орошеніе

зисъ, какъ грандіозный памятникъ разумныхъ усилій человъка. Крутизна паденія горныхъ ръкъ Ферганы, дала возможность искусственнаго отведенія изъ нихъ воды для орошенія поствовъ. Пужно отдать должную справедливость туземцамъ въ томъ искусствъ, съ которымъ они повсюду проводять арыки изъ горныхъ ръчекъ; но вслъдствіе несовершенства ирригаціонной системы, много воды теряется безъ всякой пользы. Ферганская область очень богата водою, но количество ея, до сихъ поръ, въ точности неопределено. По сведеніямъ собраннымъ А. Дмоховскимъ (1), видно, что ръчки вытекающія, какъ изъ сіверныхъ, такъ и южныхъ горъ, ограничивающихъ Ферганскую долину, въ среднемъ выводъ дають около 63.585 куб. фут. въ секунду; слъдовательно 667.364 куб. саж. въ часъ, или 16.016.845 куб. саж. въ сутки.

По вычисленіямъ завъдывающаго ирригаціей въ области А. Е. Синклера, весь объемъ воды, который дается ръчками Ферганы, образующимися изъ ключей и берущими начало изъ ледниковъ, а также главными ръками Нарыномъ и Кара-Дарьей, равняется въ общей сложности, въ зимній періодъ до 20.000 куб. фут. въ секунду, слъдовательно въ часъ 209.909 куб. саж., а въ сутки 5.037.816 куб. саж. Лътомъ, во время самой большой воды, объемъ ея доходитъ до 116.000 куб. фут. въ секунду; слъдовательно въ часъ 1.217.492 куб. саж., а въ сутки 29.219.808 куб. саж.

Устройство величественнъйшихъ ирригаціонныхъ сооруженій въ Азіи относится къ тысячельтіямъ предшествовавшимъ христіанской эръ, не говоря уже о томъ,

^(*) Объ ирригаціи въ Ферганской Области, Туркестанскія вѣдомости. 1887 г. № 35.

что подобной усовершенствованной ирригаціи, должно было задолго предшествовать орошеніе въ маленькомъ видъ. Древній Вавилонъ, висячіе сады Семирамиды орошались посредствомъ водоподъемныхъ машинъ. Еще задолго до того Халдеи прорывали каналы, руины которыхъ открываются еще и теперь въ долипъ Тигра и

Ефрата.

По нижнему теченію Сыръ-Дарыи находятся тоже слъды древнихъ ирригацій. Туземныя правительства почти вевхъ въковъ и народностей старались о разширеніи ея. Имена болье популярныхъ туземныхъ властителей непремънно связаны съ тъми или другими ирригаціонными сооруженіями. Следовательно, первоначально поселившіеся люди въ Ферганъ, были въроятно уже знакомы съ ирригаціей и въ силу неизбіжной необходимости, чтобы не умереть съ голоду, вынуждены были совокупными усиліями проводить большіе оросительные каналы, такъ какъ мелкіе, проведенные на первыхъ порахъ, прямо отъ главныхъ потоковъ къ своей усадьбъ, оказались вскоръ недостаточными, по мъръ разроставшагося народонаселенія. Къ этому много способствовало и свойство лёсса, который до того пластиченъ, что въ немъ можно рыть каналы, съ отвъсными боками, неразмывающимися текущей въ нихъ водою. Это дало возможность прорытія такихъ громадныхъ каналовъ, какъ Шариханъ-Сай, Андижанъ-Сай, Янги-арыкъ, Алтыарыкъ и друг. Отдъльные кишлаки конечно не могли проводить и поддерживать подобныя гигантскія работы, требовавшія усилій цълаго населенія и распорядительнаго содъйствія властей. При ханахъ это практиковадось слъдующимъ образомъ: отдавался приказъ о томъ, чтобы каждый домъ того вилаета, въ которомъ проводился арыкъ, въ теченіе извъстнаго времени, выставилъ по одному рабочему, съ его харчами и кетменёмъ (мотыкой) и кромъ того, если работа была большая, то и изъ другихъ вилаетовъ требовались рабочіе.

Въ болъе древнія времена, для возбужденія массъ народа, на извъстное предпріятіе нуженъ былъ какой нибудь ссобенный стимулъ; а потому всѣ преданія о проведеніи большихъ каналовъ вертятся на томъ, что они проведены, не по частной иниціативѣ, а по наитію свыше, явившемуся какому нибудь избраннику, который и руководилъ подобными работами. Населеніе настолько благовѣетъ передъ этими руководителями работъ, по проведенію арыковъ, что многіе изъ нихъ причислены къ лику святыхъ и ихъ чтятъ съ незапамятныхъ временъ. Такъ 12 человѣкъ, по иниціативѣ которыхъ выведенъ изъ рѣки Шахимардана Алты-арыкъ, веф рядомъ и считаются покровителями этихъ арыковъ; намять ихъ до сего времени чтится въ народѣ.

Легенда относительно проведенія Бай-арыка, въ Наманганскомъ уфздѣ изъ Наукентскихъ ключей, окутана совсѣмъ мистицизмомъ и таинственностью. Встарину будто бы на мѣстѣ теперешняго Намангана, на 10-ти обрывахъ жили 10 отшельниковъ, изъ которыхъ наибольшей святостью отличались Хазретъ-и-Лянгаръ-Ваба и другой номоложе Хазретъ-и - Хазыръ. Однажды, чувствуя недостатокъ въ хорошей водѣ, старшій сказалъ младшему: "садись верхомъ на посохъ и ноѣзжай на сѣверъ, Богъ номожетъ тебѣ привести оттуда воду". Хазретъ-и-Хазыръ сѣлъ верхомъ на свой посохъ, который новлекъ его къ Наукентскимъ ключамъ и отсюда повернулъ назадъ; по слѣду оставленному

посохомъ на землъ, вода пришла изъ этихъ ключей къ тому мъсту, гдъ обитали отшельники. По проведенію Янги-арыка изъ Нарына къ Сыръ-Дарьъ въ 1819 году, работы были поручены Наманганскому жителю Уста-Исянъ-баю. Такъ какъ сначала работы шли неудачно, то народъ порывался убитъ Исянъ-бая; но во снъ ему явился тотъ-же Хазретъ-и-Хазыръ, велълъ ему не падать духомъ и объщалъ указать то направленіе, по которому слъдуетъ вести арыкъ. Когда по утру онъ проснулся и вышелъ изъ палатки на работы, то увидълъ цълый рядъ, особеннымъ образомъ закрученныхъ пучковъ травы; понявъ, что это указаніе пути Хазретъ-и-Хазыра, онъ сталъ рыть по этому направленію и благополучно довелъ его до Намангана.

Помимо всёхъ этихъ фантастическихъ разсказовъ, нужно всё-таки удивляться, какимъ образомъ люди, неразвитые въ техническомъ отношеніи, съумъли отвести на свои поля воду, въ крутой гористой мъстности; а еще большее удивление возбуждаеть, что всв эти работы выполнены безъ знанія нивеллировки и безъ инструментовъ. Случается видъть отводъ воды еще высоко въ горахъ и тогда, въ крутыхъ ущельяхъ, арыкъ ведется по косогорамъ на такую высоту, что при первомъ взглядъ кажется будто бы вода, вопреки физическимъ законамъ, идетъ на гору. Неръдко ведутъ воду съ одной высоты на другую, по деревяннымъ жолобамъ, почти висящими на воздухъ, подпертыми тонкими подставками, а то по гребню искусственной насыпи. Нъкоторые каналы спускаются къ долина вдоль отвасныхъ стапъ, высаченныхъ въ твердой каменной массъ (между Вуадилемъ и Шахи-Марданомъ), или въ видъ туннелей (на ръкъ Исфаръ, близъ развалинъ древней кръпости Зимвраша).

Вев эти ирригаціонные каналы, на мъстномъ узбекскомъ нарвчіи называются арыками. Начало подобнаго главнаго арыка выводять изъ быстрой горной ръки, въ мъстъ лежащемъ высоко надъ орошаемой мъстностью, чтобы вода могла достигать до предъловъ орошаемыхъ полей, безъ остановки. Вмъстъ съ тъмъ стараются устраивать эти арыки съ возможно меньшимъ паденіємъ, такъ какъ при значительной стремительности воды, она не будеть равномърно распредъляться по полямъ и станетъ размывать берега и сносить запруды. Паденіе $\frac{1}{2000}$ до $\frac{1}{2500}$ господствующая норма, въ особенности въ большихъ арыкахъ. Въ большей части оросительныхъ арыковъ, скорость теченія 5-7 футовъ въ секунду. Главные арыки разделяются на несколько ветвей, предназначенныхъ для извъстныхъ мъстностей и въ этихъ пунктахъ устраиваются плотины, помощью которыхъ регулируется теченіе и направляется вода, по той или другой вътви, смотря чья очередь въ данное время пользоваться водой. Эти главныя вътви дълятся въерообразно на второстепенныя, а тѣ въ свою очередь дробятся на меньшія и такъ далье, до самыхъ мелкихъ, которыя проводятся по грядамъ, садамъ и проч. Въ конечныхъ своихъ развътвленіяхъ они образуютъ систематически оросительную съть, вода которой, смотря по надобности, течетъ съ одного участка поля, на другой, съ одного квадратика на сосъдній и т. д. Арыки постоянно перекрещиваются, но теченіе воды по нимъ не пріостанавливается, такъ какъ самыми простфиними устройствами, посредствомъ тополевыхъ жолобовъ, нерекинутыхъ черезъ другой арыкъ, вода одного, переходить черезъ другой арыкъ, нисколько не смъшиваясь. Для того чтобы остановить воду въ одномъ арыкъ и направить въ другой, употребляются самыя обыкновенныя приспособленія, помощью прутьевъ, дерна, кампей и т. п.

При орошеніи рисовых в полей требуется значительное количество воды, такъ какъ эти поля, т. е. корпи растенія должны находиться подъ водою, около 100 дней. Рисовыя поля издали бросаются въ глаза своею яркою зеленью и вафельною формою, потому что онъ состоять изъ небольшихъ, горизонтально расположенныхъ квадратиковъ, раздъленныхъ между собою перегородками, вышиною въ четверть, изъ той же земли, чтобы напущенная вода не стекала. Какъ только вода начинаеть убывать отъ всасываванія почвой, или отъ испаренія, тотчась добавляется свъжей, такъ что каждый квадратикъ составляеть небольшое, отдъльное болотце, поросшее кромъ риса, еще множествомъ болотныхъ растеній.

Общая илощадь главныхъ и второстепенныхъ арыковъ въ Ферганѣ, питающихъ поля водою, составляетъ около 10 % всей культурной илощади. Но этого количества очень недостаточно. Если-бы воды было еще столько, сколько ея имѣется въ настоящее время, то для орошенія всѣхъ полей, годныхъ подъ культуру и для лѣсныхъ плантацій, ея было-бы еще мало (1). Совершенно противоположное мнѣніе высказываетъ А. Дмоховскій (2). Имѣющеюся въ Ферганѣ водою (преимущественно въ долинной ея части) можно было-бы оросить въ четыре раза болѣе того количества удобной земли, какое отведено въ надѣлъ туземцамъ и въ девять разъ болѣе того, сколько засѣваютъ теперь туземцы. Послѣдній выводъ, мнѣ кажется преувеличенъ, такъ какъ дѣйствительное коли-

⁽¹⁾ Гориме лиса Ферганской области. В. И. Лисневскаго стр. 7.

⁽²⁾ Loc. cit.

чество воды, въ общей сложности, менъе указаннаго; а кромъ того, не принято въ разсчетъ фильтраціи ея въ почву и испаренія.

При орошеніи весьма важную роль въ гигіэническомъ отношении играетъ отработавшая вода, т. е. такая, которая, оросивъ рисовыя поля и другіе посівы, становится уже ненужной. Туземецъ хлопочеть лишь о томъ, какъ бы побольше захватить себт воды; а о томъ куда она пойдетъ далбе ему и дъла нътъ. Между твиъ эта вода зачастую течетъ по произволу, пока не попадеть въ такое мѣсто, откуда ей дальше нѣтъ выхода. Туть она скопляется, гність и производить болота, развивающія малярію въ огромномъ чествъ. Въ этихъ случаяхъ, необходимо было-бы вмъщательство администраціи, съ цълью заставить земледъльцевъ, при возведении оросительныхъ арыковъ, принимать міры къ удаленію отработавшей воды въ такія мъста, гдъ бы она не застаивалась, а шла далъе внизъ къ большой ръкъ.

Велъдствіе того, что воды, доставляемой ежедневно всьми арыками области, недостаточно для орошенія всьхь возділываемых полей и снабженія ею всьхь городовь и кишлаковь, то жители получають ее въ извъстномь только количествь, для чего соблюдается очередь. Въ извъстную мъстность пускается вода опредъленное число дней. Эта очередь велась при ханскомъ владычествь и осталась по настоящее время, такъ какъ въ противномь случать было бы неравномърное распредъленіе воды между жителями; одни получали-бы ее въ избыткъ, а другіе оставались-бы совствиь безъ воды. Нъкоторые кишлаки бывшаго Чустскаго утзда, вслъдствіе недостатка воды, получають ее чрезъ промежу-

токъ въ 27 дней; при этомъ пользоваться этой водой жители имѣютъ право только въ продолженіи 12 часовъ (1). Какъ прежде, такъ и теперь, завѣдываніе и распредъленіе водами лежитъ на обязанности Мирабъ-башей, которыхъ выбирается извѣстное число на уѣздъ, смотря по надобности. На ихъ обязанности лежитъ кромѣ распредѣленія воды, еще заботы объ очисткъ и поддержаніи главныхъ каналовъ и плотинъ. Арыки заносятся иломъ, а потому они разъ въ годъ, или чаще очищаются, а вынутый илъ, когда обсохнетъ, свозится на поля.

Вопросъ о водъ въ здъшнемъ крав, это вопросъ жизни и и смерти; а потому споры изъ за нея, въ скудные періоды, когда ее не хватаетъ для орошенія посъвовъ, перъдко оканчиваются весьма печально. Много убійствъ совершается, если откроется, что кто нибудь воровски, внъ очереди, воспользовался водою для орошенія своего поля. Ссоры изъ за воды называются спеціальнымъ терминомъ "водяныхъ джанджаловъ". Мирабъ-баши не обладаютъ никакими техническими и юридическими свъденіями, а руководствуются практикой и рутиной; но тъмъ не менъе, все ведется довольно правильно, какъ велось и прежде. Мирабъ-башъ своею властью безапнеляціонно разръшаетъ всъ песогласія и столкновенія, которыя возникаютъ чуть ли не ежечасно.

Всей ирригаціей въ области зав'ядываетъ спеціалисть по этой части, русскій инженерь.

При ханахъ многимъ городямъ и киплакамъ, а даже и частнымъ отдъльнымъ лицамъ были предоставлены привилегіи, относительно польвованія водою, преимущественно передъ прочими. Эти привилегіи, если толь-

⁽¹⁾ Общія черты экономических условій Ферганской области съ естественно-исторической точки зрёнія. Записка А. Вилькинса 1882 г.

ко были подтверждены несомивнными документами, остались въ силв и по настсящее время.

Пруды.

Во всвхъ городахъ и кишлакахъ, вслъдствіе періодическаго снабженія водою, жители для сохраненія ея, вырываютъ въ садахъ и дворахъ небольшіе пруды (хаузъ), которые во время очередной воды наполняются и она сохраняется до слъдующей очереди. Эта вода служитъ для приготовленія пищи, чая и другихъ житейскихъ надобностей, потому что туземцы, въ силу какихъ то религіозныхъ убъжденій, или предразсудковъ, неохотно употребляютъ колодезную воду. Вслъдствіе перяшливости туземцевъ, вода въ этихъ хаузахъ заставается, загрязняется, гністъ, а потому весьма вредно дъйствуетъ на здоровье людей; но если-бы опи содержались опрятно, тогда приносили бы несомнънную пользу.

H m w u u

Ключей въ области такое значительное количество, что перечислить ихъ нътъ никакой возможности, тъмъ болве что большинство ихъ не имветъ названія, Горныя рвчки берутъ начало, если не изъ ледниковъ, то изъ ключей. Въ верхней полосъ горъ, выше линіи древесныхъ породъ, ключи выходятъ на поверхность около мъстъ, гдъ таетъ снъгъ; они въ этой полосъ горъ хотя многочисленны, но не обильны водой и многіе изъ пихъ пересыхають во второй половинь льта. Изъ непересыхающихъ многіе не дають ручья, а образують только резервуары, вода которыхъ то просачивается, то испаряется. Въ средней горной, лъсной полосъ, количество ключей такъ же велико, какъ и въ предыдущей; но они даютъ уже гораздо больше воды, до одной мельницы. Туземцы, при опредъленіи объема воды, за единицу принимають то количество, которое необходимо для мельницы, съ однимъ поставомъ, а именно: 4 куб. фута въ секунду.

Нъкоторые считаютъ это количество 6, 25 к. ф. въ секунду.

Ключи предгорій и долины большею частью меньше и по числу и по размірамь, хотя бывають исключенія: кишлакь Сохь, Балыкчи, Аимь-кишлакь и другіе получають воду исключительно изъ ключей, какъ для общаго употребленія, такъ равно и для орошенія. Въ Наманганскомъ увздів ключь Бай-булакъ-ата даеть количество воды до двухъ мельниць, а въ центрів города Чуста бьеть ключевая вода, которой жители пользуются не только для питья, но и для поливки садовъ. Въ нівкоторыхъ містахъ ключи служатъ подспорьемъ, доставляя необходимую для употребленія воду въ то время, когда арыки, согласно очереди, снабжають другія міста.

Туземцы ключевую воду называють общимъ названіемъ Кара-су; подъ именемъ же булакъ, подразумъвается самый ключъ. Если ключъ выходить въ подводныя части береговъ, то называется сузакъ.

Происхожденіе многочисленных в ключей Ферганы зависить оть осадковъ въ горахъ, окружающихъ долину со всёхъ сторонъ. Еще А. П. Федченко (1) обратиль вниманіе, что количество воды, вытекающее изъ горъ, несоразмёрно мало, сравнительно съ поверхностью, покрытою снёгомъ и предположилъ, что много воды уносится подземными потоками. А. ф. Миддендорфъ (2) тоже говоритъ, что исчезновеніе воды въ долинѣ, обусловливается не исключительно распредѣленіемъ ея, по проводамъ, при содъйствіи человѣка. Горные потоки съ шумомъ несутся по мощнымъ гальковымъ отложеніямъ и уже тамъ на большую глубину просачивается значительное количество воды. Остальная вода, тамъ гдѣ она

⁽¹⁾ Путешествіе въ Туркестанъ, т. І. ч. ІІ. стр. 97.

⁽²⁾ Очерки Ферганской долины, стр. 206.

прорывается чрезъ скалистыя стёны, наталкивается на мощныя лёссовыя массы, образующія окраину долины и воть здёсь, во всей сил'в проявляется та особенность, или тоть общій признакъ, которымъ Рихтгофенъ такъ прекрасно характеризоваль сухопутный лёссь. Поры въ губчатой массъ лёсса разширяются водою; исчезая съ поверхности, она прокладываеть себъ путь въ глубину, гдъ, достигнувъ непроницаемаго слоя, течетъ по различнымъ, часто очень удаленнымъ одно отъ другаго направленіямъ, пока наконецъ не пробъется въ долинъ, въ видъ значительныхъ ключей. Это не бьющія водяныя жилки, столь обыкновенныя въ Европъ, но скоръе ручьи, которые вдругъ исчезають въ разщеливщихся известковыхъ горахъ, чтобы затемъ въ другомъ мфете, енова выйти изъ земли, въ видъ потока не меньшей величины, чъмъ прежде. Безчисленное множество такихъ ключей встръчается вокругъ Ферганской долины.

Ключи, или родники, выходя на поверхность, собирающієся въ ручейки, потомъ въ рѣчки, протекающія по долинѣ, имѣютъ одинаковое значеніе съ тѣми рѣчками, которыя берутъ начало въ ледникахъ; но туземцы къ ключевой водѣ относятся съ большимъ недовъріемъ и считаютъ ее вредной, при употребленіи въ сыромъ видѣ.

Въ числъ многихъ болъзней, принисываемыхъ употребленію этой воды, главнымъ образомъ указываютъ на зобъ. Мнъ кажется, что подобное мнъніе, относительно вреда ключевой воды, составилось на томъ основаніи, что подъ именемъ Кара-су, они разумьютъ одинаково какъ воду ръчекъ, образующихся изъ ключей, такъ точно и берущихъ начало изъ болотъ, не дълая въ этомъ

отношеніи никакого различія. Между тъмъ свойства той и другой воды далеко не одинаковы.

Маленькіе ключи, пробивающіеся въ низкихъ міз- Болота. стахъ и неимѣющіе оттуда выхода, составляють большое зло для нашей долины, потому что способствують образованію болоть. Подобныя болота являются постоянными, невысыхающими, потому что на сколько воды убавится вследствіе испаренія, на столько она опять пополнится этими ключами. Такихъ болотъ весьма много разбросано по всей долинъ и къ числу таковыхъ принадлежать, ныпъ осущенныя болота, окружающія Новый Маргеланъ. Одно изъ нихъ лежащее къ съверу, по всей въроятности давняго происхожденія, потому что обилуетъ значительными залежами торфа; тогда какъ въ другомъ болотъ на С. З. его не находятъ. По словамъ туземцевъ, послъднее болото образовалось не болье 70 леть тому назадь, а до того времени на этомъ месте были посъвы риса.

Этого рода болота заслуживають большого вниманія, такъ какъ осущеніе ихъ возможно только помощью дренажа, что сопряжено съ значительными издержками. Оставляя-же ихъ in statu quo, мы подвергаемся постоянному зараженію маляріей, такъ какъ они являють собою главные очаги развивающие болотную міазму.

Что касается до болоть образовавшихся случайно, отъ спуска отработавшей воды, или велъдствіе наводненій, то коль скоро причина будетъ устранена, вода испарится и оно высохнеть само собою.

Но въ большинствъ случаевъ эти болота тоже не высыхають. Разлившаяся вода стоить мъсяцъ и болье, смотря по глубинъ ложбины, а потому разводить ка-

мышъ (1), который, по спаденіи воды, составляеть надъ временнымъ болотомъ такой лъсъ, что даетъ порядочную тынь, чымь защищаеть почву оть палящаго солнца, вадерживаетъ испареніе и осушку болота. Если при этомъ вынадаютъ дожди, то подобныя болота держутся все льто. Въ этихъ случаяхъ великую роль играетъ камышъ, безъ котораго болото еще и могло бы высохнуть; но сила этого растенія такова, что если онъ разъ пустиль кории въ землю, то хотя въ сильные жары можетъ засохнуть, а въ морозы пріостановить рость; но съ первымъ тепломъ и первою водою, онъ оживетъ и его не выживешь съ завоеваннаго имъ однажды мъста. Въ добавокъ еще онъ такъ живучъ, что ему всякій климать по плечу, и кром'в того растеть какъ въ пр'всной, такъ и въ соленой водъ. Камышъ всегда задерживаетъ влагу надолго въ затопленномъ мъсть, а умирая, разлагается и заражаеть окрестность міазмою. Каждый дождь доставляетъ влагу, способствующую разложению камыша. Оттого, гдв только есть камышъ, тамъ почти всегда и лихорадки.

Озера.

Какъ въ долинъ, такъ и въ горахъ разбросано много озеръ, но большею частью незначительныхъ по величинъ. Нъкоторыя изъ нихъ содержатъ горько-соленую воду, другія-же пръсную и въ такихъ водится много рыбы, но она пахнетъ болотомъ. Озера въ горахъ, содержащія пръсную воду, произошли, или отъ стаявшихъ ледниковъ, какъ оз. Капланъ-куль въ бывшемъ Чустскомъ уъздъ, или вслъдствіе случайнаго загроможденія русла ръки обвалами скалъ, какъ оз. Курбанъкуль, близъ Шахимардана. Самое значительное озеро

⁽¹) Обыкновенный болотный тростникъ. Arundo phragmitis.

въ области, это большой Кара-куль на Памиръ, занимаетъ площадь въ 220 кв. верстъ. Оно находится на высотъ 13200 футовъ н. у. м. На основании геологическихъ слъдовъ Д. Л. Ивановъ предполагаетъ, что оно въ прежнее время составляло водоемъ болъе чъмъ 100 верстъ длиною. Вода горько-соленая, такъ что животныя пьютъ только томимыя сильною жаждою. По разсказамъ пастуховъ, уровень Кара-куля повышается регулярно каждую пятницу. Это странное явленіе А. Ө. Костенко объясняеть дъйствіемъ какого нибудь перемежающагося источника.

Находится еще много озеръ расположенныхъ на болье, или менъе значительной высотъ.

Въ Наманганскомъ увздв въ горахъ, на высотв 8000 футовъ, находится довольно большое озеро, около 7 верстъ въ длину, съ првеною водою, называемое Сары-Челекъ, питамое рѣчкою того же имсни. Въ Наманганскомъ-же увздв, въ горахъ, на высотв 10000 футовъ находится небольшое, но очень глубокое озеро Гаванское. Вода въ немъ првеная, прозрачная, и вкусная. Дно каменистое. Озеро Капланъ-куль, по дорогв въ Гульчу, на высотв 5560 футовъ. Озеро Арпа-Тукты въ Чаткальской волости, на высотв 8200 фут. Оз. Кира-куль въ Исфарійской волости на высотв 8000 фут. Оз. Берекъ-су близъ перевала Кара-казыкъ на высотв 8000 ф.

Въ долинъ, достойно вниманія соляное озсро Аксыкемъ, находящееся въ Наманганскомъ уъздъ, педалеко кишлака Камышъ-курганъ. Изъ него туземцы добываютъ соль, а кромъ того больные пріъзжаютъ купаться въ соленой водъ и грязяхъ.

Въ центръ почти, между Кокандомъ, Маргеланомъ, Наманганомъ и Чустомъ находится довольно большое,

по всей въроятности остатокъ прежде бывшаго обширнаго озера, Дамъ-куль. Оно топко, просъяно болотными растеніями, берега заросли гигантскихъ размѣровъ камышемъ, въ которыхъ пріютились кабаны; словомъ, что это озеро скорве можно назвать болотомъ, такъ какъ всявдствіе массы гніющихъ въ немъ веществъ, оно заражаетъ окрестности маляріей. Живущіе по сосъдству, въ маленькихъ кишлачкахъ, Каракалпаки весною уходять въ горы и возвращаются лишь позднею осенью, для эсилоатаціи этого камыша, который въ громадномъ количествъ вывозять въ Кокандъ, для продажи на топливо. Этимъ они только и поддерживаютъ свое существованіе, такъ какъ большею частью крайне бъдные. Точно такого-же характера озера: Минъ-булакъ, Балыкчи и другія болье мелкія. Кромъ кабановъ водящихся въ камышахъ, на этихъ озерахъ масса утокъ, бекасовъ, куликовъ и прочей болотной дичи, вследствіе чего оне часто посъщаются охотниками, въ теченіе осени и зимы. Лътомъ невозможно тамъ пробыть и полчаса, такъ какъ миріады огромныхъ комаровъ, жалящихъ немилосердно, заставять всякаго обратиться вспять.

Нѣкоторыя изъ этихъ маленькихъ озеръ многоводны, такъ что земледѣльцы отводятъ изъ нихъ небольшіе арыки, для орошенія своихъ посѣвовъ, что служитъ подспорьемъ при недостаткѣ воды въ главныхъ арычныхъ системахъ.

Подпочвенная Несмотря на обиліе ключей въ Ферганѣ, все таки вода. много воды притекаетъ въ Сыръ-Дарью подземными путями, потому что подпочвенная вода въ долинѣ идетъ по этому направленію.

Глубина подпочвенной воды, на которой она находится отъ поверхности земли, весьма различна, для

всякой отдільной містности расположенной въ долинів. Даже въ одномъ и томъ-же городъ, какъ напримъръ въ Новомъ-Маргеланъ, она неодинакова въ разныхъ кварталахъ. Уровень подпочвенной воды подверженъ постояннымъ колебаніямъ въ разное время года, но въ этомъ паправленіи не было произведено точныхъ наблюденій. Для каждаго изъ городовъ, приблизительно опредълено стояніе подпочвенной воды, что и будеть мною указано при описаніи этихъ городовъ; но колебаній ся въ теченіе года никто не опредёляль, Послі результатовь изследованія Петтенкофера, Баудича, Буханана и друг. мы знаемъ, какую важную роль играетъ въ этіологіи бользненности колебание подпочвенной воды, но къ стыду своему должны сознаться, что до сихъ поръвъ Ферганъ, мало обращалось на это вниманія. Въ 1881 году, когда болъзненность въ Новомъ Маргеланъ достигла до ужасающихъ размъровъ, мы принялись за измъренія глубины и наблюденія за колебаніями подпочвенной воды. Въ 1882 году было вырыто 15 колодцевъ, въ разныхъ частяхъ города и ежемфеячно въ каждомъ изъ нихъ отмъчался уровень воды. Было замъчено, что въ іюнь, посль наводненія бывшаго 20 мая, вода во всьхъ колодцахъ упала такъ низко, что всв они оказались сухими. Съ этого времени число лихорядочныхъ больныхъ хотя стало увеличиваться, но весьма незначительно. Быть можеть причиною этому умъренному заболъванію поспособствовало то обстоятельство, что ко дню наводненія, были уже вырыты магистральныя, глубокія канавы, для осущенія съверо-западнаго болота, по которымъ вода начала быстро стекать и почва въ городъ стала замътно осущаться. Эти канавы по всей въроятности повліяли на пониженіе грунтовых водь. Въ іюль,

вода во ветхъ колодцахъ опять появилась почти на томъ же уровнъ, какъ была въ апрълъ и мав и такъ продолжала стоять, съ весьма незначительными колебаніями до ноября, при чемъ не замъчалось особенной разницы въ заболъваніи лихорадками, какъ по количеству больныхъ, такъ и по интенсивности принадковъ. Въ слъдующій годъ, колодцы безъ поддержки разрушились и этимъ закончились наши наблюденія. Одно только замічу, что уровень подпочвенной воды въ Новомъ Маргеланъ, послъ осушки обоихъ болотъ, вездъ понизился и почва стала суще; но въ 1889 г. безъ всякой видимой причины, подпочвенная вода опять значительно повысилась и наполнила подвалы и погреба, которые въ теченіе посліднихъ літь были совершенно сухи. Літомъ этого года, лихорадочныхъ больныхъ было значительно больше, какъ между жителями, такъ и между воинскими чинами Маргеланскаго гарнизона.

Относительно уровня подпочвенной воды въ горахъ, -- ровно ничего не знаемъ.

Замерзанія к Вет горныя ртки Ферганы, не смотря на сильные вскрытія морозы и спѣжные заносы, въ горахъ никогда не замерзають, а лишь изръдка обледенъвають у береговъ. Сыръ-Дарья, во время большихъ морозовъ, покрывается льдомъ, на весьма непродолжительное время; но бывають года, когда вима стоить легкая, тогда и она не замерзаетъ. Арыки, въ которыхъ теченіе медленное, а также вев пруды, озера и болота замерзають на болье, или менъе продолжительное время. Какъ замерзаніе, такъ и таяніе льда, не подчинены извъстному опредъленному времени; спадутъ морозы, пригрфетъ солнце и льда какъ бы не существовало. Съ арыками протекающими въ

долинъ, весьма часто случается, что они въ теченіе но-

Во время таянія снъга въ горахъ, а также отъ дож- Разливы рънъ дей, вст горныя ръки переполняются водою и неръдко и наводненія. выступають изъ береговъ, производя наводненія. При верховомъ теченіи, наши ріжи не могутъ разливаться, потому что всегда прорывають себъ такое глубокое ложе, что разливы даже въ самую сильную весеннюю воду, не могутъ имъть мъста, за высотою крутыхъ береговъ. Иногда только случаются обвалы самыхъ береговъ, когда ихъ подмываетъ вода, или обваливаются снъговыя массы, вслъдствіе чего вода, выше завала, задерживается и заливаетъ все надбережье. Но тамъ это не производить никакого бъдствія, такъ какъ у кочевниковъ нътъ никакихъ построекъ, а сами они, замътивши прибыль воды, немедленно снимаются съ этого мъста и направляются выше въ горы. Опасность является лишь въ мъстахъ нижележащихъ, отъ этой временной запруды, потому что быстрая ръка, въ концъ концовъ промоетъ и прорветъ эту запруду и вдругъ понесется всею массой въ долину, производя ужасное наводнение.

Выше было сказано, что отдёльные водопроводы Ферганы первоначально проведены съ незначительнымъ и равномърнымъ паденіемъ отъ 1/2000 до 1/2500, но они не идутъ въ прямомъ направленіи къ Сыръ-Дарьѣ, а развътвляются въ широко расходящіеся въерообразно, отдъльные арыки. При этомъ развътвленія одной системы часто переплетаются съ развътвленіями сосъдней. Такъ какъ ръка выходитъ изъ горныхъ ущелій на очень различной высотъ, то паденіе представляєть скачки, или стремнины. Для компенсаціи этихъ стремнинъ, а равно для правильнаго распредъленія количествъ воды по ары-

камъ, устроены самыя примитивныя плотины, такъ какъ шлюзовъ здъсь совершенно не знаютъ. Пока вода въ ръкъ, изъ которой отведены главные арыки, стоитъ на обыкновенномъ уровнъ, или прибываетъ постепенно, тогда эти плотины могутъ сослужить службу; но коль скоро вода хлынетъ съ горъ въ громадномъ количествъ, тогда эту плотину срываетъ и она направляется кратчайшимъ путемъ по главному руслу, затопляя окрестности, словомъ происходитъ наводненіе.

Силь

Но никакое несчастіе не можеть сравниться съ тъмъ наводненіемъ, которое туземцы именують силемъ и какому они подвергаются почти ежегодно, то въ томъ, то въ другомъ мъстъ. 14 лътъ прошло со времени занятія Русскими Ферганы, а она уже пережила цълый рядъ опустошительныхъ силевыхъ наводненій.

Въ теченіе весны и льта, во время сильнаго и продолжительнаго ливня въ горахъ, вся дождевая вода по склонамъ горъ собирается въ одно мѣсто и горные потоки превращаются въ громадныя, ревущія рѣки. Масса воды стѣной несется съ такою стремительностью, что нельзя ускакать отъ нея на быстромъ конѣ. Это громадное скопленіе воды стремится съ неимовѣрною быстротою, сначала по ущелью, а потомъ переходитъ въ долину, разрушая все встрѣчаемое на пути. Мосты, плотины, срываются мгновенно; дома и стѣны подмываются и разваливаются; деревья выворачиваются съ корнями, посѣвы смываются, скотъ погибаетъ—словомъ жители повергаются въ бѣдствіе, а нерѣдко и сами погибаютъ среди всеобщаго разрушенія, если только эта катастрофа застигнетъ ихъ врасплохъ.

Больше всего страдають отъ силя, мъста лежащія

передъ выходомъ раки изъ горныхъ разсвлинъ, но бываютъ наводненія и въ болте отдаленныхъ мъстахъ. Въ 1882 году 20 мая, силевая вода достигла Новаго Маргелана и въ теченіе нъсколькихъ часовъ, все пространство имъ занимаемое, покрылось водою, не смотря на то, что отстоить отъ горъ въ 25 верстахъ. Бывшій Чустскій увздь, чаще всего подвергается опустошенію со стороны силя. Если путника въ дорогъ застигнетъ силь, то будеть ли онъ верхомъ, пъшкомъ, или въ экипажъ, неминуемо погибнетъ, если только не будетъ имъть возможности подняться во время на гору, до того предъла, куда вода не достигаетъ. Кто ни разу не видълъ силя, этой громадной водяной массы, стремящейся съ неистовствомъ по ущелью, захватывающей и уничтожающей все преграждаемое ей путь, тотъ не можетъ себъ представить этой величественной, потрясающей и всесокрушающей картины, передъ которой человъкъ становится жалкимъ и безсильнымъ существомъ. Гдъ за часъ были роскошные сады, цвътущія поля и кипъла жизнь во всъхъ ея проявленіяхъ, тамъ послѣ силяостались одни слъды разрушенія.

Человъкъ безсиленъ передъ совершившимся фактомъ, но если заблаговременно принимать мъры, то возможно было бы предотвратить эти поистинъ народныя бъдствія. Конечно, для этого потребуются большія затраты труда и денегъ; но всё-таки подобныя предпріятія могутъ быть осуществимы. Необходимо ущелья засаживать деревьями, а не уничтожать ихъ, какъ это велось и ведется до сего времени. Прежде, когда ущелья въ горахъ покрывались густымъ лъсомъ, сили были ръже и нестоль опустошительны. Лъса въ извъстной степени задерживаютъ стремительность потоковъ и препятствуютъ скопленію въ

одномъ мъсть большой массы воды, противъ которой мы уже не въ состояніи ставить преграду. Въ тъхъ мъстахъ, гдъ вода стекаетъ съ покатостей горъ въ ущелье, нужно устраивать террасы, рыть каналы, пруды, чтобы скопляющуюся воду распредёлять по разнымь направленіямъ и этимъ противодъйствовать скопленію ея въ одномъ мъстъ. Въ 1889 г. положено начало этому предпріятію, хотя пока и въ миніатюръ. За Вуадилемъ, около Объ-ханы, въ ущеліи по склону горы, устраиваются горизонтальныя уступы или террасы, которыя этажами возвышаются другь надъ другомъ; терраса эта дълается нъсколько покатою, при чемъ покатость обращена къ горъ, а потому представляетъ собою какъ бы жолобъ, или канаву въ которой задерживается стекающая по откосу горы, дождевая вода. По краю этихъ террасъ разсаживаются деревья.

Продолжение начатыхъ работъ будетъ зависъть отъ денежныхъ средствъ, которыми въ состояніи будеть располагать Военный Губернаторъ. Само собою разумъется, что подобныя работы въ одномъ только ущеліи, мало принесутъ пользы всей странъ; для этого необходимо начать и въ прочихъ ущельяхъ. Облъсение горныхъ ущелій, по которымъ пробъгають силевые потоки, повліяеть въ будущемь на благосостояніе края, такъ какъ этимъ не только предотвратятся народныя бъдствія, вызываемыя силями, но еще можно будетъ экономизировать значительную часть метеорныхъ осадковъ въ горахъ и доставить эту экономію въ долину, въ видъ лишней воды, годной для орошенія. На подобное грандіозное предпріятіе не слідуеть жаліть издержекь, хотябы это стоило милліоновъ; потому, что эти затраты вознаградятся сторицею.

Слёдуеть также возводить плотины болье усовершенствованныя, а не первобытнаго типа, которыхъ вслёдствіе громоздкости, нётъ никакой возможности удалить съ требуемою быстротою. Подобными цёлесообразными сооруженіями и мёропріятіями, возможно было бы предотвратить разрушительное дёйствіе силевой воды и утилизировать ее въ пользу человёчества, направивъ для

орошенія полей.

Наводненія даже незначительныя, если и не произведуть столь жестокихь опустошеній, то во всякомъ случав оказывають несомнінное вліяніе на развитіе маляріи въ здішней странь. При правильномъ распреділеніи воды по полямъ и садамъ, болотная міазма, если и развивается, то въ весьма умітренномъ количествів. Пашни, за исключеніемъ рисовыхъ полей, меньше всего дають болотной міазмы, потому что недолго стоять подъводою, которая при томъ и не застаивается; каждый хозяинъ, когда дойдеть до него очередь пользоваться водою, можеть напускать ее только въ теченіе дня, или ночи. Хотя онъ и постарается затопить свое поле какъ можно больше, но вода на другой день, много на третій, вбирается вся въ землю и не плодить міазмы.

Во время наводненія, мъстность затопляєтся на большомъ протяженіи, вода въ низменныхъ мъстахъ застанвается, почва заболачивается, а подсыхающія болота возобновляются. Кромъ того, во время этихъ наводненій много уничтожается растеній, которыя увлекаются общимъ теченіемъ, задерживаются гдѣ нибудь на пути и доставляютъ матеріалъ для гніенія; вельдствіе этого и развивается болотная міазма, порождающая наши лихорадки.

Не смотря на такое повидимому обилье воды, все-

таки въ ней ощущается большой недостатокъ, въ особенности при маловодіи, вслёдствіе неумёлаго регулированія ее въ оросительныхъ каналахъ и нецелесообразнаго распредвленія между земледвльцами. Съ увеличеніемъ народонаселенія, этотъ недостатокъ отразится крайне печально, за невозможностью прокормить большую массу людей, гдв безъ искусственнаго орошенія ничего не родится. Правда, въ предгорьяхъ и гористыхъ мъстностяхъ, гдъ часто перепадаютъ дожди, туземцы засвивають небольшіе участки, безъ искусственнаго орошенія, а при содъйствіи влаги изъ земли и дождей. Подобныя поля здёсь называются багарныя. Замёчательно, что туземцы знають какую то примъту, по которой предвидять сырую, или сухую весну и этимъ руководствуются при багарныхъ посъвахъ. Когда предвидится сырая весна, то они стютъ побольше, въ противномъ случав вовсе не свють. Какъ бы то ни было, но подобныя запашки весьма ничтожны и служать лишь жалкимъ подспорьемъ въ пропитаніи милліоннаго населенія. Между тімь, громадная масса воды идеть зря. Бурный Нарынъ, со стремительнымъ паденіемъ, а слъдовательно пригодный для дальнъйшаго отведенія воды, все еще несется къ Сыръ-Дарьъ, почти всею своею массою, такъ какъ количество воды отведенное Янгиарыкомъ и другими маленькими, - сравнительно ничтожное.

Тоже должно сказать и о менте водной, но всё-таки значительной Кара-Дарьт, которая, отдавъ извъстное количество воды Шариханъ-саю и Андижанъ-саю, все еще содержить громадное количество ея, идущей на встртчу Нарыну. Воды этихъ рткъ должны быть уловлены, далеко выше сліянія ихъ въ одну ртку Сыръ-Дарью, которая нынт не служить ни для рыболовства, ни для судоходства, и затъмъ отвести далеко посредствомъ каналовъ большей величины, сравнительно съ существующими. Тогда воды будетъ достаточно, а плодородныя полосы Ферганы значительно увеличатся. Даже вода Сыръ-Дарьи, оставшаяся за распредъленіемъ по арыкамъ, могла бы утилизироваться, если бы къ этому приложить стараніе и изобрътенія извъстныя въ образованныхъ странахъ.

Въ теченіе десятильтняго управленія нами краемъ, ирригація находилась въ самомъ примитивномъ состояніи и мы предоставили исключительно туземцамъ въдать всею водою Ферганы и пользоваться ею по обычаю. Наука, съ примъненіемъ теоретическихъ положеній гидродинамики, гидростатики и гидрометріи, не коснулась этого важивищаго и могущественивищаго фактора, отъ котораго зависить все благосостояние народонаселения. Между тымь туземцы будучи незнакомы съ законами гидравлики и строительнымъ искусствомъ, не въ состояніи утилизировать то громадное количество воды, которое у нихъ пропадаетъ даромъ и уносится Сыръ-Дарьей. Первобытный способъ проведенія арыковъ не можеть извлекать воды изъ этой реки, такъ какъ она должна подниматься вверхъ. Въ этомъ случав рутинв должна прійти на помощь раціональная организація орошенія. Необходимо ввести вропейскіе образцовые насосы, водоподъемныя машины и тому подобныя сооруженія. Шлюзы должны пріобрѣсти тоже громадное значеніе, вследствіе того, что они дозволять точное регулированіе высоты стоянія воды. Туземцы сами понимаютъ необходимость водоподъемныхъ машинъ и устраиваютъ кое гдв чигири; но они слишкомъ недостаточны для поднятія такой массы воды, какая требуется для

орошенія цілой пустынной містности. Здісь требуются болье грандіозныя сооруженія, которыя доступны только людямъ со спеціальными знаніями. Поэтому туземцы давно обращають свой взоръ на насъ, съ нетерпъніемъ ждуть отъ насъ научнаго почина въ этомъ діль, а мы до послъдняго времени, не сдълали еще ничего, что подняло-бы нашъ престижъвъглазахъ этого народа.

Съ 1885 г. учреждена въ Ферганъ должность областнаго ирригатора и его помощника; но этого персонала слишкомъ недостаточно, для удовлетворенія всёмъ требованіямъ современной ирригаціи. Кромъ того, необходимы громадныя затраты, чтобы поставить ирригацію въ Ферганъ на ту высоту, на какой она находится въ Ломбардіи, Китав, Индіи и на какой она находилась въ древности, следы которой видиенотся во многихъ местахъ Средней Азіи.

Второстепенныя занятія, по части распредъленія и снабженія водой, можно оставить въ рукахъ тъхъ-же Мирабъ-башей, какъ людей опытныхъ въ этомъ дълъ.

Физическія, химическія и гигіэническія

Говорить о физическихъ и химическихъ свойствахъ воды въ Ферганской области, можно только для каждой свойства во- м'встности въ отдельности и то лишь въ данное время, такъ какъ онъ мъняются даже въ теченіе дня. Безусловно самая чистая вода въ горахъ, послъ того какъ она пробилась изъ ледника и не успъла еще загрязниться. Ложе въ тъхъ мъстахъ каменистое, глубокое, а потому вода на видъ, безцвътная, прозрачная, холодная, вкусная и безъ запаха.

На температуру воды, въ разныхъ мъстахъ области, мало было обращено вниманія со стороны путещественниковъ, такъ что точныхъ цифровыхъ данныхъ, неоткуда и заимствовать. Во время своихъ поъздокъ я вездѣ, гдѣ только имѣлъ случай, измѣрялъ температуру воды и могу одно только сказать, что во всѣхъ горпыхъ рѣкахъ, протекающихъ въ Ферганской долинѣ, вода и среди лѣта очень холодная и что она повидимому холоднѣе въ рѣкахъ берущихъ начало въ Алайскомъ хребтѣ, нежели въ тѣхъ, которыя вытекаютъ изъ Чаткальскаго и Ферганскаго хребта. Причина этому понятна, такъ какъ большинство рѣкъ первой категоріи вытекаютъ изъ болѣе возвышенныхъ мѣстъ и притомъ питаются глетчерами, а вслѣдствіе той быстроты, съ какой онѣ несутся въ долину, вода не успѣваетъ нагрѣваться. Въ мелкихъ арыкахъ, хаузахъ, кунальняхъ—температура воды зависить отъ теплоты атмосфернаго воздуха; поэтому лѣтомъ бываетъ очень теплая, а зимой холодная.

Привожу нѣсколько измѣреній температуры воды, въ самое теплое время года, замѣченныхъ мною во время горныхъ поѣздокъ. Въ рѣкѣ Гульчѣ 4-го іюля, температура воды + 100 С. температура воздуха въ часъ дня, въ тѣни 26, 60 С. Высота н. у. м. 5140 футовъ.

Въ г. Ошъ, въ р. Акъ-буръ, 9 іюля т-ра воды 12⁰ С. воздуха въ тъни, въ 3 часа дня, 29⁰ С. Высота н. у. м.

3330 футовъ.

На урочищѣ Курганъ-ташъ въ Кугартскихъ горахъ, на высотъ около 6000 фут. н. у. м. температура воды въ ръчкъ 8-го іюля=110 С.—въ воздухъ 190 С.

Въ р. Кшемышъ (одинъ изъ истоковъ Исфары) въ 5-ти верстахъ по выходъ изъ ледниковъ, 6 іюля 1883 года, въ 3 часа дня, температура воды=70 С.—въ воздухъ, въ тъни 190 С. Высота н. у. м. около 10000 фут.

Въ этой-же рѣкѣ, у самаго выхода изъ ледника, 6 іюля въ 12 часовъ дня, при температурѣ воздуха 120 С. въ тѣни, вода казалась на ощущеніе рукой, не-

болье 30 С., но измърить термометромъ не было возможности, такъ какъ порывистой струей его разбило.

Въ р. Исфаръ, въ кишлакъ того-же имени, 2-го іюля 1883 года, въ часъ дня, въ тъпи температура воздуха 30° С., воды 12° С.

Въ р. Шахимарданъ-сай, на урочищъ Лянгаръ, 24 іюля 1883 г., температура воды 11° С., воздуха днемъ въ тъни 27° С.

Въ р. Падша-ата, съвернъе кишлака Наная, температура воды лътомъ не бываетъ выше 14^{0} С. 5-го апръля она была 10^{0} С., а выше въ горахъ только 5^{0} С.

Въ Н. Маргеланъ въ р. Маргеланъ-сай, въ самое жаркое время не бываетъ больше 180 С., въ сентябръ около 120, въ октябръ 50 С., въ концъ ноября 30 С.

Относительно температуры воды минеральныхъ источниковъ, будетъ сказано при ихъ описаніи.

Химическій составъ воды быль изслѣдованъ подробно въ г. г. Н. Маргеланѣ и Кокандѣ, а также нѣкоторыхъ минеральныхъ источниковъ, о которыхъ будетъ сказано ниже.

Вода Сыръ-Дарьи бываетъ всегда почти мутной; но послъ отстаиванія она дълается прозрачной, безцвътной, безъ запаха и нейтральной реакціи. Для химическаго анализа, произведеннаго въ Деритъ (¹), вода была взята внъ области.

10,000 частей Сыръ-Дарьинской воды (исключая осадокъ) содержитъ:

Сърной	кислоты			Hein	Sec. de	1,0255.
Хлора .	1				Water S	0,2255.
Углекис	лоты	m. nu	AN IEMAN		21110	1,5538.

⁽¹⁾ А. ф. Миддендорфъ.

	Кремневой	кислоты		10.	•	0,4500.
	Кислорода	(въ стрно	к. и	дву-у	гле-	
	кислы	хъ соляхъ)				0,7524.
	Калія .		***			0,2081.
	Натрія.					0,2589.
	Кальція					0,6545.
	Магнія.					0,2164.
	Сумма без	плодн. сост	г. ча	стей		5,3451.
	Воды .					9994,6549.
					-	10000,0000.
		Груг	пир	овка:		
	Офина пра	TOTIO MOTER				0.5494
	Сфрно-кисл				H	0,5484.
	Сфрио-кисл				10.00	0,9778.
	Сфрно-кисл		1.			0,6179.
	Хлористаго		•	•		0,3527.
	Двууглеки					1,2441.
	Двууглекис		31И		•	1,1542.
	Кремневой		•	***	•	0,4500.
	Сумма безі	водныхъ со	элей	700		5,3451.
	Воды .	•	•		•	9994,6549.
						10000,0000.
При	кипяченіи	и выпари	вані	и 10.	000	частей Сыръ-
		кой воды,				
	Сърно-кисл	аго кали	H-FIFT			. 0,5484.
	Сърно-кисл	аго натра				. 0,9778.
	Сърно-кисл	ой магнезі	и			. 0,5452.
	Хлористаго	магнія				. 0,3018.
	Сумма безв		лей	маточ	наго	
	разсод		•	•	•	, 2,3732,

Осъдаютъ (котельный камень):

	O ODAGIOTE (NOTONIDI		, and a		
	Углекислой извести .		•	•	1,6363.
	Угле-кислой магнезіи .		•	•	0,1088.
	Кремневой кислоты .				0,4500.
	Котельнаго камня .		1 300		2,1951.
Въ	100 ч. осадка высушеннаго	при	120)	содержится:
Эндикатовъ (глина и песокъ).	Углекислой извести.	•	. 10		15,503.
	Углекислой магнезіи			•	8,849.
	Кали	•			1,806.
	Натра				0,918.
	Окиси желъза				2,924.
	Глинозема				5,308.
	SiO ₂ и нерастворимаго	въ с	оленоі	à	кислотъ
	силикатовъ .				57,580.
Сп	$1_{\mathrm{H}_2\mathrm{O}}$. Usin	B. IE.		7,112.

Собираясь въ 1883 году на ледники къ истокамъ Исфары, меня интересовало узнать, хотя приблизительный составъ воды, въ томъ состояніи, въ какомъ она получается непосредственно изъ рукъ природы. Для этого я взяль съ собою необходимые реактивы, чтобы произвести на мѣстѣ, хотя качественный анализъ, такъ какъ о количественномъ не могло быть и рѣчи. Но этому предполагаемому анализу не суждено было осуществиться. Вслѣдствіе паденія вьючной лошади, ящикъ со всѣми реактивами разбился и уцѣлѣли только маленькая колбочка и хлористое золото. Я воспользовался и этимъ, чтобы опредѣлить примѣсь органическихъ веществъ. При киняченіи воды, взятой вблизи ледника, съ нѣсколькими каплями раствора хлористаго золота,

не получилось окрашиванія, тогда какъ въ р. Исфарѣ, въ водѣ зачерпнутой въ кишлакѣ того-же имени, при той же манипуляціи, получилась вода дымчатаго цвѣта. Слѣдовательно вода, у своего истока, не содержала легкоокисляющихся и летучихъ органическихъ веществъ, тогда какъ пройдя дальше, по предгорьямъ, отдавая и принимая оросительные арыки, уже успѣла насытиться, этими веществами. Въ верховьяхъ рѣки, падаютъ въ воду листъя, и прочіе органическіе остатки, но они по всей вѣроятности, вслѣдствіе весьма низкой температуры воды, не подвергаются гніенію, а уносятся въ долину и тамъ уже, при благопріятныхъ для этого условіяхъ, идетъ дальнѣйшій процессъ разложенія.

По причинъ невозможности производства изслъдованія воды на мість, я взяль съ собою бутылку этой воды, закупоривъ и запечатавъ ее, чтобы по прибытіи въ Маргеланъ заняться этимъ анализомъ, но и тутъ постигла неудача, --бутылка на возвратномъ пути пропала. Въроятно сопровождавшіе насъ киргизы, предполагая, что содержимое бутылки болъе цънное нежели простая вода, утащили ее, а откупоривъ и попробовавъ, бросили; это было весьма досадно, такъ какъ я совершенно не знаю, да кажется и не было сдъляно ни одного химическаго анализа воды рѣчекъ, протекающихъ по высямъ Ферганской области. Я упомянулъ объ этомъ эпизодъ съ цълью показать, что не такъ легко, въ подобныхъ мъстностяхъ, произвести какое либо изслъдованіе, или наблюденіе, при которомъ нужны инструменты, реактивы и т. п. Въ силу этого, нельзя порицать Ферганскихъ врачей, не сдълавшихъ никакихъ изслъдованій въ этомъ направленіи. Эти путешествія по горнымъ тропамъ настолько затруднительны, что не возможно предвидъть и предотвратить различныхъ случайностей.

Степень и характеръ минерализаціи воды, употребляемой человіжомь, играєть важную роль въ его здоровьи, но Фергана ожидаєть еще діятелей, которые изучили-бы и показали зависимость той, или другой болізни, отъ извістнаго качества воды. Подобное изученіе могло-бы пролить світь, на многія изъ здішнихъ эндемическихъ болізней, світанныхъ съ извістною мінетностью, а слідовательно и со свойствами употребляемой воды, какъ напримітрь зобъ, который главнымъ образомъ гнівздится въ Кокандів.

Въ происхожденіи лишь одной бользни, не подлежить сомненію, что вода играєть самую видную роль,это въ лихорадкахъ, составляющихъ главную патологію здъшней страны. Поборники различныхъ діаметрально противоположныхъ теорій, не могли отказать этой стихіи въ участіи при развитіи маляріи. Еще Гипократь замѣтилъ, что пьющіе стоячую воду, въ лихорадочной мъстности, получаютъ завалъ селезенки; а Галенъ утверждаль, что глотокъ зараженной воды можетъ вызвать общую бользнь. Опредъленные на этотъ счетъ выражается Разесъ, который прямо гнилой водъ приписываль происхождение лихорадки. Наблюдения на Кавказъ (1) и у насъ, совершенно подтверждаютъ это, доказывая, что вода не только служить образованію міазмы, но и содержить ее въ растворъ. Хотя существенный характеръ малярійной міазмы, до последняго времени, былъ неизвъстенъ, но тъмъ не менъе предполагалось, что она состоить, по существу своему, изъ рас-

⁽⁴⁾ Н. Тороповъ и друг.

тительнаго зародыша. Теперь это предположение оправдывается, такъ какъ Клебсъ и Томмаси-Круделли описали особенную палочку, которая находится въ воздухъ малярійныхъ мѣстностей. Хотя происхожденіе этой бациллы еще не выяснено, но можно съ достовърностью допустить, что она образуется вследствіе разложенія органическихъ веществъ, застоявшихся во влажной средв, т. е. при такихъ условіяхъ, которыя во всей силв бывають даны въ тъхъ теллурическихъ слояхъ, которые мы называемъ болотами. Быть можетъ этотъ микробъ, образуется при какихъ либо иныхъ условіяхъ; но попадая въ болотистую мѣстность, находить въ ней благопріятныя условія для своего размноженія. Я вывожу подобное заключение, на основании тъхъ данныхъ, которыя имълись въ наукъ, относительно происхожденія и распространенія малярійной міазмы еще въ то время, когда о бактеріяхъ вообще, мы имьли весьма смутныя понятія.

Покрытая наводненіемъ почва, послѣ удаленія воды, составляєть временное болото, такой-же опасной силы, какъ и естественныя. Искусственное орошеніе, практикуемое по всей Ферганской долинѣ, въ извѣстныхъ случаяхъ способствуеть къ заболачиванію почвы; поэтому я постараюсь вкратцѣ сдѣлать оцѣнку гидрографическихъ условій нашего края, начертанныхъ на предыдущихъ страницахъ и указать отношенія ихъ къ развитію и распространенію лихорадокъ.

Перечисленіе и подробное описаніе всёхъ арычныхъ системь въ области представляетъ только техническій интересъ; для насъ въ гигіэническомъ отношеніи важно знать лишь то, что всякій клочекъ культированной земли въ долинѣ, будетъ-ли это садъ, огородъ, или

поле,—покрытъ густою сѣтью мелкихъ арыковъ, отведенныхъ отъ главныхъ, или прямо изъ горной рѣки. Города и селенія точно также расположены на искусственно-орошаемой почвъ. Отъ подобнаго орошенія и свойства почвы, зависитъ развитіе болотной міазмы.

Множество рѣчекъ, ниспадающихъ съ горъ въ долину, даютъ жителямъ возможность обильнаго и постояннаго орошенія ихъ садовъ и поствовъ, что и составляеть главную причину, какь той изумительной растительности, дающей извъстность Ферганъ, такъ и той маляріи, отравляющей существованіе въ этомъ прелестномъ уголкъ Средней Азіи. Вода въ горныхъ рѣчкахъ у своихъ истоковъ, какъ уже сказано, является: чистой, прозрачной, и не содержащей органическихъ веществъ. Чъмъ дальше эта вода направляется съ горъ, тъмъ больше въ ней появляется взвъщенныхъ веществъ и солей въ растворъ, въ особенности, если поднимается ее уровень, такъ какъ при этомъ она, съ одной стороны захватываетъ частицы разложившихся горныхъ породъ, а съ другой, выщелачиваетъ изъ почвы различныя соли. Послъ сильныхъ дождей въ горахъ, вода этихъ ръчекъ идетъ мутная, иногда совершенно красная, или черная. Если подобная вода отстоится, то дълается програчной, но при этомъ образуется обильный осадокъ. Въ тъхъ предвлахъ, гдъ уже есть кое-какая растительность, каждый дождь сносить внизь: опавшую листву, отжившія растенія, умершихъ насъкомыхъ и все это, попадая въ ръку, уносится ею въ долину. Вода изъ этихъ ръчекъ распредъляется по арыкамъ, для орошенія посъвовъ и она кром'в выщелачиванія изъ почвы разныхъ солей, еще больше насыщается органическими веществами, которыя увеличиваются пропорціонально пройденному пространству.

Каждая ръка, съ своими развътвленіями, для своего бассейна, служить тымь же чымь водосточная труба для крыши. Всв органические остатки, гниль, падаль, мусоръ, нечистоты-попадають въ ръку, а она своимъ теченіемъ разносить по всей орошаемой мъстнести, и слагаетъ тамъ для гніенія. Если-бы еще туземцы относились, къ поддержанію чистоты воды, съ должнымъ вниманіемъ, тогда она загрязнялась-бы не въ такой степени, въ какой мы видимъ въ настоящее время. Все въдь негодное сбрасывается въ арыкъ; навозъ, всякіе отбросы и нечисть, — идутъ туда-же. Химическій апализъ воды въ Кокандскихъ арыкахъ, который будетъ приведенъ при описаніи этого города, наглядно показываетъ какое громадное количество органическихъ веществъ содержится въ водъ, которыя отлагаются въ почвъ, гніють, образуя болотную міазму, часть которой проникаетъ въ атмосферный воздухъ, а остальная циркулируеть съ водою и разносится по всей орошаемой мъстности.

Соблюдение очереди въ распредълении воды, при чемъ арыки бываютъ поперемънно, то наполненными водою, то сухими, способствуетъ быстрому гніенію органическихъ веществъ, отложившихся по берегамъ и дну арыковъ. Извъстно, что при подобныхъ обстоятельствахъ, въ жаркое время, разложеніе происходитъ весьма быстро. Наполнившіеся вновь арыки, во время очереди, насыщаются образовавшейся міазмою, которая разносится по всему пространству.

Отработавшая вода, спущенная въ какую либо низменную часть, рисовыя поля, болота расбросанныя по всей долинъ и озера поросшія камышемъ и разными водорослями, представляють собою настоящіе очаги ма-

ляріи въ Ферганской области. Озеро Дамъ-куль, остатокъ существовавшаго здѣсь моря, даже въ историческое время было значительно большихъ размѣровъ, нежели въ настоящее время. Этому озеру предстоитъ будущность торфянаго болота, но оно и теперь служитъ главнымъ малярійнымъ очагомъ. Поверхность его покрывается водорослями и представляется лѣтомъ зеленою равниной. Эта зеленая пелена къ зимѣ опускается на дно, а на слѣдующій годъ замѣняется новою.

Берега представляють, непроходимыя топи, заросшія осокой и камышемъ. Хотя береговая растительность весьма однообразная, но за то развита до нельзя. Въ тоже время подъ берегомъ кишатъ миріады инфузорій, падъ водой комары и другія крылатыя насѣкомыя, а на берегу лягушки. Все это размножается и умираетъ, а все отжившее, падая въ воду, при здѣшней высокой температурѣ лѣта, разлагается съ величайшею быстротою. Понятно, сколько здѣсь развивается болотной міазмы.

Прочія озера въ долинѣ такого-же характера, только они меньшихъ размѣровъ. Между озерами и болотами Ферганской долины не представляется большей разницы. Собственно, такъ называемыя болота говоритъ Реклю (¹)—это мелководныя озера, стоячія, или едва движущіяся, воды которыхъ поросли, по крайней мѣрѣ, въ умѣренномъ поясѣ, тростникомъ, или камышемъ, и которыя нерѣдко окаймлены по берегамъ деревьями, любящими напитанную водою почву. Впрочемъ, во всякомъ поясѣ невозможно установить сколько нибудь опредъленной границы между озерами и болотами, такъ какъ уровень этихъ водныхъ поверхностей измѣняется по

⁽¹⁾ Земля т. I стр. 335-336.

временамъ года и по годамъ, и при томъ большая часть озеръ, особенно на равнинахъ, оканчивается мелководными бухтами, которыя, въ сущности ничѣмъ не отличаются отъ болотъ. Вообще озера и болота составляютъ лишь различныя, одна въ другую переходящія степени развитія одного и того-же явленія, именно болѣе, или менѣе обширныя пространства суши, покрытыя стоячей водой (2). Озера, постоянно уменьшаясь въ объемѣ, превращаются наконецъ въ болота; наоборотъ болота, въ тропическомъ поясѣ, ежегодно, вслѣдствіе обильныхъ дождей, дѣлаются огромными озерами, на довольно продолжительное время.

Вода этихъ озеръ, точно также какъ и болотная, заражена міазмою и употребленіе её для питья въ сыромъ видъ, производить неминуемо лихорадки и поносы. Она при этомъ пахнетъ болотомъ, такъ что ее употребляють лишь въ крайнихъ случаяхъ, за невозможностью достать лучшую. Особымъ коварствомъ отличается вода спущенная съ рисовыхъ полей. Она прозрачная и чистая на видъ, но въ такой сильной степени насыщена міазмой, что если человѣкъ по неопытности напьется, то навѣрное заболѣетъ лихорадкой, или поносомъ.

Вода въ хаузахъ (прудахъ) того-же свойства, что и болотная.

Подобные пруды являются какъ бы переходными формами между болотами и озерами. Если-бы вода каждый разъ спускалась и наполнялись свъжей, а отъ времени до времени пруды эти вычищались, тогда на чистоту ея еще возможно было-бы разсчитывать; хотя и то сомнительно,

^(°) Клёдень. Всеобщая географія т. І стр. 575.

потому что они наполняются водою изъ тѣхъ же арыковъ, въ которыхъ вода уже насытилась міазмою еще раньше.

Рытье колодцевъ тоже не спасаетъ отъ лихорадокъ. Нечистоты, находящіяся на поверхности почвы, просачиваются въ колодезную воду, тѣмъ болѣе, что они обыкновенно вырываются въ близкомъ сосѣдствѣ съ жилыми помѣщеніями. Просачивающаяся вода изъ почвы, будетъ поступать въ колодезь съ значительной площади и если окружающая почва постоянно будетъ насыщена органическими разложеніями, то и вода въ колодцѣ необходимо должна оказаться нечистой.

Если теперь, посят обзора гидрографіи Ферганы, бросимъ взглядъ на этіологію маляріи, оставивъ въ сторонъ всъ хитросплетенныя теоріи, о происхожденіи лихорадокъ, а будемъ руководствоваться только фактами добытыми чисто индуктивнымъ образомъ, то должны прійти къ положительному заключенію, что вода и способъ орошенія здішней долины играеть главную роль въ развитіи и распространеніи лихорадокъ, составляющихъ главную эндемію нашей страны. Мюнхенская школа въ лицъ своего представителя проф. Петтенкофера, совершенно не допускаетъ распространенія инфекціонныхъ бользней водой и зараженія черезъ воду, даже въ томъ случав, если пить воду, завъдомо содержащую бользнетворныхъ микробовъ (1). Въ тоже время изслъдованіями Коха, Ковальскаго, Видаля и др. доказано, что въ нъкоторыхъ случаяхъ питьевая вода можетъ содержать тв или другія бользнетворныя бактеріи, и что таковая вода можетъ служить передатчикомъ заразной

⁽¹⁾ Pettenkofer Archiv. f. Hygiene. 1887 r. crp. 336.

бользни. Что-же касается зависимости здѣшнихъ лихорадокъ и поносовъ отъ употребленія сырой воды, то въ этомъ отношеніи, для меня сомнѣнія—не существуєтъ, въ виду неоспоримыхъ фактовъ, встрѣчающихся на каждомъ шагу.

Много имъется примъровъ въ нашей литературъ, доказывающихъ несомнънное вліяніе воды на развитіе лихорадокъ и въ тоже время, приводится въ примъръ много путешественниковъ, по лихорадочной мъстности, предохранившихъ себя отъ этихъ заболъваній, единственно тъмъ, что употребляли воду только прокипяченную. Указывать и перечислять эти примъры считаю излишнимъ, такъ какъ они извъстны всякому врачу. Скажу только, что наши сосъди китайцы, никогда не пьютъ сырой воды. Туземцы въ Ферганъ большею частью избъгаютъ пить сырую воду и употребляютъ поэтому много чаю. Нъкоторые изъ русскихъ, которые слъдуютъ этому примъру, весьма ръдко подвергаются заболъванію лихорадками и поносами.

Хотя изъ опытовъ Геммера, Пастера, Пайэна и др. извъстно, что нъкоторыя бактеріи не погибаютъ при 1000 С., но опыты Міquel' я, выяснили большое значеніе продолжительности кипяченія. Кромѣ того, это отпосится до извъстнаго рода бактерій, а не до малярійной бациллы, о способности которой противостоять температурѣ кипѣнія воды, до сихъ поръ пѣтъ никакихъ указаній. Относительно гэмоплазмодій еще менѣе извъстно, такъ какъ внѣ организма, культировки этого паразита до сихъ поръ были неудачны.

Конечно, міазма проникаєть въ пашъ организмъ не только при посредств'в воды, но и черезъ воздухъ; тъмъ не менъе, ослабить возможность зараженія на половину,

а можеть быть и больше, -- является вопросомъ далеко немаловажнымъ.

Мое личное мивніе, основанное на наблюденіяхъ собранныхъ съ полною объективностью, состоить въ томъ, что при обыкновенномъ нашемъ образъ жизни, когда не нужно находиться среди болоть, рисовыхъ полей и тому подобныхъ малярійныхъ очаговъ, гдв атмосфера бываетъ насыщенной болотной міазмой, — зараженіе происходить исключительно посредствомъ воды циркулирующей возл'в нашихъ домовъ, такъ какъ она въ здішней мъстности, не бываеть никогда свободной отъ малярійнаго яда. Я повторю еще разъ, что искусственное орошеніе, доставившее возможность существованія милліонному населенію на безплодной пустынь, вмьсть съ этимъ породило и ту міазму, которая подтачиваетъ въ самомъ корнъ физическое и интеллектуальное здоровье населенія и войскъ здісь расположенныхъ. Въ особенности это отражается на русскихъ, не успъвшихъ акклиматизироваться подобно туземцамъ, которые въ теченіе многихъ въковъ проживали при этихъ неблагопріятныхъ условіяхъ. А потому для предохраненія себя въ здешней местности отъ лихорадокъ и поносовъ, или по крайней мъръ для возможнаго ослабленія вреднаго вліянія, обусловливающаго развитіе этихъ бользней, следуеть безусловно отказаться отъ употребленія воды въ сыромъ видъ.

Фильтрованіе воды, черезь: песокъ, порошокъ древеснаго, животнаго и каменнаго угля, азбесть въ различныхъ видахъ, вату и пр. не приноситъ пользы, такъ какъ изслъдованіями послъдняго времени, особенно проф. А. В. Пеля доказано, что всъ подобные фильтры не только не достигаютъ цъли, но даже иногда содъйству-

ють размноженію бактерій. Д-ромъ А. И. Вильчуромт, въ лабораторіи проф. М. И. Афанасьева доказано, что столь рекламируемые фильтры Меньяна задерживаютъ бактеріи изъ воды только въ самомъ началѣ ихъ употребленія, а затімь они не только бактерій не задерживають, а даже размножають ихъ. Я даже съ недовъріємъ отношусь къ здішней зельцерской воді, которая не всегда приготовляется изъ дистилированной или кипяченой воды; а между тъмъ еще не доказано, чтобы міазма не могла существовать въ водё съ подобной минерализаціей, какую представляеть собою эта общеупотребительная вода.

Заканчивая отдълъ по гидрографіи, нельзя не упо- способъ пемянуть о переправъ черезъ ръки, такъ какъ практикуемые здѣсь нѣкоторые способы переправы оказывають иногда неблагопріятное вліяніе на здоровье переправляющихся, а подчасъ даже сопряжены съ опасностью для жизни.

На Сыръ-Дарьъ нътъ ни одного моста; на Нарынъ всего два, а на Кара-Дарьв одинъ. На прочихъ горныхъ ръкахъ въ Ферганъ очень мало мостовъ, потому что они очень быстрыя, разливаются на большое пространство и неръдко мъняютъ свое главное русло; поэтому постройка мостовъ, на подобныхъ ръкахъ, обошлась-бы слишкомъ дорого и потребовалось-бы ихъ несмътное количество.

Переправа, черезъ большинство здёшнихъ рекъ, происходить въ бродъ, для чего избираются мъста менъе глубокія и не очень быстрыя. Туземцы, живущіе возл'в р'вкъ, черезъ которыя нужно переправляться, весьма точно изучають дно ръки и всъ на немъ углубленія

реправы.

и ямы, хотя они мѣняются чуть-ли не каждый день. Туземцы съ удивительною ловкостью лавируютъ верхомъ,
среди волнъ быстро несущейся рѣки и выбираютъ мѣста менѣе глубокія, а за ними какъ за лоцманами, слѣдуютъ переправляющіеся. Въ больщинствѣ случаевъ, въ
горныхъ рѣкахъ, самая меньшая вода бываетъ на разсвѣтѣ, а потому и пользуются этимъ временемъ для того, чтобы избъгнуть переправы въ то время дня, когда
лошадь уже не въ состояніи перейти въ бродъ, а долж-

на пуститься вплавь.

При переправъ верхомъ, у непривычныхъ, отъ быстро несущихся волнъ-дълается головокруженіе; а потому въ долинъ, при переправахъ употребляются арбы, на большихъ саженныхъ колесахъ, въ которую запрягается одна, или три лошади, смотря по надобности. Арбакешъ сидящій верхомъ на упряжной лошади, искусно лавируеть за вдущимъ впереди провожатымъ, указывающимъ болъе удобныя мъста для переправы. Если ръка широка, быстра и глубока, то переправа становится подчасъ весьма опасною. Требуется большое вниманіе, умѣніе и присутствіе духа какъ со стороны проводниковъ, такъ и арбакеша, управляющаго упряжною лошадью. Вся суть въ томъ, чтобы давать арбъ такое направленіе относительно волнъ, которыя не могли бы ея ни опрокинуть, ни унести теченіемь, такъ какъ въ подобныхъ случаяхъ, лошадь уже не въ состояни будетъ удержаться, а потерявъ точку опоры, -- отдается роковому теченію и все погибнеть. Лошадь, не имъющая сноровки въ этого рода переправахъ, совершенно не годится для подобной цёли. Для этой надобности перевозчики держутъ весьма сильныхъ, опытныхъ и пріученныхъ лошадей.

Пока вода не достигла полотна арбы, т. е. настилки, арба не опрокинется; но коль скоро погрузилась въ воду и настилка, тогда становится опасно, потому что при подобной глубинъ лошадь вынуждена бываетъ плыть, вслъдствіе чего у нея нътъ точки опоры. Кромъ того, при такой глубинъ и арба не имъетъ уже той устойчивости. Если при этомъ одно колесо попадетъ на камень, или хотя въ небольшую яму, то арба неизбъжно опрокинется на бокъ и тогда дъло дрянь. Каковъ бы ни былъ искусный пловецъ, но бороться съ волнами, мчащимися со скоростью до 20 футовъ въ секунду, дъло непосильное, тъмъ болье, что на каждомъ шагу можно разбиться о подводный камень.

Во время половодья, ежегодно погибаетъ нѣсколько туземцевъ, какъ по своей небрежности, такъ и по равнодушію къ опасности. На глазахъ у него опрокинулась арба и погибли всѣ, а онъ какъ будто это его нисколько не касается, претъ себѣ за ними тѣмъ же слѣдомъ и дѣлу конецъ.

Когда переправляется кто нибуль изъ лицъ высокопоставленныхъ, или богатыхъ, тогда переправа обставляется со всевозможными предосторожностями. Путь передъ этимъ тщательно изслъдуется, по разнымъ направленіямъ, опытными перевозчиками, такъ что у нихъ на чеку всякій камень, всякая неровность дна.

Во время переправы, арба, на которой помѣщается проѣзжающій, окружена конными джигитами, которые при этомъ арканами придерживаютъ арбу, вслѣдствіе чего она не можетъ никоимъ образомъ опрокинуться. Впереди ѣдутъ провожатые, которые вмѣстѣ съ тѣмътѣлохранители, такъ какъ при малѣйщей опасности, под-

хватить и не дадуть утонуть. Мало того, при переправъ такихъ особъ верхомъ, такъ какъ въ горахъ арбъ не существуетъ, человъкъ отъ 50—100 джигитовъ верхами, становится сомкнутою цънью, противъ теченія воды и подобнымъ образомъ, на нъкоторое время, они могутъ сдерживать въ этомъ мъстъ сильный напоръ ее, такъ что переправляющійся ниже этой цъпи, не испытываетъ бурнаго теченія волнъ, при чемъ переправа становится болье удобной и безонасной. Эта живая плотина передвигается, шагъ за шагомъ, вмъстъ съ переправляющимся, пока онъ не выъдетъ на мъсто, въ которомъ вода течетъ медленно.

Въ горахъ исключительно переправляются верхомъ на лошади, такъ какъ тамъ арбъ нѣтъ. Иѣшкомъ человѣкъ не въ состояніи перейти черезъ рѣку въ бродъ, по причинѣ быстроты теченія, которое его опрокинетъ и снесеть. Верблюдъ очень сильный и легко противостоитъ теченію, но ему иногда приходитъ фантазія лечь на срединѣ рѣки и тогда сѣдоку, волей неволей, приходится выкупаться, хотя по времени года, онъ вовсе этого и не желалъ-бы. Ослы малы ростомъ, а потому не годятся для переправы.

Оригинальный способъ переправы практикуется туземцами, черезъ глубокія и широкія рѣки, но въ которыхъ теченіе умѣренное. Я не разъ любовался на подобный способъ переправы черезъ Сыръ-Дарью. Подъѣзжаетъ сартъ къ рѣкѣ на арбѣ, становится на послѣднюю и въѣзжаетъ въ воду. Лошадь, пока не глубоко, везетъ арбу, а тамъ пускается вплавь съ арбой и сѣдокомъ, стоящимъ по поясъ въ водѣ, до другаго берега. Конечно она не въ силахъ переплыть по прямому направленію; по срединѣ рѣки ихъ подхватываетъ

быстрымъ теченіемъ, сносить на довольно далекое разстояніе, лошадь хранитъ, выбивается изъ силъ, но всетаки преодолѣваетъ препятствіе и причаливаетъ благополучно къ берегу. Послѣ этого сартъ продолжаетъ бевостановочно свое путешествіе. Въ другихъ случаяхъ сѣдокъ не остается на арбѣ, а плыветъ держась обѣими руками за ее заднюю часть. При послѣднемъ способѣ легче для лошади. Не смотря на такую опасную переправу, несчастные случаи бываютъ весьма рѣдко.

Болъе отчаянный, но тъмъ не менъе общеупотребительный у кочевниковъ способъ переправы, на турсукахъ, черезъ Нарынъ, въ которомъ течение весьма быстрое. Совершается она слъдующимъ образомъ: выбравъ болъе глубокое мъсто, чтобы не наткнуться на подводные камни, переправляющійся раздівается и укладываеть вею одежду въ турсукъ (кожаный мёшокъ), который затянувъ, подвязываеть себъ къ груди и животу съ тъмъ, чтобы держаться на водъ. Затъмъ одинъ конецъ веревки привязываетъ къ хвосту лошади, а другимъ обвязываетъ вокругъ себя и пускаются вилавь черезъ ръку. Вода несетъ ихъ съ ужасной быстрой и въ концъ концевъ они причаливаютъ къ берегу. Впереди всегда плыветь на лошади опытный, въ подобныхъ переправахъ, хорошій пловецъ, знакомый съ русломъ рѣки. Ежегодно бываютъ случаи, что веревка отвязывается отъ хвоста лошади и переправляющійся, или тонетъ, или разбивается о подводныя и прибрежныя скалы.

Вещи и нассажиры переправляются еще другимъ способомъ, а именно: кладется чембаракъ (ръшетчатый деревянный кругъ на верху юрты), поверхъ него деревянныя палки, а на нихъ вещи, привязанныя къ чемба-

раку. Подъ него подвязываютъ 5—6, туго набитыхъ вещами турсуковъ и онъ спускается на воду. Поверхъ всего садятся женщины и дѣти, такъ какъ мужчины предпочитаютъ первый способъ. Этотъ плотъ привязывается къ хвостамъ 3-хъ, или 4-хъ лошадей и пускаются въ путь, подъ управленіемъ впереди плывущаго на лошади, провожатаго. Этотъ способъ еще рискованнъе, такъ какъ онъ подверженъ случайностямъ болъе предыдущаго.

На томъ-же Нарынъ, въ одномъ мъстъ, практикуется еще болье куріозный способъ переправы. На извъстномъ пунктъ, гдъ ръка течетъ между высокими скалами, узкимъ русломъ, перекинутъ черезъ нее и укръпленъ на обоихъ берегахъ довольно толстый канатъ, на который надъто деревянное кольцо. Къ нему привязаны двъ веревки, изъ которыхъ конецъ одной находится на одномъ берегу, а другой на другомъ. Къ этому кольцу подвязывають пассажира, а съ другого берега перевозчикъ киргизъ тянетъ за веревку, вслъдствіе чего кольцо, скользя по канату, передвигается къ противоположному берегу, увлекая такимъ образомъ и нассажира. Нужно при этомъ замътить, что прочность каната весьма ненадежная, такъ какъ онъ свить изъ какой-то травы; натянуть онъ очень высоко надъ водой и при томъ, вследствие съужения въ этомъ месте русла ръки, она не течетъ, а мчится съ неимовърной быстротой по камнямъ. Въ виду этого, путнику переправляющемуся по такому утлому сооруженію-приходится весьма жутко.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на Сыръ-Дарьѣ, гдѣ бываетъ значительный проѣздъ и перевозка товаровъ, имѣются паромы, по образцу европейскому. Туземные пе-

ревозчики гребутъ толстыми палками, замѣняющими весла, потому что съ послѣдними они не умѣютъ обращаться и постоянно ихъ ломаютъ; при этомъ они еще употребляютъ для переправы лошадей, которыхъ привязываютъ за хвосты къ парому и они плывя, влекутъ его за собою. Подобный способъ переправы видѣлъ А. П. Федченко въ 1871 году, въ ханское время, который практикуется и по настоящее время.

Существуютъ еще поромы, или плоты, связанные изъ камыша, на которыхъ тоже переправляются, не только люди, но даже и экипажи; но подобная переправа весьма ненадежная.

Минеральные источники.

По присоединеніи Кокандскаго ханства къ Россійской Имперіи, прошло болье года прежде, чымъ стало извыстно, что въ разныхъ мыстахъ Ферганской области находятся минеральные ключи, которыми пользовались тувемные жители, съ незапамятныхъ временъ, какъ лычебными средствами.

Значительное число больныхъ въ здѣшнемъ краѣ, нуждающихся въ лѣченіи минеральными водами, громадныя разстоянія отдѣляющія насъ отъ Кавказскихъ и заграничныхъ минеральныхъ источниковъ и вслѣдствіе этого трудность, а иногда невозможность пользованія ими на мѣстѣ,—заставляетъ насъ обратить серьёзное вниманіе на мѣстные минеральные ключи, соляныя грязи и тому подобные способы лѣченія, которыми могли бы воспользоваться больные здѣсь живущіе. Для этого необходимо привести эти источники въ такое состояніе, чтобы они могли въ дѣйствительности приносить пользу больнымъ,

не только тераневтическимъ дъйствіемъ самихъ водъ, но и гигіэнической обстановкой, безъ которой раціональное лъчение немыслимо.

Въ ряду этихъ минеральныхъ источниковъ первое мъсто занимаютъ Хазретъ-аюбские ключи. Цълебныя свойства этихъ водъ, съ незанамятныхъ временъ извъстны, не только туземнымъ жителямъ Ферганы, но и обитателямъ болбе далекихъ сосбднихъ странъ; хотя это связано съ върованіемъ о чудесномъ исціленіи многострадальнаго Іова, въ одномъ изъ этихъ источниковъ, который сохранился до сего времени. Тамъ находится преколько источниковъ, но туземцы только одинъ считаютъ священнымъ и всеисцеляющимъ, а именно тотъ, въ которомъ кунался Іовъ. Эти ключи находятся въ Андижанскомъ увздв, въ Кугартскихъ горахъ, на Аюбътау (гора Іова) подъ 410 С. Ш. и 420 В. Д., на высотв

3850 футовъ н. у. м.

Древность этихъ источниковъ неоспоримая, что до нъкоторой степени подтверждается нижеслъдующимъ преданіемъ, хотя трудно придавать ему какое либо значеніе, такъ какъ туземцы большую часть библейскихъ событій перенесли на Фергану. Это преданіе состоить въ слъдующемъ: нъкогда въ Джалалабадъ (нынъ кишлакъ у подошвы этой горы) жилъ Буаиль-паша, имъвшій племянника, по имени Аюбъ (Говъ) который за благочестіе былъ награжденъ Аллахомъ всёми земными благами, въ томъ числъ и большимъ умомъ, за что былъ высоко чтимъ и уважаемъ. Но тутъ-то Аюбъ возгордился, сталъ вести жизнь далеко неблагочестивую и разгитванный Аллахъ наказалъ его, вселивъ въ него червей, причинявшихъ сильныя страданія и великія муки. Послі десятильтнихъ страданій Аюбъ поняль, что бользнь есть

проявление гивва Аллаха и вступилъ на другой путьправды, благочестія и покаянія. Все свое несмътное богатство роздаль бъднымъ, отказался отъ почестей и нищимъ отправился на гору, носящую теперь его имя, гдъ сталъ вести жизнь праведную, съ терпъніемъ, въ постоянной молитвъ, перенося страшныя мученія въ ожиданіи смерти; но смерть не приходила и въ такомъ положеніи онъ прожиль 43 года. Всемогущій, видя истинное раскаяніе, однажды явился кающемуся грёшнику и сказалъ ему: "Аюбъ! велики твои прегръщенія, по не малое и наказапіе ниспосланное мною на тебя. Ты все это перенесъ смиренно, безъ ропота, какъ подобаетъ истинному правовърному мусульманину, теперь ты мнъ опять угодень, встань и правой ногой ударь въ землю. " Аюбъ исполниль это вельніе и на этомь мысты, сталь бить ключь горячей воды, въ которомъ по приказанію Аллаха Аюбъ, искупавшись, изцълился. Всв черви изъ него вышли и поселились на тутовыхъ деревьяхъ, которыхъ раньше здёсь не было. Затёмъ Аллахъ повельнъ ему ударить по другому мъсту земли, лъвою погою, откуда пошла холодная вода, напившись которой Аюбъ окончательно выздоровълъ, поселился на томъ мъстъ, гдъ теперь его могила, велъ жизнь святую, проводиль дни и ночи въ молитвъ, поучаль народъ, разсадилъ деревья и черезъ 10 лътъ умеръ. Аюбъ мусульманами считается великимъ святымъ; вся мъстность, а равно ключи и могила, -- святыней и каждый правовърный страждущій мусульманинъ, прибывающій въ Хазретъ-Аюбъ съ върой и надеждой, —изцъляется. Въ какое время совершилось это чудесное исціленіе они сами не внають; говорять, что льть тысячь пять, или шесть тому назадъ. Этимъ изчерпываются всв сведенія объ этихъ ключахъ.

Русскому населенію они стали изв'єстны съ 1877 года, благодаря бывшему Андижанскому у'єздному врачу Д. Мездрикову, который, посіщая эти источники въразное время года, изслідоваль внішнія свойства воды, отправиль ее въ Ташкентскую химическую лабораторію для изслідованія, и сталь посылать туда больныхь. Анализь воды быль обнародовань въ 1879 году въ Туркестанскихь відомостяхь, но мні неизв'єстно съ какого источника эта вода, такъ какъ тамъ находится нісколько отдільныхъ ключей, хотя туземцами считается цілительнымь одинь, именно тоть, въ которомъ купался Аюбъ. Кромі того, не было опреділено качество и количество газовъ, заключающихся въ этой водів.

Этотъ анализъ былъ произведенъ химикомъ Тейхомъ 15 августа 1878 г., который сообщаеть следующее: Джалабадъ-Аюбскія воды получены въ химическую лабораторію въ количествъ 20 бутылокъ, съ обозначеніемъ на каждой бутылкъ, изъ какого источника, горячаго или холоднаго взята вода. Вода въ бутылкахъ проврачна, при откупориваніи бутылокъ съ водою, горячихъ источниковъ, ощущается запахъ сърнистоводороднаго газа, реакція воды кислая, но кислая реакція исчезаеть при выставлении на воздухъ, при чемъ осаждается въ водъ мельчайшій порошокъ съры и она принимаетъ щелочную реакцію. При кипяченіи вода мутится и осаждается изъ нея, съ выдъленіемъ свободнаго, и полусвязнаго углекислаго газа, двойная соль извести и магневіи съ глиноземомъ; затѣмъ остается еще въ растворъ какъ известь, такъ и магнезія. Количество содержанія сфриистоводороднаго газа весьма неопредёленно; въ нъкоторыхъ бутылкахъ имъется его болье, въ другихъ менъе, смотря какъ тщательно укупорена бутылка; а

потому опредъленіе его не могло быть сдълано. Опредъленіе газовъ вообще должно быть производимо на мъстъ источника. При выпариваніи изслъдуемой воды получается бълый остатокъ щелочной реакціи, растворяющійся не вполнъ въ кислотахъ; при облитіи остатка хлористо-водородною кислотою выдъляется углекислота.

По составу своему вода горячихъ источниковъ отличается отъ воды холодныхъ источниковъ, только большимъ содержаніемъ неорганическихъ веществъ и отсутствіемъ сърнисто-водороднаго газа.

Въ 10,000 частяхъ воды горячихъ источниковъ найдено:

Итого	II.		11,740.	
Кремнозема	1	•	0,264.	0
Углекислаго натра .	de min		1,319.	cre ps
Хлористаго натрія.			1,527.	стающіяся раствор ѣ .
— натра .	1 (112)		3,101.	ція Вор
— магнезіи.			0,703.	
Сърнокиелой извести	11	1 > -	0,805.	BT
Глинозема			0,130.	воды.
Углемагніевой соли.	20 (0.1)		0,857.	щіяся при кипяченіи
Углеизвестковой соли.	•	8.05	3,034.	Осаждаю-

Въ 10,000 ч. воды холодныхъ источниковъ найдено плотныхъ неорганическихъ веществъ, 10, 2 ч. состоящихъ изъ:

Углеизвестковой соли.			3,204.	Осаждаю-
Углемагніевой соли.	175 #80g		0,796.	щіяся при кипяченіи
Глинозема	HOAL V		0,120.	воды.
Сфрнокислой извести.		and the same	0,774.	# #i
— магнезіи.		3 10	0,676.	ор
— натра.			2,540.	H al
Углекислаго натра .		+14	0,700.	стающіяся 5 раствор'ѣ.
Хлористаго натра .			1,420.	er I
Кремнозема			1,160.	0

Я привель этоть анализь для того, чтобы сличить съ произведеннымъ въ 1885 году Магистромъ Верблюнеромъ. Изъ анализа Г. Тейха усматривается, какъ будто всё находящіеся тамъ ключи съ горячей водой, одинаковаго состава, точно также какъ и холодные; или же приведенный анализъ относится только къ одному какому либо источнику, а о другихъ умалчивается, по той причинъ, что составъ ихъ найденъ похожимъ на этотъ.

Въ 1885 году Магистръ фармаціи Верблюнеръ произвелъ на мѣстѣ химическій анализъ почти всѣхъ источниковъ, находящихся въ этой мѣстности и опредѣлилъ качество и количество газовъ.

Въ источникъ № 1, томъ самомъ, который считается туземцами священнымъ, вода изъ ключа вытекаетъ двумя рукавами, количество которой равняется 6 ведрамъ въ минуту, или 8640 ведеръ въ сутки. Удъльный въсъ воды при+200 С. 1,00204. Въ 10000 ч. воды найдено плотныхъ неорганическихъ веществъ 10,9760, органическихъ—0,216.

Составныя части въ 1	0,000	частяхъ	воды:
Двууглекислой извести			2,846.
Двууглекислаго натра.			0,832.
Двууглекислой магнезіи			0,975.
Хлористаго натра			1,955.
Сфриокислаго натра .	1.0		2,451.
Сфрнокислой магнезіи.	1		0,903.
Сфрнокислой извести.			0,935.
Глинозема	•		0,124.
Кремнозема			0,248.
			10,269.

Сфроводорода 0,0033461 въ 1000 с. с. воды.

Цвътъ воды прозрачный, вкусъ горьковато-вяжущій,

съ съроводороднымъ запахомъ.

Температура на поверхности бассейна + 38° С. въ срединъ 38,6°, а въ нижнихъ слояхъ 39°. Температура воды въ разное время дня мъняется на 0,1°—0,2° С. Со дна обильно всплываютъ кверху пузыри газа, имъющіе съроводородный запахъ. Реакція свъжей воды нейтральная, а при стояніи на воздухъ дълается слабощелочной. Серебряныя и мъдныя вещи въ купальнъ чернъютъ.

Источникъ N 2, вода прозрачная, вкусъ довольно пріятный, безъ запаха, съ нейтральной реакціей и температурой + $37,2^{0}$ С. Прибыль воды незначительная, удѣльный въсъ воды при темп. + 20^{0} С. = 1,001984.

Въ 10000 ч. воды найдено плотныхъ неорганическихъ веществъ 10,666,—органическихъ 0,282.

Составныя части:

Cocamina			
Двууглекислой извести.	1314		2,753.
Двууглекислаго натра.			0,733.
Двууглекислой магнезіи		•	1,424.
Хлористаго натра .			1,638.
Сърнокислаго натра .			2,284.
Сърнокислой магнезіи.			1,432.
Сфриокислой извести.			0,640.
Глинозема			0,152.
Кремнозема			0,145.
			10,201.
			The state of the s

Источникъ $\mathbb N$ 3, средняя температура воды 36 0 C. Вода прозрачная, безъ всякаго запаха, мягкаго вкуса и нейтральной реакціи. Удъльный въсъ воды при темп. + 20 0 C.

=1,002246. Въ 10,000 ч. ч. воды найдено плотныхъ неорганическихъ веществъ 11,202, органическихъ 0,133.

Составныя части:

						í
Кремнозема.		•	•	2	0,176.	
Глинозема		•			0,222.	
Сфрнокислой извести					0,841.	
Сфриокислой магнезіи				•.	1,768.	
Сърнокислаго натра				•	1,982.	
Хлористаго натра					1,426.	
Двууглекислой магнез	іи	•			1,715.	
Двууглекислаго натра					1,803.	
Двууглекислой извест					1,944.	

11,877.

Источникъ № 4, надъ нимъ въ 1885 году построена купальня, для прівзжихъ больныхъ и солдатъ, такъ какъ въ № 1, преимущественно купаются туземцы. Емкость бассейна около 250 куб. фут. Температура воды 37° С. Вода желтоватаго цвѣта и мутная. Вкусъ горьковато-вяжущій. Реакція нейтральная и ощущается сѣроводородный запахъ. Прибыль воды въ минуту 3 ведра, или 4320 ведеръ въ сутки. Удѣльный вѣсъ воды при темп. +20° С.=1,00218. Въ 10000 ч.ч. воды содержится плотныхъ неорганическихъ веществъ 11,460, органическихъ 0,210.

Составныя части:

Двууглекислой извести				2,824.
Двууглекислаго натра.	. 50		1 199	2,154.
Двууглекислой магнезіи	•	•		0,952.
Хлористаго натра .				1,845.
Сърнокислаго натра .	· William			2,222.
Сфрнокислой магнезіи.	4			1,105

	-				4 750		11,988.	
Кремнозема	•		•	-	i den	ne.	0,182.	
Глинозема					•		0,299.	
Сврнокисло	й	извести	10.00	Jug Blood			0,405.	

Съроводорода 0,001519, въ 1,000 С. С. воды. Источникъ № 5, температура воды на поверхности 29,2° С., а въ глубинъ 36,2° С. Вода прозрачная, вяжущаго вкуса и слабокислой реакціи. Количество вытекающей воды незначительно. Удъльный въсъ при темп. + 20° С.=1,00264. Въ 10000 ч. ч. воды содержится плотн. неограническихъ веществъ 11,126; органическихъ 0,166.

Составныя части:

Двууглекислой извести	White It		2,612.	
Двууглекислаго натра.			2,245.	
Двууглекислой магнезіи			0,926.	
Хлористаго натра .	B. 19.		2,542.	
Сърнокислаго натра .	1/10		1,453.	
Сфрнокислой магнезіи.	Hand.		1,182.	
Сфрнокислой извести .			0,348.	
Глинозема			0,142.	10
Кремнозема	- m		0,202.	
			11,652.	

Источникъ № 6. На немъ устроены отдѣльныя ванны. Температура воды измѣрена на разстояніи 4 саженъ отъ начала источника, на глубинѣ 3 саженъ и показала 40, 5° С. Реакція воды нейтральная, переходящая въ слабощелочную. Вода прозрачная, вяжущаго вкуса и съ запахомъ съроводорода. Удѣльный въсъ при темп. +20° С.=1,00312. Въ 10,000 частяхъ воды содер-

жится плотныхъ неорганическихъ веществъ 11,819; органическихъ только слъды.

Составныя части:

Двууглекислой извести	2.0	. 8	3,240.
Двууглекислаго натра.			00
Двууглекислой магнезіи			0,979.
Хлористаго натра .			2,852.
Сфрнокислаго натра .			1,232.
Сърнокислой магнезіи.			0,960.
Сърнокислой извести .			0,218.
Глинозема		1102	0,204.
Кремнозема		•	0,248.
			12,188.

Съроводорода 0,0033461 въ 1000 С. С. воды. Источникъ № 7 и № 8, находятся одинъ возлѣ другаго и имѣютъ видъ стоячихъ ямъ, 9 футовъ въ окружности каждая и столько-же футовъ глубины. Вода прозрачная, безъ запаха, слегка вяжущаго вкуса и слабокислой реакціи.

Температура воды № 7, во всѣхъ глубинахъ 20° С. Удѣльный вѣсъ воды при темп. + 20° С.=1,00162. Въ 10000 ч. ч. воды найдено плотныхъ неорганическихъ веществъ 9,224; органическихъ 0,438.

Составныя части:

Двууглекислой извести	H. Th			2,320.
Двууглекислаго натра.			1 4	1,923.
Двууглекислой магнезіи				0,836.
Хлористаго натра .	V.	1100		2,210.
Сърновислаго натра .			1	1,845.
Сфрнокислой магнезіи.	1			0,680.
Сърнокислой извести.	4.49	181	45	0,462.
Углекислаго желъза .	1, 7	11.0/1	V	0,614.

				10,611.	
Кремнозема.	900		•	0,203.	
Глинозема .	- 10	080		0,218.	

Температура воды № 8 источника во всёхъ глубинахъ 24° С. Удёльный вёсъ воды при темп. 20° С.— 1,00220. Въ 10000 ч. ч. воды найдено плотныхъ неорганическихъ веществъ 9,684, органическихъ 0,444.

Составныя части:

Двууглекислой извести				2,222.	
Двууглекислаго натра.	1.5			1,303.	
Двууглекислой магнезіи	11			0,620.	
Хлористаго натра .	100			2,412.	
Сфриокислаго натра .				1,816.	
Сърнокислой магнезіи.			- 0,41	0,688.	
Сфрнокислой извести.				0,286.	
Углекислаго жельза .	-			0,360.	
Глинозема	•			0,410.	
Кремпозема		•		0,139.	
				10,256.	

Вблизи отъ этихъ источциковъ, находится еще 6, которые по составу воды подходятъ къ предыдущимъ, но не содержатъ желѣза. Температура въ нихъ отъ 180 С. до 300 С. За исключеніемъ источниковъ № 1, № 4 и № 6, въ которыхъ устроены ванны для купанъя, остальные не утилизируются.

Безусловно полагаться на этотъ анализъ мы не можемъ, такъ какъ извъстно, что составъ минеральныхъ ключей не постоянный и въ теченіе болье или менье продолжительнаго времени онъ мъняется. Въ виду этого, произведенный одиночный химическій анализъ, даетъ

еще крайне мало для уразумѣнія истиннаго характера этихъ минеральныхъ ключей.

Гора Аюбъ, на которой расположены всѣ эти источники, съ СВ, С, СЗ, З и ЮЗ. окружена Кугартской долиной, населенной кочующими киргизами и орошаемой рѣкой Кугартъ, впадающей въ Кара-Дарью. Цѣпь Кугартскихъ горъ надъ этой долиной, возвышается на 900 ф. Къ С. З и В. идутъ отроги этихъ горъ, почти той же высоты. Съ В. ЮВ. и Ю. горы Аюба возвышаются до 250 ф. надъ источниками. За этой возвышенностью, дальше слѣдуетъ лощина, потомъ невысокая гора, а дальше возвышенная кряжевая и волнистая мѣстность. На Ю. Ю.З. отлогій трехверстный спускъ въ долину, къ кишлаку Джалабадъ. Поэтому гора Аюбъ съ двухъ сторонъ открыта и высится надъ долиной, а съ остальныхъ двухъ защищена небольшой возвышенностью.

Поверхностные слои почвы горы Аюба состоять изъ лёсса, различной толщины, мъстами до двухъ саженъ. Встръчается огнеупорная синяя глина, носящая названіе Гульбютэ. Болье глубокіе слои не изслъдованы. Въ полуверсть къ съверу отъ источниковъ находится скалистый грунтъ, а на покатости къ Джалабаду, т. е. на Ю. З. конгломератныя залежи. Во всъхъ же остальныхъ мъстахъ, почва одна и таже и разнообразится, большимъ или меньшимъ присутствіемъ лёсса. Вообще почва весьма богатая и съ разнообразной олорой. Здъсь на небольшомъ клочкъ земли сгруппирована почти вся растительность Ферганской долины. Не считая разнообразной, подножной олоры, находимъ колючку, дубильный корень, полынь, шиповникъ разныхъ видовъ, персики, сливы, джиду, вишню, винную ягоду, оисташки,

миндаль, барбарисъ, абрикосы, яблонь, груши, чинаръ, талъ, плакучую иву, оръхъ, тутъ и огромнъйшіе въковые кайрагачи. Такое скученіе растительности необходимо отнести къ заботамъ и попеченіямъ почитателей Св. Аюба, несшихъ въ даръ все новое святой горъ.

Фауна тоже не бъдна. Масса аистовъ, гнъзда которыхъ громоздятся на куполъ мечети и старыхъ кайрагачахъ, около которыхъ суетятся сотни воробьевъ. Есть ласточки, перепела, коростели, горлинки, голуби, стрепетъ и многіе другіе.

Днемъ мухи и осы, а ночью комары и мошки сильно безпокоять обитателей; фаланги, скорпіоны и мелкіє пауки, не особенно многочисленны. За то по ночамъ одичалыя кошки и летучія мыши постоянно дають знать о своемъ существованіи. Изъ земноводныхъ встрѣчаются ужи и змѣи, между которыми, говорятъ, есть одинъ видъ ядовитыхъ. Если не было-бы аистовъ, уничтожающихъ змѣй и лягушекъ, то по всей вѣроятности ихъ водилось бы здѣсь громадное количество.

Изъ домашнихъ животныхъ: верблюдъ, лошадь, ишакъ, корова, козы, бараны и масса собакъ.

Небольшой кишлакъ на этой горъ, заселенъ Узбеками духовнаго званія, мало занимающихся хлъбопашествомъ, а живущихъ выручкой со святыхъ мъстъ и ключей.

Относительно климата описываемой мѣстности можно сказать лишь въ общихъ чертахъ, потому что не было производимо постоянныхъ наблюденій, да и онѣ тогда только могутъ быть цѣнными, если имѣются за нѣсколько лѣтъ.

За мъсяцы іюнь, іюль и первую половину августа

1885 года, температура maximum+34° С. и mimimum+22° С. Съ половины августа утрами температура пала до+16° С. Въ періодъ времени, съ 20 іюня по 10 іюля, погода была не постоянная, съ довольно рѣзкими температурными колебаніями, сильнымъ порывистымъ вѣтромъ, преимущественно Ю и ЮВ. нерѣдко съ дождемъ, а иногда съ градомъ. Въ остальное время погода была хорошая, безъ рѣзкихъ колебаній въ температурѣ, иногда съ вѣтромъ, неимѣвшимъ постояннаго направленія, чаще юговосточнымъ, пріятнымъ и освѣжающимъ, особенно по утрамъ. Дождей не было. За три мѣсяца только четыре ночи были душныя; въ остальное же время воздухъ былъ чистъ, прозраченъ. Май, по разсказамъ, всегда самый хорошій.

Трехнедъльная непогода 1885 г., по словамъ постоянныхъ обитателей этой горы принадлежитъ къ ръдкимъ явленіямъ; обыкновенно-же лъто всегда однообразно и съ хорошей погодой.

Съ 1884 года стали посылать туда по 50-ти человъкъ нижнихъ чиновъ, изъ войскъ Ферганской области, съ различными хроническими болъзнями, подъ постояннымъ наблюденіемъ врача. Лѣченіе состояло исключительно въ купаніяхъ, хотя нѣкоторые, какъ напр. сифилитики, получали при этомъ и лѣкарства. Успѣхъ за три года оказался весьма удовлетворительнымъ, такъ что эти воды пріобрѣтаютъ все больше и больше довѣрье публики.

Послѣ того, когда былъ произведенъ химическій анализъ всѣхъ источниковъ, а врачъ, постоянно находящійся тамъ во время сезона, слѣдитъ за лѣченіемъ больныхъ, дѣйствіе этихъ водъ, изъ области легендарныхъ сказаній и эмпирическаго способа употребленія,—

переходить на твердую, раціональную почву и годь съ годомъ, наши знанія будуть обогащаться болье точными клиническими наблюденіями.

Съ 1885 года тамъ учреждена санитарная станція и на время сезона открывается лазареть на 25 человъкъ.

Сърно-щелочные источники въ ущельъ Педау.

Въ 10 верстахъ къ Ю. З. отъ кишлака Риштана Кокандскаго увзда, по безплодной щебневой пустыни, начинается ущелье Педау, въ которомъ у самаго основанія отвъсной горы вытекають три источника сърнощелочной воды. При входъ въ ущелье чувствуется уже за версту свроводородный запахъ, въ особенности вечеромъ, который усиливается по мъръ приближенія къ источникамъ. Вода, вытекающая изъ ключей, чистая, прозрачная, съ сильнымъ запахомъ съроводорода и на вкусъ щелочно-горьковатая. Температура + 200 С. (10 мая 1882 г.). Реакція воды сначала кислая, а потомъ, по прошествіи н'якотораго времени д'ялается щелочной. Воды изъ 3 источниковъ вытекаетъ 600 ведеръ въ часъ. Налитая вода въ бутылку совершенно прозрачная, но постоявъ нѣкоторое время, дѣлается бѣловатою и образуется на днъ съровато-бълый осадокъ. Опущенная въ источникъ серебряная монета въ нъсколько секундъ чернветъ.

Въ 1881 году была препровождена вода въ Ташкентскую лабораторію, для химическаго анализа, по поводу котораго Магистръ фармаціи Тейхъ, въ отзывъ отъ 6 іюня 1881 года, писалъ слъдующее: Вода въ препровожденныхъ для изслъдованія банкахъ была прозрачна, на див банокъ имълся свровато-бълаго цвъта осадокъ, —въ однъхъ больше, въ другихъ меньше. При откупориваніи банокъ ощущался сильный, сфроводородный запахъ. Оставленная открытой вода мутнъетъ, такъ какъ происходитъ разложение раствореннаго въ водъ съроводорода и выдъленія части свободной углекислоты; стра и часть углекислыхъ солей извести и магнезіи, осаждаясь мельчайшими осадками, производять муть. Простоявъ нъсколько дней вода снова дълается прозрачною. Реакція воды сначала кислая, принимаеть при этомъ слабощелочную реакцію. Относительно этого свойства, вода всъхъ 3-хъ источниковъ одинакова; тоже самое оказалось по качественному и количественному химическому изследованію. Колебанія въ сумме остающагося твердаго остатка, послъ выпариванія взвъшеннаго количества воды этихъ источниковъ, весьма незначительны и состояли въ сотыхъ доляхъ. При кипячении воды осаждается изъ нея, при улетучиваніи углекислоты и съроводорода: основная углеизвестковая соль, съ незначительною примъсью, какъ съры, такъ и углемагніевой соли.

Въ 1000 частяхъ воды найдено слѣдующее количество составныхъ частей:

Углеизвестковой соли, растворенной

въ избыткъ углекисл	оты			0,1680.
Сърнокислой извести.				1,1339.
Хлористаго магнія .		. 330		0,6270.
Сърнокислой магнезіи				0,2130.
Хлористаго натра .		. 35		1,2780.
Хлористаго калія	· First		•	0,0020.
Углекислаго натра .		•		0,1650.
Глинозема и кремнозема				0,0200.
		1.00		3,6069.

Опредъленія газовъ: сърнистаго водорода и свободной углекислоты не сдълано. Мъстность, какъ въ ущельи, такъ и кругомъ—пустынная и безлюдная, не смотря на то, что мимо этихъ источниковъ идетъ дорога въ Сохъ. Вслъдствіе отсутствія деревьевъ и прочей растительности, жизнь въ этой мъстности, въ теченіе знойнаго лъта, была невыносимой. Сухой, горячій воздухъ, накаленная почва, удушливый съроводородный запахъ—мало представляли собою удовольствія; но тъмъ не менте, климатическія условія для многихъ больныхъ были весьма благопріятны. Люди, страдающіе хроническими малярійными принадками, поправлялись тамъ безъ всякаго лъченія.

Въ теченіе 1881 и 1882 года, Маргеланскій городовой врачъ Бунинъ, получивъ небольшую субсидію отъ казны и затративъ порядочную сумму изъ своихъ собственныхъ средствъ, устроилъ на этихъ источникахъ все болье, или менье необходимое, какъ для льченія больныхъ, такъ и для неприхотливой жизни, въ теченіе льтняго сезона. Сдъланъ былъ деревянный срубъ надъ ключами и устроены: одна общая ванна и 7-мь отдільныхъ, изъ которыхъ 3 деревянныя, а 4 изъ мъстнаго асфальта. Вода въ эти ванны, проводилась изъ источниковъ черезъ трубы деревянныя и глиняпыя, подъ вемлею, а спускалась по арыкамъ и употреблялась для орошенія посаженныхъ деревьевъ. Для пом'ященія больныхъ, нижнихъ чиновъ и частныхъ лицъ, были построены три каркасные барака, въ которыхъ имълось 28 небольшихъ комнатъ. Было посажено 12 тысячь разныхъ сортовъ деревьевъ, которыя хорошо принялись и черезъ нъсколько лътъ могъ бы образоваться порядочный садъ.

Со смертью врача Бунина въ 1883 году, пользо-

ваніе этими водами прекратилось. Не нашлось ни кого изъ частныхъ предпринимателей, желающихъ взять эти источники въ аренду и эксплоатировать; а потому всё эти приспособленія и постройки въ настоящее время, безъ поддержки, совершенно разрушились, деревья посохли и вся эта мъстность представляетъ полное запустъніе.

Между туземцами эти источники не пользовались извъстностью, подобно Хазреть-Аюбскимъ и другимъ. Быть можетъ причиною этому служитъ сравнительно низкая температура воды, а сарты неохотно купаются въ холодной водъ; такъ же и то, что происхожденіе этихъ источниковъ, не связано съ какими либо традиціями, или религіозными событіями, а потому не производятъ среди нихъ извъстнаго обаянія. Такъ какъ мимо этихъ ключей пролегаетъ дорога въ Сохъ, то туземцы иногда останавливаются, чтобы выкупать въ этой водъ больныхъ верблюдовъ и лошадей, на которыхъ, по ихъ мнѣнію, эта вода хорошо дъйствуетъ. Точно также, на стертыя спины этихъ животныхъ и прочія раненія, прикладываютъ образующійся тамъ илъ.

Соланое озеро Акъ-Сыкентъ съ минеральными грязями.

Соляное озеро Акъ-Сыкентъ, находящееся вблизи кишлака Камышъ-кургана, въ бывшемъ Чустскомъ увздѣ, помимо нъсколькихъ сотъ тысячь пудовъ въ годъ соли, которой оно даетъ въ готовомъ видѣ туземцамъ, еще съ давнихъ поръ славится между ними своею цѣлебностью и привлекаетъ къ себѣ массу больныхъ, не только изъ ближайшихъ окрестностей, но даже и за сотни

верстъ. Всевозможнаго рода больные, хроники, потерявшіе всякую надежду на успѣшность испробованныхъ лѣченій, а также больные съ острыми болѣзнями (часто безъ разбора) толпами тянутся къ Акъ-Сыкенту, чтобы сложить тамъ свои недуги и страданія, что къ сожалѣнію ведетъ часто къ печальнымъ результатамъ, даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда лѣченіе соляными ваннами и грязями, по всѣмъ даннымъ, должно было бы принести полный успѣхъ.

Отсутствіе какихъ бы то ни было приспособленій, требуемыхъ самой невзыскательной гигіэной, составляють одну изъ причинъ, почему больные не получають ожидаемой пользы.

Площадь солянаго озера равняется приблизительно $2^{1}/_{2}$ квадр. верстамъ. Оно лежитъ подъ 40^{0} 30° С. III. и 41^{0} В. Д. на высотъ 1600 ф. н. у. м.; озеро имъетъ направленіе съ запада на съверовостокъ, окружено со всъхъ сторонъ высокими горами. Горы южнаго берега озера Акъ-Сыкентъ-Баши, весьма круто спускаются къ самому озеру, возвышаясь надъ нимъ сплошною ровною стъною; горы-же съвернаго берега представляютъ болъе отлогіе склоны, изрытые дождевыми промоинами и ущельями. Онъ понижаются отъ середины къ съверовападу и передъ курганчами Иръ-Тулъ сливаются съ Камышъ - Курганской равниной. Въ съверо-западную часть озера впадаетъ вода соляныхъ ключей Караканъ, остающаяся отъ работъ по добыванію осадочной соли, въ урочищъ того же имени.

Общую покатость дно озера имъетъ къ серединъ, при чемъ наибольшая глубина, въ южной части его, не превышаетъ полуторыхъ саженей; съверные - же берега на столько отлоги, что совершенно сливаются съ

окаймляющей дорогой.

Горы, окружающія озеро Акъ-Сыкенть, состоять изъ твердыхъ глинистыхъ породъ, съ прослойками гипса, обнаруживающагося зубчатыми параллельными рядами поперекъ склоновъ. Соли, эти горы повидимому вовсе не содержать, такъ какъ по водостокамъ и промоинамъ, нигдъ незамътно даже самыхъ легкихъ соляныхъ налетовъ, всегда обнаруживающихъ ен присутствіе. Озеро, за исключеніемъ дождливаго времени, или накопленій силевой воды, обыкновенно покрыто слоемъ осадочной кристаллической соли, толщиною отъ $\frac{1}{2}$ —2 вершковъ; слой этотъ, по мъръ увеличенія жаровъ и сухой погоды, увеличивается и пріобрътаетъ наибольшую толщину въ срединъ осеннихъ мъсяцевъ. Воды въ озеръ обыкновенно очень мало, такъ что купанье и плаванье невозможно. Вода въ озеръ совершенно прозрачная, съ очень слабымъ желтоватымъ оттънкомъ, сильно соленаго вкуса, съ чуть замътной горечью, щелочной реакціи.

Дно озера покрываетъ толстый слой наносной, весьма линкой грязи, представляющей собою линкую пластическую массу, совершенно чернаго цвъта, содержащую въ себъ большой процентъ поваренной соли, сърнокислой извести и въроятно органическихъ веществъ и ила, наносимыхъ съ предгорій Карамазарскихъ и Бабадарханскихъ горъ. Грязь по извлеченіи ея на поверхность слегка отзывается запахомъ сърнистаго водорода, весьма трудно смывается съ кожи, на воздухъ быстро сохнетъ, принимаетъ темно-сърый цвътъ, съ бълыми крапинками. Подъ слоемъ грязи дно озера твердое, песчано-глинистое.

Присутствіе соли въ озерѣ наглядно объясняется

стоками двухъ соляныхъ ключей Каракана, насыщенныхъ солью. Они, предъ входомъ въ озеро, проходятъ черезъ пески, вода образуетъ заливы у подошвы горъ, фильтруется въ пескъ и разливаясь по большой поверхности, въ тоже время испаряясь, впадаетъ въ озеро, въ видъ сильно насыщеннаго солью раствора.

10 августа 1886 года, при небольшихъ облакахъ и легкомъ NE. вътръ, температура воды и грязи была слъдующая:

 $36,5^{0}$ Въ 7 ч. утра на поверхности На глубинъ фута 34,60 22,80Въ воздухъ . . 50,30Въ 12 ч. дня на новерхности . . На глубинъ фута 49,40 39,40 Въ воздухв. . 39,80Въ 8 ч. вечера: на поверхности . На глубинѣ фута 40,20 $29,0^{\circ}$ Въ воздухъ . . облака. 15 Августа свежій ветерь NE, кучевыя $38,4^{\circ}$ Въ 7 ч. утра на поверхности. . На глубинъ фута 36,40 Въ воздухв . . 21,60 Въ 12 ч. дня на поверхности . . 47,20 На глубинъ фута 45,60 — $32,5^0$ — Въ воздухъ . . $38,7^{\circ}$ — Въ 8 ч. вечера на поверхности . На глубинъ фута 39,50 — $27,5^{0}$ — Въ воздухъ . .

17-го августа, вслъдствіе прохладнаго съверо восточнаго вътра, значительной облачности и накрапывающаго дождя, температура сильно понизилась.

Въ котловинъ, занимаемой озеромъ Акъ-сыкентъ, съ конца февраля до середины августа дують еженедёльные, правильно повторяющіеся, порывистые юго-западные вътры, обыкновенно теплые. Они почти всегда переходять въ бурю и сопровождаются тучами приподнятаго песка, сильно раскаленнаго. Самое озеро защищено отъ этого высокими горами. Въ концъ іюня и іюль, вдоль котловины дують иногда, посль заката солнца, горячіе вътры (гармъ силь), которые производять духоту и сильную сухость кожи. По утрамъ лътомъ до 7 часовъ, часто дуетъ легкій, прохладный вътеръ отъ ръки, съ юговосточной части котловины. Со второй половины августа, югозападные вътры начинаютъ постепенно замъняться съверо-восточными, прохладными вътрами, которые въ ноябръ вытъсняють окончательно первые, замъняя ихъ до весны.

Съ 10 или 15 августа, лѣченіе туземцевъ соляными грязями прекращается, такъ какъ температура воздуха, а равно и грязей, начинаетъ понижаться. Пользовавшихся въ 1886 г. туземцевъ простиралось до 300 человѣкъ. Начинаютъ собираться больные съ 15-го іюня, слѣдовательно сезонъ продолжается два мѣсяца.

Лъчатся туземцы безъ разбора, по вдохновенію, отъ всъхъ бользней. Здъсь можно встрытить больныхъ съ острымъ и хроническимъ ревматизмомъ, сифилитиковъ, во всъхъ стадіяхъ, паралитиковъ, больныхъ съ контрактурами, съ разнаго рода накожными сыпными бользнями и проч. Больные пользуются солью вмъстъ съ грязью и одною солью. Въ первомъ случат вырываютъ продолговатыя ямки, глубиною отъ ½ до одного аршина, кладутъ въ нихъ больныхъ въ бъльт и все тъло до шеи покрываютъ грязью. Надъ головой устраи-

вають зонты, для предохраненія оть солнечнаго удара. Въ ваннахъ этихъ больные лежать по мѣрѣ силъ; обыкновенно отъ часу, до полуторыхъ часовъ; а нѣкоторые субъекты выдерживаютъ до 3 часовъ и болѣе. Весь курсъ лѣченія, нѣкоторые оканчиваютъ одною ванною и больше шести никто не принимаетъ. Начинаютъ принимать ванны съ 10 ч. утра до 3 ч. по полудни. Нѣкоторые послѣ этого обмываются прѣсною водою, другіе же остаются не обмытыми, въ продолженіи цѣлаго дня.

Въ Семипалатинской области Омскаго Округа, въ киргизской степи, есть Калкаманскія соляныя грязи. Я видѣлъ польвующихся тамъ киргизъ, совершенно по этому-же способу какъ и здѣсь; за исключеніемъ лишь того, что они ложатся туда голыми, безъ бѣлья, такъ какъ послѣднее рѣдко у кого и бываетъ. Случалось видѣть, что зарытый больной, долежится до того, что

его вынимають чуть живаго.

Лъчение одною солью на оз. Акъ-Сыкентъ про изводится почти тъмъ-же способомъ, съ тою только разницей, что больные ложатся не выкапывая ямокъ, на поверхности озера, вблизи берега и обкладываются слоемъ соли, набранной съ поверхности озера. Послъднія ванны крайне горячія и труднъе переносятся больными.

Озеро Акъ-Сыкентъ лежитъ въ 6 верстахъ отъ кишлака Камышъ-кургана, въ 14 верстахъ отъ кишлака Шахидана, въ 3 верстахъ отъ хорошей торной дороги изъ Коканда на Ташкентъ. Отъ почтовой станціи Мурва-Рабатъ въ 30 верстахъ, отъ Коканда въ 68 верстахъ, отъ Ходжента въ 78 верстахъ. Пръсная вода въ 1½ верстъ отъ озера.

На самомъ озерѣ нѣтъ никакого приспособленія, для жилья. Нужно запасаться юртой и всѣмъ необходимымъ, или жить въ ближайшемъ кишлакѣ Камышъкурганѣ. Этотъ кишлакъ находится на болотистой, солонцеватой почвѣ, съ бѣдной древесной растительностью. Вода ключевая, но отзывается тиной. Постоянно тамъ дуютъ сильные, юго-западные вѣтры.

Кишлакъ Шахиданъ лежитъ въ чрезвычайно красивомъ Пангазскомъ ущельи, по которому раскинуты сады и кишлаки, на протяжении 15 верстъ. Мъстность возвышенная, здоровая, съ прекрасною водою и прохладная. Этотъ кишлакъ можетъ служить огдыхомъ, послъ лъчения этими грязями.

Извъстное количество этой воды и грязи, герметически закупоренныхъ, отправлено въ Ташкентъ въ 1886 г. для химическаго изслъдованія; но результатъ этого мнѣ еще не извъстенъ. Конечно, главная составная часть какъ той, такъ и другой—поваренная соль.

Много еще существуеть въ Ферганъ теплыхъ ключей, соляныхъ озеръ и такихъ же источниковъ; но они не изслъдованы и не пользуются извъстностью среди туземцевъ. Они върятъ только въ традиціи, освященныя въками, а потому не набрасываются на вновь открытые; доказательствомъ чему служатъ Педаускіе сърно-щелочные источники, не пользующіеся довъріемъ мъстнаго населенія.

ГЛАВА ІУ.

Климатъ Ферганской области.

Первыя свёденія о климать Ферганы сообщены намъ Фразеромъ, который въ 1821 г. характеризоваль его въ немногихъ словахъ, слёдующимъ образомъ: три мѣсяца въ году нужно топить; весна открывается небольшимъ дождемъ, при чемъ сильные вѣтры гонятъ облака; лѣто знойное и безъ дождей; влажность снова возвращается лишь къ концу лѣта (1).

Само собою разумѣется, что это опредѣленіе, относится только до Ферганской долины, а отнюдь не до всей области, потому что окружающія горы, съ вершинами покрытыми вѣчными свѣгами, рѣзко отличаются своимъ климатомъ отъ долины, средняя высота которой отъ 1000—1500 ф. н. у. м. Поднимаясь лѣтомъ со дна долины въ горы, мы можемъ въ очень короткое время, побывать во всѣхъ климатахъ, быстро переходя отъ тропическаго зноя къ вѣчно снѣговымъ и ледянымъ полямъ, гдѣ зимою царитъ полярная стужа, а среди лѣта нерѣдко бываютъ снѣжные бураны.

Это разнообразіе, или разнохарактерность климата, зависить единственно оть орографическихъ свойствъ Ферганской области, а не отъ вліянія широты; потому что вся область занимаєть только около трехъ градусовъ сѣверной широты, а между тѣмъ здѣсь каждый пунктъ имѣетъ свой термическій характеръ.

Для того, чтобы можно было съ точностью опредълить среднія температуры во всей области, нужно,

^(*) Очерки Ферганской долины А. ф. Миддендорфа стр. 103.

чтобы въ каждомъ мѣстѣ велись свои термометрическія наблюденія. Но такъ какъ горы большею частью безлюдныя и только въ теченіе короткаго лѣта посѣщаются кочевниками, поэтому подобныя наблюденія не осуществимы; хотя могли бы представить, если не практическій, то научный интересъ.

Для насъ конечно важнѣе изучить климатическія условія Ферганской долины, потому что въ ней расположилось все осѣдлое туземное населеніе, а также русское и наши войска. Климатическія условія играють весьма важную роль въ гигіэническомъ отношеніи. Гумбольдть, подъ климатомъ разумѣетъ совокупность атмосферныхъ измѣненій, оказывающихъ вліяніе на наши организмы и относитъ сюда температуру, влажность, измѣненіе барометрическаго давленія, тишина атмосферы, вѣтры, напряженіе атмосфернаго электричества, чистота воздуха, или присутствіе въ немъ міазмъ и наконецъ степень ясности и прозрачности неба (1).

Температура.

Температура стоить во главъ всего того, что называемъ климатомъ. Знаніе, какимъ количествомъ годоваго тепла вообще пользуется та, или другая мъстность, важно въ медицинскомъ отношеніи, такъ какъ по этому можно судить о большей, или меньшей бользненности, а въ особенности, о степени лихорадочности, потому что теплота составляеть одинъ изъ тъхъ трехъ агентовъ, безъ которыхъ не можетъ развиться малярія.

Всв города Ферганской области расположены въ долинв, недалеко одинъ отъ другаго, а потому по климату, за исключеніемъ Оша, весьма мало отличаются другъ отъ друга. Вся долина запимаетъ только одинъ градусъ широты

^{(&#}x27;) Cosmos. Paris 1846 т. I стр. 377 и 380.

и лежить почти на одной высотъ, поэтому и не можеть быть значительной разницы. А. ф. Миддендорфъ, посътивъ Фергану въ 1878 г., когда въ ней не было еще ни одной метеорологической станціи, охарактеризоваль климатъ долины слъдующимъ образомъ: (1). Безморозная погода бываетъ часто уже въ февралъ, но обыкновенно въ половинъ марта и температура въ тъни достигаетъ свыше 200, такъ что трава начинаетъ пробиваться. Полуденное солнце въ срединъ февраля, на столько тепло, что чувствуешь настоящую весну. Температура повышается быстро и съ незначительнымъ охлажденіемъ по ночамъ; въ мав она уже отяготительна для европейца, стверянина, во второй половинъ лъта почти невыносима, ибо въ іюлъи августъ средняя температура вътъни достигаетъ почти 300 (въ полуденное время нъсколькими градусами выше); вомногіе дни она равна 35—360. На солнцъ почва нагръвается до 700 и выше, такъ что яйцо въ ней испекается. Что по ночамъ здёсь происходить меньшее охлаждение, нежели въ степяхъ, -- это должно приписать состоянію неба; къ ночи оно завола кивается и часто верхніе слои воздуха наполнены пылью.

Но наибольшая жара наступаеть въ тѣни очень поздно, какъ и во веѣхъ континентальныхъ странахъ; лѣтомъ—даже около 4 часовъ по полудни. На поверхности-же земли максикумъ температуры наступаетъ гораздо ранъе и бываетъ болъе нежели въ воздухъ.

Сентябрь похожъ на май, октябрь на апръль; эти осенніе мъсяцы—самые пріятные въ году, послѣ прекращенія лътняго зноя. Мартъ свободенъ отъ морозовъ,

⁽¹⁾ Loc. cit. crp. 118.

въ ноябръ-же они уже наступаютъ, служа переходомъ къ декабрю, который, впрочемъ, оказывается самымъ не постояннымъ мъсяцемъ. Въ нъкоторые годы въ декабръ почти вовсе не бываетъ снъга, температура понижается липь на нъсколько градусовъ ниже 0; средняя температура держится выше точки замерзанія, а въ полдень термометръ стоитъ выше + 10°; въ другіе же годы термометръ падаетъ (даже въ полдень) до—16°, а средняя мъсячная температура на много градусовъ ниже О. Конечно это— чрезвычайные случаи; по мпънію тувемневъ, Русскіе принесли съ собою такіе холода. Январь нъсколько холоднъе ноября, а неръдко онъ бываетъ самымъ холоднымъ мъсяцемъ въ году.

Законъ, установленный Дове, что во всей восточной Азіи мъсяцы: съ апръля по сентябрь очень жарки сравнительно съ географическимъ положеніемъ,—оправдываются въ Ферганъ.

По имѣющимся у меня метеорологическимъ наблюденіямъ, произведеннымъ въ г. Нов. Маргеланѣ за 11 лѣтъ, средняя годовая температура равна 13, 90 С.

По годамъ колебанія незначительны, а именно:

Таблица 1.

1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888
14,6	14,4	13,1	14,4	12,9	14,0	13,7	13,8	13,1	14,4	14,8

Средняя температура по місяцамь, за 8 літь, съ 1881 по 1888 г. включительно, была слідующая;

Таблица 2.

		-	de la companya della companya della companya de la companya della	-5-1					
Депабрь.	-5,4	3,1	2,3	1,6	-0,4	1,3	3,3	1,4	6,0
.44ддвоН	.dqdnoH .c.		5,1	2,5	7.8	4,8	7,9	7,1	5,8
. адбитаО	12,2	11,5	12,2	11,6	14,1	12,4	15,9	15,0	13,1
Сентябрь.	21,9	21,0	20,5	20,0	21,7	20,5	20,8	19,8	20,7
Antyers.	28.7	28,5	28,3	26,5	28,1	27,8	27,6	26,6	27,7
.arail	29,7	28,0	29,5	27,9	25,4	29,2	28,5	29,9	28,5
Тюнь.	25,9	26,8	27,6	28,1	26,4	25,9	26,0	26,3	26,6
Mañ.	20,4	22.1	22,3	21,6	21,8	20,4	21,1	22,1	21,4
AudquA.	18,0	15,0	17,5	17,1	16,1	18,7	18.2	15,1	16,3
·drqsM	10,4	3,2	9,4	6,4	9,1	7,6	8,0	6,6	8,0
Deppar.	3,2	-5,5	-4,4	1,0	0,3	-5,3	-1,3	3,4	-1,0
.адванК	2,1	8,69	-2,5	0,0	-4,5	-1,2	-2,6	1,6	-1,6
Годы на- блюденій,	Въ 1881 г.	- 1882	- 1883 -	- 1884	1885 -	- 1886	- 1887 -	- 1888 -	Средияя за 8 абтъ.

За эти-же годы, максимумы и минимумы температуры приходились въ слъдующіе мъсяцы:

1881 г. мах. 40,2° С. въ іюль; міп. —16,3° въ декабръ. 1882 г. — 38,2° — въ іюль; — —19,8° въ февраль. 1883 г. — 41,1° — въ іюнь; — —17,2° въ февраль. 1884 г. — 40,1° — въ іюль; — —16,5° въ январъ. 1885 г. — 37,8° — въ іюль; — —19,3° въ декабръ. 1886 г. — 38,4° — въ іюль; — —20,3° въ февраль. 1887 г. — 37,8° — въ іюль; — —15,5° въ февраль. 1887 г. — 37,8° — въ іюль; — —15,5° въ февраль. 1888 г. — 38,2° — въ іюль; — —16,7° въ декабръ.

Относительно температуры въ прочихъ городахъ Ферганы, у меня имъются свъденія только за 1882 г., указапныя въ слъдующей таблиць:

Таблица 3.

	За годъ.	Япварь.	Февраль.	Марть.	Aupere.	Май	Іюнь.	Ings.	ABrycrb.	Сентябрь.	Октибрь.	Ноябрь.	Декабрь.
Въ Кокандъ.	13,6	-5,5	-4,3	4,3	16,5	23,7	28, 1	28, 5	27,6	21,6	11,6	7,8	3,7
— Наманганъ .	13, 2	-5,7	-5,9	4,2	16, 1	22, 5	26,7	27,3	26,7	20,6	11,2	8,3	4,0
— Андижанъ .	_	-5,9	-4,8	3,4	15,4	22, 0	25,8	27,2	26,6	20, 3	10,2	-	
— Ошѣ	11,4	-3,0	-4,5	6,3	12,8	17,3	23,4	25,0	24,8	18,2	9,8	4,6	2,4
— Гульчв	7,8	-7,7	-7,6	0,9	9,9	14, 4	18,8	20, 2	21,8	15, 2	6,4	2,1	-0,2

Нужно замѣтить, что 1882 г. быль самый холодный; въ Н. Маргеланѣ средняя годовая температура равнялась только 12,9°—самая низшая въ теченіе 11-ти лътъ. Средняя тетпература въ январъ была—5,8°; въ февраль —5,20. Изъ этого можно заключить, что въ вышеупомянутыхъ городахъ, въ прочіе годы, бываетъ значительно теплъе, нежели показано въ этой таблицъ.

Максимумы температуры въ Н. Маргеланъ бывають б. ч. въ іюль; только въ 1883 г. случился въ іюнъ и это была самая высшая т-ра, изъ наблюдавшихся за вев годы. Минимумы приходились на декабрь и февраль, и только одинъ разъ на январь.

Что касается времени наступленія максимумовъ и минимумовъ температуры въ періодъ отдільныхъ сутокъ, то первые соотвътствуютъ около 2 часовъ по полудни, а послъдніе между 4 и 7 часами по полуночи.

Для горныхъ мъстностей, не только не опредълена Температура средняя годовая температура, но и вообще, по причинъ въ горахъ. малодоступности ихъ, кромъ лъта, климатъ здъшнихъ горъ почти не изслъдованъ. Имъются отрывочныя наблюденія путешественниковъ, отмѣчавшихъ температуру извъстныхъ мъстностей, при кратковременныхъ остановкахъ. Нъкоторыя изъ нихъ будутъ приведены ниже. В. И. Лисневскій бывая часто въ горахъ, по роду своихъ служебныхъ обязанностей и сообразуясь съ временемъ кочевокъ и откочевокъ киргизовъ, а также принимая во внимание свои записи въ путевыхъ дневникахъ, дълаетъ слъдующее опредъление климата горъ, окружающихъ Ферганскую долину. (1).

Зима на вершинахъ горъ отъ 7500 до 9000 ф. н. у. м. держится въ теченіе $6^{1}/_{2}$ місяцевь, съ половины октября до первой половины мая; весна съ половины мая до іюля; лъто-въ теченіе іюля до второй половины августа и осень-съ половины августа до по-

⁽¹⁾ Горные въса Ферганской области, В. И. Лисневскаго 1885 г. стр. 7.

ловины октября; но въ теченіе не только весны и осени, но и лъта, перемежающіеся заморозки и иней, а иногда сильные дожди и снъга, не составляють особен-

ной редкости.

На горахъ, приблизительно выше 9000 ф. весна наступаетъ нѣсколько позже—въ половинѣ іюня; лѣто можно считать въ теченіе около $1^{1}/_{2}$ мѣсяцевъ, съ 1 іюля по 20 августа; осень короче, чѣмъ на высотахъ предыдущаго пояса—съ 20 августа до половины сентября и зима—съ половины сентября до половины іюня (9 мѣсяцевъ);—но въ теченіе лѣта на этой высотѣ, на склонахъ горъ, обращенныхъ къ сѣверу и востоку, можно встрѣтить весьма часто массы неталаго снѣга отъ $3/_{4}$ до 2—3 арш. толщиною. Въ іюлѣ и началѣ августа можно встрѣтить пласты нестаявшаго снѣга въ видѣ фирновыхъ массъ до $1^{1}/_{2}$ аршина толщиною, на высотѣх сравнительно очень небольшихъ—иногда на высотѣ 3600—4000 ф. н. у. м.

На высотахъ отъ 3500 до 5500 ф. весна наступаетъ со второй половины февраля и продолжается до
мая; лѣто—съ начала мая до половины сентября; осень
съ половины сентября до половины ноября и зима съ
половины ноября до половины февраля, тогда какъ въ
долинъ Ферганы, лѣто можно считать въ теченіе пяти
мѣсяцевъ—съ половины апрѣля до половины сентября;
виму въ теченіе трехъ мѣсяцевъ—съ половины ноября
до половины февраля, а осень и весна, каждая порознь,
продолжаются въ теченіе двухъ мѣсяцевъ; первая съ
половины февраля до половины апрѣля, а вторая—съ
половины сентября до половины апрѣля, а вторая—съ
половины сентября до половины ноября. Выдаются иногда такія зимы, что онѣ скорѣе напоминаютъ собою
осень въ центрѣ Европейской Россіи; но за то въ го-

рахъ, онъ бываютъ очень суровы и напоминаютъ по-

лярныя страны.

Нижеслъдующая таблица, составленная по записямъ В. И. Лисневскаго, можеть дать нъкоторое понятіе о весенией и лътней температуръ горныхъ мъстностей, лежащихъ на различныхъ высотахъ.

Таблица 4.

Высота мѣстно-	По зап	исямъ 188	4 года.	По записямъ 1882 года.			
стей надъ уров- немъ моря въ фу-	Въ послъд- ней половинъ апръля.	Въ май съ 5 по 20 число	Въ іюль.	Въ послъд- ней половинъ августа.			
тахъ.	Утро. Пол- день. Ве- черъ.	Утро. Пол- день. Ве- черъ.	Утро Пол- день. Ве- черъ.	Утро. Пол- день. Ве- черъ.			
Отъ 1350 до 3500	Среди горъ съ мелкой кустар- пой раститель- ностью.	Среди горь, ли- шенныхъ куль- туры, на грани- цѣ Маргелан- скаго и Ошск. уѣзловъ.	Бъ горахъ ли-				
" 3500 " 5500	12,7 24,4 17,5	$7.1 \begin{vmatrix} (7) \\ 15, 1 \\ (^2) \end{vmatrix} 7,3$	20,7 30,0 21,2	12,0 27,0 -			
" 5500 " 7500	- - -	- 12,7 -	16,1 — 18,7	8,7 25,8 16,			
" 7500 " 9000	6,3 16,3 10,0	$- \begin{vmatrix} 6,5 \end{vmatrix} -$	16,0 26, 3 18, 7				
" 9000 и выше	- - -		$\begin{vmatrix} \binom{4}{1} \\ +2 \end{vmatrix}$ 22,5 5,6	- -1,2 18,8 10,			
4400.	Среди горъ въ ущельй куль- турномъ киш- лака Шахи- марданъ Мар- геланскаго укзда. 16,3 20,0 18,7						
		(1) На солнцѣдо ходило до 28,7° и. (2) На солнц до 15,0° п. (3) Въ полдень во время снѣ га при сѣвер номъ вѣтрѣ теми. опускал до1,3° ц.	, - -	. (4) При сввер выграночью с инеемъ теми опускается д6,2° ц. (3) При насмун погода темнер опус. до +11,5 ц., а въ ясну доходияа до 28,0° ц.			

Вообще климать Ферганскихъ горъ, какъ и въ другихъ странахъ, отличается не только значительными колебаніями температуры года, отдёльныхъ временъ года и дня и абсолютно меньшимъ содержаніемъ въ воздухъ влаги, но и сравнительно болье сильнымъ движеніемъ воздуха: утромъ при большемъ нагръваніи горъ, холодный воздухъ равнинъ поднимается по горъ; вечеромъже при охлажденіи вершинъ, холодный воздухъ спускается оттуда.

Кромѣ того, привожу еще нѣсколько замѣтокъ, по поводу температуры въ различныхъ горныхъ мѣстностяхъ.

Въ Шахи-Марданъ, на высотъ 4500 ф. 3 іюля, температура въ полдень, въ тъни=290 С.; въ полночь =150.

у ледника Щуровскаго, на высотъ 12,300 $\,^{\circ}$ б. въ 2 ч. дня, въ тъни было 26° С. а ночью О.

На Алав, въ іюль, дневная температура достигаеть до 25° С. а ночью нервдко падаеть ниже О и идеть сныть.

На Алав, на озерв Большомъ Кара-кулв, Капитанъ Путята замвтилъ, на высотв 13000 ф. 19 іюля 1883 г. передъ восходомъ солнца $+6^0$ С. въ полдень 18^0 , а послв заката 12^0 .

На урочищъ Сары-бель 20 іюня, передъ восходомъ $+4^0$ С. въ полдень 20^0 , послъ заката 10^0 .

На урочищѣ Кара-ташъ, близъ ледника, изъ котораго вытекаетъ Кшемышъ, на высотѣ около 10000 ф. я отмѣтилъ температуру 5 іюля 1883 г. въ тѣни: 4 часа утра 7° С., 12 ч. дня 19°,—5 ч. вечера, 15°, 7 ч. вечера 12°, въ 9 ч. вечера 10°.

На Большомъ Памиръ 4 августа, передъ восходомъ солица -2^0 С. въ полдень $+24^0$, послъ заката -2^0 .

Температура воздуха, подверженнаго двиствію пря- Наблюденія мыхъ солнечныхъ лучей, очень высока; въ степныхъ радгаціонмъстахъ она достигаетъ иногда 70° С., но правильныхъ метромъ. наблюденій нигдѣ не производилось.

Если принять въ разсчеть только среднюю темпе- Зависимость ратуру года, какую мы имвемъ въ Ферганской долинв, отъ различт. е. 13,90 С., то мы должны были-бы пользоваться ныхъ условій. климатомъ Италіи и южной Франціи; потому что въ Венеція средняя температура года=13,70, въ Монтпелье 13,60, въ Тулонъ 14,30 (1). Но велъдствіе непостоянства здъшней погоды, быстро мъняющейся и переходящей отъ одной крайности къ другой, климатъ Ферганы далеко отстоить отъ Италіанскаго. Въ отношеніи скачковъ соперничають не одни максимумы и минимумы, но также и среднія величины. Это въ особенности относится къ зимнимъ мъсяцамъ. Послъ ряда зимъ, настолько теплыхъ, что онъ и не заслуживаютъ этого названія, такъ какъ характеризуются лишь слякотью и грязью, -- настунають ужасныя стужи, иногда въ теченіе двухъ місяцевъ, въ которые морозы доходять 17-190 С. Такія зимы были, съ 1877 на 1878 г. и съ 1881 на 1882 г., которыя стубили многочисленныя фруктовыя деревья и виноградныя лозы. Точно также нашу долину, по климатическимъ условіямъ, нельзя сравнивать съ европейскими странами, лежащими подъ той же широтою.

Ферганская долина лежитъ между 40 и 41°. С. Ш. Слъдовательно подъ той же, подъ которой находятся: Мадритъ, Римъ, Неаполь; но въ климатъ она разнится

⁽¹⁾ Медицинская Географія Ж. Будена. Т. І. стр. 246.

отъ этихъ городовъ, въ виду того, что температура мъстности зависить не только отъ широты ея, но и отъ географической долготы. Одна изъ главныхъ причинъ такого пониженія температуры, по мірт приближенія къ восточнымъ предъламъ стараго свъта, зависитъ безъ сомнанія отъ дайствія гольфетрима и югозападныхъ ватровъ, которые сообща повышаютъ зимнюю температуру береговъ западной Европы. Сверхъ того послъдніе нагоняютъ массу облаковъ, которыхъ теплотворное дъйствіе необходимо уменьшается въ той мёрт, какъ они

удаляются отъ мъста ихъ образованія.

Климатъ горъ, окружающихъ Ферганскую долину, зависить не только отъ географической широты и долготы, а подчиняется вліянію высоты. Чамъ выше мастность надъ уровнемъ океана, тъмъ ниже тамъ температура. Законъ пониженія температуры до крайнихъ предъловъ еще не открытъ; но для горъ принимаютъ, что въ общей сложности температура понижается на 10 С., съ каждыми 166 метрами, или 544 футами. На это имъетъ вліяніе не только степень удаленія отъ поверхности океана, но и напряжение солнечныхъ лучей, зависящее отъ плотности воздуха, а также и самое выдъленіе лучистаго теплорода, болъе удобное въ атмосферъ чистой, холодной и сухой. При этомъ имъетъ значение и широта географическая. По словамъ Гумбольдта, между 38 и 710 Ш. возвышение на 78 до 85 метровъ, соотвътствуетъ перемъщенію на 10 широты къ съверу. Уменьшение температуры при поднятій на высоты разнится тоже по временамъ года и часамъ дня. Лътомъ, извъстное понижение температуры по мірт возвышенія, происходить гораздо быстріве, чёмъ зимою; средняя цифра зимы тёмъ более подходить къ лътней, чъмъ выше мы поднимаемся. Эти цифры пониженія температуры при поднятіи вычислены для многихъ горъ въ Европѣ и на Кавказѣ, но для Ферганскихъ высотъ, кажется, никѣмъ не были опредѣлены, по крайней мѣрѣ мнѣ не приходилось встрѣчать.

Пониженіе температуры, по мітрів возвышенія мітетностей, имітеть весьма важное значеніе въ метеорологіи и въ медицинской географіи, потому что имітеть связь съ гипотезами, на которых основаны вычисленія высоть атмосферы, распреділеніе органических существи и ихъ физіологическія и патологическія проявленія.

Кром'в извъстнаго повышенія мъстности н. у. м., на понижение температуры въ нашей странъ вліяетъ близость снѣговъ и глетчеровъ, охлаждающихъ въ извѣстпой степени атмосферу. Последніе вліяють и на пониженіе температуры въ Ферганской долинъ, въ особенности ночью, когда воздушные потоки притекають съ горъ книзу и приносять прохладу, послъ удушающаго дневнаго зноя. Въ горахъ, окаймляющихъ нашу долину съ съвера, пътъ большихъ глетчеровъ, а снъговыя залежи, въ срединъ лъта, большею частью исчезають; тогда какъ въ Алайскихъ горахъ многочисленные ледники и мощныя залежи сибга существують постоянно. Въ виду этого въ Наманганъ, въ теченіе лъта бывають удушливыя ночи, а въ Новомъ-Маргеланъ во все лъто выдадутся развѣ двѣ, три таковыхъ; а то обыкновенно ночная температура весьма пріятная. Быть можеть на температуру ночей вліяеть и то обстоятельство, что Наманганъ находится противъ южнаго склона горъ, которыя въ течение дня накаливаются сильнъе, нежели съверный склонъ Алайскаго хребта, противъ котораго расположенъ Новый Маргеланъ. Но такъ какъ разстояніе обоихъ городовъ отъ горъ довольно значительное, то скорѣе эту разницу слѣдуетъ отнести къ ночнымъ воздушнымъ потокамъ, которые въ Маргеланѣ идутъ съ ледниковыхъ и снѣжныхъ горъ.

Вообще близость высокихъ сиѣжныхъ горъ охлаждаетъ годовую температуру Ферганской долины. Лѣтомъ, а въ особенности осенью, когда въ долинѣ идетъ дождь, а въ горахъ, въ тоже время—снѣгъ, то температура въ долинѣ быстро понижается на нѣсколько градусовъ.

Окружающія нашу долину горы защищають ее оть стороннихь вліяній. Съ сввера она защищена оть свверныхь вѣтровъ, съ юга отъ южныхъ. А потому на сколько свверныя горы противодѣйствують пониженію температуры, на столько южныя препятствують къ повышенію ея. Словомъ, на климать въ Ферганской области главнымъ образомъ вліяеть орографическое положеніе, которое, отличаясь крайнимъ разнообразіемъ, способствуеть чрезвычайному разнообразію и противоположностямъ климатическихъ условій этой страны.

Эти-то до крайности ръзкіе переходы отъ лѣтняго зноя къ ночному холоду и дѣлаютъ то, что въ Ферганъ преобладаютъ надъ всѣми только двѣ группы болѣзней: малярійныя въ теплое время и катаррально-ревматическія въ теченіе всего года; значитъ и въ теплое время, когда ихъ въ другихъ мѣстахъ бываетъ меньше всего. Это зависитъ отъ того, что лѣтомъ, когда человѣкъ распарится деннымъ зноемъ, его охватываетъ ночью холодный вѣтеръ съ горъ, вслѣдствіе чего онъ простуживается.

Осенью, когда денная температура еще очень высока, а ночи становятся уже холодными, лихорадки и

кровавые поносы значительно ожесточаются. Фергана въ этомъ отношеніи не составляеть исключенія, потому что подобныя забольванія, при такихъ же условіяхъ, наблюдаются вообще въ жаркихъ странахъ. Въ Алжиріи дизентерія господствуетъ главнымъ образомъ, какъ и у насъ, во время жаркихъ мѣсяцевъ, т. е. тогда, когда солдаты подвергаются вліянію температуры въ 50° и даже 60° на солнцѣ и въ тоже время ночью выносятъ температуру, которая самое большее равняется 15°. (Л Лаверанъ, Камбей). Эти сильныя колебанія температуры составляютъ одну изъ главныхъ причинъ дизентеріи. Тѣ же самыя причины оказываются и въ Индіи, гдѣ тоже сильно страдають отъ дизентеріи (Аннеслей, Моргидъ).

На годовую температуру мъста оказываютъ вліяніе гидрографическія условія края; но въ Ферганъ мало такихъ значительныхъ водовиъстилищъ, которыя моглибы повліять на здішній климать. Едипственное большое озеро Каракуль на Памиръ находится на такой громадной высоть (13000 ф.), что оно не можеть имъть никакого отношенія къ климату Ферганской долины. Но за то присутствие многихъ небольшихъ озеръ, болотъ и ръкъ, а главнымъ образомъ ирригаціонныхъ системъ непремвино способствуетъ умвренію лютняго зноя, въ силу постояннаго испаренія. Въ центръ Нов. Маргелана льтомъ термометръ показываеть обыкновенно меньшее число градусовъ тепла, нежели на метеорологической станціи, находящейся на окраинъ города, въ мъстности открытой и весьма слабо орошенной. Горныя ръчки въ особенности освъжаютъ воздухъ, вслъдствіе весьма низкой температуры воды. Любимое мъстопребываніе туземцевъ-возл'в пруда или нацъ арыкомъ,

подъ тънистымъ деревомъ; для этого ставится громадныхъ размъровъ кровать черезъ арыкъ, въ видъ моста, на которой они лежатъ и спятъ днемъ и ночью. Протекающая подъ кроватью вода умъряетъ какъ дневной зной, такъ и ночную духоту.

Замерзающія болота и озера своимъ льдомъ задерживаютъ развитіе весенней теплоты, вслёдствіе чего, возлѣ этихъ водовмъстилищъ, весна начинается позже.

Въ мъстахъ, покрытыхъ богатою древесною растительностью умъряется и льтній зной, и зимній холодъ. Деревья служать естественными проводниками влаги изъ почвы, потому что онв выпускають посредствомь листьевъ въ атмосферу воду, всосанную корнями изъ подземныхъ водохранилищъ и которую дерево не усвоило себъ и не разложило. Слъдовательно, лъса и сады противодъйствують образованію болоть и способствують осущенію почвы; а вм'єсть съ этимъ сообщають атмосферъ нужное количество влаги, такъ какъ листва въ теченіе льта представляеть огромную поверхность испаренія, которая тёмъ больше, чёмъ гуще и вётвистёе деревья. По этому у насъ въ долинъ, въ большихъ садахъ, воздухъ долженъ охлаждаться при одномъ такомъ постоянномъ и обширномъ испареніи, не говоря уже о твии, которую дають густыя деревья, какъ напр. кайрагачи, тополи, ивы, оръховыя и прочія деревья. Кромъ того, деревья своею листвою увеличиваютъ поверхность, черезъ которую почью выдъляется лучистый теплородъ. Замвчено, что лесистое место, при всехъ равныхъ другихъ условіяхъ, становится отъ 4-70 холодиве мъстъ лишенныхъ растительности. Деревья имбютъ вліяніе на здоровость мъстности и тогда, когда находятся на нути воздушнаго тока, на полненнаго міазмами, тогда они

предохраняють мѣстность, лежащую позади ихъ, между тѣмъ какъ открытая мѣстность подвергается вліянію

болъзнетворныхъ началъ.

Наконець, деревья играють роль громоотводовъ. Истребленіе лісовь равносильно уничтоженію такого числа громоотводовь, сколько было срублено деревьевь; оть этого изміняется электрическое состояніе цілаго края и одна изъ стихій, необходимыхъ для образованія града, скопляется въ містности, гді прежде она неминуемо разсівевалась отъ незамітнаго, но безпрерывнаго дійствія деревьевь. Эти теоретическіе выводы подтверждаются многочисленными наблюденіями.

Соображая годовую температуру мёстности, слё- Температура дуетъ имёть въ виду и удобонагрёваемость почвы. Песокъ и черноземъ нагрёваются легко и скоро остываетъ, а глина на оборотъ очень туго пагрёвается, но за то и медленно остываетъ. Точно также и всякая каменная порода нагрёвается и остываетъ тёмъ легче, чёмъ меньше она содержитъ глины. Оттого въ нашей долинѣ, среди глинистаго мергеля, въ теченіе лёта, какъ утромъ, такъ вечеромъ и ночью бываетъ жарко, потому что эта почва, разъ накалившись, не скоро остываетъ.

Изъ произведенныхъ А. Ф. Миддендорфомъ въ Маргеланъ измъреній температуры почвы оказалось, что уже въ мартъ и апрълъ, температура достигаетъ 10—150 на глубинъ одного фута и обнаруживаетъ меньшія колебанія; тогда какъ термометръ, лежащій на поверхности почвы, слъдуя ва температурой воздуха, уже въ срединъ марта нагръвается до 310 въ часъ по полудни, а 10 апръля поднялся до 320. Въ самое жаркое время сухая лёссовая почва нагръвается до 700 С. Въ таблицъ 5 показаны наблюденія надъ температурой почвы

въ Новомъ Маргеланъ за весь годъ. Наблюденія за прочіе года весьма сходны съ этими и разница самая пичтожная.

Еще имъются два условія, хотя не столь постоянныя и болье измънчивыя, но тьмъ не менье, оказывающія значительное вліяніе на измъненіе температуры,— это состояніе неба и вътры.

Состояніе Ясное небо ділаеть день жаркимь, а почь холоднеба и ною. Літо тімь жарче, чімь больше ясныхь дней, а осадки. зима тімь холодніве, чімь ясніве погода.

Читая описанія здішняго края, встрівчаємь выраженія: "постоянно ясное, безоблачное среднеазіатское небо характеризуєть літнюю половину года". Но подобная безоблачность и бездождье нерідко нарушаются. Приходится наблюдать и небо, заволоченное тучами, и дожди среди літа, хотя послідніе въ это время составляють исключенія. Наибольшее количество атмосферныхь осадковъ всегда приходится на горы. Дожди и грозы большею частью бывають по окрайнамь долины, а весною, т. е. въ марті и апрілі, въ гористыхъ містахъ составляють чуть-ли не повседневное явленіе. Въ горахъ наименьшее количество осадковъ приходится обыкновенно на іюль и августь, а въ долині, послі теплыхъ безсніжныхъ зимъ на май, іюнь, іюль, августь, сентябрь, иногда даже и октябрь.

Ливни съ грозою вовсе не ръдкость въ теченіе всего льта, въ горахъ, окаймляющихъ долину; отъ нихъ часто происходятъ опустошительные сили, о которыхъ было сказано, при обзоръ гидрографіи Ферганы.

Зимніе дожди въ мѣстностяхъ, окаймляющихъ долину, распространяются и на послѣднюю; весенніе-же дождибывають въ долинѣ уже гораздо рѣже, нежели въ предгорьяхъ.

Таблица 5.
Наблюденія почвенных термометрова въ 1884 г. на
Маргеланской метеорологической станціи.

43447

	mapi	Chan	mor	T IN	CIC	op	3310	L XI.	100.	LUL		таг	1141	и.		
	3,0.	1.		+13,8	9,6 +12,4	9,7 +11,8	+12,3	+14,3	+19,7 + 16,3	+18.4	+20,0	+20,6	+20,1	+18,2	+16,0	+16,3 $+16,5$ $+16,4$ $+16,2$
Ъ.	1,6.	1.		+10,3 +13,	+		+12,4	+16,5	+19,7	+22,4	+23,5	+23,3	+20,3	+16,5	+12,6	+16,4
×	0,8.	Т		+ 6,4	+ 6,7	+ 8,8 +	+14,4	+19,6	+24,2	+26,4	+26,2	+24,4	+18.7	9.1 +12,7 +16,5 +18,2	5,1 + 8,3 +12,6 +16,0	+16,5
PA		Сред-		+ 3, 2+	+ 4,7+	+ 7,8+	+17,1	+25,5	+87,7	+29,2	+28,0	9 +24,6 +24,4	+16,8		+ 5,1	+16,3
ETPAX	4.	Сумма.		3,5 + 3,5 + 10,6 +	+14,2+	7,8 +23,4+	+16.9 +17.1 +51.2 +17.1 +14.4	+22,2 +66,7 +22,2 +19,6 +16,5	75,9 +25,8 +27,9 +27,5 +27,6 +83,0 +27,7 +24,2	91,9 +30,6 +29,4 +29,1 +29,1 +87,6 +29,2 +26,4 +22,4 +18.4	84,7 +28,2 +28,2 +27,9 +27,8 +83,9 +28,0 +26,2 +23,5 +20,0	+73,	38, 3 +12, 8 +17, 0 +16, 8 +16, 7 +50, 5 +16, 8 +18, 7 +20, 3 +20, 1	9,2+9,1+8,9+27,2+	4,6+1,5+5,2+5,1+5,0+15,3+	1
M	0,	9.		+ 3,5	4,7 + 4,7	7,7 + 7,8	+17,1	+25,2	5 +27,6	+29,1	1+27,8	66,2 +22,1 +24,9 +24,6 +24,4	3+16,7	+ 8,8	1 + 5,0	+14,5 $+16,5$ $+16,3$ $+16,2$
Ъ	0	I.				7,9 + 7,7	+16,8	1 + 22, 1	+27,8	+29,1	2 +27,8	+24,6	1+16,8	2 + 9,1	2 + 5,1	5 +16,8
D D	2 721112	7.		0,4+0,1+3,6+	1,3 + 4,8 +	7,3 + 7,8	56,9 +19,0 +17,2	71,1 +23,7 +22,4	457,8	3 +29,4	+28,5	+24,8	8 +17,0	2,3 + 9,2	+ 5,5	+16,
H F	и.	Сред-		+ 0,1	4,0 + 1,8		+19,0	+23,7	+25,8	+30,6	+28,2	+22,1	+12,8	9+2,8	1,8	+14,8
5 M	хност	Сумма.		1,5 + 0,4	EU:	+ 6,12	4 56,8			11.3		0.0		6,	213	1
глуви	На поверхности	9.		1	7-1,4	7 + 4,1	+13,	8+11,8	+24,5 +34,1 +17,8	+24,2 $+44,0$ $+28,7$	+21,1 +43,5 +20,1	7+14,5	1+6,0	1 - 0,0	1 - 2,8	1+ 9,2
L J	Ha 1	i		2,8 + 4,7	2,3 + 7,7	1+15,7	+12,3 +31,2	+19,5 +33,8	5+34,	2 +44,0	1+43,	+14,0 +37,7	4,9 +27,4	2,6 +10,4	4,0+11,4	9, 2 +25, 1 +
4		7.	ent.	1 2,8	- 2,8	+ 2,1	+12,	-0		+24,	Part of the last	+14,	+ 4,9	- 2,	- 4,0	+
H	Мѣсяцы.			Январь	Февраль	Марть	Amptas	й	411	41	Августь	Сентябуь .	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Среднее.
mulk i	M		V Carrie	AE S	Фел	Ma	AII	Mañ .	Іюнь	Inde	AB	Cei	CK	H ₀	Ler	Cp

Явленіе довольно характеристичное, что въ долинъ не бываеть росы, хотя тоже не безусловно; по окраинамъ-же долины, въ предгорьяхъ и горахъ появляется обильная роса.

Градъ.

Градъ какъ въ долинъ, такъ и въ предгорьяхъ и даже на высотахъ между 4500 и 7500 фут. составляетъ ежегодное явленіе, весьма вредное для земледълія и скотоводства, такъ какъ уничтожаетъ разные посъвы и неръдко убиваетъ не только мелкій, но и болье крупный скотъ. Отъ градобитія страдаютъ всъ увзды, но въ особенности подвержены этому бъдствію Наманганскій и бывшій Чустскій.

CHEFT.

Снъту въ долинъ бываетъ мало. Ръдко выдаются вимы, въ теченіе которыхъ выпадаетъ снътъ и держиться двъ, три недъли, такъ что можно тадить на саняхъ. Обыкновенно онъ полежитъ два три дня и затъмъ растаетъ. Въ горахъ онъ выпадаетъ въ громадномъ количествъ и горные проходы бываютъ завалены толщею снъта въ нъсколько саженъ; вслъдствіе чего, многіе изъ нихъ бываютъ непроходимы до средины лъта. Неръдко въ горахъ случаются снъжные обвалы, подъ которыми погибаютъ не только одинокіе путники, но и цълые караваны.

Время выпаденія и таянія снъга въ горахъ весьма различное, смотря по высотъ мъстности. Полное таяніе на горахъ выше 9000 ф. прекращается въ концъ іюня. На высотъ приблизительно 9500 ф., въ лощинахъ, защищенныхъ отъ сухихъ западныхъ и югозападныхъ вътровъ, слъдовательно въ подвътренныхъ сторонахъ, обращенныхъ на востокъ, снъгъ продолжаетъ лежать до наступленія зимы, въ видъ незначительныхъ по площади фирновыхъ массъ, толщиною въ 1—21/2 аршинъ.

На Алав сивгъ сходить весьма быстро и въ мав его уже нътъ, хотя зимою снъга бывають весьма глубокіе. Неръдко случается среди льта, что температура въ полдень болъе 200 въ тъни, а ночью пойдеть снъгъ, который по утру, когда пригрѣетъ солнце весь растаетъ.

Въ Алайскомъ хребтъ, снъжная линія находится на высотв 14000 футовъ и въ мъстностяхъ выше ея сибгъ лежитъ постоянно. Въ съверномъ хребтъ, на высотъ 10000 футовъ, снъгъ сходитъ не ранъе конца апръля, а снова начинаетъ выпадать съ половины сентября и окончательно ложится въ концъ октября. Какъ бы ни была тепла зима въ долинъ, въ горахъ нижняя предъльная линія снъга всегда лежить не выше 5-6 тысячь футовъ.

Въ долинъ, какъ уже было сказано, время вынаденія ситга и продолжительность его лежанія, подвержены безконечнымъ колебаніямъ. 20-го октября 1886 года въ Новомъ Маргеланъ выпаль весьма глубокій снъгь и пролежалъ однъ сутки; такого ранняго выпаденія не запомнять туземцы. Со времени занятія Ферганы Русскими, самое раннее выпаденіе снъга было 4 ноября, который конечно пролежалъ недолго. Въ 1889 г. съ 18 на 19 октября тоже шель снъгъ, но онъ сейчасъ разстаяль; за то 22 декабря того-же года, я быль застигнутъ въ Махрамъ настоящимъ снъжнымъ бураномъ, продержавшимъ меня на станціи цёлыя сутки.

Годовое количество осадковъ въ Ферганской долинъ количество весьма незначительное. На основании наблюдений на осадновъ. Нов. Маргеланской метеорологической станціи за послъдніе 8 льтъ, осадки въ среднемъ равняются 137,5 миллиметровъ въ годъ. Мах. въ 1886 г. = 191,9 и тіп.

въ 1884 г. = 86,3 миллим. въ годъ, какъ это видно изъ таблицы 7.

Такое-же приблизительно количество осадковъ и въ другихъ городахъ, за исключеніемъ Оша, который можетъ быть отнесенъ къ предгорьямъ; но точныхъ цифръ, относительно прочихъ мъстностей за тъ-же года у меня нътъ. Имъются только вычисленія за 1882 г., изъ которыхъ видно, что годовое количество осадковъ въ миллиметрахъ равнялось: въ Кокандъ 87,9;—въ Наманганъ 155,6;—въ Ошъ 382,5;—въ Гульчъ 539,7.

Незначительное количество осадковъ въ долинъ зависитъ отъ топографическаго и орографическаго ен положенія. Западные вътры, которые въ Средней Азіи одни только и приносятъ влагу, прежде чъмъ попасть въ Ферганскую долину, должны переброситься черезъ высокіе кряжи горъ, при чемъ освобождаются отъ значительнаго количества водяныхъ паровъ, какъ въ горахъ, такъ и предгорьяхъ, а на долю долины ничего и не остается. Доказательствомъ этому служатъ Ташкентъ и Самаркандъ, которые, не будучи такъ окружены горами, получаютъ осадковъ значительно больше противъ Маргелана и Коканда, а именно: въ 1882 г. въ Ташкентъ было 357,8, а въ Самаркандъ 350,1 миллиметровъ (1).

Испареніе.

Испареніе и сила испаренія зависять отъ давленія воздуха, температуры, влажности, облачности, количества осадковъ и вътровъ. Нижеслъдующая таблица показываетъ количество испареній въ миллиметрахъ, за 3 послъдпіе года, по мъсяцамъ, по наблюденіямъ на Маргеланской метеорологической станціи.

⁽⁴⁾ Летописи Главной Физической обсерваторіи за 1882 г.

Таблица 6.

	188	6 г.	188	7 г.	1888	r.
	Сумма.	Сред.	Сумма.	Сред.	Сумма.	Сред.
Январь .	9,6	0,3	15,2	0,5	21,9	0,7
Февраль .	8,9	0,3	15,0	0,5	31,1	1,1
Мартъ	35,1	1,1	44,7	1,4	51,9	1,7
Апръль .	67,5	2,2	100,4	3,3	98,5	3,2
Май	145,6	4,7	156,8	5,0	162,9	5,2
Іюнь	178,5	5,95	199,4	6,5	217,4	7,2
Іюль	219,3	7,1	204,3	6,6	268,3	8,6
Августъ .	198,0	6,4	207,5	6,7	243,2	7,8
Сентябрь.	127,2	4,2	132,7	4,4	146,5	4,9
Октябрь .	81,6	2,6	87,1	2,8	117,3	3,8
Ноябрь .	29,6	0,99	52,0	1,7	40,1	1,3
Декабрь .	17,3	0,55	16,8	0,5	17,6	0,6
Въ годъ.	1118,2	3,0	1230,7	3,3	1414,0	3,8

Въ Ферганской долинъ, подверженной засухъ, но къ тому-же и сильпо орошенной, должны обнаруживаться

контрасты тъмъ явственнъе, что нътъ недостатка въ высокой температуръ, которая усиливаетъ вліяніе относительной влажности на абсолютную величину прироста, или убыли испаренія. Западные вътры, дующіе изъ сухихъ степей, въ виду большой ихъ силы, чрезвычайно и внезапно увеличиваютъ испареніе. Иногда, надъ орошаемыми полями появляется бъловатая дымка, указывающая на водяные пары. Въ городахъ, послъ заката солнца, часто бываютъ туманы, вслъдствіе чего становится весьма сыро.

Испаренія въ Ферган'в начинають усиливаться съ апр'вля до іюля или августа, когда они равны максимуму, настолько, что достигають значительной годовой амплитуды. Зимою въ январ'в и феврал'в испаренія представляють минимумъ, а атмосферные осадки превосхо-

дять количество испаряющейся воды.

При восхожденіи со дна котловины къ краямъ ея обнаруживаются уклоненія въ испареніи, въ особенности-же въ отношеніи количества испаряющейся влаги къ количеству атмосферныхъ осадковъ. Въ горной полосѣ и предгорьяхъ росы обильны. По рѣчнымъ долинамъ и по склонамъ окружающихъ горъ, испаренія сгущаются тутъ-же въ цѣлыя облака, которыя и поднимаются кверху или стелятся по горизонтали.

Сравнивая количество испаренія воды съ количествомь осадковь въ Маргелань, (табл. 6 и 7), легко замітить несоразмірность между получаемой и отдаваємой жидкостью. Въ виду этого слідовало-бы ожидать чрезмірной сухости воздуха; но на самомъ ділів этого не бываеть, какъ видно изъ приложенныхъ наблюденій объ относительной влажности. И въ самомъ ділів, при чемъ туть ничтожное количество влаги, получаемое атмосфер-

ными осадками, когда ее имѣется въ изобиліи, благодаря оросительной сѣти, покрывающей культурныя мѣстности. Въ мѣстахъ безводныхъ, песчанистыхъ, гдѣ нѣтъ никакой растительности, сухость воздуха дѣйствительно поразительна и она ощущается людьми весьма явственно, помимо всякихъ гигроскопическихъ наблюденій.

Цифры относительной влажности, показанныя въ табл. 7, по моему, ниже настоящихъ, т. е. ниже тъхъ. какія получились-бы въ центръ города, въ населенной и засаженной деревьями мъстности, покрытой сътью мелкихъ арыковъ. Наблюденія производились при лазареть на возвышенной и открытой мъстности, неорошаемой и лишенной растительности; а подобныя условія, какъ извъстно, не остаются безъ вліянія на уменьшеніе влажности воздуха. Въ доказательство сказаннаго, могу привести указаніе на подобный-же фактъ въ Ташкентв, отмвченный Д-ромъ И. Яворскимъ (1). Въ этомъ городъ производились въ 1882 г. наблюденія въ астрономической обсерваторіи и въ учительской семинаріи. Между обоими пунктами разстояніе около 3-хъ версть, причемъ обсерваторія находится на стверо-восточной окраинт города, въ мъстности слабо заселенной, негусто засаженной деревьями, болье возвышенной (на нъсколько метровъ), чъмъ городъ. Невдалекъ отъ холма, на которомъ помъщается обсерваторія, протекаеть довольно многоводный каналь Саларъ, но мелкая оросительная съть здъсь слабо развита. Семинарія, напротивъ, расположена въ центръ города, въ лощинъ; съ NW стороны къ ней примыкаетъ довольно обширная площадь, съ S-молодой городской садъ. Во дворъ семинаріи находится тънистый садъ; мелкая оросительная съть развита очень хорошо. Наблюденія

^{(&#}x27;) Опыть медицинской географіи и статистики Туркестана. Ч. І. И. Яворскаго. 1889 г. стр. 85.

показали: на первой станціи (обсерваторіи) годовую относительную влажность 57, съ минимумомъ въ 11, на второй-же годовую 65 и наименьшую 17. Разница довольно замѣтная. Еще большая разница въ этомъ отношеніи замѣчается между обсерваторією и городскою дабораторією; послѣдняя находится въ еще болѣе населенной и засаженной деревьями мѣстности, съ еще болѣе развитою сѣтью мелкихъ оросительныхъ каналовъ, чѣмъ семинарія. Для этихъ станцій мы имѣемъ:

Зима. Весна. Лето. Осень. Годъ.

 Лабораторія.
 76.
 67.
 55.
 65.
 66.

 Обсерваторія.
 64.
 61.
 41.
 46.
 53.

Абсолютная влажность на объихъ городскихъ станціяхъ также больше, чъмъ на обсерваторіи; такъ мы имъемъ среднюю годовую за 1882 г. для лабораторіи 7,5,—для семинаріи 7,7,—а для обсерваторіи лишь 6,6.

Несоотвътственность между осадками и испареніемъ присуща не одной только Ферганъ. Большая часть Средней Азіи находится въ такомъ-же ненормальномъ положеніи, гдъ почва и нижніе слои воздуха получаютъ изъ атмосферы мало, а отдаютъ много.

Этотъ вопросъ, точно также какъ и другіе, относящіеся до климата Туркестанскаго края, насколько возможно подробно разобраны Д-ромъ И. Яворскимъ и изложены въ недавно вышедшемъ его сочиненіи (1).

Въ таблицъ 7 показаны среднія цифры за 8 лѣтъ въ Новомъ Маргеланъ: 1) абсолютной и относительной влажности, 2) осадковъ, 3) числа дней съ осадками, ясныхъ, пасмурныхъ и т. д. Цифры эти заимствованы изъ Маргеланской метеорологической станціи, находящейся при Маргеланскомъ мъстномъ лазаретъ.

⁽¹⁾ loc. cit.

Таблица 7.

					100				-
	Lypa.	22	27	28	17	13	22	14	40
дней.	Пасмурн	06	97	77	113	120	134	123	132
	Асныхъ.	130	129	149	129	110	80	103	100
Число	Pposm.	80	16	111	9	11	14	Ξ	10
Чис	Снътъ.	6	6	7	10	13	19	14	6
	Осадки	49	54	45	40	54	54	58	22
	Максии.	16,1	19,8	37,0	12,6	10,0	20,1	15, 5	17,7
Осадки.	Сумия	149,2	150,2	128,5	86,3	126,9	191,9	132,9	184,2
.115.	6	4,2	4,1	3,9	4,5	4,6			
Облачность.	-	4,7	4,6	4,2	4,8	5,4			
r 90	2	4,8	4,8	4,0	5.0	5,7			
MILITER	амуминиМ	15	16	13	14	13	22	19	15
ывая ть.	Средняя	63	63	58	55	49	64	59	61
Относительная влажность.	6	, 69	02	65	19	54	70	65	67
Относ		49	48	42	40	37	20	44	44
	2	11	11	99	63	57	73	89	11
1	Средняя	7,8	7,3	6,7	6,4	5,8	7,7	7,3	7,4
ютна;	6	7,7	7,3	6,7	6,4	5,8	7,6	7,3	7,4
Абсолютиая влажность.	-	8,2	2,6	6,7	9'9	5,8	8,0	7,5	7,4
-	2	7,6	7,1	9,9	6,3	5,9	7,5	7,2	7,3
i						,:		0.00	
года.		1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888

Вътры.

Термическія условія находятся въ большой и постоянной зависимости отъ вътровъ. Каждый вътеръ непремънно, или повышаетъ, или понижаетъ температуру мъста. Фергана, будучи небольшой долиной, окруженной глубокими ущельями, лежащими иногда на значительной высоть, подвержена дъйствію внезапно поднимающихся порывистыхъ вътровъ, тъмъ сильнъе, чъмъ значительнъе разница между температурами въ глубинъ котловины и на высотахъ. Иногда при великолъпной и тихой погодъ мъстность вдругъ помрачится: поднимается буря и вътеръ съ такою силою швыряетъ крупный песокъ въ лицо, что нътъ возможности идти или ъхать. По окрайнъ долины такіе порывистые вътры наскакиваютъ съ разныхъ сторонъ, потому что тамъ воздушные потоки днемъ поднимаются въ гору, а ночью притекаютъ книзу и приносять прохладу. Такія холодныя теченія спускаются по всей окружности долины, следовательно съ различныхъ и противоположныхъ странъ свъта. На направленіе этихъ теченій им'єтъ важное вліяніе орографическій характеръ края. Горы, предгорья, ущелья и т. п. отклоняють первоначальное направление вътровъ.

На див долины преобладаеть западный и юго-западный вътеръ. Уже Султанъ Баберъ писалъ, что у входа въ долину, въ степи Ха-Дервишъ, всегда дуетъ ръзкій вътеръ по направленію къ Маргелану. Этотъ-же западный вътеръ дуетъ и на большихъ высотахъ въ долинъ Алая. Этотъ вътеръ дуетъ большею частью, по ночамъ и въ нъкоторые годы замъчалась весьма правильная періодичность. Но иногда онъ дуетъ съ такою неимовърною силою, что ломаетъ въковыя деревья, разворачиваетъ заборы, срываетъ желъзныя крыши и т. п.

Въ Бухаръ и далъе до 360 ш. къ югу, при боль-Гармъ-силь. шомъ безвътріи и подавляющей духоть, обыкновенно въ предполуденные часы, поднимается разслабляющій южный вътеръ, который переходить и въ Фергану, превращаясь здёсь въ Ю. З. Этотъ вътеръ называется туземцами Гармъ-силь, вредное вліяніе котораго отражается на людяхъ и животныхъ, а въ особенности на мъстной растительности. Время его конець іюня, іюль и начало августа. Напряженность его небольшая; токъ воздуха идеть въ самыхъ низкихъ слояхъ. Изъ растеній въ особенности страдаеть отъ него рись, нотому что Гармъсиль застаеть его между началомъ цвътенія и концемъ наливанія вернъ. Если температура Гармъ-силя высока, то достаточно нескольких часовь, чтобы убить рись и другія растенія. Онъ губить рись не тімь, что ломаетъ стебли и обрываетъ листья и колоски-все остается въ цълости, но растенія желтьють, иногда красивють, словно они обожжены горячимъ дыханіемъ пахнувшаго на нихъ вътра. Отъ зеренъ остается одна шелуха.

Туземцы увъряють, что Гармъ-силь дъйствуеть вредно также на ячмень, пшеницу, дыни и на плоды

винограда, урюка и тута.

На человъка онъ дъйствуетъ крайне разслабляющимъ образомъ и, по словамъ туземцевъ, вызываетъ параличи. Въ 1884 году въ началъ іюля въ Наманскомъ уъздъ бывшій Гармъ-силь вызвалъ между жительми до 50 различныхъ параличей. Въ русской части города въ тоже время собака получила лъвостороннее искривленіе шеи и этотъ параличъ держался больше года безъ всякаго улучшенія. Гармъ-силь въ особенности дъйствуетъ пагубно, если человъкъ подвергается непосредственному его дъйствію; а потому туземцы, застигну-

тые имъ въ открытой мъстности, не смотря на жару и духоту, закутываются съ головою въ халатъ или одъяло и такимъ только образомъ спасаются отъ вреднаго его вліянія.

По словамъ туземцевъ Гармъ-силь обладаетъ особымъ непріятнымъ запахомъ, который они сравниваютъ съ запахомъ болотныхъ испареній.

Пыльные ту» маны. Особенность Ферганы—это сухіе пыльные туманы, бывающіе здѣсь во второй половинѣ весны, лѣтомъ и въ первой половинѣ осени. Этотъ пыльный туманъ, по мнѣнію А. ф. Миддендорфа находится въ непосредственной связи съ воздушными потоками (courant ascendant), поднимающимися повсюду надъ чрезмѣрно нагрѣтымъ континентомъ.

Въ жаркое время года эта пыль замътно явственные въ открытой степи въ видъ пыльнаго смерча. Въ особенности, въ полуденные часы знойныхъ мъсяцевъ, повсюду въ степи поднимается одинъ вихрь за другимъ, перекатываясь по ея поверхности. Пыль долго потомъ стоитъ въ воздухъ, постепенио осъдая и покрывая всё густымъ слоемъ. Особенно отъ ней страдаютъ глаза и дыхательные органы, вслъдствіе раздраженія. Растеніямъ тоже эта пыль производитъ вредъ, такъ какъ норы ихъ сильно засоряются. Пыль такъ тонка, что она въ громадномъ количествъ проникаетъ въ совершенно замкнутыя жилища и тамъ набивается въ комоды, шкафы и т. п.

Пыльные туманы носять здёсь названіе бусь. Они распространяются не только по долинѣ, но простираются и въ болѣе возвышенныя мѣста до 10000 футовъ н. у. м.

Наблюденія направленія вътровъ производились на

Маргеланской метеорологической станціи, а потому привожу эти свъдънія въ слъдующей таблиць за 5 льтъ:

Таблица

года.	N.	NE.	Ε.	SE.	S.	SW.	w.	NW.	Тихо.
1881.	35	43	27	128	156	91	136	85	385
1882.	6	31	48	122	253	36	135	109	348
1883.	_	40	49	87	86	67	91	55	620
1884.	1	13	7	82	11	91	55	27	811
1885.	76	60	91	88	33	94	86	49	525

Объ атмосферномъ электричествъ въ Ферганъ я ни- электричечего не въ состояніи сказать, потому что наблюденій надъ нимъ вовсе не дълалось, за исключениемъ метеорологической станціи, гдв отмвчалось число дней съ грозой, которые показаны были выше.

Грозы въ долинъ бываютъ очень ръдко, но за то грозы. въ горахъ, въ которыхъ электрическое напряжение достигаеть значительной силы, онв появляются часто и представляють страшную, но вмёстё съ тёмъ величественную картину. Человъку боящемуся грозы, лучше и не пускаться въ горныя путешествія, такъ какъ онъ легко можетъ быть застигнутъ ею въ расплохъ, среди горной тъснины. Неръдко случается, что при ясной погодь, вдругъ стемиветъ, начинаетъ рвать вътеръ, польетъ проливной дождь, съ горъ понесутся ревущіе потоки,

повалятся съ вершинъ камни и каждую минуту при ослѣпительномъ блескѣ молніи раздаются страшные, оглушительные раскаты грома, потрясающіе почву и скалы, съ которыхъ нерѣдко скатываются громадныя глыбы, придавливающія путешественника. Пробирающемуся верхомъ по тропѣ возлѣ отвѣсной скалы кажется, что всякій ударь грома происходитъ тутъ-же надъ головою и оглушенная этимъ лошадь, дрожитъ отъ страха, а съ каждымъ болѣе сильнымъ ударомъ, то шарахнется въ сторону, то припадетъ на всѣ четыре ноги. Въ довершеніе этихъ удовольствій можно какъ разъ въ это время, въ ущельи наскочить на силь, отъ котораго уже нѣтъ спасенія.

Огненные шары. Нъкоторые наблюдали въ предгорьяхъ огненные шары, происхождение которыхъ для насъ загадка. Самъ Араго сознается, что эти шары составляютъ камень преткновения для добросовъстныхъ метеорологовъ. Шарообразныя молніи кажутся однимъ изъ самыхъ необъяснимыхъ явленій физики. Какъ образуются онъ; въ какой области происходятъ? Откуда берутся составляющія ихъ вещества? Отчего онъ иногда останавливаются и потомъ вдругъ летятъ съ большою скоростью? Передъ всъми этими вопросами наука становится въ тупикъ.

По всей въроятности много несчастій происходить оть молніи, но у меня относительно этого нъть никакихъ свъдъній. Точно также не могу ничего сказать о вліяніи электричества на развитіе нъкоторыхъ эпидемій, а равно малярійныхъ бользней, потому что не было произведено никакихъ наблюденій въ этомъ направленіи.

Озонъ.

Относительно озона и присутствія его въ воздухѣ являются предположенія о возможности связать происхожденіе эпидемическихъ бользней съ недостаткомъ или

избыткомъ его въ атмосферъ. Изслъдованія Клеменса доказали, что относительно вліянія болоть на происхожденіе маляріи необходимо принимать во вниманіе количество озона; нікоторыя болота выділяють этоть газъ въ большомъ обиліи и, по словамъ его, они то именно и не производять вовсе лихорадокъ (¹). На Кавказъ нъкоторыми врачами производились наблюденія надъ дійствіемъ озона и о нихъ упоминаєть уже Н. Тороповъ, въ своей медицинской географіи. Въ Ферганъ этихъ наблюденій не ділалось, хотя они могли бы представлять интересъ для такой малярійной мъстности.

Барометрическія наблюденія производились на Марге- Барометри ланской метеорологической станціи, среднія цифры въ ко- ческія набл торыхъ показаны въ следующей таблице. Что-же касается до связи извъстныхъ заболъваній или бользненныхъ припадковъ, въ зависимости отъ барометрическихъ измъненій, то въ этомъ направлени не было сдълано наблюдений.

Относительно вліянія разрѣженнаго воздуха на организмъ человъка и животныхъ въ горныхъ мъстностяхъ будеть сказано въ следующей главе.

Таблица БАРОМЕТРИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ.

	Г	0	1	Ļ	A.		Среднее.	Maxim.	Minim.
Въ	188	2	r.			III;	709,2	723,3	693,4
	188	3,	г.	11.1		-	709,1	721,2	695,8
-	188	4	г.			141	708,7	723,3	695,6
-	188						708,8	721,8	695,9
	188	6	г.	•			709,4	728,4	696,4
_	188	7	г.				709,4	721,2	698,5
-	188	8	г.				707,5	722,5	694,1

⁽¹⁾ Руководство къ внутренней патологін С. Жакку. Т. IV. стр. 9.

Метеорологическія понанія туземцевъ.

Космическія воззрвнія туземцевь не только весьма скудны, но большею частью и нелѣны. Они рѣшительно не имъютъ никакого представленія о вліяніи разныхъ теллурическихъ условій на состояніе погоды, на количество и періодичность атмосферных в осадков в и т. п.

Изучение астрономіи, даже въ самомъ сокращенномъ объемъ, не допускается въ ихъ учебныхъ заведеніяхъ (медресэ), такъ какъ познаніе міра вселенной (дунія) запрещено кораномъ. Если бы кто изъ туземныхъ ученыхъ, вопреки этому запрещенію, вздумалъ-бы заняться астрономическими наблюденіями; то шаріать очень строго наказалъ-бы его за подобное еретическое стремленіе, а общество отвергло бы его, какъ против-

ника мусульманства.

Туземцамъ, даже болъе интеллигентнымъ, неизвъстны самые элементарные пріемы метеорологическихъ наблюденій, такъ какъ у нихъ не существуетъ никакихъ необходимыхъ для этого инструментовъ. Съ термометромъ и барометромъ они вовсе незнакомы и по настоящее время, не смотря на то, что многіе изъ нихъ, имъющіе общеніе съ Русскими, могли бы видъть и убъдиться въ полезномъ ихъ примъненіи въ обыденной жизни. Но оковы, разобщающія восточнаго человіка съ міромъ разумности, заставляють его относиться индифферентно ко всему тому, чего онъ не унаследоваль отъ своихъ предковъ. Поэтому онъ по прежнему видить въ ватмъніяхъ солица и луны, въ громъ и молніи, не вліяніе естественныхъ силъ природы, а враждебныя дъйствія шайтана (дьявола), старающагося повредить правовърнымъ, какимъ бы то ни было образомъ.

Туземцы не нуждаются въ термометръ для опредъленія градусами температуры воздуха. Силу морозовъ богатые измъряютъ числомъ надътыхъ на себя халатовъ, а бъдняки—субъективнымъ ощущеніемъ. Въ измъреніи явтней температуры они вовсе не нуждаются; чъмъ теплъе, тъмъ лучше.

Нужно однако-жъ замѣтить, что не смотря на отсутствіе всякихъ метеорологическихъ нознаній, туземцы, на основаніи извѣстныхъ примѣтъ, довольно удачно предсказываютъ перемѣну погоды, суровость зимы, сухость или сырость весны и т. п. явленія, которыя близко касаются ихъ, какъ земіедѣльцевъ и скотоводовъ. На этотъ предметъ имѣются у нихъ свои спеціалисты, большею частью старики, которые долголѣтними наблюденіями пріобрѣли въ этомъ отношеніи извѣстную опытность. Конечно, на эти предсказанія не всегда можно безусловно полагаться, но въ большинствѣ случаєвъ они все-таки оправдываются.

Вліяніе климата на здоровье людей.

Изъ предшествовавшаго краткаго очерка мы могли составить совершенно ясное понятіе о климатическихъ условіяхъ здѣшняго края. Съ подобными разнообразіями, съ такими контрастами, какіе представляетъ здѣшній климатъ на столь незначительной территоріи, мы едва можемъ встрѣтить на земномъ шарѣ другую подобную мѣстность. Кавказъ только можетъ соперничать въ этомъ отношеніи, но за то онъ занимаетъ пространство гораздо обширнѣе, сравнительно съ маленькой Ферганой.

Но главный вопросъ состоить въ томъ: здоровъ-ли, вреденъ-ли Ферганскій климать для человѣка вообще и для переселенца въ особенности? На этотъ вопросъ тоже нельзя отвѣтить категорически; онъ чрезвычайно здо-

ровъ и въ тоже время чрезвычайно вредепъ, смотря по

мъсту.

Передъ прівздомъ своимъ сюда на службу, сколько разъ не приходилось мнѣ обращаться съ вопросомъ относительно климата Ферганы къ людямъ, побывавшимъ въ здъшнемъ краъ, всегда получаль одинъ отвътъ: ужаено жарко и убійственныя лихорадки. Они были правы, потому что по своему служебному положенію проживали исключительно въ долинъ и только ея климатическія условія запечатлъвались въ памяти. Страна съ такою богатою растительностью, съ такимъ обильнымъ орошеніемь, при высокой продолжительной весенней и лътней температуръ, представляетъ всъ условія для обравованія и распространенія малярійной міазмы. Н. Тороповъ (1) въ краткихъ словахъ, но весьма наглядно изложиль условія для происхожденія лихорадокъ на Кавказъ: "лихорадочная міазма развивается только тамъ, гда зелено, сыро и тепло". Относительно ферганскихъ лихорадокъ намъ остается повторить тоже самое. На каждомъ клочкъ земли, на которомъ пріютилось осъдлое населеніе долины: зелено, тепло и сыро. А потому преобладающими бользиями въ Ферганской долинь, являются болотныя лихорадки съ поносами. Малярія въ разныхъ проявленіяхъ эндемическая бользнь въ этой странь, которая въ извъстное время года и при неблагопріятныхъ условіяхъ развивается эпидемически.

Въ особености вновь прибывшіе подвергаются забольванію малярійными бользнями, что легко наблюдать на новобранцахъ въ первый и второй годъ посль прибытія сюда на службу. Старослужащіе солдаты больють значительно меньше или по крайней мъръ не такими тя-

⁽¹⁾ Опыть медицинской географіи Кавказа Н. Торопова 1864 г.

желыми и упорными формами лихорадокъ. Тувемцы тоже не гарантированы отъ заболъваній лихорадками, но несравненно въ меньшей степени противъ солдатъ и русскаго населенія.

Степень лихорадочности не совпадаеть съ изотермичностью другихъ странъ, т. е., при одинаковомъ количествъ годоваго тепла и при равныхъ повидимому прочихъ условіяхъ, въ Ферганъ лихорадокъ больше.

Это зависить отъ неодинаковаго распредвленія телла по временамъ года. Чъмъ неравномърнъе распредълена годовая температура по временамъ года, чёмъ болъе знойное лъто, тъмъ страна дълается крайне лихорадочной, потому-что усиленное развитие тепла усиливаеть разложение. Въ Ферганской долинъ, гдъ средияя лътняя температура=26,80 С., но гдъ она неръдко днемъ въ тъни достигаетъ 40°, а на солнцъ свыше 60°, то при обильномъ орошеніи и избыткі отжившей растительности разложение должно происходить весьма усиленнымъ образомъ. Нужды нътъ, что зимой, во время 16-180 мороза, разложение пріостанавливается; за то весною и лѣтомъ оно идетъ съ неимовърною силою и развиваеть повальную міазму. Чёмъ дольше стоить жаръ, тъмъ сильнъе идетъ разложение, а вслъдствие этого скопляется большее количество міазмы; конечно, если при этомъ нътъ недостатка въ матеріалъ и въ сырости. Вообще здъсь чъмъ мъстность ниже, сыръе и жарче, тъмъ больше растительности; а слёдовательно она тёмъ лихорадочиве.

При равномърномъ распредълении тепла по временамъ года разложение органическихъ веществъ происходитъ медленъе, а потому и міазмы развивается сравпительно меньше. Въ тъхъ-же мъстахъ, гдъ средняя лътняя температура ниже 15° С., тамъ дихорадокъ вовсе не бываетъ.

Хотя въ нашей долинъ средняя температура весны= $16,5^{\circ}$ С., а осени только $11,8^{\circ}$, но относительно развитія лихорадокъ весну нельзя даже и сравнивать съ осенью, - такая большая между ними разница. Осень, въ особенности сентябрь и октябрь, самые страшные у насъ мъсяцы какъ по числу заболъваній, такъ по интензивности припадковъ и по осложненіямъ поносами и дивентеріей. Это происходить не вследствіе увеличенія осенью міазмы, а оттого, что только въ концъ лъта и въ началъ осени вполиъ обпаруживаются результаты двиствія самой жестокой льтней міазмы. Кромъ того, разложение органическихъ веществъ въ началъ осени, еще достаточно теплой, идеть само по себъ довольно сильно. Средняя температура сентября=19,40 С., но бывають дни, въ которые максимумы достигають 34,30 въ тъни. Слъдовательно въ это время заболъваютъ кромъ твхъ, которые еще заразились летомъ и тв, которые заражаются осенью, да при этомъ у многихъ обнаруживаются рецидивы вследствіе того, что летняя болезнь не была окончательно излъчена. Кромъ того осенью начинаютъ прибывать партіи новобранцевъ, составляющихъ главный контингентъ заболъвающихъ. Въ довершение зла къ тому времени поспъваютъ или върнъе дълаются весьма дешевыми, а потому доступными солдатамъ и бъднякамъ: дыни, огурцы и т. п., которые при неумъренномъ и песвоевременномъ употреблении значительно увеличивають проценть забольвающихь лихорадками и поносами. Плоды и фрукты сами по себъ конечно не могутъ произвести лихорадки, но при существующемъ вараженіи маляріей, которая нѣкоторое время не проявляется никакими болѣзненными припадками, вслѣдъ за какими либо вліяніями, дающими толчекъ къ нарушенію равновѣсія, можетъ немедленно появиться приступъ лихорадки. Простуда, разстройство желудка и проч. могутъ служить достаточной причиной, чтобы вызвать проявленіе этой болѣзни.

Въ зимніе мъсяцы меньше всего забольваеть лихорадками, но чтобы совершенно онъ прекращались,— этого не бываеть. Хотя морозы, сковывая на нъкоторое время почву, пріостанавливають развитіе міазмы, но забольвають по всей въроятности тъ, которые раньше заразились, и въ ихъ организмахъ зараза скрывалась, ничъмъ не обнаруживая себя, до извъстнаго толчка. Кромъ того много появляется рецидивистовъ, для которыхъ простуда послужила причиною возврата. Впрочемъ въ нъкоторые годы зима обнаруживается только грязью и днемъ солице пригръваетъ довольно изрядно, а потому я думаю, что въ подобное время не совершенно прекращается развитіе малярійной міазмы, а лишь только уменьшается.

Зимою, во всякомъ случав, преобладають катарральныя и ревматическія болвани, хотя онв бывають и лвтомъ. Всв эти болвани до того сопряжены и замаскированы маляріей, что вначаль редко возможно поставить правильную діагностику; кромв того и теченіе всёхъ этихъ бользней въ высшей степени неправильное, а леченіе безъ хинина не мыслимо, даже при обыкновенномъ бронхіальномъ катаррів.

Вътры суть главные дъятели въ измъненіи температуры, но въ каждое время года повышеніе или пониженіе ея обусловливается другимъ вътромъ. Для насъболье представляеть интереса съ медицинской точки

зрвнія, такъ сказать, механическое двиствіе ввтровъ, потому что они играють важную роль, часто разсвивая міазму, частью же служа для переноса ея. Вътры, дующіе съ болоть, всегда приносять міазму въ містности. лежащія на пути ихъ движенія. Во всякомъ случав, вътры, дующіе съ извъстною силою съ запада или съ востока вдоль по долинь, дъйствують благодьтельнымь образомъ, потому что при этомъ вся она провентилируется, безъ чего во многихъ городахъ скопленіе міазмы, а вивств съ симъ заболввание малярией достигли бы ужасающихъ размъровъ. Сами туземцы относятся къ подобнымъ вътрамъ и бурямъ благосконно, заявляя, что они очищаютъ воздухъ, лишь-бы не ломали деревьевъ, которыми сарты дорожать и заботятся о разведеніи ихъ вокругъ своихъ сакель. Противоположно этому дъйствуютъ горячіе вътры, называемые Гармъ-силь, о которомъ уже было сказано.

Неблагопріятное дъйствіе вътровъ заключаєтся еще вътомъ, что подъ вліяніємъ ихъ люди подвергаются простуднымъ бользнямъ, даже среди жаркаго дъта, потому что при вспотъвшей кожъ вътеръ сильно охлаждаєтъ извъстную часть тъла. Туземцы остороживе насъ възтомъ отношеніи; они (за исключеніемъ бъдняковъ) никогда, какъ бы жарко не было, не выйдутъ изъ дому, чтобы не напялить на себя халата, а то и двухъ. Кромъ того вътры обыкновенно подымаютъ и несутъ такую массу пыли, которая по содержанію разныхъ солей и известковыхъ частицъ, сильно раздражаєтъ глаза и дыхательныя органы. Весьма много туземцевъ больныхъ различными воспаленіями глазъ.

На Алав и Памиръ жители не знаютъ лихорадокъ, по ревматизмы и прочіл простудныя бользни развиты повсемъстно, не смотря на то, что кочевники обладаютъ атлетическимъ здоровьемъ и съ ранняго дътства привыкли къ подобнымъ вліяніямъ. У всѣхъ почти Памирцевъ больютъ глаза преимущественно отъ солонцеватой и песчаной ныли, поднимающейся отъ порывовъ сильнаго вътра. Кромъ того у нихъ лътомъ обыкновенно засыхаютъ и трескаются губы, вслъдствіе вліянія тъхъже вътровъ и сухости воздуха.

Дожди въ гигізническомъ отношеніи иміють различное значение въ долинъ и горахъ. На сколько всякій дождь необходимъ для органической жизни, на столько онъ вреденъ въ Ферганской долинъ, тъмъ именно, что помогаетъ развитію быстраго разложенія отжившихъ организмовъ, такъ какъ сырость отъ дождя проникаетъ и туда, куда можетъ быть и не проникла бы оросительная вода срыковъ. Но тъмъ не менъе, дождь бываеть полезнымъ вслъдствіе того, что очищаеть воздухъ отъ міазмъ. Каждая дождевая капля, падая, непремінно уносить съ собою всякую встрівчаємую примісь къ воздуху, стало быть и міазму. Въ гористыхъ мѣстахъ дожди, во всякомъ случав, составляютъ благодвяніе, такъ какъ безъ нихъ не могла бы развиваться никакая растительность. Кром'в того, отобравь отъ воздуха міазму, они не проникають съ нею въ почву, какъ это происходить въ доливъ, а напротивъ вода быстро сбъгаеть по покатостямь и сносить всю эту міазму, какъ въ складочное мъсто въ ту же долину. Эта же дождевая вода уносить съ покатостей значительную часть матеріала, изъ котораго образуется міазма, и распредъляетъ по арыкамъ въ долинъ для разложенія. Следовательно дожди, очищая горы отъ міазмы, тімъ самымъ увеличивають ее въ долинъ.

Послѣ всего вышеизложеннаго легко отвѣтить на вопросъ, здоровъ-ли климатъ въ Ферганской области, или вреденъ? Въ горахъ онъ безусловно здоровый и если бы мы имѣли возможность поселиться въ нихъ на извѣстной высотѣ, возлѣ горныхъ рѣчекъ, тогда относительно здоровья, нечего было-бы и желать лучшаго. И въ долинѣ, не будь лихорадокъ, мѣстностъ была бы весьма здоровой. А то здѣшная болотная міазма, помимо безчисленнаго множества малярійныхъ болѣзней, еще налагаетъ руку на всякую другую болѣзнь, совершенно ей несродную.

ГЛАВА V.

Мѣста въ Ферганской области, пользующіяся лучшими климатическими условіями въ санитарномъ отношеніи.

Говоря о санитарных условіях всей территоріи нужно помнить мнѣніе Линда, что "самыя здоровыя въ свѣтѣ страны заключають въ себѣ мѣста грунта, въ которых иностранцы подвергаются болѣзнямъ. Едва-ли можно найти какое либо большое протяженіе материка, или даже какой либо островъ, гдѣ не было-бы такихъ мѣстъ, въ которыхъ европейцы могутъ наслаждаться безпрерывнымъ здоровьемъ во всѣ времена года". Однимъ словомъ вездѣ могутъ быть здоровые и нездоровые пункты.

Ознакомившись съ орографіей, геологіей, гидрографіей и климатическими условіями Ферганской области, легко вывести заключеніе о здоровости той или дру-

гой мѣстности. Въ этомъ отношеніи всю территорію можно раздѣлить на два отдѣла: 1) вся Ферганская долина, которая по топографическому положенію, свойству почвы, способу орошенія и высокой весенией и лѣтней температурѣ принадлежить къ сильно лихорадочной мѣстности, а потому представляетъ собою весьма нездоровую страну и 2) гористая мѣстность, окаймляющая долину, въ силу нѣсколько иныхъ болѣе благопріятныхъ условій, принадлежить къ болѣе здоровымъ.

Съ самой глубокой древности народы придавали возвышеннымъ мѣстамъ особенное гигіэническое значеніе и первые храмы эскулана были построены на возвышенныхъ здоровыхъ мѣстахъ, съ цѣлью доставить больнымъ возможность пользоваться чистымъ горнымъ воздухомъ. У Плутарха, Тита-Ливія, Витрувія и друг. мы находимъ указанія на здоровость гористыхъ мѣстностей. И въ настоящее время можно сказать утвердительно, что въ большинствъ случаевъ обитаніе на возвышенныхъ мѣстахъ составляетъ для человѣка могущественнѣйшее средство для предохраненія себя отъ дѣйствія эпидемическихъ и другихъ болѣзней.

Во вевхъ странахъ, гдв наиболве господствуютъ лихорадки, есть мъстности, лежащія на извъстной высотв, нисколько не подверженныя двйствію болоть. Въ этомъ отношеніи Ферганская область представляєть собою столько разнообразія, что являєтся возможность избрать мъстопребываніемъ извъстный пунктъ, находящійся на любой высотв надъ уровнемъ моря. Конечно этимъ возможно пользоваться только до извъстнаго предъла, за которымъ пребываніе уже становится или вреднымъ, или даже опаснымъ и невозможнымъ.

Предълы высоты, на которой полезно пребываніе,

зависить отъ состоянія здоровья, привычки и индивидуальности. Чахоточные, эмфизематики, одержимые бользнями сердца и имъющіе наклонность къ кровотеченію, не переносять даже умъренной высоты, тогда какъ здоровые и привычные люди свободно поднимаются на весьма высокія горы, не чувствуя особенно тяжелыхъ

припадковъ.

Кассини полагалъ, что выше 4767 метровъ (15640 ф.) н. у. м. не можетъ жить пикакое животное. Это митніе высказано было по всей в роятности, на основании какихъ либо теоретическихъ соображеній, такъ какъ мы знаемъ, что люди обитаютъ въ мъстахъ, лежащихъ на высотъ 4800 метровъ, а временно достигаютъ высотъ еще несравненно болъе значительныхъ. Гумбольдтъ поднимален на Чимборасо до высоты 5878 метровъ, а Буссенго до 6004 метровъ. Наконецъ Гэ-Люссакъ, а также Барраль и Биксію во время своихъ воздухоплаваній поднимались болье чъмъ на 7000 метровъ (22966 ф.). Нъкоторые воздухоплаватели поднимались гораздо выше, но мы не имбемъ для этого вбрныхъ доказательствъ. Глосхеръ въ сентябръ 1862 года поднялся на 10 тысячъ метровъ (32809 ф.), но онъ едва не погибъ. Барометръ показывалъ въ то время 0,40 м., а термометръ —38,5°. Кроче-Спинсили и Сивель въ 70-тыхъ годахъ погибли оттого, что неблагоразумно долго оставались на высотъ около 8 верстъ надъ поверхностью земли (около 28000 ф.). Въ Ферганскихъ горахъ до такихъ высоть подняться никому не приходилось, потому что самые высокіе пункты, какъ пикъ Кауфмана, Гурумды, Гоу-недоступны; но на такую высоту, на какую поднялся Буссенго, горцы окрестныхъ владъній всходять безпрепятственно. На Кара-Корумскій переваль Гиндукуша (18550 ф.) поднимаются цълые караваны.

Совокупность явленій, обнаруживающихся въ человьків на возвышенностяхь земнаго шара, Дакоста ещо въ XV столітіи обозначиль именемъ горнаго недуга. Эти же явленія или припадки были упоминаемы и другими путешественниками, какъ-то: Соссюромъ, Мартеномъ, Гумбольдтомъ, Буссенго и другими.

Намъ обитателямъ Ферганы, которымъ доводилось путешествовать въ горахъ, очень хорошо внакомы всё эти припадки, потому что каждый въ болѣе или менѣе значительной степени испыталъ ихъ на себѣ. Они главнымъ образомъ состоятъ въ слѣдующемъ: дыханіе ускоряется, появляется одышка, трепетаніе сердца, усиленное біеніе артерій, кровотеченія изъ поверхностныхъ слизистыхъ оболочекъ, потеря аппетита, сильная жажда, глухота, значительная физическая и умственная вялость, сонливость, боли въ конечностяхъ, въ особенности въ колѣнныхъ и тазобедренныхъ суставахъ, головная боль, головокруженіе, позывъ къ рвотѣ и обмороки. Всѣ эти явленія происходятъ преимущественно отъ вліянія разрѣженнаго воздуха, а нотому дѣлаются все сильнѣе по мѣрѣ возвышенія надъ уровнемъ моря.

По мивнію Пайерна (1) утомленіе и трудность дыхапія, испытываемыя путешественниками при восхожденіяхь на высокія горы, происходять не оть недостатка кислорода во вдыхаємомъ воздухв, всявдствіе разрвженія его, а оть нарушенія равновъсія, между напряженіємь жидкостей, содержащихся въ нашихъ органахъ, и напряженіємь наружнаго воздуха. Онь полагаеть, что барометрическіе предвлы, которыхъ человъкъ не должень переступать, не принявъ нъкоторыхъ предосторож-

⁽¹) Въ залискъ представленной Парижской Академія наукъ 18 Августа, 1853 года.

ностей, заключаются между 8,30 м. и 4,56 м. то есть, полагая для этого послъдняго предъла 3,8 м. сверхъ атмосфернаго давленія.

Большая часть этихъ страданій зависить и отъ мышечныхъ усилій, которыя требуются для восхожденія, а не исключительно отъ разр'єженія воздуха. Поднимаясь на гору верхомъ, большинство припадковъ какъто: сердцебіеніе, одышка и боли въ ногахъ-не ощущаются, даже на сравнительно высокихъ горахъ. На высотв 11000 футовъ, вдучи верхомъ на гору, я не ощущаль равно никакихъ бользненныхъ явленій и спустился къ ръкъ пъшкомъ тоже совершенно свободно; но когда пришлось подняться къ оставленнымъ на верху спутникамъ, то появилось чувство усталости въ такой степени, какой я никогда не испытываль въ прежней своей жизни. Она доходила до того, что послъ 10-20 шаговъ я буквально при всемъ напряжении силъ не могъ двинуться. При этомъ сильныя трепетанія сердца и біенія артерій, а равно одышка одольвали въ такой мвръ, что при дальнъйшемъ усиліи, долженъ былъ-бы последовать полный упадокъ силь и обморокъ. Въ теченіи ніскольких минуть остановки, при чемъ я даже и не садился, силы возстановлялись до того, что я быль увъренъ въ возможности подняться безъ задержки; но едълавши 20 шаговъ, опять повторялось то же состояніе и только при движеніи, съ остановками посл'в каждыхъ 10 шаговъ, я достигъ мъста стоянки. Бывшій со мною деньщикъ, молодой, здоровый человъкъ не испытывалъ этого и шелъ повидимому свободно.

При крутыхъ подъёмахъ, взбираясь пѣшкомъ по карнизамъ, очень облегчаетъ движеніе, если держаться за хвостъ идущей впереди лошади, которая тащитъ

какъ на буксиръ. При этомъ можно пройти гораздо большее разстояние безъ остановки, нежели одному безъ этой помощи.

Во время Алайскаго похода на высотѣ 11000 ф. солдаты и офицеры, во время стоянки, чувствовали себя превосходно; но заявляли, что при усиленныхъ активныхъ движеніяхъ тоже являлись: одышка, сердцебіеніе, усталость, чего не замѣчалось во время пребыванія въ Ферганской долинѣ. Тоже замѣчалось и на животныхъ. Одинъ изъ батарейныхъ командировъ во время ученія пустилъ батарею въ карьеръ и лошади послѣ незначительнаго разстояпія стали падатъ; тогда только онъ убѣдился въ невозможности производить движеній батареи тѣми-же аллюрами, которые были доступны въ долинѣ.

Медленнымъ шагомъ, съ остановками наши войска въ 1880 году свободно перешли черезъ перевалъ Кара-Казыкъ вмъстъ съ конно-горною батареей, а высота этаго перевала 14500 ф. н. у. м.

На крутыхъ подъёмахъ, какъ бы сильна пи была лошадь, она не въ состояніи идти быстро и безостановочно. Сдѣлавъ шаговъ 100, она сстанавливается на нѣсколько минутъ и въ этихъ случаяхъ, если лошадь горная и опытная, то никакими понужденіями нельзя заставить ее идти дальше, пока не отдохнетъ. Если-же лошадь непривычная и горячая, то заставляя ее идти въ гору черезъ силу, можно уложить замертво.

Не подлежить сомнѣнію, что когда люди поднимаются на высокую гору пѣшкомъ, то со стороны дыханія, кровообращенія и теплообразованія наблюдаются разнообразныя разстройства. Многочисленные факты доказывають намъ, что страданія описанныя подъ именемъ болѣзней горъ, значительно болѣе зависять отъ

мышечныхъ усилій, которыя требуются для восхожденія, нежели отъ разръженнаго воздуха. При полетахъ, совершаемыхъ на аэростатахъ, подобныя явленія вовсе не наблюдаются въ такой степени, за исключеніемъ тъхъ случаевъ, когда воздухоплаватель поднимается на крайне большія высоты. Гаварре (1) очень хорошо объясняетъ, на основаніи закона превращенія силь, почему воздухоплаватель въ своемъ шарѣ не испытываетъ тъхъ бользненныхъ припадковъ, которые выпадаютъ на долю путешественника, съ трудомъ взбирающагося на отвъсные и покрытые снътомъ склоны высокой горы.

Когда человъкъ поднимается на воздушномъ шаръ, ему не приходится дълать какой нибудь затраты механической силы; все тепло, которое развивается въ его тълъ, вслъдствіе органическаго горънія, регулируется въ этомъ случав единственно только температурою окружающей среды. По мъръ того какъ внѣшняя температура понижается, при дальнѣйшемъ повышеніи въ атмосферь, то и горъніе становится нѣсколько болье дъятельнымъ для того, что бы поддержать на нормальной точкъ температуру тъла; въ то же время ускоряется нѣсколько и дыханіе, также какъ и пульсъ; этимъ и ограничиваются всъ явленія. Горъніе въ организмѣ никогда не бываетъ настолько значительно, чтобы дъятельность легкихъ оказалась недостаточною для полнаго выведенія углекислоты.

Напротивъ того, когда человѣкъ пѣшкомъ взбирается на высокую гору, онъ совершаетъ значительное количество механической работы, которая колеблется, смотря по вѣсу его тѣла, по высотѣ мѣста, на которое

⁽⁴⁾ Ученіе о войсковыхъ бользняхъ А. Лаверана стр. 93.

онъ поднимается, и по характеру почвы. Дыхательное горѣніе должно доставлять эквивалентное затраченной подобнымъ образомъ механической силѣ количество тепла, не говоря уже о томъ теплѣ, которое необходимо для поддержанія физіологической температуры; потребленіе матеріаловъ при этомъ чрезмѣрно; силы быстро истощаются, дыхательныя движенія и кровообращеніе значительно ускоряются для того, чтобы сдѣлать возможнымъ поглощеніе того количества кислорода, которое требуется усиленнымъ горѣніемъ, а также и для того, чтобы освободить кровь отъ излишней углекислоты.

Въ тъхъ случаяхъ, когда восхождение совершается медленно, въ данное время затрачивается меньшее количество силы и потому функціональныя разстройства не бывають значительны; но если восхождение совершается быстро, то выдёленіе газовъ, хотя оно и бываетъ особенно дъятельно, оказывается всё-же недостаточнымъ для поддержанія нормальнаго состава крови, которая остается насыщенною углекислотою; вследствіе этого дыханіе становится затруднительнымъ, одышка усиливается до чрезвычайности и сопровождается головною болью, головокружениемъ и сонливостью. Понятно теперь, почему остановка на нъсколько минутъ оказывается достаточной для устраненія всёхъ этихъ припадковъ. Съ того момента, какъ человѣкъ остается въ поков, затрата силы прекращается, двятельность дыхательнаго горвнія быстро понижается до той степени, которая строго необходима для поддержанія его нормальной температуры.

Вслъдствіе всъхъ этихъ соображеній я считаю себя въ правъ утверждать, что большая часть функціональ-

ныхъ разстройствъ, которыми отличается болѣзнь горъ, должна быть объясняема дѣйствительнымъ отравленіемъ крови растворенною въ ней углекислотою; но нѣкоторые припадки на значительной высотъ появляются тоже исключительно отъ вліянія разрѣженнаго воздуха, помимо активныхъ движеній.

Буссенго говоритъ, что во всъхъ путешествіяхъ по Кордильерамъ, онъ всегда ощущалъ при равной высотъ, несравненно болве тягостные припадки при восхожденіи на кручу, покрытую снёгомъ, чёмъ при восхождении на голую скалу. Индъйцы говорили ему, что и они всегда чувствуютъ удушье, когда долго шли по снъжной равнинъ. Вслъдствіе этого онъ предполагаетъ, что можеть быть отъ дъйствія теплоты, производимой солнечными лучами, изъ снъга освобождается значительно испорченный воздухъ. Относительно этого обстоятельства въ Ферганъ, мнъ не случалось слышать подобныхъ заявленій. Говорять, что вообще пъшеходь, взбираясь на гору покрытую снёгомъ, утомляется скорёе, вслёдствіе необходимости выше поднимать ноги, которыя вязнутъ въ снъту; а при этомъ требуется болъе значительнаго напряженія мыщечныхъ усилій. Что же касается до путешествующихъ верхомъ, то они не замъчали разницы въ припадкахъ относительно сижжныхъ и голыхъ подъемовъ.

Человъкъ можетъ привыкнутъ въ извъстной степени какъ дышать разръженнымъ воздухомъ, безъ малъйшаго вреда для его здоровья, такъ точно и къ восхожденіямъ на высочайшія горы, весьма мало при этомъ утомляясь. Буссенго въ письмъ своемъ къ А. Гумбольдту говоритъ: кто видълъ дъятельность въ городахъ, какъ Богота, Микуйпампа, Потози и друг., лежащихъ на высотъ 2600 до 4000 метровъ (13123 ф.), кто былъ свидътелемъ силы и удивительной ловкости торсадеровъ, въ бояхъ съ быками въ Кито, на высотъ 3000 метровъ (9842 ф.) н. у. м., наконецъ кто видълъ, какъ молодыя и нъжныя женщины проплясываютъ ночь на пролетъ въ мъстностяхъ, почти столь-же возвышенныхъ какъ Монбланъ, гдъ Сосюръ, едва имълъ силы, чтобы сдълать свои наблюденія и гдъ сопровождающіе его кръпкіе горцы въ изнеможеніи падали на спътъ и кто вспомнилъ при томъ, что извъстное сраженіе при Пичинчъ происходило на высотъ 4736 метровъ, тому не покажется удивительнымъ, что человъкъ можетъ привыкнуть дышать разръженнымъ воздухомъ высочайшихъ горъ.

Торные жители Ферганы и сосъднихъ съ нею странъ, какъ-то: Каратегинцы, Дарвазцы и другіе, родившіеся и выросшіе въ горахъ, точно также не имъютъ понятія о тъхъ припадкахъ, которые мы ощущаемъ на ихъ родинъ. Они мало того, что совершенно свободно поднимаются на высокія и крутыя горы; по при этомъ еще несутъ на себъ довольно увъсистый багажъ. Они въ высокихъ мъстностяхъ работаютъ, охотятся на вершинахъ горъ, гоняясь за дикими козлами и архарами, не испытывая ни одышки, ни утомленія.

Горцы въ Каратегинъ и Дарвазъ настолько выносливы и неутомимы въ ходьбъ, что способны дълать по 80—120 верстъ въ одинъ день пъшкомъ съ кожанымъ мъшкомъ на спинъ для провизіи или съ вьюкомъ за спиною въ 3 пуда, чему былъ свидътелемъ Г. А. Арандаренко (¹), дълая дневные переъзды съ пъшими

⁽¹⁾ Досуги въ Туркестанъ. Г. А. Арандаренко. сгр. 454.

горцами по 80 верстъ, черезъ сивжные перевалы въ 14000 футовъ. Ему-же представили знаменитаго скорохода Боби-Караульбеги, 36 лвтъ, который, будучи посланъ своимъ бекомъ, умудрился пройти въ половинв мая 1880 г. пвшкомъ, сдвлавъ безъ отдыха, съ 3 часовъ утра до 7 ч., вечера—140 верстъ, пройдя при этомъ черезъ три перевала въ 13500 ф. каждый. Этотъ горецъ пояснялъ, что въ ходьбъ по горамъ—главное условіе не садиться для отдыха; что подыматься вверхъ, заложивъ руки на тонкую трость за спиною гораздо легче, чвмъ спускаться съ перевала внизъ.

Если эти цифры и не безусловно върны, такъ какъ тамошнія дороги не мърены; то во всякомъ случав достойно вниманія, что человъкъ въ состояніи идти пъшкомъ наравнъ съ лошадью, дълая съ ней одинаковые переходы.

Во время путешествій по высокимъ горамъ, при появленіи принадковъ горнаго недуга, какъ-то: одышки, сердцебіенія, головокруженія и обмороковъ, лучшимъ средствомъ, возстановляющимъ на нѣкоторое время силы, оказывается глотокъ коньяку. Это дѣйствуетъ магическимъ образомъ и мнѣ нерѣдко приходилось испытать какъ на себѣ, такъ и другихъ. Нѣкоторые изъ офицеровъ мнѣ разсказывали, что передъ охотой въ высокихъ горныхъ мѣстностяхъ, принимали пебольшіе пріемы мышьяковистаго Фоулероваго раствора, при чемъ замѣчали гораздо большую выносливость и пе чувствовали тѣхъ болѣзненныхъ явленій, которымъ обыкновенно подвергались при тѣхъ же самыхъ условіяхъ. Между туземцами это средство кажется вовсе не практикуется.

Животныя точно также, какъ и люди привыкаютъ къ разръженному воздуху. Горныя лошади не испытываютъ на большихъ высотахъ такого утомленія, какъ лошади долины. Переходы черезъ хребетъ Гинду-кушъ, на Каракорумскій перевалъ, высота котораго 18550 ф. п. у. м., люди переносятъ безъ особаго затрудненія, потому что караваны проходятъ ежегодно туда и обратно. Лошади, купленныя въ долинъ Кашгаріи и пущенныя въ дорогу черезъ Гинду-кушъ на перевалъ Янги-Даванъ (по дорогъ въ Лядахъ черезъ Кильямъ) въ состояніи только входить безъ выоковъ, а таковые подымаются на тибетскихъ быкахъ; лошади-же, работавшія на Алайскихъ перевалахъ, входятъ на этотъ перевалъ свободно, но все-таки съ половиннымъ выокомъ.

Туземцы при движеніяхъ въ высокихъ горахъ какъ вьючнымъ, такъ и верховымъ лошадямъ, даютъ очень мало зерноваго фуража; потому что на основаніи опыта ими дознано вредное послѣдствіе на здоровьѣ этихъ животныхъ, при употребленіи въ избыткѣ зерна, въ разрѣженной атмосферѣ. На большихъ высотахъ въ теченіе 5-ти дней даютъ не болѣе $1^{1}/_{2}$ фунта зерна кукурузы въ день на лошадь. На такихъ высотахъ лошади не переносятъ на себѣ обыкновенныхъ тяжестей, а потому на нее вьючится только 4 пуда (1).

Индивидуальность играетъ тоже значительную роль при восхожденіяхъ на высокія горы. Дъйствіе разръженнаго воздуха обнаруживается тотчасъ, а не постепенно и при томъ у разныхълицъ—на различныхъ высотахъ. Нъкоторые ощущаютъ его дъйствіе уже на высотъ 1600 метровъ (5249 ф.) и весьма немногіе изъ непривычныхъ чувствуютъ себя совершенно свободно на высотъ 3900 метровъ (11795 ф.), т. е. при активныхъ

^{(&}lt;sup>4</sup>) Отчеть о поездке въ Кашгаръ и Южиую Кашгарію въ 1885 г. Поруручика Б. Л. Громбчевскаго стр. 104.

движеніяхъ. Докторъ Клеркъ не могъ оставаться на вершинъ Монблана (15781 ф.) болъе 3 минутъ и сильное чувство дурноты принудило его посиъщно возвратиться въ болъе низкія мъста. Впослъдствіи онъ сошелъ съ ума и умеръ. Замъчательно, что изъ 6-ти Англичанъ, всходившихъ на вершину Монблана раньше доктора Клерка (въ 1825 г.), двое сошли съ ума и одинъ умеръ. И такъ изъ восьми англійскихъ путешественниковъ трое сошли съ ума (1).

Монбланъ находится на высотъ 15781 ф. н. у. м., а потому въ Ферганъ и окрестныхъ владъпіяхъ, на подобную высоту восходять чуть-ли не ежечасно и мнъ никогда не приходилось слышать, чтобы кто нибудь изъ туземцевъ или русскихъ, находившихся на такой высотъ, сошелъ съ ума. Быть можетъ причина недуга ускользнула въ тъхъ случаяхъ отъ медицинской оцънки, а не была слъдствіемъ восхожденія на подобную высоту.

Что касается до бользненных высеній, замьчаемых у разных людей, на различных высотах, то относительно этого нельзя установить общаго правила. Гордонъ говорить объ одномъ изъ своихъ сотоварищей, который могъ служить горнымъ барометромъ, по жестокимъ головнымъ болямъ, появляющимся каждый разъ, какъ поднимались на высоту свыше 11800 футовъ.

Мит извъстны факты, что люди проживающе довольно долго въ Ферганской долинт, не смотря на лихорадочную мъстность, чувствовали себя здоровыми, а заболъвали жестокими пароксизмами лихорадокъ, коль скоро поднимались даже верхомъ на высоту 12000 фу-

⁽⁴⁾ Руководство къ изученію медицинской географіи и статистики Ж. Будена.

товъ, гдъ уже конечно не можетъ быть и ръчи о малярійной міазмъ. Мало того, припадки лихорадки ослабъвали, по мъръ спусканія въ нижележащія мъстности. О подобномъ случав заявляетъ и Б. Л. Гронбчевскій (1), которому пришлось наблюдать надъ однимъ конвойныхъ казаковъ, во время объезда границы Ферганской области съ китайскими владъніями. Онъ говоритъ: "все время (12 дней) намъ пришлось провести въ мъстностяхъ, абсолютная высота которыхъ достигаетъ 12000 ф. н. у. м. Вліяніе разръженной атмосферы дъйствовало неодинаково на всёхъ насъ; такъ напримъръ, лично я страдалъ жестокими головными болями и безпрестанными обильными кровотеченіями изъ носа. Одинъ изъ конвойныхъ казаковъ, человъкъ полнокровный и крвикаго телосложенія, страдаль лихорадкою, приступы которой увеличивались по мъръ подъема на большія высоты и уменьшались при спускъ; остальные казаки отдълывались сильною одышкою ".

Люди, одержимые извъстными болъзнями весьма часто не переносятъ даже умъреннаго повышенія мъстности, тогда какъ здоровые чувствуютъ тамъ себя въ вождельнномъ состояніи. Въ 1883 году одна больная, страдавшая легочною чахоткою, поселилась на льто въ прекрасной горной мъстности, возлъ ръки Шахимарданъсая, на высотъ около 3800 ф. н. у. м. Она чувствовала себя тамъ гораздо хуже, нежели въ Маргеланъ. Когда мы пріъзжали ее навъщать, то не могли нахвалиться здоровостью этой мъстности. Чистый горный воздухъ, купанья и прогулки вызывали неимовърный аппетитъ и богатырскій сонъ; больная же проводила дни и ночи

⁽¹⁾ Ioc. cit. crp. 17.

безъ сна, дыханіе становилось затрудненнымъ, даже при легкихъ движеніяхъ, аппетита почти вовсе не было, а прохладныя ночи вызывали удушливый кашель и колотье въ боку, которые не давали ей успокоиться въ теченіе всей ночи.

Въ противоположность этому, люди изнуренные лихорадками и поносами малярійнаго происхожденія, малокровные, потерявшіе аппетитъ и сонъ, весьма быстро поправляются въ мъстностяхъ находящихся на высотъ отъ 5 до 8 тысячъ футовъ н. у. м. Нижніе чины находящісся въ Гульчъ и Иркештамъ, за время своего тамъ пребыванія, поправляются до неузнаваемости.

Всв города Ферганской области расположены въ долинв, а потому квартирующія въ нихъ войска наравнв съ жителями подвержены вліянію малярійной міавмы.

При описаніи городовъ мною будуть указаны нѣкоторыя мѣстности и селенія, принадлежащія къ курортамъ нашей долины и посѣщаемыя какъ больными, такъ и здоровыми, желающими подышать чистымъ воздухомъ и отдохнуть отъ жаркихъ дней и душныхъ ночей ферганскихъ городовъ. Но эти селенія или кишлаки, не представляютъ собою вполнѣ здоровыхъ мѣстъ, такъ какъ въ силу загрязненія почвы, воздухъ и вода не могутъ быть столь чистыми, какъ это мы видимъ въ гористыхъ, не заселенныхъ мѣстностяхъ.

Если бы избрать подходящую мѣстность въ горахъ, приспособивъ ее въ такой мѣрѣ, чтобы можно было прожить съ извѣстнымъ комфортомъ и безъ лишеній, тогда она могла бы въ дѣйствительности служить гигіэнической санитарной станціей, какъ для частныхъ людей, такъ точно и для воинскихъ чиновъ. А такихъ мѣстъ

въ горахъ, отвѣчающихъ всѣмъ условіямъ санитарной станціи, видимо—невидимо. Правда, что лучшіе пункты въ этомъ отношеніи, являющіеся подъ видомъ весьма живописныхъ мѣстностей, покрытыхъ лиственными рощами и хвойными лѣсами, отстоятъ слишкомъ далеко и высоко отъ центра долины, такъ что путешествіе туда сопряжено съ довольно значительными затрудненіями, въ особенности для больныхъ, которые не въ состояніи ѣхать верхомъ. Колесной дороги туда не существуєтъ и провести ее, даже при значительныхъ денежныхъ затратахъ, не вездѣ возможно.

Войскамъ Ферганской области болъе всего необходимо оставлять малярійную долину на извъстное время и удаляться въ горы.

Ежегодныя паблюденія указывають, что перемежныя лихорадки и прочія малярійныя забольванія, среди нижнихь чиновь, усиливаются льтомь и въ началь осени. Увеличивается не только число забольвающихь, но также интенсивность и разнообразіе бользненныхь формь, о чемь будеть сказано ниже. Во все это время войска стоять въ лагеряхь, которые расположены въ черть города или на окраинь; сльдовательно находятся въ тъхь-же неблагопріятныхь условіяхь, относительно маляріи, какь и во время пребыванія въ городь на зимнихь квартирахь.

Вся мъстность, на которой расположены лагери, какъ въ Нов. Маргеланъ, такъ и въ другихъ городахъ области, находилась прежде подъ пашнями, садами и т. п., а потому въ настоящее время вся почва пропитана органическими разложеніями, которыя, подъ вліяніемъ сырости и тепла, продуцируютъ малярійную міазму. Сверхъ того, окружающія мъстности покрыты хлъб-

ными и другими растеніями, которыя для своего произростанія требують искусственнаго орошенія, что также усугубляєть бользненность среди войскь, находящихся въ этихъ лагеряхъ.

Увести войска, на лагерное время въ горы, въ немалярійную, здоровую мъстность, оставляя въ городъ лишь необходимое число людей для занятія карауловъ,— вотъ по моему единственная, цълесообразная мъра для сбереженія здоровья и предотвращенія тъхъ гибельныхъ послъдствій, наблюдаемыхъ пами ежегодно, передъ которыми въ безсиліи и разочарованіи опускаємъ руки.

Оставшіеся люди, для занятія карауловъ, копечно не должны быть обречены на цёлое лёто; ихъ слёдуетъ мёнять черезъ извёстный промежутокъ времени съ такимъ разсчетомъ, чтобы тяготы подобной службы ложились равномёрно на всёхъ солдатъ, за исключеніемъ тёхъ, организмъ которыхъ подвергся серьезнымъ измёненіямъ отъ перенесенныхъ лихорадокъ, вслёдствіе чего имъ слёдуетъ оставаться все время въ горахъ. При подобномъ порядкъ вещей не будетъ надобности въ санитарно гигізническихъ станціяхъ, потому что весь гарнизонъ во время лагеря будетъ пользоваться благопріятными условіями санитарныхъ станцій.

Проведя все лъто и начало осени при такихъ благопріятныхъ условіяхъ, люди поправятся, возвратятся на зимнія квартиры бодрыми, здоровыми и будутъ въ силахъ бороться съ маляріей во время пребыванія въ городъ. Съ октября малярійныя бользни и въ доливъ начинаютъ ослабъвать такъ что забольваютъ большею частью только тъ, которые перепесли лихорадку лътомъ и осенью,—словомъ бываютъ только рецидивисты.

Что-же касается до военныхъ цѣлей, то полагаю, что дагерное расположение войскъ въ горахъ не только не повредить дёлу, а напротивь, можеть посодъйствовать къ болъе успъшному выполненію программы лътнихъ занятій. Когда занятія будуть вестись съ людьми здоровыми и бодрыми, то они безъ сомнънія пойдуть несравненно лучше и правильнъе, нежели съ слабыми и изнуренными, которые то и дъло заболъвають лихорадкою, вслъдствіе чего начатыя съ ними занятія должны перерываться.

Прохожденію курса стръльбы, горная мъстность не можеть быть помъхой. Разныя ученія, передвиженія и маневры въ горахъ, на различныхъ высотахъ принеслибы несомивниую пользу какъ въ смыслв спеціальнаго обученія, такъ равно и въ гигіэническомъ отношеніи. Это пріучало-бы организмъ къ движеніямъ по горамъ, къ вліянію разр'вженнаго воздуха, что непривычными людьми трудно переносится. Свободное движение на высотахъ пріобрътается только продолжительными упражненіями. А потому, если нашимъ войскамъ доведется когда либо совершать горные походы, то при настоящемъ положеніи дъла, безъ надлежащей подготовки,они будуть весьма затруднительны. На высокихъ мъстахъ появятся припадки горнаго недуга, что можетъ сильно противодействовать извёстнымъ военнымъ предначертаніемъ и задуманнымъ цёлямъ.

ГЛАВА VI. Минералогія Ферганской области.

Въ надрахъ горъ, окружающихъ Ферганскую долипу, несомнёно скрываются неисчернаемыя минеральныя богатства, до сихъ поръ мало извъстныя, ожидающія только предпріимчивыхъ людей обладающихъ техническими знаніями, а главное-необходимыми капиталами; 14 лътъ прошло съ занятія Ферганы русскими, а не одинъ почти изъ горныхъ промысловъ не тронутъ. Намъ извъстно, что въ горахъ находится много ископаемыхъ, какъ-то: бирюзы, золота, серебра, мъди, свинца, желъза, съры, мрамора, гипса, сърнаго колчедана, селитры, соли, огнеупорной глины, нефти, графита и богатыя залежи каменнаго угля; но изследованія и развъдки по этой части дълаются весьма поверхностно или людьми мало знакомыми съ этимъ дъломъ, или неимінощими достаточныхъ, для подобныхъ изысканій, денежныхъ средствъ. Некогорые изъ туземцевъ, повидимому, знають многія м'всторожденія серебра, м'вди и другихъ полезныхъ металловъ, но почему-то уклоняются оть указаній этихъ мъсть; а мы, производя розысканія ощупью, случайно иногда натыкаемся на подобныя мъсторожденія; по за неимъніемъ денегъ, необходимыхъ для начала разработокъ, оставляемъ до порыдо времени въ секретъ, надъясь при пособіи лицъ, располагающихъ капиталами, приступить къ утилизированію своихъ открытій.

Вотъ почему горная промышленность въ нашемъ крат далеко не находится на той степени, какая была бы желательной. Кромт каменпоугольныхъ, нефтяныхъ

и некоторыхъ другихъ производствъ, все остальныя находятся въ примитивномъ состояніи. Съ химическимъ составомъ различныхъ ископаемыхъ насъ познакомили труды магистра фармаціи Тейха; образцы-же минераловъ собраны въ Ташкентскомъ музев.

Въ горахъ, окружающихъ Ферганскую долину, по- драгоцънные видимому чрезвычайно мало хорошихъ минераловъ и въ этомъ случав здвшняя бирюза (калаитъ) будетъ едва ли не первымъ драгоцъннымъ камнемъ, -- но она значительно хуже персидской. Бирюза въ большой модъ у туземцевъ и богатые украшають ею рукоятки сабель, свдла, пояса и т. п. Въ Кокандв находятся искусные мастера, выдълывающіе разныя золотыя и серебряныя вещи, украшаемыя бирюзой, по европейскимъ образцамъ, а именно: браслеты, серьги, занонки, ручки для перьевъ и т. п.

Попадаются кристаллы драгоцівнюй шиниели, краснаго корунда и рубина, которые находять себъ не малый сбыть на Кокандскомъ базаръ. Мельчайшіе, въ видъ шлиха, кристаллики этихъ минераловъ, продаются довольно дорого; сарты придають имъ цёлебныя свойства.

Существующія въ Фергань, какъ и во всемь Туркестанъ, образованія миндально-каменныхъ породъ (мелафировъ) заключаютъ мъсторожденія лишь весьма простыхъ минераловъ, какъ напримъръ: халцедонъ, агатъ, горный хрусталь и гойландить.

Въ послъднее время, въ горахъ Кокандскаго увзда, наткнулись на мъсторожденія ляпись-лазури, гранатовъ и даже изумрудовъ; но мнв кажется, что всв эти минералы сомнительнаго достоинства. Образчики отправ-

лены въ Петербургъ для изслъдованія, но результать еще не извъстенъ.

Къ югу отъ Ферганской области, внѣ предъловъ ея, въ Бадахшанѣ, близь Шугнана, на берегу р. Пянджа, въ 16 миляхъ отъ Баршара и въ 30—къ С. отъ Ишкашима, находятся знаменитыя рубиновыя копи, прославившіяся съ давняго времени. Говорятъ, что гаранскіе рубины залегаютъ въ известнякѣ, подобно голышамъ или кремнямъ, встрѣчаемымъ въ этой-же породѣ.

Въ сосъдствъ съ этими конями, также въ Бадахшанъ, по ръкъ Кокчъ, впадающей въ Аму-Дарью, находятся огромныя массы ляписъ-лазури. Разработка, какъ рубиновъ, такъ и ляписъ-лазури, производится только зимою.

Алмазовъ и другихъ драгоцънныхъ камней до сихъ поръ не найдено.

Въ Чаткальской волости, Наманганскаго увзда, по Мазаръ-саю, вдоль всего берега этой ръки, находится горный хрусталь; а въ верховьяхъ Кокъ-су, впадающей въ Чаткалъ, залежи малахита.

Золото.

Золотыми розсыпями, находящимися въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Ферганской области, болѣе всего интересовались, какъ въ прежнее, такъ и въ настоящее время, но промывка даетъ такой ничтожный процентъ золота, что И. В. Мушкетовъ справедливо замѣтилъ, что здѣшніе волотопромышленники ходятъ въ лохмотьяхъ. И дѣйствительно, нѣкоторые изъ туземцевъ, занимаясь промывкой волота примитивнымъ способомъ, на бараньей шкурѣ, вымываютъ его каждый изъ нихъ на 20 коп. въ день, какъ разъ только на дневное пропитаніе.

На лѣвомъ берегу Касанъ-сая находится казенный волотой пріискъ, никѣмъ не разрабатываемый. Касан-

скіе потретичные конгломераты какъ прежде, такъ и въ недавнее время, привлекали къ себѣ вниманіе промышленниковъ вслѣдствіе содержанія въ нихъ золота. Въ логѣ Буто-яръ и сосѣднихъ съ нимъ находятся даже старыя разработки золота, занимающія большое пространство. Развѣдки Г. Федорова показали, что золото попадается весьма мелкими зернами въ глинисто-песчаномъ цементѣ конгломерата и содержаніе его не превышаетъ нѣсколькихъ долей, такъ что выгода разработокъ весьма соминтельна.

Д. Л. Ивановъ (1) упоминаетъ о золотомъ промыслъ на Алав, по ръкъ Мукъ, или какъ ее называютъ-Мукъсу. Промысель этоть, при всей незначительности его развитія и примитивности пріемовъ, заслуживаеть по многимъ причинамъ вниманія. Промывкой золота занимаются вдоль береговъ Мукъ-су у Алтынъ-Мазара и далъе въ Каратегинъ до устья ръки Оби-Кабудъ, т. е. на протяженіи 130 версть бурной ріки, не могущей установить своего русла и міняющей его въ теченіи года нъсколько разъ. По этому въ промывку поступаютъ пески подвижные, несомые ежегодно ръкою въ огромномъ количествъ. И всё-таки, на длинъ ста слишкомъ верстъ, жители считаютъ возможнымъ добывать въ этой массъ неску, перемъщающагося русла, достаточное для заработка количество золота. Продолжительная практика промывателей указала, что богатство песковъ увеличивается по мъръ приближенія къ вершинь, такъ что наибольшій проценть получается близъ Алтынъ - Мазара. Основательная догадка нъкоторыхъ промышленниковъ, что коренные источники золота на-

⁽¹⁾ Краткій отчеть о геологическихь изслідовані хъ на Памирі.

ходятся въ истокахъ Мука, заставляла ихъ дѣлать изысканія по верховымъ ручьямъ. Хотя практическіе результаты, зависѣвшіе отъ мѣстныхъ условій, были плохи, но общее убѣжденіе говоритъ, что золотоносностью Мука обязана главнымъ образомъ Суукъ-саю—тѣсной щели, крайне трудно доступной.

Въ Области еще находятся нъкоторыя золотоносныя ръки, но добыча изъ нихъ золота до того скудная, что едва обезпечиваетъ дневное пропитаніе добывателя.

Руды.

Массивно-кристаллическія и слоистыя метаморфическія породы, въ горной части Области, богаты свинцовыми и желізными рудами; точно также находятся и місторожденія мідныхъ рудь. Свинцовыя руды неріздко содержать довольно значительное количество серебра. Но вей эти подземныя богатства, какъ уже было сказано выше, пока не эксплоатируются и ждуть людей, которые занялись бы разработкой этихъ полезныхъ исконаемыхъ, отъ которыхъ государство можеть получить значительныя выгоды.

Въ Кетмень-тюбинской волости, Андижанскаго увзда, около перевала Тузъ-ашу (Суса-мыръ-тау), у верховьевъ р. Алты-кана, разрабатываются мъстными киргизами жильныя свинцовыя руды. Свинецъ добывается въ незначительномъ количествъ только для мъстныхъ нуждъ и самымъ первобытнымъ способомъ: руда плавится въ ямъ, вырытой тутъ же въ землъ. По разсказамъ киргизовъ руда оченъ хорошая, но рудники не имъютъ будущности, такъ какъ лежатъ въ оченъ глухомъ и трудно доступномъ мъстъ. Примъси серебра нътъ.

У меня нътъ свъдъній относительно того, произво-

дились ли разработки всёхъ этихъ рудъ въ прежнее время; но во всякомъ случав, если онв и существовали, то въ весьма ограниченномъ видв, при самыхъ примитивныхъ пріемахъ. Мы знаемъ, что въ сосёдстве съ Ферганой подобная разработка производилась. Д. Л. Ивановъ (1) приводитъ тё немногія свёдёнія, которыя указываютъ слёдующее:

- 1) Въ боковомъ правомъ ущельи, впадающемъ въ Гунтъ и называемомъ Кумышъ-джилга (серебряное ущелье), гдъ-то въ верховьяхъ, прежде разрабатывалась жила чистаго серебра, толщиною въ руку, но была брошена будто-бы вслъдствіе сильнаго вымогательства правителей въ сторону рудокоповъ; а върнъе, что копь брошена вслъдствіе обвала. Теперь нътъ людей знающихъ это мъсто.
- 2) На Мургабъ указывають мъсто разрушеннаго желъзнаго завода. Въ окрестныхъ горныхъ породахъ наблюдается сильное развитіе жельзной слюдки.
- 3) Въ низовьяхъ р. Кудары есть брошенныя старыя копи, въ которыхъ добывали мѣдную и свинцовую руду.

Изъ этого можно заключить, что и въ предълахъ Ферганской области въ прежнее время производилась выплавка нѣкоторыхъ металловъ для мѣстныхъ нуждъ, такъ какъ получать ихъ изъ Россіи и другихъ мѣстъ, при тогдашнемъ положеніи дѣлъ, было весьма затруднительно. По заявленію туземцевъ, серебряная монета (коканы) чеканилась изъ серебра, добываемаго на мѣстъ, или въ сосѣднихъ владѣніяхъ, точно также какъ и производство разныхъ вещей и украшеній. Въ настоящее время,

⁽¹⁾ Loc. cit.

когда жельзо, мъдь, олово и другіе металлы привозятся изъ Россіи безпренятственно и само собою разумьется, что они несравненно высшаго качества, нежели добываемые на мъстъ примитивнымъ способомъ, туземцы забросили свои крошечные заводы, а покупаютъ все необходимое для своихъ издълій на базарахъ.

Маленькіе чугунно-литейные заводы существують еъ давнихъ поръ и по настоящее время. На нихъ отливають сошники, втулки для арбяныхъ колесъ и прочіе незамысловатые предметы; но все это производство въ весьма незначительномъ видъ. Въ Наманганъ съ давнихъ поръ существуютъ четыре чугунно-литейныхъ завода и на всъхъ ихъ въ годъ получается отъ 24—40 пудовъ чугуна. Въ Чустъ 3 завода, на которыхъ годовая сумма производительности составляетъ около 300 рублей.

Котлы, въ которыхъ мѣстные жители приготовляютъ пищу, привозятся изъ Россіи готовыми и раскупаются какъ осѣдыми жителями, такъ и кочевниками. Изъ оффиціальныхъ свѣдѣній видно (¹), что въ 1885 г. привезено въ Фергану изъ Россіи чугунныхъ котловъ на 439,500 рублей; желѣза, стали, чугуна и желѣзныхъ издѣлій на 124,000 руб.; мѣди и свинцу на 7,800 руб. Вывезено изъ Ферганы въ Кашгаръ желѣза, стали, чугуна, котловъ, желѣзныхъ и мѣдныхъ издѣлій на 24,445 руб. Слѣдовательно на 546,855 руб.—осталось въ Ферганѣ и распродалось, какъ осѣдлому, такъ и кочевому населенію.

с t р a. Около 40 верстъ къ SSW отъ города Коканда, въ одномъ изъ побочныхъ овраговъ (Иръ-яга) живописной

⁽¹⁾ Всеподданъйшій отчеть по области за 1885 годъ.

долины Шаръ-су, мощные осадки мъловаго періода образують изгибъ и переломъ, и кромъ того обнажають нижніе стрые рухляки, почти сплошь проникнутые кристаллическою сфрою, начиная отъ кристаллическихъ друзъ до втековъ, около 6-ти дюймовъ толщины. Это замвчательное мвсторождение свры было опредвлено Г. Д. Романовскимъ еще въ 1876 г. Въ настоящее время оно разрабатывается Д. Петровымъ, частью для своего спичечнаго завода, а частью для продажи. Мы пріобрътали эту съру для дезинфекціи зданій и другихъ предметовъ посредствомъ сфристой кислоты.

При ханахъ въ этомъ мъстъ тоже добывалась съра для приготовленія пороха и сфрянокъ, такъ какъ спичекъ туземцы до сихъ поръ не умѣютъ дѣлать, а употребляють русскаго издълія. Прежняя разработка велась самымъ первобытнымъ способомъ. Отдъленіе съры отъ пустой породы дёлалось тишой (сартовскій топоръ), которой откалывались самые чистые и богатые куски евры; остальное-же шло въ отвалъ какъ не стоющее вниманія. На самомъ- же дълъ, отвалъ на столько богатъ сърой, что ея въ немъ теперь навърное гораздо больше, чёмъ было получено ханскимъ правительствомъ. Въ одной изъ восточныхъ ямъ можно проследить жилы и желваки чистой съры (1).

Мъсторожденія съры находятся еще и въ другихъ мъстахъ, но они никъмъ не разрабатываются.

Породы мрамора находятся почти по всему Тянь- мраморь, шаню, а известнякъ имъетъ еще большее распространеніе. Точно также гипсь залегаеть громадными массами въ разныхъ мѣстахъ, въ особенности около киш-

^{(&#}x27;) Д. Л. Ивановъ.

лака Самгара, гдъ изъ него состоятъ цълыя горы до 3000 футовъ высоты. Всъ эти породы не утилизируются ва исключеніемъ алебастра, который употребляется въ большомъ количествъ, потому что богатые сарты шту-катурятъ имъ стъны своихъ жилищъ и дълаютъ всевозможныя лъпныя украшенія.

Глины.

Разныхъ сортовъ и цвътовъ глины имъютъ значительное распространеніе. Огнеупорная, синяя глина, навываемая сартами Гуль-бюте, находится во многихъ мъстахъ, но самыя бельшія залежи ея—около кишлака Учъ-Кургана, въ 30 верстахъ отъ Маргелана. Она по своему достоинству пріобръла такое значеніе, что вывозится за предълы Области на заводы. Мъстные жлтели дълаютъ изъ нее тигли для плавки металловъ.

Около Риштана находится особыхъ свойствъ горшечная глина, вслъдствіе чего въ этомъ кишлакъ съ древнихъ временъ существуетъ громадное производство горшковъ и всевозможной посуды, употребляемой не только во всей Ферганъ, но и за предълами ея. Она считается весьма хорошаго достоинства.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ есть и фарфоръ, но онъ плохаго качества, а потому и не употребляется для выдѣлыванія посуды, тѣмъ болѣе, что всегда легко достать прекрасныя фарфоровыя чашки и другія вещи, привовимыя черезъ Кашгаръ изъ Китая. Въ 1885 г. привевено китайскихъ чашекъ въ Фергану на 1883 рубля. Каменный мозгъ, или, по туземному, Колыбъ-ташъ, встрѣчается рѣдко въ предѣлахъ Области; но его много въ сосѣднихъ уѣздахъ Семирѣченской области, а также въ Кураминскомъ уѣздъ. Составъ Колыбъ-таша показываеть, что вещество это обладаетъ одинаковымъ составомъ съ каолиномъ, но имѣетъ сложеніе не землистое,

а плотное (1). Вещество это, вслъдствие своей огнеупорности, представляетъ собою весьма цвиный матеріалъ для металлургическихъ операцій. Въ г. Върномъ, около котораго его очень много, выдълываются изъ Колыбъ-таша разныя галантерейныя вещи очень тонкой работы. Твердость этой породы около 2,5.

Селитры весьма много. Она добывалась и въ преж- Селитра. нее время при хапахъ для производства пороха, а также кожевниками при выдёлкѣ кожъ; кромѣ того употребляется въ народной медицинъ. Въ домашнемъ быту для приготовленія солонины употребляется, кажется, только русскими. Болъе значительныя, или, по крайней мъръ. болъе доступныя залежи селитры, гдв ее добывають въ большомъ количествъ, находятся въ Шариханской волости, около кишлака Кара-Калпакъ, употребляемая преимущественно кожевниками. Также находятся залежи около Камышъ-Кургана и въ 30 верстахъ отъ Маргелана, около Кувы. Въ послъднемъ мъстъ ее добываютъ съ давнихъ поръ, а въ 1886 г. подъ толстымъ слоемъ селитры открылись кирпичныя постройки. Къ какому времени онъ относятся-трудно сказать, такъ какъ не были еще произведены правильныя раскопки; но во всякомъ случав, существовавшій на этомъ мість городь, или селеніе, относится къ весьма отдаленному времени, разъ онъ уже покрыть толстымь слоемъ селитры. Туземцы не сохранили преданій о существовавшемъ здісь городі.

Квасцы тоже добываются во многихъ мъстахъ, но въ Наманганскомъ увздв по Касанъ-саю, въ урочищв Бузукъ, на Ачикъ-ташъ-тау, квасцы встрвчаются готовыми кристаллами, въсомъ въ фунтъ и болъе. Тамъ-же

⁽¹⁾ Матеріалы для геологіи Туркестанскаго края. Г. Д. Романовскаго. Вып. І, стр. 29.

они добываются изъ розсыпей при вывариваніи въ небольшомъ котлѣ. Квасцы употребляются туземцами для нѣкоторыхъ производствъ и какъ лѣкарство. Главнымъ образомъ квасцы употребляются здѣсь при окраскѣ бумажныхъ тканей, кожъ и т. п., какъ закрѣпа красокъ.

Въ бывшемъ Чустскомъ увздв, по Чандаласъ-саю, въ горахъ и въ Аштской волости, на Аакъ-ташв, находится много квасцовъ. При Мадали-ханв въэтихъ мветностяхъ были устроены глубокія шахты, но всявдствіе безпорядковъ, работы были прекращены.

Въ Кокандскомъ уфздф, около сфрнаго и нефтянаго мъсторожденія, въ долинъ Шаръ-су, между устричными известняками и рухляками, заключающими съру, жаются довольно толстые пласты мягкаго рухляковаго былосивжнаго вещества, извъстнаго у туземцевъ подъ именемъ ачекъ, или ачикъ. Горный инженеръ профессоръ химін В. В. Бекъ, сдълаль анализъ этого вещества, въ которомъ кромъ глины, гипса и съры оказалось еще присутствіе сфрно-кислой магнезіи и поташистыхъ квасцовъ. Замъчательная вещь, что туземцы, не имъя никакого понятія о химіи, знали о составъ этого вещества, потому что ачикъ-ташъ называются квасцы. А. ф.-Миддендорфъ полагаетъ, что нарынскій квасцовый сланецъ, согласно анализу профессора Шмидта, по всей въроятности, тождественъ съ веществомъ ачекъ, находящимся въ долинъ Шаръ-су и который употребляется при дубленіи.

Поваренная

сель.

Въ Ферганской области преобладаютъ нижніе соленосные, третичные осадки (палеогеновые); здѣсь эти слои несогласно пластуются съ Ферганскимъ мѣловымъ ярусомъ.

Мъсторождения каменной соли и самоосадочной на-

ходятся во многихъ мъстахъ; но болье онь обслъдованы около Самгара, на Ю.—В. отъ горы Кара-Мазаръ. По опредъленію профессора Ремановскаго, самая соль имъетъ наружный видъ и сложеніе такое-же, какъ извъстная соль Велички.

Она въ настоящее время разработывается и поступаетъ въ продажу подъ названіемъ Бардунгульской каменной поваренной соли. По анализу, сдъланному въ лабораторіи Ташкентскаго военнаго госпиталя въ сентябръ 1886 г., эта соль содержить на 100 частей:

Хлористаго	натрія		•		4	-	93.	
Кристаллиза	щіонной	воды					4.	
Хлористаго	магнія,	калія	и	кальц	ія.		3.	
				Итог	0.		100.	(III)

Бардунгульская соль имъетъ преимущество передъ всъми извъстными солями, употребляемыми въ Области, по своей чистотъ. Въ киргизской, самоосадочной соли содержится селитра, а въ Самаркандской каменной соли—желъзо и марганецъ, вслъдствіе чего она имъетъ розовый оттънокъ (1). Бардунгульская соль даже превосходитъ извъстную Илецкую, такъ какъ послъдняя содержитъ $2^{1}/_{2}$ $^{0}/_{0}$ сърнокислыхъ соединеній, придающихъ ей нъсколько горькій вкусъ, тогда какъ въ Бардунгульской—этихъ соединеній вовсе не заключается, вслъдствіе чего эта соль имъетъ чистый соленый вкусъ.

Въ Кетмень-тюбинской волости, въ системв рѣки Туркенъ, педалеко отъ ея устья, почти около Нарыпа, имѣются богатѣйшія валежи каменной соли, въ видѣ цѣлой отдѣльной горы. Соль прикрыта только небольшимъ

^(*) Такъ называемая Сапаркандская соль добывается не въ Самаркандѣ, а въ кишлакѣ Башъ-Хурда, въ горномъ хребтѣ того-же имени, въ 64 верстахъ отъ Гузара, въ Бухарскихъ владѣніяхъ.

елоемъ гипса и глины. Верхніе слои соли нечисты. Отбитый кусокъ заключаетъ внутри себя много постороннихъ примъсей, по дальше соль очень чистая и на видъ похожа на горный хрусталь. Химическій анализъ еще не произведенъ и она добывается исключительно для мъстныхъ нуждъ.

Въ бывшемъ Чустскомъ увздв, вблизи кишлака Камышъ-Курганъ, производится добываніе соли изъ озера Акъ-Сыкенъ, гдв таковая сама кристаллизируется къ концу лвта естественнымъ образомъ и собирается пре-имущсственно жителями вышеуномянутаго кишлака, котя не воспрещается пользоваться всвмъ желающимъ. Соли изъ этого озера добывается ежегодно отъ 2500—3000 арбъ, т. е. отъ 75,000—100,000 пудовъ, изъ которыхъ ⁴/₅ всего количества добывается чистой, бѣлой соли, употребляемой въ пищу людьми, а ¹/₅ сѣрой соли, идущей на присыпку корма скоту.

Одинъ человѣкъ, съ арбой и лошадью, въ теченіи мѣсяца получаетъ чистаго заработка, отъ добыванія и развоза соли отъ 8—10 рублей. Добываніе соли на озерѣ Акъ-Сыкенъ производится не всегда съ одинаковою успѣшностью. Сили, которые въ этой мѣстности нерѣдки, наполняютъ озеро водою, которая вслѣдствіе этого не успѣваетъ испариться за лѣто; ранніе-же дожди въ началѣ осени размываютъ собранную соль, лежащую на берегу, потому что не имѣется никакихъ приспособленій для ея сохраненія и защиты отъ дождя. При такихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, въ извѣстные года, вывозъ соли вовсе пе производится.

Жители Алая и Памира получають соль изъ Рянгкульской соленой копи, представляющей поверхностную и слабую разработку одного пласта зернистой соли. Кром'в того, на урочищ'в Тузь-Дара, около большаго Алая, производится добываніе соли кочевниками для собственной надобности, но она плохаго качества.

Окраины долины Ферганы изобилуютъ неотью зе- Нефтяные леновато — чернаго цвъта; она показывается на границъ источники. между третичными и мъловыми осадками. Она выходить на земную поверхность многочисленными ключами, числомъ болъе 200 (1). Въ общемъ расположении ихъ замвчаются двв полосы вдоль предгорій или, ввриве, вдоль передовыхъ грядовыхъ поднятій, окружающихъ Ферганскую котловину. Первая съверо-восточная нефтяная полоса (въ Наманганскомъ и Андижанскомъ увздахъ), на параллели, идущей на 35 верстъ съвернъе Намангана. Длиною эта полоса-верстъ 40 и расположена по объимъ сторонамъ Нарына, отъ Майля-сая на западъ, до Кульменя на востокъ. Вторая юго-западная нефтяная полоса (въ Маргеланскомъ и Кокандскомъ увздахъ) лежить на широтъ Махрама, длиною около 100 версть отъ Канибадама на западъ, до Чукуръ-кишлака, или Чиміона на востокъ. Кромъ того, есть еще какъ бы промежуточная, восточная нефтяная группа (въ Андижанскомъ увздв), почти на одной широтв съ Андижаномъ, верстахъ въ 40 къ востоку отъ него, на Кара-Дарьв, близъ Аимъ-Кишлака. Разстояніе между съверо-восточной полосой и юго-западной изминяется отъ 140 до 175-ти верстъ.

И такъ, обширная Ферганская долина нъкоторымъ образомъ окружена съ съвера, востока и юга нефтяными источниками, естественная производительность которыхъ однако пока весьма незначительна. Для ръше-

⁽¹⁾ Нефтяние источники Ферганской области Д. Л. Ивановъ. Туркестанскін вѣдомости 1882 г. № 33 и 34.

нія вопроса по подземнымъ богатствамъ этого вещества пеобходимо произвести разв'єдочное буреніе во многихъ

пунктахъ.

Г. Д. Романовскій говорить (1), что геологическія условія нахожденія нефти въ Ферганской области, какъ и большинства другихъ ея пріисковъ на земномъ шарѣ, опровергають теоріи образованія этого жидкаго углеводорода путемъ перегонки газообразныхъ, или парообразныхъ углеродисто-водородныхъ соединеній, будтобы исходящихъ отъ раскаленныхъ нъдръ земли. Выходы этого вещества на поверхность строго обусловливаются здъсь границами распространенія нижележащихъ буроугольныхъ образованій, покоющихся на кристаллическихъ и метаморфическихъ породахъ, въ коихъ не замъчено даже мальйшихъ признаковъ нефти или смолистыхъ веществъ, не смотря на весьма близкое обнаженіе ихъ отъ источниковъ горнаго масла. Это явленіе, напротивь, подтверждаеть господствующее и авторитетное мнъніе большинства европейскихъ и американскихъ ученыхъ, что нефть образовалась отъ подземнаго разложенія (гніенія, обугливанія) растительныхъ и частью животныхъ остатковъ.

Во вевхъ извъстныхъ здъсь мъстностяхъ, съ выходами горнаго масла, послъднее залегаетъ въ пластахъ горныхъ породъ (известнякахъ, глинистыхъ сланцахъ и пескахъ), принадлежащихъ къ Ферганскому ярусу мъловой системы.

Кромъ сырой, жидкой нефти, имъются слъдующіе минеральные продукты, сопровождающіе ее въ той или другой группъ источниковъ: 1) битумъ и горный воскъ, по туземному—ташъ-мумъ (горная смола), 2) чистая сгу-

⁽¹⁾ Loc. cit. Вып. I стр. 37.

щенная нефть—чистый киръ, по туземному—суёкъ-мумъ (жидкая смола), 3) нефтью напитанная земля и сгущенная нефть съ нескомъ и гравіемъ—нечистый киръ, по туземному—хилкъ. 4) нефтяные пески, 5) смолистые известняки, 6) минеральные ключи (съ солями и сърнистымъ водородомъ), 7) углеводородный газъ, 8) съра, 9) квасцы и 10) гинсъ.

Сырая нефть иногда выходить на новерхность, просачиваясь изъ горныхъ породъ въ видъ чистой нефти; чаще-же вытекаеть вмъсть съ водою, образуя небольшой ключикъ. Вода въ большинствъ случаевъ горькосоленая, съ замътнымъ присутствіемъ сърнистаго водорода, почему близъ выхода ключей всегда образуется тонкая пленка, бълая, или едва желтоватая, которая па огив даеть ясный запахъ свры. Почти вездв выходы нефти сопровождаются выдъленіемъ газовъ, образующихъ на поверхности ея массу мелкихъ, радужныхъ пузырьковъ. Тамъ, гдъ нефть собиралась, или собирается человъкомъ, на мъстахъ выхода ея, вырыты ямы, которыя иногда превращаются въ глубокіе колодцы. Самые глубокіе изъ нихъ на Кичикъ-мав, въ Наманганскомъ увздъ, достигаютъ до 20 аршинъ. На Майли-су, въ Андижанскомъ увздв, проведены глубокіе арыки отъ выхода ключа къ сборной ямъ.

Удъльный въсъ сырой нефти, по опредъленію Д. Л. Иванова, въ среднемъ—0,950 при 140 R., т. е. Ферганская сырая нефть принадлежитъ къ тяжелымъ сортамъ горнаго масла. Количество вытекающей нефти изъ того или другого источника очень разнообразно и измъняется отъ нъсколькихъ канель до 6 ведеръ въ сутки.

Въ тъхъ случаяхъ, когда выходящая нефть не собирается въ ямахъ, она естественнымъ путемъ расплывается вокругъ выхода и напитываетъ собою землю. На солнцв и воздухв всв легкія составныя части пефти испаряются и остается сгущенная нефть въ видъ вара, или, върнъе, кира, смъшаннаго съ землистыми частицами, пескомъ, камнями и проч. Въ этомъ видъ нефть называется туземцами хилкъ. Онъ бываетъ различныхъ сортовъ, что зависитъ отъ степени сгущенія нефти, отъ ея сравнительнаго количества съ посторонними примъсями и отъ состава этихъ последнихъ. Хилкъ, въ которомъ много землистыхъ частицъ (глины), а нефть довольно жидка, годится только какъ горючая земля. Густой-же, богатый киромъ хилкъ, содержащій извъстное количество песку и мелкихъ камней, представляеть собою смёсь, подобную нёкоторымъ искусственнымъ асфальтовымъ смъсямъ и можетъ употребляться какъ очень хорошій цементь для кладки на немъ камня и кирпича въ сырыхъ и водныхъ мъстахъ, замъняя гидравлическія смѣси. Онъ годится на тротуары, полы, обдълку купалень, помойныхъ ямъ, въ баняхъ и проч.

Въ нѣкоторыхъ казармахъ Ферганской области и лазаретахъ начинаютъ дѣлать полы изъ хилка и они оказываются весьма пригодными, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ незамѣнимыми. Эти полы легко содержать въ чистотѣ, вода не пропитывается, иыли нѣтъ, такъ что весьма желательно, чтобы во всѣхъ лѣчебныхъ заведеніяхъ были устроены подобные полы. Нужно при этомъ замѣтить, что хилкъ, въ соприкосновеніи съ щелочными жидкостями, трескается, отстаетъ и весьма быстро разрушается. По этому въ ретирадахъ онъ вовсе

не годится, такъ какъ моча дъйствуетъ на него разрушающимъ образомъ, при чемъ ощущается острый амміячный запахъ.

Лучшаго качества хилкъ добывается: 1) на Майлисав и Кизылъ-Алмв въ Наманганскомъ увздв, 2) на Унку и Шингв, а также на Майли-су и Теке-Бели, Андижанскаго увзда, 3) близъ Чукуръ-кишлака Маргеланскаго увзда и 4) на Риштанскихъ и Канибадамскихъ источникахъ Кокандскаго увзда.

Нефть въ чистомъ видѣ не утилизировалась туземцами и только въ рѣдкихъ случаяхъ употреблялась какъ горючій матеріалъ. Нефтяные источники по рѣчкѣ Майлису, въ 28 верстахъ къ сѣверу отъ кишлака Исбаскента, съ давнихъ поръ были извѣстны туземцамъ и во время Худояръ-хана, въ началѣ семидесятыхъ годовъ, на нихъ выдѣлывался плохой керосинъ, при помощи самодѣльныхъ приспособленій, подражавшихъ перегонному кубу и холодильнику.

Въ 1882 г. А. Д. Германъ началъ добывать нефть въ петочникахъ около Чиміона и вблизи Чукуръ - кишлака и въ 1883 г. сталъ перегонять керосинъ весьма хорошаго качества, который употреблялся въ Маргеланъ для освъщенія, какъ въ частныхъ домахъ, такъ и въ казенныхъ учрежденіяхъ. Заводъ этотъ просуществовалъ недолго, за неимъніемъ денежныхъ средствъ для дальнъйшаго производства, но тъмъ пе менъе заслуга г. Германа состоигъ въ томъ, что Фергана впервые увидъла прекрасный керосинъ мъстнаго производства и цъна на привозный сразу значительно понизилась, вслъдствіе чего онъ сталь входить во всеобщее употребленіе.

Въ настоящее время, добываніемъ нефти и перегонкой керосина ванимается Д. Петровъ на источни-

кахъ, находящихся въ Каримъ-Дувана, Кокандскаго увзда и, кажется, дёло идетъ успѣшнѣе.

Озонеритъ,

Озокеритъ, или горный воскъ, горная смола, по туз. ташъ-мумъ, разработывается главнымъ образомъ въ Наманганскомъ уъздъ, на Майли-саъ, въ горъ Кокъ-Ташъ или Кокъ-Тюбе, въ которой трещины заполнились различными минеральными веществами и превратились въ жилы. Между ними особенно распространены жилы известковаго шната и озокерита, достигающія 30 центиметровъ толщины.

Разработка ташъ-мума идетъ съ давнихъ поръ, болъе 40 лътъ и считается у туземцевъ наиболъе доходнымъ дъломъ, велъдствіе большаго спроса. Цъна ташъмума на рынкахъ достигаетъ 10 руб. за пудъ. У туземныхъ мастеровъ опъ употребляетси въ кожевенномъ, сапожномъ, шорномъ дълъ и въ производствъ бумажныхъ матерій; у туземныхъ-же врачей—для приготовленія разныхъ мазей и пластырей. Для русской техники ташъ мумъ можетъ служить матеріаломъ для полученія вазелина, парафина, церезина и проч.

Другія копи горной смолы, напр. Карау, бливъ Битау, на Чингыръ-Ташѣ гораздо бъднѣе и худшихъ достоинствъ.

Другой сорть смолы, которая у туземцевъ извъстна подъ названіемъ жидкаго мума, представляетъ, повидимому, средину между вышесписаннымъ и чистой сгущенной нефтью. Добывается она на источникахъ близъ Каримъ-Дуваны, въ Кокандскомъ уъздъ, гдъ находится множество старыхъ и нынъ разработываемыхъ копей, указывающихъ на значительные размъры этихъ работъ туземныхъ промышленниковъ.

Въ Ферганъ мощные угленосные осадки являются: Каменный въ Наманганскомъ увздв въ Кыркъ-Угульской волости, на урочищѣ Кокъ-Тюбе, въ верстахъ 25 отъ Учъ-Кургана; въ Андижанскомъ убедъ-въ мъстности Маркай Кугартской волости, версть около 120 отъ г. Андижана; въ Ошекомъ увздв, -- въ Наукатской волости, въ урочищв Куръ-Куль и въ 45 верстахъ къ Ю. отъ Коканда, въ долинъ ръки Шаръ-су (ущелье Сай-Бургалы), а так-. же между верховьями рѣкъ Исфары и Ходжа-Бакырканъ. Эти пласты залегають подъ мёловыми известияками и покоются большею частью на кварцевыхъ порфирахъ. До сихъ поръ разработка каменнаго угля производится въ незначительномъ количествъ, но, въроятно, въ скоромъ времени отопление имъ войдетъ во всеобщее употребление.

Въ геологическомъ отдълъ было уже уномянуто, что професоръ Романовскій относить здішніе каменноугольные пласты къ ретійской формаціи, а не къ настоящей каменно-угольной, что наблюдается почти на всемъ Азіатскомъ материкъ, всявдствіе этого здъшній уголь принадлежить къ буроугольнымъ образованіямъ и по качеству гораздо ниже настоящаго каменнаго угля.

Мъсторожденія графита до сихъ поръ никъмъ не разработываются, не смотря на то, что въ послъднее время открыты мощныя залежи въ горахъ, окружающихъ Ферганскую долину съ юга. Повидимому, онъ весьма удовлетворительнаго качества, но здёсь пока не имъетъ никакого примъненія.

Собранные по настоящее время въ Туркестанскомъ Палеонтолократ остатки первобытных животных и растеній найдены преимущественно въ предгорьяхъ и горахъ западнаго и съвернаго Тянь-Шаня, а отчасти въ Алай-

скомъ хребтъ. Они принадлежатъ ко всъмъ тремъ періодамъ нептуническихъ, или осадочныхъ горныхъ образованій, а именно: къ древнему (палеозойскому), среднему (мезозойскому), и новому (кэнозойскому). Не смотря на огромное распространеніе этихъ образованій, особенно палеозойскихъ, заключающіеся въ нихъ органическіе остатки принадлежатъ къ весьма немногимъ семействамъ, родамъ и видоизмѣненіямъ.

Я не стану перечислять всёхъ ископаемыхъ, найденныхъ въ Ферганѣ русскими путешественниками, посъщавшими эту страну, такъ какъ они описаны и изображены на прекрасныхъ рисункахъ профессоромъ Романовскимъ, въ сочиненіи подъ заглавіемъ: "Матеріалы для геологіи Туркестанскаго края".

ГЛАВА VII. Флора Ферганской Области.

Различіе климатических условій, зависящих отъ общій •5• орографическаго положенія, въ связи съ свойствомъ почвы и количествомъ оросительной воды, повліяли на разнообразіе флоры въ Ферганской Области въ такой степени, что здёсь мы встрёчаемся съ растительностью тропиковъ, полярныхъ странъ и различныхъ промежуточныхъ между ними мъстностей.

Растенія распредъляются по горамъ снизу вверхъ, совершенно въ томъ-же порядкъ, въ какомъ они идутъ отъ экватора къ полюсамъ; всякая мъстность въ Ферганъ, лежащая на извъстной высотъ надъ уровнемъ моря, покрыта соотвътствующею растительностью, если только почва и необходимое количество влажности допускаютъ произрастаніе. Поэтому Фергана можетъ представить образцы флоры чуть не целой Европы и большей части Азіи. Одни только морозы, достигающіе въ теченіе нъсколькихъ дней—17—19⁰ С., мъщаютъ флоръ нашей долины поравняться, во всёхъ отношеніяхъ, съ олорой Испаніи и Италіи.

Н. А. Сфверцовъ различаетъ 5 вертикальныхъ поясовъ: 1-ый степной (1), до высоты 700 ф. н. у. м., 2-ой культурный - до 2000 ф., 3-й лиственный - до 6000 ф., 4-ый хвойный - до 10000 о. и 5-ый альпійскихъ травъ выше 10000 ф. Каждому изъ этихъ поясовъ свойственна евоя флора, хотя границы распредъленія разнаго рода растеній далеко не соотв'єствують этому д'вленію.

Растительность Памира состоить изъ оригинальной

⁽¹⁾ Этого пояса въ Ферганъ не существуетъ.

смѣси степныхъ формъ влаковъ съ разнообразнѣйшими верхнеальнійскими травами; послѣднія примѣшиваются къ почти сплошнымъ степнымъ злакамъ Алая. Вообще флора Памира гораздо богаче, чѣмъ можно бы ожидать по его крайне суровому климату, свободному отъ ночныхъ морозовъ только въ теченіе 10—15 дней, во второй половинѣ іюля; въ августѣ-же эти морозы ночью достигаютъ—15 и даже—170 С.

Въ Алайскихъ горахъ, на высотъ 13300 ф., А. Федченко находиль Oxygraphis glacialis и это была, повидимому, наибольшая высота, на которой имфются растенія, потому что на высотъ 14000 ф. уже лежить снъжная линія. А между тъмъ Памиръ, кромъ травъ, не безусловно лишенъ и кустарниковъ, даже деревьевъ, на той-же высотъ. Въ двухъ мъстахъ, близъ ръки Аксу и около Яшиль-Куля, Н. Съверцовъ (1) нашелъ таловыя рощицы, на высоть 12500 ф. съ полутора и даже двухсаженными деревьями, а кусты гребенщика, спорадически, по разнымъ ръчкамъ, поднимаются и до 131/, тысячъ Ф. Правда, что согласно опредъленію Н. Стверцова, втиный снътъ на съверныхъ склонахъ Памирскихъ горъ лежить на высотв около 15000 ф.; южные-же склоны освобождаются лѣтомъ отъ снѣга до высоты 18 и даже $18^{1}/_{2}$ тысячь ϕ . Это только и даеть возможность гребенщику на Памиръ подняться до такой высоты, на могутъ расти горахъ какой въ Алайскихъ oxygraphis glacialis.

Вообще замъчательное явление въ природъ представляетъ собою эта альпійская флора, которая застав-

⁽⁴⁾ Замътки о фаунь позвоночныхъ Памяра Н. А. Съверцова. Записки Туркестанскаго отдъла Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи. Т. І. вып. І.

ляеть болье удивляться, нежели могучая тропическая растительность. Нужно видъть, какъ она въ горахъ отвоевываеть отъ снъга каждый клочекъ земли и спъщитъ пустить тоненькіе стебельки, чтобы воспользоваться короткимъ лътомъ, съ незначительнымъ количествомъ тепла. Я видёль около ледника, на вершокъ отъ снега, ростки какого-то растенія, въроятно астрагала, Охутго із kaschmiriana, замъченнаго А. Федченко на той же высотъ и эти ростки пущены въ одинъ день, такъ какъ наканунъ это мъсто еще находилось подъ снъгомъ. Даже выше снъжной линіи, если только обстоятельства поблагопріятствують тому, что на какомъ либо клочкв, возвышающемся надъ остальною мъстностью, или около камня, сифгъ растаетъ, то немедленно появляются растенія, быстро увеличивающіяся въ рость и достигають неріода цвътенія. Кругомъ все покрыто снъжною педеною, а эти одинокія растенія стойко перепосять всв перипетіи борьбы за существованіе.

Ниже альнійскаго пояса слідуеть поясь хвойныхь деревьевь, представителями которыхь въ Ферганіз являются только можжевельникь, ель и пихта. Этоть поясь можеть быть подразділень на три: нижняя часть есть поясь хвойно-лиственнаго ліса: ель, пихта, береза, тополь; средняя—представляеть почти чистые ельники съ примісью рябины; верхняя, собственно переходная къ слідующему поясу, характеризуется можжевельникомь, при отсутствій елей, но онъ спускается и въ поясь ельниковь, занимая тамъ скаты на солнцепёкъ.

Этотъ поясъ, съ подобными подраздъленіями, является только въ горахъ окружающихъ Ферганскую долину съ съвера; въ Алайскомъ-же хребтъ, поясъ хвойныхъ составляетъ исключительно можжевельникъ (juni-

perus pseudosabina), а ель и пихта почти не встрѣчаются, за исключеніемъ еловой рощи за Гульчой.

Наиболъе богатый поясъ 3-й, т. е. лиственный, въ которомъ разнообразіе естественной флоры зависить отъ геологическаго строенія почвы. Лиственныя породы болъе развиты тамъ, гдъ встръчается перемежаемость

кристаллическихъ породъ съ осадочными.

2-й поясъ, культурный, у насъ представляль-бы собою почти совершенно безплодную пустыню, если-бы не усилія людей, трудившихся въ теченіи тысячельтій и превратившихъ эту пустыню въ плодороднъйшую страну. Естественная флора Ферганы существуетъ только въ горахъ и—кое гдѣ, по берегамъ рѣчекъ; вся-же остальная растительность въ долинъ произошла отъ посадокъ и посъвовъ, такъ какъ безъ искусственнаго орониенія здѣсь мало что можетъ произрастать.

Общепринятаго выраженія о Ферганской долинь, что она безъ искусственнаго орошенія представляла бы собой безплодную пустыню нельзя принимать въ буквальномъ смысль этого слова. Растительность существуеть и безъ орошенія, но она чрезвычайно скудная, въ сравненіи съ роскошною культурною флорою здішняго края и притомъ такая, которая не можетъ служить для питанія человька, вслідствіе чего безъ искусственнаго орошенія немыслимо его существованіе. Но нікокоторыя растенія какъ древесныя, такъ и травянистыя, растущія безъ искусственнаго орошенія, разбросаны въ долинь въ незначительномъ количествіх и онів придерживаются извістной почвы.

На глинистой почвъ, съ сухой подпочвой, могутъ только расти Ephedra, Rosa berberifolia, Halimodendron argenteum—(колючка); съ сырою-же подпочвою встръча-

ются многія породы: Populus diversifolia, Eleagnus angustifolia и нъкоторые виды Atragenae, Atrophaxis и одинъ видъ

Caligonum.

На сухой лёссовой почвъ растеть довольно много Capparis herbacea (капорцы), а также много видовъ тюльпановъ; кромъ того: Jxioliryon, Leontice, Corydalis, Eremurus robusta, Cynodon, Dactylon, Alhagi camellorum — (верблюжій кормъ), многіе виды Artemisiae и вонючки: Scorodosma, Dorema и Ferula.

На песчаной почвъ въ прежнее время произросталъ Наюхую автоменто (саксаулъ), но еще при ханахъ онъ весь быль уничтоженъ. Въ настоящее время, осталось еще незначительное количество въ бывшемъ Чустскомъ уѣздъ, благодаря нашей администраціи, позаботившейся о сохраненіи этихъ жалкихъ остатковъ. Разные виды Ташагіх (гребенщикъ) довольно распространены, но они тоже уничтожаются туземцами на топливо. Кромѣ того на песчаной почвъ попадаются Автоменто Siversii, два вида Агузтідае, Сагех агенагіае и Еlymus агенагіае. Послъднее растеніе нарочно разводится въ Евронъ для скръпленія песковъ, а здъсь его туземцы уничтожаютъ съ корнями на топливо.

Изъ луковичныхъ растеній, до высоты 5000 ф. много ветръчается разныхъ видовъ тюльпановъ, ирисовъ, изъ которыхъ одинъ новый видъ Jris Korolkovii и родъ Когоlkovia — названы въ честь Генерала Королькова, занимающагося изученіемъ флоры Туркестанскаго края. Кромъ того разные виды: Arum, Crocus, Eremurus, Gentianae, Salviae, Lavandulae, а также кустарняки Spireae, и Incarvillea Olgae — названный въ честь жены извъстнаго натуралиста Федченки, путешествовавшей вмъстъ съ мужемъ по Ферганъ еще во время ханскаго владычества въ 1871 году.

Болье или менье сносная некультурная растительность въ долинь встръчается лишь вдоль Дарьи, главнымъ образомъ по ея львому берегу, гдъ находятся остатки бывшихъ когда то озеръ и болотъ, питающихъ заросли камышей и нъкоторыхъ кустарниковъ въ родъ гребенщика, янтака (колючки) и друг. Мъстами находятся небольшія рощицы Туранги (Populus diversifolia) которая льтъ 100 тому назадъ образовала цълые льса, тянувшіеся по берегамъ Дарьи и на ея островахъ.

Въ настоящее время рощи не культурныхъ, древесныхъ породъ, а равно пастбища встръчаются только въ горахъ, населенныхъ исключительно кочевыми и полукочевыми киргизами – главными виновниками уничтоженія лъсовъ, о чемъ будетъ сказано ниже. На мъстахъ гдъ лътъ 40 — 50 тому назадъ зеленъли рощи березы, арчи и прочихъ деревьевъ, мы встръчаемъ только пни, или совершенно обнаженную почву, такъ какъ пни съ корнями постепенно выкорчевывались и шли на топливо ближайшимъ ауламъ.

Въ началъ VIII въка, когда арабы вторглись въ Фергану, лъса ели, арчи, грецкаго оръха, клёна, беревы, дикой яблони и абрикоса не только покрывали сплотной массой горы окружающія долину, но спускались даже до культурнаго пояса, по берегамъ такихъ ръчекъ какъ Гава, Касанъ, Чаначъ, Падша-Ата, Исфара, Сохъ и другія. Большая часть средняго пояса, т. е. между культурнымъ и лиственнымъ, была покрыта зарослями такихъ кустарниковъ, какъ фисташника, гребенщика, жимолости, иргая, барбариса, шиповника и т. д. въ Наманганъ 80-ти и 90-лътніе старики помнятъ то время, когда кусты фисташника росли еще на безплодныхъ въ настоящее время возвышенностяхъ, окру-

жающихъ городъ съ его съверной стороны. Лътъ 50 тому назадъ строевая арча спускалась до Напая и ниже; а теперь она находится только за 25 и 30 верстъ къ съверу отъ этого кишлака. Одни только громадные пни арчи, въ окрестностяхъ Напая и деревянныя части построекъ въ кишлакахъ свидътельствуютъ о бывшихъ когда то арчевыхъ лъсахъ, доступныхъ для добыванія. Въ настоящее время ель и арча встръчаются только въ трудно доступныхъ ущельяхъ.

Среди этихъ зарослей, во многихъ пунктахъ этого средняго пояса долины, находились обильные водою ключи и родники, питавшіеся сивгомъ горъ, а потому почти повсюду зеленвли обширныя пастбища, на столько богатыя травами, что нъсколько въковъ спустя, когда узбеки нахлынули сюда изъ съверовосточной Азіи, значительная часть изъ нихъ, поселившихся въ Ферганъ, долгое время не нуждались въ горныхъ пастбищахъ.

Истребление лѣсовъ повлекло за собою то, что почва въ этихъ мѣстахъ отъ таянія снѣга и лѣтнихъ ливней, стала размываться и сноситься съ высокихъ пунктовъ вмѣстѣ съ корнями травянистыхъ растеній, вслѣдствіе чего съ изчезновеніемъ лѣсовъ изчезли и богатыя пастбища.

Два народа населяющіе Ферганскую Область, или народы двухъ племенъ иранскаго и тюрко - монгольскаго, поселившіеся въ долинъ и въ горахъ, соперничаютъ между собою относительно насажденія и уничтоженія древесной растительности. Потомки древне-персовъ, поселившіеся въ долинъ, перенесли съ собою любовь къ разведенію деревьевъ вокругъ своихъ жилищъ. Необходимость въ кускъ насущнаго хлъба побуждала осъдлаго обитателя Ферганы къ земледълію, а нужда

въ тъпп и влажности воздуха, научила его садить и дорожить каждымъ деревомъ. Гибель карагача, осъняющаго его жилище, онъ сравниваетъ съ незамъпимой потерей покровителя, котораго ему неудастся вновь пріобръсти, въ виду медленнаго роста этихъ деревьевъ, на что недостаточно всей дальнъйшей его жизни. Какъ для того, такъ и другаго необходимо было соорудить тъ ирригаціонныя системы, которыя возбуждаютъ въ пасъ удивленіе и которыя стоили неимовърныхъ усилій и заботъ этому трудолюбивому народу.

При здъшнемъ жгучемъ солнцъ, въ столь сухомъ континентальномъ воздухф, который не только возбуждаеть мучительную жажду, но и самъ жаждеть, - тънь отъ густолиственныхъ большихъ деревьевъ отнюдь не выражаетъ собою роскоши, или прихоти, а представляетъ необходимость; каждый нищій добивается ея, чтобы вздохнуть отъ одолъвающаго и разслабляющаго зноя. За то кочевники тюркскаго происхожденія презирають и опустошають древесный мірь. Красота деревьевь ихъ не прелыщаетъ, а въ тънистости ихъ они не особенно нуждаются, такъ какъ на лёто уходять повыше въ горы, къ альпійскимъ лугамъ, гдф не такъ жарко. Они даже избъгаютъ при кочевкахъ сосъдства зарослей и лъсовъ, такъ какъ въ подобныхъ мъстахъ безчисленное множество комаровъ и оводовъ безпокоющихъ, какъ ихъ самихъ, такъ и пасущійся скотъ.

Но узбекъ, дълающійся осъдлымъ, принимается за посадку деревьевъ и ухаживаетъ за ними. За то и стала богатой и разнообразной растительность этой небольшой долины.

Съ приходомъ Русскихъ, Ферганская олора еще зна-

тивными деревьями, привезенными изъ разныхъ странъ. которыя прекрасно принялись и растутъ, украшая сады и аллеи пашихъ городовъ. Многія фруктовыя деревья привиты и даютъ превосходные плоды.

Овощи, которыя вовсе не были извъстны туземцамъ, какъ-то: картофель, капуста кочанная и цвътная и т. п., въ настоящее время ими разводятся съ усиъхомъ, если не для собственнаго употребленія, то для продажи русскимъ жителямъ.

Не смотря на плодородіе здѣшней страны и тщательный уходъ за посадками и посѣвами со стороны трудолюбивыхъ сартовъ, многіе плоды и овощи перерождаются. Рѣдька черезъ нѣсколі ко лѣтъ превращаєтся въ совершенно безвкусную; лукъ содержить мало остроты; яблоки, груши, арбузы—бываютъ водянистыми и невкусными. Табакъ, разводимый изъ сѣмянъ турецкаго табаку, оказывается ниже посредственнаго. Почва-ли причиною этому, или обильное искусственное орошеніе, трудно регулируемое, а можетъ быть еще не примѣнились къ здѣшней почвѣ и климату—не знаю, но фактъ этотъ извѣстенъ всякому.

Если сравнить среднюю годовую температуру Ферганской долины, равияющуюся около 14° С. съ таковоюже въ западной Европъ, то слъдуетъ прійти къ заключенію, что у насъ флора должна походить на италіанскую, или испанскую; но на самомъ дълъ, наша флора далеко отстала отъ тамошнихъ странъ. Разнообразія, контрасты и перемънчивость климата Ферганской долины препятствуютъ главнымъ образомъ успъшному разведенію всъхъ растеній, свойственныхъ теплымъ странамъ Европы. Кактусъ, маслина, лимонъ и другіе не

переносять морозовь, которые здёсь иногда достигають—17 и 19° С.

Впрочемъ нѣкоторые сорта маслинъ слѣдовало-бы попробовать разводить въ центральной части долины. Замѣчено, что въ Крыму маслины могутъ переносить холодъ почти до—16° С., если только онъ не продолжителенъ. Здѣсь если и бываютъ морозы свыше этихъ градусовъ, то это случается не всякую зиму и кромѣ того они появляются исключительно въ теченіе нѣскольскихъ почныхъ часовъ, а не держутся цѣлыя сутки. Во всякомъ случаѣ, если Ферганскій климатъ выдерживаютъ какія либо растенія теплой полосы, то только однолѣтнія, какъ напримѣръ: рисъ, хлопчатникъ, сорго и т. п. Гранаты, смоковница и нѣкоторые сорты винограда не переносятъ такихъ морозовъ, поэтому туземцы на зиму ихъ сохраняютъ, засыпая соломою, листвой и землею. Впрочемъ гранаты болѣе выносливы нежели смоковница.

Опыты по разведенію Eucalypti globuli были не удачны; они тоже не переносять здішнихь морозовь, а потому не могуть расти на открытомь воздухів. Eucalyptus globuli погибаеть, какъ только температура становится ниже—11° С. Это обстоятельство весьма печальное, такъ какъ разведеніе этихъ деревьевь, въ столь лихорадочной містности, могло-бы оказать благодітельное вліяніе.

Я не стану перечислять всё тё тысячи родовъ и видовъ растеній, образующихъ Ферганскую флору, такъ какъ это составляетъ спеціалный предметъ ботаники. Я упомяну лишь о тёхъ древесныхъ и травяныхъ породахъ, которыя представляютъ собою какой либо интересъ въ бытовомъ, или соціальномъ отношеніи здёшняго населенія и имѣютъ вліяніе на гигіэническія условія, а также на употребляемыя въ медицинъ.

Что же касается до того обстоятельства, что растенія представляють собою матеріаль, изъ котораго при содъйствіи воды и тепла образуется болотная міазма, то въ этомъ отношении порода растепій, какъ мив кажется, играетъ незначительную роль. Всякое растеніе можеть во всякое время стать источникомъ міазмы, коль скоро отживъ оно станетъ разлагаться на сырой почвъ при достаточномъ количествъ тепла. Міазма образуется везді, гді только накопляются и гніють какіе бы то ни были остатки растительной жизни. Само собою разумъется, что тъ изъ растеній, которыя растуть въ изобиліи и быстро отживають, дають болье всего продукта для образованія міазмы. Поэтому камышъ и разныя болотныя растенія, рисовыя поля, деревья съ богатой листвой, опадающей осенью и не убирающейся, - проязводять міазму въ болве значительной степени, нежели хвойныя деревья.

На основаніи изслідованій Бертело, въ глинистой почві вовсе не требуется, чтобы берега канавъ и другихъ водоемовъ были непремінно унавожены отжившими частями высшихъ растеній. Они могутъ быть совершенно свободны отъ макроскопической флоры и тімъ не меніе могутъ служить весьма плодородной почвой для флоры микроскопической, что подтверждено изслідованіями В. Г. Эмма (1).

Не отвергая этого положенія основаннаго на даниыхъ, добытыхъ строго научными изслѣдованіями, я всётаки подобнымъ мѣстностямъ приписываю второстепенное значеніе въ этіологіи маляріи нашей Области. Въ

⁽¹⁾ Опыть выясненія этіологіи маляріи при работахь съ землей вообще и въ частности при кириичномъ производстві въ Усть-Ижорі. В. М. Журналь 1886 года.

Ферганской долинъ тъ только мъстности, на которыхъ легла самая густая растительность и почва насыщена органическими распадами, — отличаются особеннымъ развитіемъ маляріи. Этотъ фактъ намъ приходится наблюдать не только въ мъстностяхъ болье или менье отдаленныхъ одна отъ другой, но и въ одномъ и томъ-же городъ.

Люди поселившіеся на лѣто въ старомъ, густомъ, запущенномъ саду, который въ теченіе многихъ лѣтъ не разчищался—заболѣваютъ лихорадками несравненно чаще и сильнѣе, нежели живущіе въ молодомъ, небольшомъ, опрятно содержимомъ садикъ. Обитатели маленькихъ кишлаксвъ и курганчей, лежащихъ возлѣ рѣкъ и большихъ арыковъ, берега которыхъ не заросшіе и вообще, когда въ нихъ мало растительности, страдаютъ отъ лихорадокъ меньше, нежели тѣ, которые живутъ вблизи болотъ и рисовыхъ полей.

На совпаденіе сильной растительности съ маляріей указывають многіе авторы, какъ напр. Бекъ, Гризингеръ, Лаверанъ, Коленъ, Гиршъ, Гезеръ, Тороповъ и многіе другіе.

полеводство. У каждаго народа существуетъ какой нибудь растительный, или животный продуктъ, который составляетъ главное основание его пронитания, а для бъднъйшихъ классовъ часто единственную пищу. У осъдлыхъ народовъ Ферганы, главную пищу составляютъ зерновые хлъба. У многихъ народовъ Европы и другихъ странъ, у которыхъ главный пищевой продуктъ составляютъ зерновые хлъба, неурожай ихъ служитъ причиною голода. Въ Ферганъ, при искусственномъ орошении и плодород-

ной почвъ, хлъбонашество не подвержено такимъ крайнимъ случайностямъ, а потому не можетъ быть общаго неурожая, какъ въ Россіи и другихъ странахъ, въ полномъ значеніи этого слова. На земляхъ искусственно орошаемыхъ, урожай зависитъ отъ количества воды и можетъ только колебаться отъ отличнаго до удовлетворительнаго, но отнюдь не ниже. Запашки производимыя на земляхъ неорошаемыхъ, такъ называемыхъ—богарныхъ, весьма не значительны, а потому не могутъ идти въ разсчетъ.

Существуеть однако много такихъ постороннихъ причинъ, которыя могутъ сильно повліять на успѣхъ сбора посвянныхъ съмянъ въ извъстныхъ участкахъ. Въ нъкоторыхъ мъстностяхъ, подверженныхъ дъйствію силя, иногда уничтожаются совершенно посъвы, вслъдствіе чего жители лишаются куска хліба и должны его замънять какими либо суррогатами. Градобитія, весьма неръдкія явленія въ Ферганъ, часто вредять посъвамъ. Иногда буйные вътры выдувають изъ почвы уже задъланныя съмена; раннимъ-же лътомъ, они ломаютъ растенія и вредять цвітенію, а позднимь літомь выбиваютъ зерно изъ колоса. Въ особенности вреденъ горячій вътеръ Гармъ-Силь, который вельдствіе своей чрезвычайной сухости вызываеть или пустоцейть, или производить сморщивание молочнаго зерна. Саранча, этоть бичъ земледъльца, тоже иногда посъщаетъ Фергану и опустошаеть поля, но, къ счастію, это бываеть весьма ръдко: окружающія высокія горы отчасти защищають ферганскія поля отъ подобнаго нашествія, хотя не безусловно. Иногда она залетаетъ на такую значительную высоту, какъ котловина у овера большаго Кара-Куля

на Памирѣ (¹). Существуетъ много другихъ насѣкомыхъ, животныхъ и птицъ вредящихъ земледѣльцу. Всѣ эти вредныя вліяпія, при совмѣстномъ воздѣйствіи нѣсколькихъ изъ нихъ, могутъ тоже произвести бѣдствія въ этой плодородной странѣ и лишить труженика—пахаря жатвы. При подобной катастрофѣ, населеніе вынуждено бываетъ пополнять недостатокъ хлѣба употребленіемъ въ пишу разнаго рода фруктовъ и муки изъ тутовыхъ ягодъ.

Для кочующихъ племенъ главнымъ продуктомъ пищи служить молоко отъ стадъ, а отчасти тоже верновые хлъба, которые они пріобрѣтаютъ у осъдлаго населенія, или въ пебольшомъ количествъ засъваютъ сами на богарныхъ поляхъ безъ искусственнаго орошенія.

По вычисленію А. О. Костенко, земледѣльческая область въ Ферганѣ, по роду земель, представляетъ слѣдующія цифры въ гектарахъ: (одинъ гектаръ равняется 0,91533 нашей десятины).

Пустыни, или необработан-

ныя земли . 3.410.000 гек. $(46,2^{0}/_{0})$.

Всего 7.370.000 гектаровъ.

Изъ обзора Ферганской Области за 1885 г., представлениаго при всеподданнъйшемъ отчетъ, видно, что въ постоянное пользованіе населенія бывшими организаціонными учрежденіями отведено 1.077.651 десятина земли, изъ которой 544.263 дес. постоянно обработываемой, 219.011 дес. перелоговъ, т. е. земель обработываемыхъ по недостатку для орошенія воды, одинъ разъ въ нъсколько лѣтъ и 314.377 дес. находящихся среди на-

^{(&#}x27;) В. Ф. Ошанинъ. Адайская долина. Туркестанскія Відомости. 1877 г.

дъловъ земли неудобной. Сверхъ того, населеніе пользуется: 1) 47.140 дес. культурной земли, принадлежащей вакуфамъ (мусульманскимъ духовнымъ учрежденіямъ), доходы съ которой идутъ въ пользу этихъ учрежденій, 2) 18.925 дес. казенной, отдаваемой въ аренду и 3) 28.900 дес. городскихъ земель. Такимъ образомъ, въ пользованіи населенія всего находится 1.172.616 десятинъ; но изъ этого количества, постоянно обработывается земли только 620.600 десятинъ, считая въ томъ числѣ и казенную, обработываемую арендаторами. Слъдовательно цифра полей въ настоящее время больше озпаченной А. Ө. Костепко, что указываетъ на увеличеніе земледѣлія въ краѣ.

Можно считать, что изъ всей территоріи Области обработывается нынѣ не болѣе 11.000 квадратныхъ версть, но следуеть надеяться, что культурная площадь въ будущемъ можетъ увеличиться, потому что въ долинъ встръчаются значительные участки земли, нынъ не обработываемые за недостаткомъ орошенія. Эти участки состоять въ большинствъ изъ солонцеватыхъ пространствъ, переръзанныхъ песками, которыхъ нельзя считать непригодными для культуры, такъ какъ во всей долинъ Ферганы почва была болъе или менъе солонцеватою. Послъ орошенія въ теченіи 4—5 льть и послъ достаточнаго удобренія, солонцеватыя земля становятся вполнъ производительными и даютъ хорошіе урожан; весь вопросъ сводится къ полученію возможности оросить эти участки, изучениемъ чего и заняты въ настоящее время ирригаціонныя силы Области. Распространеніе культуры на солончаки, нынѣ пустующіе, кромѣ увеличенія площади производительной земли, полезно и для остальныхъ земель пынѣ культивируемыхъ, потому что обезопасить ихъ отъ постепеннаго, хотя и медленнаго засыпанія песками, что замівчается въ нікоторыхъ частяхъ Области. Еще во времена ханскаго владычества пески захватили не малую часть культурной земли, заставивъ жителей бросить насиженныя мізста.

Въ геологическомъ отдѣлѣ было сказано, что культурную почву Ферганы главнымъ образомъ составляетъ лёссъ, которому эта страна обязана такимъ замѣчательнымъ плодородіемъ. Но особенность этой почвы, т. е. способность ея при здѣшнихъ климатическихъ условіяхъ твердѣть и образовывать кору значительной толщины, вынуждаетъ земленашца къ такому громадному труду, который не слыханъ у насъ въ Россіи. Песчаныя почвы, большею частью, совершенно безплодны, а потому не воздѣлываются.

Профессоръ Мендельевъ излагаетъ свои воззрънія относительно физико-химическаго дъйствія почвы на вещества приходящія съ нею въ соприкосновеніе слъдующимъ образомъ: въ нескъ и песчанныхъ почвахъ, легко проницаемыхъ воздухомъ, разрушеніе всъхъ веществъ взятыхъ для удобренія, ихъ раствореніе и переходъ при дъйствіи воздуха въ форму усвояемую растеніями, совершается весьма легко. Но такія почвы не способны удержать питательныхъ растворовъ и воды необходимой для питанія растеній; они только смочатъ новерхность частичекъ почвы и легко могутъ быть отмыты чистой водой. Нъкоторые только виды растеній, о которыхъ было сказано выше, растутъ исключительно на песчаныхъ почвахъ.

Глина-же, вслёдствіе огромной поверхности капиллярныхъ промежутковъ, задерживаетъ растворы солей и вообще питательныя вещества, необходимыя для питанія растеній, весьма сильно, такъ что нужна огромная масса воды, чтобы отмыть разъ поглощенныя вещества.

Особая способность глины къ поглощенію имѣетъ громадное значеніе въ эксноміи природы, такъ какъ различные растворы, попадающіе съ атмосферною водою на слой глины, отдаютъ этой послѣдней кали, фосфорную кислоту и т. п. питательныя начала, необходимыя для растеній, которыя и фиксируютси глиной, а не уносятся и не вымываются водою, какъ изъ песчаной почвы. Разрушеніе ихъ въ глинъ, при содъйствіи воздуха, вслѣдствіе плотности глины, идетъ медленнъе, чѣмъ въ пескѣ, и въ глинистой почвѣ сохраняются съ упорствомъ находящіяся въ ней питательныя для растепія вещества, такъ легко вымываемыя изъ песчаной почвы (1).

М. Бертело (2), на основаніи своихъ изслѣдованій, о которыхъ онъ сдѣлалъ сообщеніе Парижской акадсмін наукъ въ засѣданія 26 октября 1885 г., говоритъ, что глинистыя почвы, глинистые пески и коалинъ обладаютъ свойствомъ медленно фиксировать свободный атмосферный азотъ. Эта способность независима ни отъ нитрификаціи, ни отъ конденсаціи амміяка. Она свойственна дѣйствію извѣстныхъ живыхъ организмовъ. Она не проявляется зимой, по проявляется особенно во время активнаго состоянія растительности. Температура въ 100° ее уничтожаєтъ.

Этими свойствами глинистыхъ почвъ объясняется неистощимая продуктивная способность почвы, доставляющая растепіямъ азотъ, несмотря на ежегодные сборы урожаевъ. Исключивъ азотъ азотной кислоты и амміяка, приносимый почвъ дождями, которые по наблю-

⁽¹⁾ Основы химін 1882 г. ч. ІІ.

⁽²⁾ B. F. JMMe. Loc. cit.

деніямъ Лауса и Джильберта опредвляются въ 8 кило на гектаръ, а по наблюденіямъ въ Монсури только 1,7 кило (1883 г.) и принимая во вниманіе, что извлекаемое ежегодно изъ почвы, напр. луга, вмёстё съ урожаемъ количество азота простирается отъ 50-60 кило на гектаръ, мы видимъ, что ежегодная потеря азота съ гектара будеть простираться отъ 40-50 кило. Достойны вниманія въ этомъ отношеніи посівы въ здішнемъ крав людерны, которая даеть 4 укоса въ льто, непрерывно въ теченіе 10-15 льтъ. Каждый укось въ среднемъ даетъ 300 пудовъ съна на десятину. Азотъ почвы долженъ быль-бы истощиться ежегодной съемкой урожаевъ, если бы не было этой компенсирующей силы болбе энергичной, чемь метеорическія доставки азота въ видъ NH, и H NO. Настоящія изслъдованія, говорить Бертело, дёлають очевиднымъ одинъ изъмеханизмовъ этой регенераціи азота необходимой, чтобы дать намъ отчетъ въ непрерывной плодовитости естественныхъ почвъ.

Этимъ объясняется въ тоже время, какимъ образомъ глинистые пески, почти безплодные, въ моментъ, когда они приведены въ соприкосновеніе съ атмосферой, могутъ однако служить поддержкой и питаніемъ для послѣдовательныхъ вегетацій, болѣе и болѣе цвѣтущихъ, потому что они утилизируютъ постепенно азотъ, фиксированный ежегодно этими песками и азотъ распада предыдущихъ вегетацій, аккумулированныхъ и присоединенныхъ къ тѣмъ же глинистымъ пескамъ, что ведетъ такимъ образомъ къ постепенному образованію растительной земли.

Вотъ данныя, на основаніи которыхъ объясняется плодородіе лёсса, который, какъ извѣстно, состоитъ изъ глины, песку и извести.

Туземцы, путемъ въковыхъ опытовъ и наблюденій, достигли знаній относительно того, на какой почвъ произрастаютъ извъстные сорта хлъбныхъ растеній, на какой высотъ они могутъ расти и какое количество орошенія требуется для нормальнаго произрастанія.

На высотъ 4000 ф. джугара, рисъ, виноградъ и хлопчатникъ уже не вызръвають, а поэтому тамъ съются ленъ и просо, которые на днъ долины ръдко разводятся, по малой доходности.

Предёлъ разведенія пшеницы въ Области около 4000 ф. н. у. м., хотя въ Варухѣ жители еще воздѣлываютъ ее не смотря на то, что этотъ кишлакъ лежитъ на высотѣ 4530 ф. Разводятъ тамъ и рисъ, на болѣе низкихъ мѣстахъ, но джугары и хлопчатника уже тамъ нѣтъ. Богарная яровая пшеница можетъ еще созрѣвать на высотѣ отъ 5—6 тысячъ футовъ н. у. м.

Верхняя граница проса около 7000 ф., ячменя выте 8000 ф. Въ горной долинъ Сарыколъ, близъ Памира, на склонъ къ Кашгару, рожь и бобы созръвають даже на высотъ 10.150 ф. Въ Ваханъ существують пашни тоже на высотъ 10.000 футовъ.

Туземцы предпочитають, гдѣ только возможно, воздѣлывать свои поля на перелогахъ, т. е. послѣ истощенія одного земельнаго участка они обращаются для посѣвовъ къ другимъ. Такой способъ земледѣлія имѣетъ главною цѣлью, особенно у кочеваго населенія, сберетать удобреніе и пометь домашняго скота для употребленія его на топливо, такъ какъ древесное отопленіе здѣсь довольно дорого.

Увеличеніе запашекъ на новыхъ мѣстахъ представляетъ хлѣбопашцу много затрудненія, такъ какъ съ пимъ сопряжено проведеніе новыхъ арыковъ, что отнимаетъ много времени и требуетъ значительныхъ затратъ.

Начало разведенія многихъ полевыхъ и главнъйшихъ прядильныхъ растеній въ Средней Азіи относится къ глубокой древности. Центральная Азія является колыбелью большинства нововведеній и способовъ культуры, распространившихся потомъ и въ Европъ.

А. Ф.-Миддендорфъ говоритъ (1), что съ древнъйшихъ временъ и несомнънно почти за 3000 лътъ до Р. Х. въ Китаъ на поляхъ воздълывалось 5 слъдующихъ растеній: два, а пожалуй и три вида проса, пшеница, рисъ и высоко въ горахъ овесъ. Разводились также и разныя овощи: огурцы, бобы, петрушка. Сверхъ того, дыни, арбузы, лукъ, ръдька и морковь на столько обыкновенныя, распространенныя въ Средней Азіи растенія, что введеніе ихъ также, навърно, относится къ древней эпохъ, почему они и составляютъ такую неотъемлемую принадлежность домашняго хозяйства туземцевъ.

Пшеница, по тувемному бугдай, составляетъ главный хлѣбъ осѣдлыхъ туземцевъ и русскихъ, живущихъ въ этомъ краѣ, а потому на нее обращено особое вниманіе. По словамъ де-Кандоля, родина пшеницы около Татаріи и Персіи. Она сѣется здѣсь какъ озимая, такъ и яровая. Послѣдняя дѣлится на разводимую при искусственномъ орошеніи и засѣваемую подъ дождь. Сарты разводятъ преимущественно озимую, а киргизы-яровую. Подъ нее отводится удобренная земля, подвергнутая паровой обработкѣ. Въ 1887 г. подъ посѣвами озимой пшеницы занято было 51.645 десятинъ, а яровой

^{(&#}x27;) Очерки Ферганской долины. А. ф.-Миддендорфа стр. 234.

22.683 д. (¹). Здѣсь различается до 10-ти сортовъ пшеницы (²). Нѣкоторые изъ нихъ разводятся лишь въ теплой долинѣ, другіе-же, переносящіе и болѣе холодный климатъ, въ предгорьяхъ.

Время поства и поситванія пшеницы различно, смотря по поясамъ. Озимую пшеницу на дит Ферганской долины начинаютъ стять въ началт октября и продолжають, если позволяеть погода, до января. На болте возвышенныхъ мъстахъ, въ предгорьяхъ, заствають въ концт августа. Время поства яровой пшеницы—въ началт марта, а въ болте возвышенныхъ мъстахъ—съ прекращеніемъ заморозковъ и наступленіемъ весны. Время посптванія пшеницы въ долинт, въ концт мая и началт іюня, а выше—въ половинт іюля.

Среди туземцевъ существуетъ мнѣніе, что иногда засѣянная пшеница превращается въ рожь. Объ этомъ упоминаетъ Г. А. Арандаренко (3) говоря, что "по верховьямъ Матчи зачастую посѣянная пшеница превращается въ рожь (робахунъ). Это фактическое превращеніе случается съ озимою пшеницею въ безснѣжныя, холодныя зимы. Въ кишлакъ Сурхатъ засѣянная осенью пшеница всегда даетъ рожь". Это странное явленіе возможно объяснить лишь тѣмъ, что въ той мъстности, гдѣ происходитъ это кажущееся превращеніе, растетъ много дикой ржи, которая при благопріятныхъ для нея условіяхъ, заглушая пшеницу, является первенствующею на засѣянномъ полѣ, потому что зерна пшеницы въ безснѣжную суровую зиму вымерзаютъ.

⁽⁴⁾ Офиціальния свёдёнія заимствованы вездё изъ приложенія къ всеподданньйшему отчету Военнаго Губернатора Ферганской Области.

⁽²⁾ В. Наливкинь. Туркестанскія Вѣд. 1880 г.

⁽³⁾ Г. А. Арандаренко. Досуги въ Туркестанѣ. 1874—1889 г.г. стр. 405.

Обыкновенный средній урожай пшеницы—самъ десять. Въ 1885 г. для озимой пшеницы средній былъ 10,8, максимумъ—15, а минимумъ—7,3. Для провой средній—7,2, максимумъ—8, а минимумъ—6. Въ 1887 г. для озимой пшеницы, въ среднемъ былъ самъ 13,36, а для провой—7,32.

Подобный урожай, по сравненію съ европейскими етранами, можно считать весьма удовлетворительнымъ. По статистическимъ даннымъ, во Франціи средній урожай пшеницы самъ 6,07 (1). Но если сравнить этотъ урожай съ цифрами указываемыми въ древности, гдъ, какъ напр. въ Вавилоніи или Ливіи, пшеница давала при посвив самъ 300, тогда урожай Ферганской долины, считающейся плодородной, на столько ничтожный, что его нельзя и приравнивать къ тъмъ благодатнымъ странамъ. Хотя всё эти данныя древней эпохи нужно принимать съ крайнею осторожностью, но тъмъ не менъе и Александръ Гумбольдтъ убъдился, что въ Мексикъ средній урожай пшеницы отъ 25-30 на 1, а на плоскихъ возвышенностяхъ этой страны доходитъ до 40. Слъдовательно, если взять нашу максимальную цифру т. е. 15, то тамъ урожай почти втрое больше, чъмъ у насъ; на большихъ-же фермахъ въ Мексикъ родится самъ 50-60. При усовершенствованномъ способъ культировки возможно и въ Ферганъ достигнуть болъе интенсивнаго урожая. Въ Самаркандъ устроена образцовая ферма, на которой пшеница родится минимумъ самъ 20, а максимумъ самъ 44. Климатическія и почвенныя условія Самарканда такія-же какъ и нашихъ городовъ.

Въ 1887 г. было посъяно во всей Области: ози-

⁽¹) Руководство къ изученію Медицинской географія. Ж. Будена. т. 1. стр. 270.

мой пиненицы 309.872 пуда и яровой 157.445; собраноже: озимой пиненицы 4.139.996 пудовъ и яровой 1.123.451; а вообще собрано какъ той, такъ и другой 5.263.447 пуд. Вольше всего приходится на Наманганскій увздъ, а именно: 1.858.664 пуд. (1).

Принимая во вниманіе неудовлетворительный способъ собиранія статистическихъ свъдъній, исключительно черезъ тувемную администрацію, слъдуетъ считать цифровыя данныя о посъвахъ и урожав лишь приблизительно върными, но во всякомъ случав не преувеличивающими дъйствительность, такъ какъ въ обычав туземцевъ скрывать истинные размъры своего экономическаго благосостоянія.

Туземный хлѣбъ составляютъ лепешки, которыя преимущественно пекутся изъ пшеничной муки. Всѣ Русскіе живущіе въ здѣшнемъ краѣ и войска продовольствуются пшеничнымъ хлѣбомъ, такъ какъ ржанаго въ Области нѣтъ. Кромѣ того пшеничная мука идетъ въ хозяйствѣ и на другія надоблости. Войскамъ расположеннымъ въ Области потребно въ годъ пшеницы около 26.390 четвертей; эта цифра мѣняется, смотря по числу паличнаго состава войскъ.

Рисъ. Oriza sativa; растеніе и неочищенное зерно, по туземному названію шалы, а крупа—гурунджъ. Возділываніе риса—самая любимая отрасль полеводства въ Фергані, такъ какъ изъ него приготовляется національное, весьма распространенное кушанье—палау, о которомъ будеть сказано ниже, въ отділі о ниці.

Рисъ, по всей въроятности, давно здъсь извъстенъ, такъ какъ уже Александръ Македонскій нашелъ его въ

⁽¹⁾ Офиціальныя сведёнія.

Бактріи. Онъ разводится въ значительномъ количествѣ, если только достаточно оросительной воды, необходимой для произрастанія его; за то при необычайномъ плодородіи, онъ менѣе притязателенъ всѣхъ прочихъ культурныхъ растеній относительно удобренія. Въ низкихъ котловинахъ, которыхъ невозможно осущить, это единственно возможный хлѣбъ.

Въ среднемъ рисъ родится самъ 13,5; максимумъ—26, минимумъ—10. Въ 1887 г. урожай въ Области былъ самъ 20,47. Суходольный рисъ (Riz sec de la Chine), посъянный на той же самаркандской фермъ, при веленомъ удобреніи, далъ въ среднемъ самъ 76, а максимумъ—самъ 83. Тувемный рисъ, при туземномъ способъ удобренія, тамъ-же далъ самъ 40.

Въ 1887 г. въ Ферганъ было посъяно риса на 50.288 десятинахъ: 251.442 пуда, а снято 5.147.465 пудовъ (1).

Такъ какъ въ Области никакой другой крупы не существуетъ, то рисъ исключительно употребляется въ нашихъ войскахъ для приготовленія каши. Его на этотъ предметь идетъ для всей Области около 4725 четвертей.

Остальное количество собраннаго верна, за исключеніемъ оставляемаго на посѣвъ, употребляется самимиже жителями, а также вывозится въ Семирѣченскую Область и Западную Сибирь. Самое большое количество риса разводится въ Андижанскомъ уѣздѣ. Въ 1887 г. изъ всего количества снятаго риса 3.135.440 пудовъ приходится на Андижанскій уѣздъ, вслѣдъ за которымъ идетъ Наманганскій, въ которомъ снято 1.574.008 пу-

⁽¹⁾ Офиціальныя сведёнія.

довъ. Въ остальныхъ увздахъ онъ разводится въ мень-

Рисовая солома не употребляется въ кормъ скоту, вслѣдствіе своего свойства производить у животныхъ изнурительное мочеиспусканіе (¹). У лошадей она вызываеть кашель.

Такъ какъ рисъ требуетъ въ теченіе 4-хъ мѣсяцевъ высокой температуры, а созрѣваетъ только въ сентябрѣ, или началѣ октября, то онъ воздѣлывается исключительно въ долинѣ. Сѣется сейчасъ послѣ пшеницы. Въ Наманганскомъ уѣздѣ существуетъ рисъ ранній, созрѣвающій уже въ іюлѣ (²).

Здѣсь различаютъ два сорта риса: красноватый и бѣлый. Горный рисъ, или суходольный, который уже разводится на Кавказѣ и начинаетъ разводиться въ Самаркандѣ, въ Ферганѣ еще не вошелъ въ употребленіс. Говорятъ, что суходольный рисъ будто-бы не выдерживаетъ Гармъ-силя и плохо обдирается на туземномъ абджуазѣ (³).

На почвахъ богатыхъ органическими веществами рисъ легко подвергается ржавчинъ, если вода не поддерживается въ постоянномъ движеніи.

Рисъ, какъ водяное растеніе, нуждается быть подъ водою около 100 дней, вслъдствіе чего рисовыя поля обыкновенно на все это время затопляются. Вода спускается на нъсколько дней, если листья начинаютъ немного отливать желтизною.

Руководствуясь данными обществъ ирригаціи въ Италіи и принимая во вниманіе разсчеты строителейтехниковъ въ Закавкавскомъ крав, окажется, что въ

^{(&#}x27;) Г. А. Арандаренко. L. с. стр. 323.

⁽²⁾ В. Називаниъ. Туркестанскія Ведомости 1880 г.

⁽³⁾ Г. А. Арандаренко. L. с. стр. 612.

среднемъ выводъ требуется въ Ферганъ для орошенія 100.000 десятинъ рисовыхъ полей постоянной струи воды 5.497 куб. футовъ въ секунду (1), но туземцы расходуютъ на свои рисовыя поля значительно большее количество воды.

Всявдствіе подобнаго заболачиванія почвы, рисовыя поля пріобрѣли давно печальную славу убійственныхъ очаговъ маляріи. Уже въ XV стольтіи въ Миланъ и Ломбардіи рисовыя поля были изгнаны изъ окрестностей городовъ. Съ XVII столътія по этому поводу одинъ эдиктъ слъдовалъ за другимъ. Пространства занятыя этими полями, во время культуры риса, представляются залитыми водою площадями, изръзанными вдоль и поперегъ выступающими изъ воды узкими дорожками, или грядками земли, раздёляющими все поле на отдъльные участки, или бассейны, въ которыхъ и растеть рись. Съ точки зрвнія отношенія воды и суши, это явленіе прямо противоположно дельтамъ рікть; тамъ почти горизонтальная площадь суши изръзана водными протоками, здъсь водная поверхность поля изръзана выступающими поверхъ воды узкими полосами земли. Но общее обоимъ явленіямъ свойство-это крайнее развитіе береговыхъ линій, обусловливающее значительное протяженіе полосъ земли, представляющихъ всф переходы оть крайней степени влажности до относительно сухихъ поясовъ, съ поверхности которыхъ уже могутъ отдъляться въ атмосферу пылеобразныя частицы усохшей почвы, а вмъстъ съ послъдней и бактеріальныя формы, развившіяся на этихъ поясахъ вслъдствіе содержанія обильнаго растительнаго распада. При спускъ воды съ

⁽¹) Объ ирригація въ Ферганской Области. А. Дмоховскій. Туркестанск. Вѣхомости 1887 г. № 35.

рисовыхъ полей, эти пространства въ высшей степени развиваютъ міазму и въ это время они становятся весьма опасными.

Италіанскіе гигіэнисты всегда указывали на это пагубное вліяніе рисовыхъ полей, требуя законодательныхъ мѣръ для воспрепятствованія ихъ распространенію и удаленію отъ жилыхъ мѣстъ, что и было достигнуто для нѣкоторыхъ мѣстностей. Въ сѣверной Италіи, гдѣ существуєтъ совершенная система орошенія, постановлено, чтобы рисовыя поля отстояли на 14 километровъ (почти 14-ть верстъ) отъ главныхъ городовъ, на 9 отъ городовъ меньшей величины и на 1 километръ отъ маленькихъ городковъ (1). На Кавказѣ администрація вынуждена была тоже принять мѣры для удаленія рисовыхъ полей отъ паселенныхъ мѣстностей, какъ напр. отъ города Ленкорана.

Въ Ферганъ, во время ханскаго владычества, не обращалось никакого вниманія на близость рисовыхъ полей къ городамъ. Возлѣ самыхъ стѣнъ крѣпости Махрама, съ значительнымъ гарнизономъ, махрамскій бекъ отвелъ мѣсто подъ посѣвы риса (²). По занятіи Русскими, этотъ вопросъ подвергался всестороннему обсужденію и вышло распоряженіе, чтобы рисовыя поля находились не ближе 6-ти верстъ отъ городовъ, но это распоряженіе не вездѣ исполняется въ точности, и рисовыя поля отъ нѣкоторыхъ уѣздныхъ городовъ расположены на болѣе близкомъ разстояніи. Только относительно Новаго Маргелана еще соблюдается шестиверстное разстояніе не смотря на то, что много было просьбъ туземцевъ о разрѣшеніи развести рисовыя по-

⁽¹⁾ Руководство къ практической гигіэнъ. А. Паркса. стр. 453.

⁽²⁾ Путешествіе въ Туркестань. А. П. Федченко. стр. 32.

ля въ 3-хъ верстахъ отъ города, такъ какъ имѣются для этого весьма удобныя мѣста.

Вслъдствіе близости рисовыхъ полей отъ городовъ, эти поля, помимо всъхъ другихъ условій, способствуютъ увеличенію числа лихорадочныхъ больныхъ, такъ какъ они обладаютъ свойствами наиболье интенсивнаго развитія маляріи.

Просо-джугара, (Sorghum cernuum), по туземному джавари. Она кажется появилась въ Средней Азіи въ болье поздній періодъ, нежели прочія хльбныя растенія, хотя Дженкинсонъ встрычаль ее въ Хивъ въ

срединъ XVI столътія (1).

Джугара требуеть сильнаго удобренія, но за то даетъ населенію значительный доходъ. Въ 1887 г. было посъяно джугары 61.449 пудовъ, а снято 2.855.085 пуд. (2). Шаровидныя метелки джугары въсятъ 2—3 фунтовъ и обыкновенный процентъ урожая самъ 38—50. При усовершенствованной культировкъ, на хорошо удобренномъ полъ, джугара можетъ дать самъ 400.

Зерно джугары, превосходящее просо вдвое по крупности, употребляется въ пищу лишь бъднымъ населеніемъ; преимущественно-же оно служитъ кормомъ лошадямъ и домашней птицъ. Въ пищу джугара употребляется какъ крупа, но чрезвычайно трудно разваривается. Будучи перемолотой въ муку, изъ нее пекутъ лепешки, но такъ какъ онъ гораздо хуже пшеничныхъ, то и употребляются только бъдными. Толетые, длинные стебли джугары содержатъ много сахару, а потому служатъ лакомствомъ для дътей туземцевъ. Въ кишлакахъ во время сбора джугары неръдко можно видъть малень-

⁽¹⁾ Миддендорфъ. Loc. cit. стр. 235.

⁽²⁾ Офиціальныя сведенія.

кихъ сартятъ, жующихъ съ наслажденіемъ и высасывающихъ сахарный сокъ изъ стеблей джугары.

Джугара требуетъ меньше тепла для произрастанія, нежели рисъ; но для созрѣванія ея нужно по крайней мѣрѣ 7—9 мѣсяцевъ, а потому она можетъ только разводиться въ долинѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ предгорій рисъ еще воздѣлывается, а джугара не созрѣваетъ. Впрочемъ существуетъ нѣсколько сортовъ джугары (кажется три), они различаются величиною зерна и временемъ, которое нужно для созрѣванія. Самый скороспѣлый сортъ требуетъ около 4 мѣсяцевъ для своего развитія и созрѣванія, содержитъ самыя мелкія зерна и рѣдко употребляется на муку. Другой сортъ средній, по времени созрѣванія (5 мѣсяцевъ), заключаетъ зерна средней величины и считается хуже третьяго, самаго крупнозернистаго сорта, болѣе всего воздѣлываемаго.

При посъвъ джугары въ апрълъ, она созръваетъ въ октябръ или ноябръ. Она очень обезсиливаетъ почву, по вмъстъ съ тъмъ освобождаетъ ес отъ сорныхъ травъ. Джугара не снимается раньше того, пока ее не захватятъ морозы. Если осень теплая и не бываетъ утренниковъ, то она остается на корпъ до декабря.

Джугара легко плесневъетъ, а потому ее довольно трудно сохранять въ теченіи продолжительнаго времени. Плантаціи джугары во многихъ мъстахъ сильно страдають отъ нападеній прожорливыхъ гусеницъ одной бабочки (Heliothis armigera) (1).

Существуеть кормовая смѣсь, получаемая совмѣстнымъ посѣвомъ джугары $1^{1}/_{2}$ пуда, кунакъ (Setaria italica) $^{3}/_{4}$ п. и машъ (Soja hispida) $^{3}/_{4}$ п. на десятину. По дости-

^(*) Записка А. Вилъкчиса, поданная Г. Военному Губернатору Ферганской Сбласти 1882 г. стр. 10.

женіи высоты $3^1/_2$ футовъ траву косять и сушать, или скармливають въ зеленомъ состояніи. Урожая съ десятины достаточно для хорошаго прокормленія 10 воловъ въ теченіи 7-ми мѣсяцевъ, но эта смѣсь не пріобрѣла всеобщаго распространенія. Туземцы чаще сѣютъ кормовую джугару (бачки); она снимается въ незрѣломъ видѣ, такъ какъ большею частью сѣется вторымъ посѣвомъ, а потому имѣетъ тонкіе мелкіе стебли и идетъ на кормъ скоту. Убирается въ срединѣ сентября.

Хотя джугара, т. е. зерно преимущественно употребляется въ кормъ лошадямъ, но туземцы считаютъ ее ниже ячменя и послъднему отдаютъ въ этомъ отношеніи преимущество. Они говорять, что джугара трудно переваривается, въ особенности старыми лошадьми и кромъ того, если вскоръ послъ корму джугарой напоить лошадь, то она околъваетъ.

Въ виду возбужденнаго вопроса о замѣнѣ ячменя джугарой, для корма казенныхъ лошадей, были предприняты въ Маргеланѣ по этому поводу опыты, которые производились при одной изъ частей войскъ, при участіи врача и ветеринара. Результаты мнѣ еще не извѣстны.

Джугара должна быть очень питательной, такъ какъ, по Кёнигу, содержить азотистыхъ веществъ $19,50^{0}/_{0}$, тогда какъ пшеница всего $10,48^{0}/_{0}$.

Кукуруза. Zea Mays, по туз. мекке-джугара, или мака-джавари, родомъ изъ Америки, распространенная на востокъ Венеціанцами, прививается вдъсь туго, въроятно вслъдствіе трудности размола въ муку (³).

Въ Ферган'в разводится въ незначительномъ количествъ, преимущественно въ Наманганскомъ уфздъ, глав-

^{(&#}x27;) Миддендорфъ. Loc. cit. стр. 243.

нымъ образомъ въ съверной полосъ, гдъ она замъняетъ джугару. Посъвъ ен въ долинъ производится вмъстъ съ джугарой въ средипъ марта, а въ съверной части Наманганскаго уъзда въ концъ апръля. Время созръванія на днъ долины въ концъ іюля, а по окраинамъ, въ предгорьяхъ—только въ сентябръ.

По сосъдству съ Ферганой, въ Кашгарін воздълываніе кукурузы очень распространено (1). Она употребляется мъстнымъ населеніемъ въ пищу, подъ видомъ крупы, а мука изъ нее идетъ на приготовленіе хлъба т. е. лепешекъ. Зерно дается лошадямъ вмъсто ячиеня, стебель служитъ кормомъ барапамъ, а высушенные плодовые стержий и кории употребляются на топливо.

Заквашенные стебли кукурузы составляють превосходный, питательный кормь для рогатаго скота и барановь, но въ здёшней странв онъ еще не вошель въ употребленіе.

Многіе европейскіе ученые полагають, что при исключительномъ употребленіи людьми маиса въ пищу, развивается извъстная бользнь—пеллагра. (Маггагі, Lussana, Frua, Lombroso, Selmi и др.). Въ Италіи, Испаніи, Венгріи, Румыніи и другихъ странахъ, гдѣ маисъ въ большомъ употребленіи, эта бользнь упорно держится, поражая преимущественно сельское населеніе. Д-ръ Неіder (1889), на основаніи своихъ изслѣдованій, дълаетъ выводы, что пеллагра не есть микотическое заболѣваніе и что причина ея—хроническое отравленіе продуктами испорченнаго маиса (2).

⁽¹) Отчеть о повздка въ Кашгаръ и южную Кашгарію въ 1885 г. Поручика Б. Л. Громбчевскаго.

^(°) Счеркъ ученія о пеллагрѣ. К. Штюрмера. (Вѣстн. общ. гигізны. Февраль 1890 г. Отд. IV. стр. 93).

Не смотря на обширное употребленіе кукурузы въ Кашгаріи и бъдность тамошняго населенія, мнъ не доводилось слышать ни здъсь, ни тамъ о существованіи пеллагры. Быть можетъ климатическія, почвенныя и сельско-хозяйственныя условія здъсь и въ Кашгаріи, способствуя полному созръванію зеренъ маиса, вмъстъ съ тъмъ предотвращаютъ порчу ихъ, вслъдствіе чего не образуются bacillus maidis и другія вредныя вещества, обусловливающія развитіе этой бользии.

Въ виду безвредности кукурузы въ здѣшнемъ краѣ, полезно было-бы разведеніе ее въ большемъ количествѣ, нежели въ настоящее время. Она пуждается въ небольшомъ количествѣ воды, а потому слѣдовало-бы разводить ее въ горныхъ мѣстностяхъ, въ особенности тирольскую горную кукурузу, которая доставила-бы хлѣбъ кочевому населенію и кормъ скоту въ зимнее время. Въ среднемъ урожаѣ можно получить до 360 пудовъ верна съ десятины и до 3000 пуд. стеблей съ листвой.

Кукуруза по содержанію азотистыхъ, жировыхъ и крахмалистыхъ веществъ можетъ соперничать съ прочими продуктами этого рода. По Кёнигу въ кукурузъ содержится на 100 частей азотистыхъ веществъ 10, 05, жировъ —4,76, сахару—4,59 и крахмалистыхъ веществъ—62, 19.

Сортъ кукурузы, разводимой въ Ферганъ, по вкусу весьма схожъ съ кукурузой средней и южной Россіи и ръзко отличается отъ американскихъ, такъ называемыхъ столовыхъ сортовъ, вслъдствіе малаго содержанія сахару; кромъ того здъшняя кукуруза вовсе не разваривается въ водъ. Въ послъднее время нъкоторые изъ русскихъ стали разводить столовые американскіе сорта, по въ незна-

чительномъ количествъ и только для собственнаго уготребленія.

Просо, это любимый хлѣбъ киргизовъ и поэтому оно воздѣлывается преимущественно ими. Различаютъ два сорта: тарыкъ (Panicum miliaceum) и кунакъ (Panicum italicum) съ гораздо болѣе мелкимъ зерномъ.

Просо, вслъдствіе короткаго своего растительнаго періода и не требующее большаго количества воды, разводится далеко по предгорьямъ и горамъ до высоты 7000 футовъ н. у. м.; эта высота составляетъ верхнюю границу для этого растенія.

Въ самой долинъ просо ръдео разводится по причинъ малодоходности, а потому оно иногда съется какъ послъдующее растеніе, т. е. послъ уборки озимой пшеницы или ячменя. Въ горахъ просо созръваетъ въ іюлъ или августъ, а при запоздаломъ посъвъ даже въ септябръ.

Въ 1885 г. было снято обоихъ сортовъ проса осъдлымъ населеніемъ 31.425 четвертей, а кочевымъ—90.906 четвертей. Обыкновенный урожай бываетъ самъ 18, а иногда гораздо больше. Въ 1887 г. было снято у осъдлаго и кочеваго паселенія 851.155 пудовъ проса; урожай былъ самъ 21.09 въ среднемъ (1).

Просо кром'в того, что употребляется въ пищу, еще идеть на приготовление солода, изъ котораго д'влается особенный напитокъ, въ род'в браги, называемый буза, о которомъ будетъ сказано ниже.

Ачмень, по туз. арпа, разводится какъ въ долинъ, такъ и въ горахъ, слъдовательно какъ осъдлымъ населеніемъ, такъ и кочевымъ. Въ 1885 году сиято яч-

⁽¹⁾ Офиціальныя свідбиія.

меня 101.857 четвертей, изь которыхъ 61.732 освдлыми жителями, а 40.125 ч. кочевниками. Въ 1887 г. освдлыми сиято 511.626 пудовъ, а кочевниками 178.524 пуд. Обыкновенно средній урожай самъ 8.

Лёссовая почва очень пригодна для этого злака, а такъ какъ онъ довольствуется сравнительно незначительнымъ орошеніемъ и можетъ созрѣвать на значительной высотѣ, то и разводится почти во всѣхъ полосахъ Области, но въ долинѣ исключительно при искусственномъ орошеніи, а въ горахъ сѣется подъ дождь. Онъ бываетъ озимый и яровой.

На высотъ 8000 ф. н. у. м. онъ созръваетъ и его жнутъ только въ концъ іюля и даже въ августъ, тогда какъ въ долинъ въ концъ мая и не позже начала іюня. Средняя температура года и особенно зимы имъетъ незначительное вліяніе на предълъ произрастанія ячменя, но средняя лътняя температура въ 80, кажется, необходима для его вызръванія на нашемъ материкъ.

Кастоферъ опредълиль предълы высоты въ Швейцаріи, на которыхъ могутъ прозябать хлъбныя растенія; для ячменя онъ считаєть предъломь 4800 ф. н. у. м., а для ржи 4600 ф. (¹). Но этими вычисленіями мы никакъ не можемъ руководствоваться, потому что у насъ ячмень созръваетъ на высотъ слишкомъ 8000, а рожь на высотъ 10.150 ф. н. у. м.

Сравнительно съ другими хлъбными растеніями, ячменя у насъ съется немного, потому что онъ служитъ преимущественно кормомъ лошадей, а людьми употребляется весьма ръдко и то исключительно бъднымъ населеніемъ.

⁽²⁾ Ж. Буденъ. Loc. cit. Т. І. стр. 254.

Крупы ни обыкновенной ячной, ни перловой туземцы не приготовляють. Для корма казенныхъ лошадей, въ войскахъ Ферганской Области, въ настоящее время требуется ячменя около 17000 четвертей въ годъ.

Кромѣ того ячмень идетъ на производство пива. Въ Н. Маргеланѣ существуютъ два пивоваренныхъ завода. Въ 1886 году на заводѣ Громова сварено пива 2000 ведеръ, а на заводѣ Фирсова 7000 ведеръ.

Въ Ташкентъ варятъ пиво также изъ риса, но въ Маргеланъ для этого употребляется исключительно ячмень.

Рожь, по туз. джаударъ, овесъ—кара-чубъ и гречиха, которая, кажется, и не имѣетъ названія на туземномъ языкѣ, вовсе не воздѣлываются въ Ферганѣ, хотя они могутъ быть разводимы, въ особенности въ горахъ и предгорьяхъ, окружающихъ долину, подобно тому какъ на Кавказѣ. Н. А. Сѣверцовъ въ горахъ, на плоскихъ возвышенностяхъ, нашелъ рожь (Secale cereale) дикорастущей, съ полновѣсными колосьями, а потому признаетъ возможною культуру ржи на соотвѣтствующихъ высотахъ (¹).

Бывшій Андижанскій утадный врачт Д. Мездриковъ дѣлалъ опыты по этому предмету и результаты получились благопріятные. Онъ сѣялъ въ самомъ Андижапѣ рожь какъ озимую, такъ и яровую, а также овесъ и гречиху, которые давали прекрасный урожай.

Въ горахъ я видълъ много дикорастущаго овса, но зерно его весьма маленькое. Грумъ-Гржимайло (2) нашелъ овесъ какъ въ дикомъ, такъ и въ воздъланномъ видъ въ верхней части Каратегина и на Алаъ.

⁽¹⁾ Путешествіе по Туркестанскому краю и проч. Н. Сѣверцова.

⁽²⁾ Изв. И. Р. Г. Общ. Т. ХХ, стр. 664 и др.

Изъ бобовыхъ растеній въ Ферганъ разводится преимущественно машъ. Это—родъ чечевицы (Soja hispida), принадлежитъ къ числу любимыхъ туземцами растеній, какъ по своей питательности, такъ и по удобству воздълыванія. Онъ созръваетъ въ три мъсяца, нуждается въ орошеніи только одинъ разъ, а потому часто съется послъ уборки озимой пшеницы въ то-же льто и на томъ-же полъ.

Машъ, по всей въроятности, разводится съ давняго времени. Филологическими изслъдованіями доказано, что чечевица, упоминаемая уже въ библіи, принадлежитъ къ растеніямъ до индо-германской культуры. Была-ли это чечевица или soja hispida, неизвъстно. Его съютъ много въ здъшнемъ краъ, но насъкомыя и мыши сильно вредятъ этому растенію. Soja hispida содержитъ много авотистыхъ веществъ и маслянистыхъ, а потому принадлежитъ къ самымъ питательнымъ продуктамъ изъ растительнаго царства.

Туземцы разводять также и горохъ, нахудъ, (Cicer arietinum), но онь много уступаетъ нашему; вкусомъ онъ похожъ, но вовсе не разваривается Впрочемъ, въ послъднее время стали разводить въ небольшомъ количествъ и нашъ русскій горохъ изъ съмянъ привозимыхъ изъ Россіи. Въ Наманганскомъ уъздъ разводятъ въ незначительномъ количествъ бобы, но они мелкіе и уступаютъ нашимъ русскимъ сортамъ. Бъдные жители употребляютъ ихъ въ пищу просто поджаренными, иногда-же они прибавляются въ туземныя кушанья.

Нашими войсками, здёсь расположенными, машъ почему-то игнорируется, а между тёмъ введеніе его въ солдатскую пищу, хотя изрёдка, было-бы не лишнимъ,

такъ какъ опъ по своимъ питательнымъ свойствамъ

васлуживаетъ полнаго внимапія.

Кунжутные жыхи составляють превосходное масло, котораго, даже при несовершенномъ тувемномъ способъ выжиманія, получается до $75^0/_0$. Опо по вкусу ими цънится выше прочихъ и употребляется въ пищу. Кунжутные жмыхи составляють превосходный кормъ для скота, при употребленіи которыхъ онъ весьма быстро отъъдается. Не смотря на это кунжутъ разводится въ незначительномъ количестьъ.

Чистое кунжутное масло по качеству не уступить оливковому, но оно довольно дорогое, а потому рѣдко употребляется бѣднымъ населеніемъ. Подъ именемъ кунжутаго у нехъ идетъ смѣшанное масло, выжатое изъ сѣмянъ: кунжута, хлопчатника, дынь, арбузовъ, огурцовъ и другихъ растеній. Оно очень грязное и вонючее. По вечерамъ въ туземныхъ городахъ и кишлакахъ, когда сарты начинаютъ приготовлять на этомъ маслѣ пищу, противный запахъ распространяется по всей мѣстности.

Приготовляемая туземцами олифа изъ съмянъ хлопчатника и кунжута не высыхаетъ, а потому вовсе не годится для красокъ. До сихъ поръ она привозилась изъ Россіи и продавалась отъ 20—24 руб. за пудъ. Съ открытіемъ въ Кокандъ купцомъ Лахтинымъ хлопкоочистительнаго и масло-бойнаго завода начали выжимать лучшаго достоинства масло изъ разныхъ съмянъ, не смъщивая ихъ подобно туземцамъ, а сортируя, вслъдствіе чего теперь олифа, получаемая съ этого завода продается по 8 руб. за пудъ, что не можетъ не отравиться съ выгодой на малярныхъ работахъ. Стебли кунжута идутъ на топливо. Ленъ, по туз. зыгыръ, разводится главнымъ образомъ по предгорьямъ, но можетъ расти и въ долинѣ. Съется съ прекращеніемъ заморозковъ, но всегда прежде пшеницы. Время поспъванія его въ гористыхъ мѣстностяхъ въ августъ и началъ сентября. Ленъ теперь всегда съется яровой, но говорятъ, что прежде были озимые посъвы и давали хорошій урожай.

Туземный ленъ бываеть трехъ сортовъ: черный, желтый и красный. Стютъ его исключительно для полученія стиянь, изъ которыхъ выжимается масло, употребляемое въ нищу. Изъ стеблей пряжа не выдълывается, а они идутъ на кормъ скоту и на топливо. Часто вмъстъ съ льномъ стютъ сорную траву—суреницу, по туз. индау. По Федченко это бълая горчица (Eruca sativa) или рапсъ (Brassica napus) по Кушакевичу. Стемена индау вмъстъ съ съменами льна идутъ на выжимку масла.

Главный бичъ льна—маленькій червячекъ, который иногда уничтожаетъ цѣлые посѣвы льна. Красный сортъ льна меньше всего страдаетъ отъ этихъ червей, а потому предпочтительно засѣвается туземцами.

Конопля,—кендыръ, тоже воздёлывается не какъ прядильное растеніе, а для масла и для приготовленія наши (гашиша). О последнемъ будетъ сказано ниже. Хотя приготовленіе и продажа наши запрещены, а вместь съ темъ не дозволяется и разведеніе конопли въ вдёшнемъ краф, но темъ не менёе все это втайнё про-изводится.

Туземцы не только не употребляють конопляныхъ волоконъ на ткани, но даже не вьють веревокъ изъ нихъ, не смотря на то, что онъ были-бы гораздо прочнъе ихъ шерстяныхъ аркановъ, которые мало того что

сами некръпкіе, да вдобавокъ ихъ поъдаетъ моль. Даже канаты на паромахъ унотребляются свитыми изъ болотной травы—осоки, которые весьма не надежные въ смыслъ прочности и не ръдко рвутся, подвергая нереправляющихся опасности. Но туземцы относительно всего, большіе консерваторы и туго поддаются нововведеніямъ. Впрочемъ въ Самаркандской Области изъ волоконъ мъстной конопли давно уже дълаются веревки и онъ значительно кръпче приготовляемыхъ въ Россіи, но въ Ферганъ это производство еще только въ зачаткъ.

Эта косность будеть, пожалуй, поміхой для всеобщаго распространенія среди ихъ культуры рами, или такъ называемой китайской кранивы, которая, какъ показаль предварительный опыть въ Маргеланскомъ питомникъ, можетъ съ успѣхомъ разводиться въ Ферганской долинъ. Въ виду высокихъ качествъ пряжи рами, было бы весьма желательно убѣдить сартовъ приняться за разведеніе этого растенія, которое можетъ впослѣдствіи доставить имъ громадную выгоду. Нѣтъ сомпѣнія, что высокія качества этой пряжи, позволяющей дѣлать изъ пея самые разнообразные продукты, начиная отъ веревокъ и паруснаго холста и кончая тонкими, роскошными тканями и кружевами, конечно, обезпечатъ ей быстрое распространеніе (1).

Мака, —кукнаръ, прежде разводился въ большомъ количествъ не столько для съмянъ, сколько для головокъ (саріта рарачегія), изъ которыхъ приготовляется одуряющій напитокъ, называемый кукнаръ. Въ настоящее время разведеніе мака тоже запрещено, но его столько

⁽¹⁾ Рами или китайская вранива. Составиль А. Вилькинсь, 1889 г.

здъсь дикорастущаго, даже на всякой сартовской крышъ, что трудно противодъйствовать употребленію этого напитка.

Табакъ, по туз. тамаки. Онъ безспорно въ употребленіи съ давняго времени. Табакъ изъ Карши пользовался въ Средней Азіи наибольшей извъстностью (1), второе мъсто принадлежало табаку Бухарскому. Ферганскій табакъ считался худшимъ за его желтый цвътъ. Можетъ быть, въ Ферганъ могли-бы родиться лучшіе турецкіе и американскіе сорта табаку, но до сихъ поръразводимый здъсь курительный табакъ весьма плохаго достоинства. Почти весь табакъ и сигары получаются здъсь изъ Россіи. Въроятно, здъшніе табаководы не освоились еще со свойствами почвы, орошенія и другими условіями при разведеніи и выдерживаніи табаку, потому что въ Ташкентъ, изъ плантацій Первушина, онъ отличается весьма хорошими качествами.

Хлопчатникъ, Gossypium herbaceum, по туземпому гуза. Это растеніе, бывшее въ употребленіи въ
Индіи съ незапамятныхъ временъ, достигло Персіи и
Египта лишь въ началѣ нашего лѣтосчисленія. Для
здѣшняго края онъ имѣетъ особую цѣну, такъ какъ
подобно шелку даетъ занятіе множеству рукъ, чѣмъ
доставляетъ возможность въ пріобрѣтеніи куска хлѣба
многимъ бѣдиякамъ, помимо самихъ плантаторовъ. Даже
малолѣтніе принимаютъ участіе въ сборѣ коробочекъ и
вытеребливаніи изъ нихъ хлопка, за что получаютъ поденную плату.

По свъдъніямъ, доставленнымъ Увздными Начальниками, въ 1885 г. снято хлопка до 470.000 пудовъ, изъ котораго болъе половины обработано на мъстъ, а

⁽¹) Туркестанскія Вѣдомости. 1875 г. № 5.

около 200.000 пудовъ вывезено въ Россію. Въ 1887 г. было собрано американскаго хлопка 23.054 пуд., а мъстнаго—749.541. п. Изъ этого числа вывезено въ Россію 300.278 пуд. на сумму 2.101.946 р., осталось же въ Области 472.317 п., переработкой котораго было занято около 40 т. ручныхъ ткацкихъ станковъ и около 100 т. ручныхъ прядилокъ. Такимъ образомъ въ 1887 г. благодаря хлопководству 18,55% всего населенія имъло на мъстъ занятіе и поддержку для своего существованія.

Изъ хлопка выдълывается здѣсь мѣстная ткань— мата (бязь) въ значительномъ количествѣ; часть ея употребляется туземцами на бѣлье, а излишекъ вывозится въ Семирѣченскую Область и Западную Сибирь для продажи киргизамъ.

Мата значительно мягче обыкновеннаго солдатскаго холста, но менѣе прочна. Еще ткутъ изъ хлопка джангалу, нѣчто среднее между кисеей и марлей. Высшій сортъ джангалы употребляется на чалмы, а низшій на подкладку. Зендель, или буякъ, приготовляется изъ крашенныхъ бумажныхъ нитокъ: это та же мата, синяго цвѣта, употребляется на подкладку халатовъ. Выдѣлываются еще другія цвѣтныя матеріи, какъ то: алача, каляма и проч., идущія на халаты, одѣяла, платки, палатки и т. п.

Кромѣ хлопчатника мѣстной породы, начинаетъ прививаться разведеніе его изъ сѣмянъ американскихъ, (сортъ Upland), который стоитъ гораздо выше мѣстнаго.

Сколько мнѣ извѣстно, первые опыты по разведенію американскаго хлопка въ Ферганѣ произведены бывшимъ Андижанскимъ уѣзднымъ врачомъ Д. Н. Мездриковымъ. Онъ выписалъ сѣмена и въ 1879 г., изъ любви къ искусству, засѣялъ въ Андижанѣ небольшой участокъ

земли, при чемъ получился отличный результать. Съ тъхъ поръ начали и другіе разводить американскій хлопокъ, по до послъдняго времени мъстный хлопокъ значительно превалировалъ надъ американскимъ.

Изъ мъстныхъ статистическихъ данныхъ видно, что въ Ферганъ въ 1885 г. было засъяно туземцами американскимъ хлопкомъ 106 десятинъ, а мъстнымъ— 52.052 дес. (1), въ 1887 г. американскимъ хлопкомъ— 1.033 дес., а мъстнымъ—48.191 дес. (2). Но въ 1889 г. культура американскаго хлопка очень подвинулась, въ ущербъ мъстному. Илантаціей хлопка стали заниматься кромъ туземцевъ и русскіе.

По статистическимъ свъдъніямъ, въ 1889 г. было засъяно во всей Области американскимъ хлонкомъ 27.840 десятинъ, мъстнымъ—22.855 дес., а всего—50.695 дес. Снято неочищениаго хлопка американскаго 1.042.790 пудовъ, мъстнаго—857.075 пуд., а всего—

1.899.865 пудовъ.

Хлопчатникъ воздълывается въ яровомъ полъ. Растеніе это требуетъ за собой большаго ухода; землю подъ него удобряютъ навозомъ, иногда-же вмъсто удобренія поле только обновляютъ, посыпая его землей взятой съ дорогъ, или разрушенныхъ зданій.

Какъ мъстный, такъ и американскій хлопчатникъ требуетъ незначительной влажности и, напротивъ, ръшительно боится излишней сырости, при этомъ требуетъ рыхлой, смъшанной съ большимъ количествомъ песку, почвы. Особенно вредна хлопчатнику большая поливка; на засъяпное имъ поле напускаютъ понемногу воды въ бороздки между грядами и такая поливка, въ продол-

⁽¹⁾ А. Дмоховскій. Туркестанскія Відомости. 1887 г. № 35.

⁽²⁾ Обзоръ Ферганской Области за 1887 г.

женіи произрастанія хлопчатника, производится только 2—4 раза не болѣе. Наблюдають при напусканіи воды между грядокъ, чтобы вода не покрывала самого растенія, а увлажала-бы только его корни. Посѣвъ считается погибшимъ, если послѣ него въ скоромъ времени шли дожди, тогда приходится вновь перепахивать поле и вновь засѣвать.

Это обстоятельство имѣетъ важное значеніе относительно возможности разведенія хлопчатника вблизи городовъ, потому что всѣ тѣ культурныя растенія, которыя требуютъ пемного воды для орошенія, менѣе вліяютъ на развитіе малярійной міазмы. Кукуруза и ячмень нуждаются въ наименьшемъ количествѣ воды; точно также soja hispida, просо, макъ и кунжутъ не требуютъ большаго количества воды и въ крайности довольствуются однократнымъ орошеніемъ.

На орошеніе земли подъ пшеницу, просо, ячмень, джугару, согласно вычисленію Бюфона (¹), полагается постоянный притокъ струи воды только 8—15 куб. дюймовъ въ секунду на десятину. Эти данныя слъдуетъ имъть въ виду при рѣшеніи вопроса о посъвахъ въ сосъдствъ съ городами, потому что въ здѣшнемъ краъ дорожатъ каждымъ клочкомъ земли способной къ культировкъ.

Относительно хлопчатника замѣчено, что во время его цвѣтенія между людьми, живущими въ сосѣдствѣ, значительно увеличивается число лихорадочныхъ больныхъ; но я полагаю, что это явленіе «сит hoe, а не propter hoe». Хлопчатникъ начинаетъ цвѣсти въ іюлѣ, но цвѣтетъ также какъ и созръваетъ не вдругъ, а по-

⁽¹⁾ Водовладение и ирригація. Виктора Дингельштедта. Ч. І. стр. 238.

степенно и это тянется продолжительное время: отъ 3—4 мѣсяцевъ. Какъ разъ это совпадаетъ съ повсемѣстнымъ усиленіемъ заболѣваній маляріей въ долинѣ, независимо отъ того, находятся-ли вблизи хлопковыя плантаціи, или нѣтъ.

Сфмена хлопчатника содержать до $30^{\circ}/_{0}$ масла, а потому по отдъленіи хлопка они идуть для выжимки масла. Туземцы имфють обыкновеніе при добываніи масла ко всфмь сфменамь прибавлять по $^{1}/_{4}$ хлопковыхъ сфмянь, что сообщаеть весьма непріятный вкусъ и запахъ болье тонкимъ масламъ. Въ особенности противна смфсь льнанаго и хлопчатниковаго масла, а оно большею частью употребляется бфднымъ населеніемъ. Примфсь хлопковыхъ сфмянъ дфлается съ тою цфлью, чтобы облегчить производство. При примитивномъ способф выжиманія масла изъ мелкихъ и скользкихъ сфмянъ, оно производится успфшнфе, когда прибавлены болфе крупныя сфмена, связующія съ собою мелкія.

Хлопчатниковые жмыхи поступають въ кормъ скоту. Американскій сельско-хозяйственный департаменть предприняль опыты съ кормленіемъ коровъ мукой изъ съмянь хлопчатника и поручиль проф. Wiley (Уашингтонъ) сдълать анализъ масла, приготовленнаго изъ молока такихъ животныхъ. Оказалось, что подобное масло: 1) содержитъ, сравнительно низкій процентъ летучихъ кислотъ; 2) имъетъ феноменально—высокую точку плавленія, (что дълаетъ продуктъ пригоднымъ для употребленія особенно въ жаркихъ климатахъ) и 3) содержитъ значительную порцію весьма прочныхъ, возстановляющихъ веществъ (1).

Стебли и съмена хлопчатника употребляются здъсь

⁽⁴⁾ Въстникъ Обществ. гигізны и т. д. 1889 г. Декабрь. Отд. ІХ. стр. 138.

на топливо; въ особенности пригодны для этой цѣли стебли американскаго хлопка, отличающіеся нагрѣвательною способностью.

Если не было неблагопріятныхъ условій, то средній урожай хлопка въ Туркестанскомъ крав можно опредвлить следующими цифрами (1).

Мфстный хлопокъ:

Низшій урожай даеть съ десятины 40 пудовъ, на сумму 32 руб., средній;—50 пуд., на сумму 46 руб.; высшій—60 п., на сумму 60 руб.

Американскій хлопокъ:

Низній урожай съ десятины 60 пуд., на сумму 84 р.; средній—70 пуд.; на сумму 114 руб.; высшій—80 п.; на сумму 144 руб.

Въ Ферганъ, сколько мнъ извъстно, сборъ хлопка съ десятины при благопріятныхъ условіяхъ бываетъ значительно больше. Обработка земли подъ хлопокъ обходится не дешево. На обработку нови расходуєтся до 50 руб. за десятину.

Какъ ни велика разница въ доходности сбора американскаго хлопка и мъстнаго, я тъмъ не менъе полагалъ-бы обратить болъе серьезное вниманіе на усовершенствованіе культуры послъдняго, который болъе пригоденъ при кустарномъ производствъ, доставляющемъ средства къ пропитанію большой массъ бъднъйшаго населенія. Разведеніе американскаго хлопка требуетъ несравненно больше труда при сборъ коробочекъ, что при недостаткъ рабочихъ силъ имъстъ немаловажное значеніе. При созръваніи мъстнаго хлопка коробочки трескаются, но хлопокъ въ нихъ остастся, а нотому опъ могутъ быть сняты, когда угодно и послъ этого онъ

^{(&#}x27;) Туркестанская свравочная книга на 1885 г. Ч. И. стр. 109.

вытеребливается и идеть въ очистку. Въ американскомъ, какъ только коробочка растрескается, хлопокъ, по причинъ легкаго сцъпленія, отдъляется самъ и уносится при мальйшемъ вътеркъ. Хлопокъ начинаетъ созръвать въ августъ, но созръваетъ не весь вдругъ, а постепенно, такъ что даже на одномъ кустикъ онъ уже совершенно созрѣлъ, а на другомъ только начинаетъ цвѣсти и это длится, какъ уже было сказано, отъ 3-4 мъсяцевъ. Въ виду этого, воздѣлыватель американскаго хлопка во все это время долженъ ежедневно обходить поле и наблюдать за тъмъ, не растрескалась-ли которая либо изъ коробочекъ, чтобы своевременно вынуть изъ нее хлопокъ. Это сопряжено съ большой потерей времени, въ особенности при маленькихъ плантаціяхъ, гдъ одинъ человъкъ долженъ поспъвать и за тъмъ и за другимъ, потому что у мелкихъ земледельцевъ кромъ хлопчатника есть и другіе посъвы.

Мъстный хлопокъ значительно меньше страдаетъ отъ насъкомыхъ; онъ легко сбивается въ вату, тогда какъ американскій требуетъ для этого проклейки. Илантаціи хлопка страдаютъ отъ нападенія гусеницъ бабочки (Heliothis armigera), тъхъ-же самыхъ, которыя появляются на джугаръ (1).

Мъстный хлопокъ очищается на незамысловатыхъ ручныхъ деревяныхъ станкахъ, называемыхъ чигриками, что всякій можетъ сдълать у себя на дому, тогда
какъ американскій долженъ идти для очистки на хлопкоочистительныя машины, для чего туземецъ обязательно веветъ его на заводъ, который иногда отстоитъ довольно
далеко отъ мъста его жительства. При невозможности
везти хлопокъ для очистки самому, онъ по неволъ про-

⁽¹⁾ A. Видькинсь, Loc, cit.

дается скупщикамъ, а эти кулаки—промышленники пользуются барышемъ, въ ущербъ бъдняковъ-производителей.

Разведеніемъ хлопчатника, какъ самостоятельной отраслью промышленности, въ Ферганъ никто почти не занимался. Хлопокъ засъвсется земледъльцами, какъ подспорье въ хозяйствъ и какъ одинъ изъ видовъ растеній, употребляющихся во всякомъ домъ. Такихъ лицъ, которые засъвали-бы въ большихъ размърахъ только одинъ хлопокъ, какъ главный источникъ земледъльческаго ховяйства, до послъдняго времени не было, а потому на улучшение какъ самаго продукта, такъ и способа обработки его, не обращалось вниманія. — свяли такъ, какъ свяли дъды и отцы. Поэтому если обратить внимание на культировку мъстнаго хлопка, путемъ подбора съмянъ, то онъ несомнънно доставиль бы болъе значительныя выгоды туземцамъ, нежели въ настоящее время. Изъ него нельзя получить пряжи высшихъ номеровъ, но за то онъ имъетъ неотъемлемое достоинство въ пряжъ до № 20, а если усовершенствовать культуру его, то Nº 40.

Вытеребка хлопка изъ коробочекъ мѣстнаго хлопчатника тоже даетъ хлѣбъ бѣднымъ людямъ, живущимъ въ городахъ и кишлакахъ. Хотя плата за подобную работу пичтожная, потому что въ день онъ можетъ заработать только отъ 6—8 копѣекъ, но за то этимъ занимаются старики, дѣти и всякій слабый, безпомощный, негодный къ другой работѣ людъ, при чемъ всё-таки выручатъ на пропитаніе.

Вытеребленный изъ коробочекъ хлопокъ очищается, т. е. отдъляется волокно отъ съмени. До послъдняго времени эта очистка производилась на чигрикахъ, при чемъ рабочій получаль за трудъ тоже отъ 6—8 к. въ день,

Принято за норму, что одинъ рабочій очищаєть пудъ хлопковыхъ коробочекъ въ два дня, унотребляя первый день на вытеребку волокна изъ коробочекъ, а второй на очистку чигрикомъ, такъ что въ два дня нолучается чистаго волокна 9 фунтовъ и за эту работу онъ получаетъ половину всего съмени, т. е. $10^{1}/_{2}$ фунтовъ, что стоитъ отъ 8-12 копъекъ.

Изъ одного пуда хлопковыхъ коробокъ получается 9 фунтовъ волокна, 9 фунтовъ шелухи, 21 фунтъ съмени и 1 фунтъ траты.

Въ настоящее время въ Кокандъ, Ст. Маргеланъ, Наманганъ, Андижанъ и Ошъ существуютъ хлопко-очистительные заводы, приводимые въ дъйствіе водою. Очистка хлопка производится джинами и, конечно, она болье совершенная, нежели на чигрикахъ. Очищенный хлопокъ поступаетъ въ прессъ, послъ чего отправляется въ Россію.

Заводъ въ Кокандъ работаетъ четырьмя машинами при 18 человъкъ рабочихъ. Суточная работа даетъ около 105 пудовъ чистаго хлопка, слъдовательно такое количество, на которое потребовалось-бы 466 человъкъ рабочихъ, очищающихъ его на чигрикахъ, другими словами, заводъ лишаетъ 466 человъкъ того заработка, который они пріобрътали при туземномъ способъ очистки; въ тагомъ-же положеніи очутились рабочіе и въ другихи уъздныхъ городахъ.

Для вытеребки изъ коробки хлопка съ съменемъ на заводъ работаютъ мужчины, женщины и дъти, такъ кагъ эта работа должна производиться руками, а машина для этого еще не изобрътена. За очистку съ пуда коробочекъ платится 8—10 копъекъ, а такъ какъ больше пуда

одинъ рабочій не можеть очистить, то слідовательно онъ нолучаеть въ сутки не болье 10 к.

Дэкснушка, или Люцерна—Medicago sativa, по туз. бида, занимаетъ видное мъсто въ полеводствъ, благодаря почвъ и искусственному орошенію. Въ 1887 г. подъ посъвами дженушки было 53.242 десятины. Плодородіе ея обусловливается свойствомъ лёсса, а именно: содержаніе извести, однородность, глубина, сухая и теплая подночва. Будучи разъ посъянной, она въ теченіе 10—12-ти лътъ даетъ прекрасное питательное съпо, при удобреніи-же можетъ существовать дольше. Въ теченіе лъта ее косятъ 4—5 разъ, а въ городахъ при кормленіи лошадей зеленымъ кормомъ и болье. Въ промежуткахъ снятія люцерны поле орошается 1—2 раза, такъ что въ продолженіи лъта оно орошается отъ 5—10 разъ. Въ среднемъ десятина даетъ до 750 пудовъ съпа и 35—50 пудовъ съмянъ.

Русскіе люцерну здёсь обыкновенно называють клеверомь, хотя послёдній въ долинё не разводится. Въ горахъ много дикорастущаго клевера (trifolium) и опъ служить кормомь насущимся тамь стадамь кочевниковь.

Люцерна мѣстами поѣдается личинками двухъ видовъ жучковъ—долгоносиковъ до того, что становится негодной какъ кормовая трава, такъ какъ отъ листовыхъ иластинокъ почти пичего не остается (1).

Общепринятое мивніе, что люцерна не должна возвращаться на старое місто раніве 4-хъ літъ, а такъ какъ послів нея хорошо родится всякое культурное растеніе, то обыкновенно сівотъ джугару, требующую большей удобрительной силы почвы.

⁽¹⁾ A. Вилькинсъ, Loc. cit.

Ц t на на землю и ея доходность. Цъна на землю зависить: отъ свойства почвы, высоты надъ уровнемъ моря, отъ большей или меньшей удаленности отъ городовъ и базарныхъ пунктовъ, отъ большей или меньшей ровности и горизонтальности поверхности почвы. Здъсь играетъ роль и количество воды, которая можетъ орошать данную землю. Отъ этихъ условій зависитъ съ одной стороны возможность производить наиболье доходные посъвы риса, джугары и хлопчатника, а съ другой—обезпеченіе сбыта этихъ ироизведеній, съ наибольшей выгодой. Въ виду этихъ условій цъна колеблется отъ 6 до 400 руб. за десятину.

Доходность земли различна въ разныхъ пунктахъ Ферганы. Среднею доходностью можно принять данныя, выведенныя за нъсколько лътъ для Наманганскаго уъзда, который по своимъ почвеннымъ, ирригаціоннымъ и прочимъ условіямъ можетъ быть принятъ за средній. Эти данныя заимствованы у В. Наливкина (1) и изложены въ слъдующей таблицъ.

1								Урожай съ десятины въ	Цъна за пудъ.	
								пудахъ.	РУБ.	коп.
Пшеница	100							50,5	_	55
Ячмень			1781					62,5	_	36
Рисъ .		215						105,5		46
Джугара								138,5		33
Хлопчатникъ (мъстный)								58,5	1 120	90
Ленъ (зер								28,5	-	65
Просо .								41—		27
Люцерна	(H	HV	ТЪ	3—	5 p	as	ь).	300—	-	12

⁽¹⁾ Очеркъ быта женщины осъдлаго туземнаго населенія Ферганы. 1886 г.

Площади земель Наманганского убада заняты подъ разные продукты, а потому средній валовой доходъ съ десятины вообще равенъ 48 руб. 34 коп. (1).

Какъ отдёль земледёлія, огородничество составляеть Огородинчезначительную отрасль хозяйства. Огородничествомъ занимается здёсь преимущественно осёдлое населеніе, которое поставило этотъ родъ хозяйства на весьма раціо-

нальную почву. Культурныя работы, какъ-то: удобреніе, поливка, разрыхленіе почвы, окучка растеній, уборка растеній и проч. ведутся туземцами весьма тщательно.

Парниковаго хозяйства они не ведутъ.

Въ 1887 г. огородами было занято 10.245 десятинъ (2). На орошение земли подъ огороды, по вычисленію Каландры, полагается по литру воды въ секунду на одну десятину (61,0270 куб. д.) (³).

Въ огородахъ разводятъ: дыни, арбузы, огурцы, тыквы, морковь, рёдьку, рёпу, цикорій, свеклу, хрёнъ, картофель, капусту, лукъ, чеснокъ, стручковый перецъ, марену и другія.

Большая часть огородныхъ растеній потребляется туземцами и русскимъ населеніемъ на мъстъ, остальная часть, въ особенности марена и стручковый перецъ, вывозятся въ Кашгаръ и Бухару.

Дыня, — Cucumis melo, по туз. каунъ. Онъ дълятся на двъ группы: гандалякъ-мелкія, круглыя, поспъвающія очень рано и каунъ-большія, продолговатыя, съ

⁽¹⁾ Очеркъ экономическаго состоянія Наманганскаго уёзда по даннимъ земледвльческого сельского хозяйства. П. А. 1884 г. стр. 31.

⁽²⁾ Офиціальныя свёдёнія.

⁽³⁾ В. Дингельштедть. L. с. стр. 236.

мягкимъ мясомъ. Какъ тѣ, такъ и другія бываютъ разныхъ сортовъ. Первыя—гандаляки поспѣваютъ во второй половинѣ мая, а каупы въ концѣ іюня; самыя-же позднія кыркма, сохраняемыя на зиму, поспѣваютъ только въ концѣ августа и сентябрѣ.

Почвы содержащія соль, называемыя здѣсь сайкешъ, производять самыя лучшія дыни (¹), но онѣ требують, что бы было достаточное количество воды въ подпочвѣ. На десятинѣ можеть уродиться 9 тысячь дынь. Онѣ большею частью разводятся на поляхъ и только въ незначительномъ количествѣ садятся по близости жилищъ, въ огородахъ. Нерѣдко ихъ сажаютъ также какъ и арбузы между хлопчатникомъ, джугарой и коноплей.

Дыни очень часто плохо родятся отъ разныхъ болъзней, причиной которыхъ является растительный паразитъ,—orobanche, (Phelipea indica), по туз. шумбіа.

Хотя среди туземцевъ существуетъ повърье, будто Архангелъ Гавріилъ роздалъ изъ рая дынныя съмена и что дынный сокъ—это вода изъ райскаго пруда—кевсеръ, но тъмъ не менъе дыни въ здъшнемъ крав считаются вредными, такъ какъ способствуютъ развитію лихорадокъ и поносовъ, въ особенности если ихъ употреблять въ незръломъ видъ. Сарты, какъ привыкшіе къ пимъ съ дътства, не въ такой степени подвержены вредному ихъ вліянію, но наши солдаты, забольвающіе подобными разстройствами, весьма часто обязаны этимъ неумъренному или несвоевременному употребленію дынь.

Арбузъ, Cucurbita citrullus, по туз. тарбузъ, не въ такомъ всеобщемъ употребленіи, какъ дыни. Здъшніе сорта арбузовъ во многомъ уступаютъ астраханскимъ,

⁽¹⁾ В. Наливкинъ. Туркестанскія Вѣдомости 1880 г.

малороссійскимъ и друг. Даже въ Семиръчьи они родятся болье крупные, сочные и вкусные. Въ Ташкепть они привозятся подъ именемъ Върненскихъ, въ Ферганъ-же разводятся изъ привозныхъ съмянъ, тогда они бываютъ лучшаго качества, чъмъ мъстные, но по истечении извъстнаго времени, кажется, перерождаются.

Арбувы въ здъшней странъ не считаются на столько вредными, какъ дыни и могутъ быть употребляемы безнаказанно.

Дыни и арбузы, какъ извъстно, содержатъ въ большомъ количествъ тростниковый сахаръ, способный кристаллизоваться, но до сихъ поръ никто этимъ не воспользовался, такъ какъ въ Туркестанскомъ краѣ нътъ сахарныхъ заводовъ.

Осурцы, Сиситія sativus, разпыхъ видовъ, по туз. бадринъ, разводились въ здѣшнемъ краѣ давно, съ приходомъ же Русскихъ, вслѣдствіе увеличившагося спроса на этотъ продуктъ, туземцы стали развоцить еще въ болѣе значительномъ количествѣ. Въ настоящее время появилось много разповидностей, которыя не были извѣстпы туземцамъ.

Тыква, Сисигыта реро, по туз. ашъ-кавакъ, употребляется туземцами въ пищу. Она входитъ въ составъ пъкоторыхъ мъстныхъ кушаній, какъ напримъръ: ширъ-каду и друг.

Горлянка, Cucurbita lagenaria, по туз. кавакъ, въ пищу не употребляется, а разводится въ значительномъ количествъ для приготовленія изъ нея извъстнаго рода посуды. Для этого туземцы вынимаютъ изъ нее мякоть, а наружная оболочка представляетъ собою кувшинъ, въ которомъ держатъ масло, или воду. Эти кувшины не оцъненны въ дорогъ, такъ какъ вода въ нихъ пе на-

столько согрѣвается, какъ въ бутылкахъ. Въ маленькихъ горлянкахъ они держутъ мелкій табакъ, закладываемый за щеку. Кромѣ того изъ нее дѣлаютъ чилимы, т. е. мѣстные кальяны, о которыхъ будетъ сказано ниже.

Изъ числа овощей разводимыхъ въ огородахъ, Морковъ, по туз. сабызъ, пользуется у туземцевъ большою популярностью. Она прибавляется почти ко всъмъ кушаньямъ и приготовленіе палау безъ нее пеобходится. На базарахъ опа повсюду продается уже изръзанной па мелкіе ломтаки, т. е. въ такомъ видъ, въ какомъ кладется въ туземныя кушанья.

Индъйцы, проживающіе здѣсь, выкуривають изъ моркови водку, которая употребляется туземцами. Послѣ извѣстной очистки она бываеть очень крѣпкой и довольно вкусной. Въ прежнее время, говорять, она выдълывалась въ значительномъ количествѣ и имѣла большой сбыть; конечно, все это производилось втайпѣ.

Тукъ, (піязъ)—тоже во всеобщемъ употребленіи и разводится въ большомъ количествъ. Преимущественно употребляется ръпчатый, а зеленый лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Здъшній лукъ, разводимый въ огородахъ, не имъетъ той остроты, какъ въ Россіи; въроятно, онъ содержитъ меньше сърнистаго алила. Средняя Азія, нужно полагать, —отечество цыбули (Allium сера), такъ какъ она растетъ здъсь въ дикомъ состояніи въ горахъ на высотъ 6000 ф. Въ горахъ-же растетъ и дикій лукъ (Allium огеорнішт), по туз. каурганъ, который обладаетъ противо-цынготными свойствами и охотно употребляется въ приправу къ кушаньямъ, какъ осъдлымъ, такъ и кочевымъ населеніемъ. Кромъ этого въ горахъ растетъ еще множество различныхъ породъ лука и всъ онъ употребляются мъстнымъ населеніемъ въ

пищу, хотя и не въ большомъ количествъ. Между прочими стоитъ упомянуть слъдующія породы: ascalonicum var.—чрезвычайно вкусный, луковицы котораго достигають величины большаго грецкаго оръха. По величинъ замъчателенъ такъ называемый киргизами сассыкъ-матаръ, съ бълыми цвътами, растущій въ Алайскихъ горахъ, или мандыль съ лилово-голубыми цвътами -въ горахъ къ С. отъ Намангана. Этотъ лукъ (Allium giganteum?) достигаеть огромныхъ разміровь; цвіточный стебель бываетъ вышиною до $2^3/_4$ арш. Луковица бълая, пирамидальная, мясистая, достигаеть до 3-хъ вершковъ въ діаметръ, съ очень ръзкимъ и весьма противнымь запахомъ; ее тоже вдять киргизы,-но чего только они не фдять! Въдь пьють-же они настой взъ корня Assae foetidae (отъ боли въ животв), которая всявдствіе своего отвратительнаго запаха заслужила еще въ средніе вѣка названіе stercus diaboli; впрочемъ, персы называютъ этотъ корень "блюдомъ боговъ". Ужъ если гдъ, то въ здъшнихъ странахъ болъе всего приложима пословица: "о вкусахъ не спорятъ".

Чеснока, по туз. сарымсакъ, воздёлывался туземцами и прежде, но въ незначительномъ количествъ, такъ какъ онъ не въ такомъ почетъ, какъ среди евреевъ. Съ приходомъ Русскихъ стали разводить нъсколько больше для продажи; онъ растетъ и въ дикомъ состояніи.

Хртито въ прежнее время не былъ вовсе въ употреблени, но въ настоящее время его разводятъ въ достаточномъ количествъ для продажи.

Картофель, Solanum tuberosum, на мъстномъ наръчіи не имъстъ названія, потому что до прихода сюда Русскихъ былъ неизвъстенъ тувемцамъ. Впрочемъ, при взятіи Ташкента, въ 1865 г. онъ былъ найденъ въ небольшомъ количествъ у проживавшихъ тамъ татаръ. Сначала онъ былъ встръченъ туземцами съ предубъжденіемъ, но все таки они стали его разводить для продажи русскимъ жителямъ и войскамъ, а въ настоящее время и сами стали свыкаться съ его унотребленіемъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Маргеланскаго уѣзда картофель уже употребляется въ пищу среди бѣднаго населени, такъ что этой овощи предстоитъ хорошая будущность въ этомъ краѣ. Въ 1885 г. добыто картофеля въ Области 1710 четвертей, изъ которыхъ самое большое количество приходится на Маргеланскій уѣздъ, а именно: 999 четв. и Наманганскій з33; остальное количество распредѣлилось по другимъ уѣздамъ.

Капуста, какъ кочанная, такъ и цвѣтная, а также свекла тоже не употреблялись туземцами, а первоначально начали ихъ разводить исключительно для продажи, но теперь онѣ начинаютъ понемногу входить въ составъ пищи мѣстнаго населенія.

Мало еще обращено вниманія на разведеніе красной свеклы, которая и въ настоящее время безъ всякой усовершенствованной культировки содержить въ себъ сахару отъ $12-17^0/_0$.

Въ незначительномъ количествъ разводится теперь спаржа, артишоки, баклажаны, помидоры и друг.

По пустыннымъ мѣстамъ въ долинѣ очень много растетъ Саррагія herbacea, объ употребленіи которыхъ туземцы ничего не знали и считали это растеніе за сорную траву. Маргеланскій городовой врачъ Бунинъ, кажется, первый въ Ферганѣ началъ приготовлять капарцы, которыя нынѣ уже многими собираются и маринуются. Въ Ташкентѣ еще раньше началъ ихъ приготов-

лять аптекарь Краузе и эти капарцы ничемъ не уступаютъ привознымъ.

Не смотря на благопріятныя климатическія и поч- садоводство. венныя условія Области, садоводство у туземцевъ находится на низкой степени развитія. Они не только не обращаютъ вниманія на выборъ мѣста для садовъ, но и самая плапировка, а равно посадка деревьевъ производится кое-какъ, а между тѣмъ садоводство и разведеніе фруктовъ вообще составляетъ здѣсь видную отрасль хозяйства среди осѣдлаго населенія. Изъ общаго количества находящихся въ пользованіи населенія земель подъ садами и виноградниками числится до 15 000 десятинъ.

Въ садахъ разводятъ: абрикосы, персики, яблони, груши, гранаты, черешни, сливы, вишпи, грецкій оръхъ, айву, миндаль, фистанки, винныя ягоды, виноградъ и проч. Оранжерей и грунтовыхъ сараевъ туземцы не устранваютъ. Единственный способъ сохраненія фруктовъ—подвъшиваніе въ сухомъ помъщеніи. Сушка илодовъ произведится на солнцъ; особо-же устроенныхъ сушиленъ нътъ.

Изъ статистическихъ данныхъ видно, что продукты садовъ не только удовлетворяютъ мѣстной потребности населенія, но составляютъ значительный предметъ вывоза. Въ 1885 г. винограда собрано болѣе 2-хъ милліоновъ пудовъ, а другихъ фруктовъ около милліона, не смотря на то, что въ тотъ годъ во многихъ мѣстахъ, особенно близъ горъ, на урожаѣ вредно отразились бывшіе весною во время цвѣтенія фруктовыхъ деревьевъ заморозки.

Кромъ весеннихъ заморозковъ фруктовыя деревья страдаютъ отъ личинокъ вредной бабочки (Oeneria dispar. L.), которыя иногда совершенно оголяютъ эти де-

ревья, такъ что жители и не видятъ на нихъ плодовъ (1).

Туземцы въ своихъ садахъ кромѣ фруктовыхъ деревьевъ разводятъ и другія, какъ-то: талъ, тополь, карагачъ, чинаръ, акаціи, тутъ, а также нѣкоторыя лѣкарственныя и красильныя растенія. Въ послѣднее время, по примѣру Русскихъ, начали сажать новыя породы привозныхъ деревьевъ, которыя прежде здѣсь не были извѣстны.

На орошеніе садовъ, виноградниковъ, тутовыхъ плантацій и друг., согласно вывода гидравлика Фролова (2), требуется воды по 56,75 куб. дюймовъ въ секунду на одну десятину.

Въ концъ 1877 г. въ Н. Маргеланъ былъ основанъ древесный питомпикъ съ цълью разведенія и акклимативаціи древесныхъ и кустарныхъ породъ, пригодныхъ для облъсенія предгорій, а также распространенія лучшихъ сортовъ фруктовыхъ деревьевъ среди мъстнаго населенія. До конца 1882 г. питомникъ развелъ 135 десятинъ новыхъ насажденій, на которыхъ высажено 420.000 молодыхъ деревьевъ и кромѣ того болѣе 300.000 молодыхъ деревьевъ отнущено какъ частнымъ лицамъ, такъ и разнымъ учрежденіямъ. Къ концу 1882 г. въ питомникъ осталось культированной площади 14 десятинъ, на которыхъ насчитывается до милліона древесныхъ всходовъ, какъ мъстной, такъ и Европейской флоры.

Благодаря этому питомнику, сады и уличныя аллеи ферганскихъ городовъ украсились многочисленными деревьями и кустарниками, которыхъ до сего времени

⁽¹⁾ A. Вилькинсъ. Loc. cit.

⁽²⁾ В. Дчигельштедть. Loc. cit. стр. 236.

не было въ здвинемъ крав. Къ нимъ принадлежатъ: Ailantus glandulosa, Gleditschia triacanta inermis, Robinia pseudoacacia съ нъкоторыми разновидиостями, Catalpa syringefolia (адамово дерево), Negundo acerifolia (американскій кленъ), разные виды Асег и Populus, въ особенности Populus Simonii и ontariensis. Для соленыхъ и мокрыхъ почвъ имъютъ важное значеніе разные виды Rhus и хвойное дерево Taxodium distichum. Много разсажено оръховъ, ясеней, навлоніи, Lirio dendron, Acaciae Julibrissin, а изъ хвойныхъ—разныя туи, juniperus, cupressus и abies. Pinus весьма немного. Затъмъ для украшенія садовъ много разведено розъ, вьющихся растеній, а главное—богатый отдълъ фруктовыхъ деревьевъ и кустарииковъ.

Въ виду громадныхъ расходовъ, требующихъ поддержанія питомника въ такомъ обширномъ размѣрѣ, а равно оранжерей, опъ въ настоящее время переданъ городу и уменьшенъ значительно противъ прежняго, а оранжерея совсѣмъ закрыта.

Оранжерея стоила большихъ денегъ и въ ней было устроено паровое отопленіе съ приспособленіями для регулированія въ ней влажности воздуха. При подобномъ устройствъ отопленія имълось въ виду разведеніе деревьевъ Sequoja sempervirens, которыя въ настоящее время успъшно культивируются во Франціи. Если бы эта попытка удалась, то край много выиграль-бы отъ разведенія подобныхъ деревьевъ, которыя могутъ служить какъ прекрасный строевой и столярный лъсъ. Не знаю въ силу какихъ обстоятельствъ, но эти деревья такъ и пепривозились изъ-за границы въ Фергану. Поэтому неизвъстно, можетъ-ли Sequoja sempervirens расти здъсь, или нътъ.

Туземные сады. Во встхъ туземныхъ садахъ разводится въ большомъ количествъ виноградъ. Встхъ сортовъ его въ Области насчитываютъ до 20-ти. Лучшимъ считается кишмишъ, или ханскій, неимъющій косточекъ и содержащій въ себъ отъ 20—22% сахару. За тъмъ слъдуетъ черный (чарасъ) и красный сортъ. Какъ кишмишъ, такъ и оба послъдніе сорта, частью сбываются на мъстъ въ сыромъ видъ, частью идутъ на Наманганскій винокуренный заводъ, но большею частью вывозится въ Россію и Сибирь въ сушеномъ видъ. Въ 1887 г. вывезено въ Россію сушенаго винограда около 50 т пуд. на сумму около 100 т. рублей (1).

Изъ кинмиша выдълываютъ также натоку. Остальные сорта винограда потребляются на мъстъ въ сыромъ видъ и на винодълье, а также на приготовление уксуса. Есть сортъ винограда, который даетъ ягоды два раза въ годъ.

Цъпа хорошему винограду на мъстъ, въ розничной продажъ для стола у разнощиковъ отъ 2—4 копъекъ за фунтъ; въ оптовой-же для заводовъ около 25 коп. пудъ. Сушеный виноградъ продается по 2 р. за пудъ

Лозы здъшняго винограда длинныя. Кусты сажаются двумя параллельными рядами, разстояніе между которыми около 4—5 аршинъ. Между двумя такими рядами кустовъ, изъ сырыхъ таловыхъ жердей устрамваются дуги, концы которыхъ врываются въ землю: высота дугъ больше человъческаго роста. Дуги соединяются между собою или тонкими жердями, или жгутами, свитыми изъ камыша; къ послъднимъ привязываются лозы и если виноградникъ уже взрослый, то

⁽¹⁾ Офиціальный сведёній.

получается сплошь закрытый корридоръ, ствны и крыша котораго образуются изъ мелкихъ вътвей и листьевъ виноградника. Если такихъ корридоровъ ифсколько, то они примыкаютъ другъ къ другу своими продольными сторонами вплотную. При подобномъ устройствъ, кисти винограда опускаются внутрь этого корридора и, по причинъ тъни отъ многочисленныхъ листьевъ, солнечные лучи не проникають туда и не могуть непосредственно дъйствовать на ягоды, что оказывается не безъ вліянія на надлежащее созръваніе. Собственно говоря, ягоды созрѣвають, такъ какъ продолжительная, высокая температура лъта способствуетъ этому; но лишеніе непосредственнаго дійствія солнечных лучей вліяеть на качество винограда. Быть можеть, это обстоятельство служить причиною, что мъстныя вина, достоинству, уступають крымскимь и будто бы, по кавказскимъ.

Вообще винодъліе въ Ферганъ мало развито. Нъкоторыми изъ живущихъ здѣсь Русскихъ выдѣлывается вино для собственнаго лишь употребленія, а для продажи приготовляется однимъ, или двумя лицами и то въ весьма незначительномъ количествъ. Туземцы тоже приготовляютъ себъ—мусалясъ, но плохаго достоинства. Все мѣстное вино, употребляемое жителями Ферганы, привозится изъ Самарканда и Ташкента, приготовляемое изъ тамошняго винограда на заводахъ Филатова, Иванова и Первушина. Нѣкоторые сорта этихъ винъ, болѣе или менѣе выдержаные, довольно доброкачественны, по отличаются крѣпостью вслѣдствіе значительнаго содержанія спирта.

Единственный изъ фруктовъ, разводимый въ вдѣшнемъ краѣ, который не считается вреднымъ относительно развитія желудочно-кишечных в катарровъ, — это виноградъ. Врачъ А. Красовскій (1) наблюдаль тоже самое на Кавказѣ въ г. Озургеты. Виноградъ, употребляемый тамъ въ изобиліи, а также мъстное виноградное вино не способствовали развитію лихорадокъ, тогда какъ зелень и прочіе фрукты, въ особенности не совсѣмъ спѣлые и употребляемые въ неумъренномъ количествъ, вызывали острыя разстройства желудочно-кишечнаго канала, къ которымъ присоединялась лихорадка.

Туземцы Ферганы увъряютъ, что во время эпидеміи холеры употребленіе винограднаго сока будто бы служить даже предохранительнымь средствомъ отъ этой бользни. Это, пожалуй, не абсурдъ, потому что запятыя—видныя Коховскія бактеріи погибаютъ отъ кислотъ, а потому не слъдуетъ игнорировать этимъ заявленіямъ и при случав провърить.

Къ плодовымъ деревьямъ относятся: ябленя, груша, слива, вишня, черешня, айва, абрикосовое и персиковое деревья, оръхъ, миндаль и фисташки; кромъ того кустарниковыя породы: гранаты и смоковница.

Яблоки, по туз. адма, разводятся въ многочисленномъ количествъ въ долинъ, а въ горахъ растутъ въ дикомъ состояніи. Всъ сорта не вкусные, водянистые, такъ что гораздо хуже самыхъ посредственныхъ сортовъ разводимыхъ въ россійскихъ губерніяхъ. Правда, что тамъ прививныя, а здъсь дикорастущія. Россійскія дикія яблоки не могутъ и сравниваться съ здъшними, какъ по величинъ, такъ и по качеству, въ особенности съ яблоками растущими въ кишлакахъ Алмазъ и Чадакъ, въ бывшемъ Чустскомъ уъздъ, яблоки

⁽¹⁾ Изъ наблюденій надъ болотной лихорадкой А. Красовскаго. Врачебныя Вѣдомости 1882 г. № 37.

которыхъ пользуются извъстностью во всемъ Туркестанскомъ крав. Они кислосладкаго вкуса, созръвають поздно и хорошо сохраняются на виму.

Въ послъднее время начинають появляться въ садахъ плоды на привитыхъ деревьяхъ лучшихъ европейскихъ сортовъ. Прививаютъ въ большинствъ случаевъ къ сортамъ носящимъ названіе doucin, которые употребляются для подвоевъ и въ Европъ.

Труши, по тув. альмурудъ, такъ-же какъ и яблоки, отличаются громадною величиною, по водянистыя и не вкусныя. Единственный сортъ, навываемый деляфрусъ, разводимый въ кишлакахъ Исфаръ и Канибадамъ, поспъвающій очень поздно, вкуснъе всъхъ мъстныхъ сортовъ, имъющихся въ Туркестанскомъ краъ. Разпые европейскіе сорта тоже теперь прививаются усиленно и уже даютъ прекрасные плоды.

Айва, по туз. биги. Плоды въ употребленіи какъ ереди русскихъ, такъ и туземцевъ; послъдніе прибавляють айву въ палау.

Абрикосы (урюкъ) и персики (шафтала) воздълываются въ большомъ количествъ и доведены до множества разновидностей. Урюкъ начинаетъ цвъсти очень рано, въ концъ февраля или въ началъ марта. Въ 1879 г.; 19 чевраля, урюки, миндали и вишни были въ полномъ цвъту; по за то въ 1890 г. по случаю поздней весны эти деревья начали цвъсти только 20 марта.

Изъ незрълаго урюка русскіе приготовляють варенья, а кромъ того прибавляють его въ зеленыя щи, что придаеть имъ замъчательный вкусъ.

Урюкъ въ сыромъ видѣ, хотя и совершенио зрѣлый, употребляется въ незначительномъ количествѣ, потому что вызываетъ разстройства желудочно-кишечнаго канала, въ особенности у дътей. Я видълъ даже овецъ и барановъ, у которыхъ вслъдствіе неумъреннаго употребленія урюка дълался сильный поносъ, не смотря на то, что урюкъ былъ совершенно зрълый и падалъ съ деревьевъ на землю, откуда они и подбирали его.

Сарты урюкъ сушать и въ такомъ видѣ сохраняють на зиму. Очень большое количество сушенаго урюка вывозится въ Россію и Сибирь. Въ 1887 г. супеныхъ персиковъ и абрикосовъ (урюка) вывезено въ Россію около 40 т. пуд., на сумму около 100 тыс. руб. (¹).

Вишни и сливы употребляются какъ въ свъжемъ видъ, такъ и сушеномъ. Существуетъ здъсь особый родъ сливы, называемой али-бухара. Это—что то среднее между вишнею, сливою и абрикосомъ. Плоды бываютъ темно-красные и желтые, очень вкуспые; косточки продолговатыя.

Транаты (анаръ). Изъ плодовъ выжимается сокъ, который въ большомъ употребленіи, какъ морсъ. Говорять, что онъ обладаетъ противоцынготными свойствами, а потому употребляется вмъсто лимоновъ. Корень употребляется въ медицинъ.

Винных ягодз (анджиръ) мпого сортовъ, но туземцы не умъютъ ихъ консервировать; въ свъжемъ видъ они мало употребляются, потому что приторносладки.

Ортожи, миндаль, фисташки и другіе употребляются на мёстё, а также вывозятся за предёлы Области. Изъ орёховъ выжимается масло высокаго качества, но оно употребляется исключительно русскими, или болёе богатыми туземцами. Фисташки туземцы также обсахаривають и продають на базарахъ.

⁽¹⁾ Офиціальныя свідінія.

Кромѣ этихъ плодовыхъ деревьевъ во всякомъ саду, а также возлѣ заборовъ и кругомъ пашень, гдѣ только позволяетъ мѣсто, разводятъ тута меревъя,— шелковицу (Morus nigra et alba). Они составляютъ весьма доходную статью садоводамъ, такъ какъ листья покупаются шелководами для выкармливанія шелковичныхъ червей. Вслѣдствіе того, что въ кормъ червямъ употребляются только листья молодыхъ побѣговъ, то вѣтви съ листьями ежегодно обрубаются, а потому деревья представляютъ собою уродливый видъ. Когда шелковичное дерево растетъ свободно безъ обрубки вѣтвей, то оно достигаетъ громадныхъ размѣровъ и служитъ украшеніемъ садовъ. Деревья тута могутъ достигать трехсотлѣтняго возраста.

Г. Петровскій (1) насчитываеть 5 породь тутоваго дерева, по туземцы подразд'яляють еще на большее число разновидностей, которыя они различають по степени годности для кормленія шелковичныхъ червей.

Туть даеть ягоды, изъ которыхъ приготовляется патока, но въ громадномъ количествъ опъ сущатся и мука изъ нихъ употребляется въ пищу бъднымъ населеніемъ въ видъ особаго пищеваго продукта, называемаго "тутъ-талкана". Одно сорокалътнее дерево въ урожайный годъ даетъ до 160 фунтовъ сущеныхъ ягодъ (²); обыкновенно-же отъ 30—50 фунтовъ.

Одинъ сортъ тута даетъ ягоды, изъ которыхъ получается краска, употребляемая для окрашиванія шелковыхъ и бумажныхъ матерій; другой сортъ—ша-тутъ имъетъ примъненіе въ туземной медицинъ; употребляется какъ потогонное.

⁽¹⁾ Шелководство и шелкомотаніе въ Средней Азін. 1874 г. стр. 40.

⁽²⁾ Г. А. Арандаренко. L. с. сгр. 599.

Въ молодыхъ вътвяхъ тутоваго дерева заключаются кръпкія, гибкія, блестящія волокна, весьма сходныя съ льняными, изъ которыхъ можно приготовлять пряжу, но туземцы этимъ производствомъ не занимаются.

Пехт, Eleagnus angustifolia, по туз. джида. Даетъ плоды похожіе на финики, но опи не вкусные, мучнистые и мало въ нихъ сладости; цвётетъ въ копцѣ апрѣля и маѣ, при чемъ распространяется сильный, пріятный запахъ, по многіе нервные люди не переносять его, такъ какъ у нихъ появляется жестокая головная боль, а потому они избѣгаютъ гулять въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ много джиды въ цвѣту.

Карагачъ или Кайрагачъ, Ulmus campestris, въ дикомъ видъ встръчается ръдко, а разволится въ садахъ и во дворахъ передъ домами. Растетъ весьма медленно и можетъ существовать сотни лътъ, но въ старости имъетъ дупло, вслъдствіе чего становится некръпкимъ и во время бури легко ломается. Карагачъ растетъ стройно, достигаетъ 10 саж. вышины и 3 арш. въ окружности; богатъ листвой настолько, что сквозь ее не проходитъ дождь и при томъ даетъ тънь на значительномъ разстоянии. Туземцы различаютъ три породы карагача, или разновидности, отличающіяся расположеніемъ вътвей и наружнымъ видомъ; одна изъ нихъ именуется—сада, другая—буджгунъ и третья—тугупъ. Изъ буджгунъ-карагача дълаютъ колеса.

Карагачъ въ здѣшнемъ краѣ, вслѣдствіе крѣпости древесины, замѣняетъ собою дубъ; изъ него дѣлаютъ разныя столярныя издѣлія, а также колеса и прочія вещи, для которыхъ требуется крѣпкое дерево. Какъ топливо онъ тоже считается лучшимъ нежели тополь и талъ.

Чинаръ, Platanus orientalis, употребляется въ подълкахъ какъ кръпкое и красивое дерево; въ особенности изящны чинаровые столы, шкафы, шкатулки и т. п.

Чинаръ разводится б. ч. искусственно, достигаетъ громадныхъ размъровъ и можетъ существовать тысячу лътъ. Въ Туркестанскомъ крат достойны вниманія два великана: одинъ чинаръ около Ходжекента, въ 60 верстахъ отъ Ташкента, въ которомъ дупло 8 арш. въ діаметръ; другой — близъ Самарканда, въ Ургутъ, не имъетъ соперниковъ. Этотъ чинаръ болъе 40 ф. въ окружности, сучъя его могутъ охватить лишь 3—4 человъка, а въ дуплъ его (10 шаговъ въ квадратъ) помъщается школа. Въ Ферганъ такихъ громадныхъ чинаровъ нътъ.

Возлѣ мечетей, а иногда въ садахъ, на берегу прудовъ, встрѣчается *плакучая ива* (Salix Babilonica), достигающая громадныхъ размѣровъ и спускающая свои вѣтви въ воду этихъ прудовъ.

Весьма рѣдкое дерево въ Ферганѣ, но встрѣчающееся иногда посаженнымъ на мазаркахъ (могилахъ)— это Сауръ, Віота огіentalis. Въ этихъ мѣстахъ онъ достигаетъ большихъ размѣровъ, такъ какъ вполнѣ гарантированъ отъ порубки: съ могилы никто никогда не тронетъ.

Сарты вообще любять цвѣты (гуль), а потому въ каждомъ садикѣ они разводять по нѣскольку сортовъ розъ, тюльпановъ, гвоздики, Осумит Basilicum, zinnia, ipomea, chrysanthemum, gomphrena и друг. У Русскихъ, любителей цвѣтоводства, въ настоящее время цвѣтники содержутъ въ себѣ всѣ виды, какіе только могутъ быть разводимы.

Въ здѣшнемъ краѣ почему то не распространено разведеніе *подсолнечников* (Helianthus), которые

могли-бы приносить неоспоримую пользу въ гигіеническомъ отношеніи, такъ какъ дренируя и осушая почву возлѣ жилищъ, этимъ самымъ способствовали бы уменьшенію болотной міазмы. Англичанинъ Гельсъ и нѣмецъ Шюблеръ нашли (¹), что каждый подсолнечникъ испаряетъ ежедневно фунтъ съ четвертью воды; стало быть это растеніе вбираетъ ее столько-же изъ почвы. Чѣмъ суше и жарче погода, тѣмъ конечно сильнѣе испаряются листья. И въ экономическомъ отношеніи подсолнечники принесли-бы пользу туземному паселенію, такъ какъ изъ сѣмянъ они могли-бы получать хорошее, вкусное масло. Въ послѣднее время въ Ферганѣ нѣкоторые больные стали употреблять подсолнечникъ настоянный въ водкѣ противъ лихорадки и, повидимому, съ усиѣхомъ.

Изъ числа красильныхъ растеній, разводимыхъ

тувемцами, болъе извъстны слъдующія:

Тхумакъ, или тухумакъ (Sophora japonica), дерево похожее на акацію, изъ цвѣтовъ котораго добывается желтая краска, идущая у туземцевъ для окраски кожъ

и другихъ издёлій.

Марена, Rubia tinctorum, по туз. руянъ, разводится преимущественно на поляхъ и огородахъ въ большомъ количествъ не только для мъстнаго употребленія, но и для отправки въ Россію и Кашгаръ. Въ 1885 г. ее вывезено изъ Ферганы на 24.500 руб. (2); но скоро она потеряетъ свое значеніе и прекратится доходная статья для занимающихся разведеніемъ этого растенія. Въ корнъ марены содержится красящее вещество ализаринъ, представляющій превосходную краску

⁽⁴⁾ Медицинская географія Кавказа. Н. Торопова стр. 351.

^(°) Офиціальныя сведенія.

для бумажныхъ тканей. Нъмецкіе химики Гребе и Либерманъ приготовили это красящее вещество изъ каменно-угольнаго деття, ничъмъ не отличающееся отъ натуральнаго, а потому оно теперь въ Европъ употребляется повсемъстно на ситцевыхъ и красильныхъ фабрикахъ и разведеніе марены съ тъхъ поръ совершенно тамъ прекратилось.

Мальва, по туз. гуль-хайры, разводится въ са-

дахъ для добыванія краски.

усма, —туземное названіе, растеніе изъ семейства крестоцвътныхъ; изъ листьевъ приготовляется краста, которою сартянки чернять себъ брови.

Въ экономическомъ отношении интересно знать Доходность доходность вемли, находящейся подъ садами, но, къ сожальнию, цифровыя свъдъния у меня имъются только для Наманганскаго уъзда (1). При этомъ авторъ оговаривается, что доходность какого-либо рода изъ плодовыхъ деревьевъ, за исключениемъ виноградниковъ и гранатъ, не можетъ служить для опредъления доходности сада данной площади, такъ какъ безчисленная комбинация деревьевъ по сортамъ и числу дълаетъ одинъ садъ отличнымъ отъ другаго по доходу. Доходность плодовыхъ деревьевъ можетъ быть выражена такъ:

⁽¹⁾ Очеркъ экономическаго состоянія Наманганскаго утзда. П. А. сгр. 11.

Алича (родъ сливы) даетъ 15 ф. стоимостью 30 к. Айва. 30 ф. — — 60 — Винная ягода. 10 ф. — — 20 —

Тутъ средней величины можетъ прокормить червей, дающихъ $2^{1}/_{2}$ фунта коконовъ, или съ него можетъ быть продана листва на 40-50 коп.

Тухумакъ средней величины даетъ цвъту до $^{1}\!/_{2}$ пуда на 50 коп.

Принимая во вниманіе, что на танацѣ земли можетъ произрастать по 6 деревьевъ каждой породы, и сообразуясь съ вышеприведенными цифрами, можемъ опредѣлить доходность каждаго танапа ($^1/_6$ десятины) приблизительно въ 51 руб. 90 коп. Полагая на потерю отъ насѣкомыхъ, вѣтра, гнилости и т. п. $^1/_5$ часть, получимъ доходъ одного танапа сада въ 42 руб. 52 коп.

Виноградникъ 1 танапъ даетъ 50 пуд.—10 руб. Гранатъ 1 — 7 пуд.—14 руб.

Относительно виноградниковъ эти цифры доходности минимальны, потому что въ Андижанскомъ увздв имъются такіе богатые виноградники, которые даютъ съ танапа 100—150 пуд. винограда.

1 соводство.

Лѣса Ферганской Области не имѣютъ никакого сходства съ лѣсами Россіи и Сибири, гдѣ лѣсныя площади покрываютъ пеобозримыя пространства. Ферганскіе лѣса представляютъ собою рощицы и перелѣски, расположенные въ горпыхъ ущельяхъ, а мѣстами на склонахъ горъ, если только почва и достаточное количество влаги позволяютъ произрастанію древесной растительности.

Горы окружающія Ферганскую долину, какъ уже было сказано выше, состоять изъ различныхъ грани-

товидныхъ глинъ и др. Въ углубленіяхъ, ущельяхъ, а мѣстами на склонахъ горъ, покрытыхъ лёссомъ и гдѣ легко задерживается влага, эти мѣста покрывались альнійскою растительностью, которая въ теченіе вѣковъ, отживая и разлагаясь, образовала слой растительнаго перегноя до ³/₄ арш. толщиною. Въ этихъ то мѣстахъ главнымъ образомъ встрѣчаются лѣсные участки, состоящіе изъ разныхъ породъ деревьевъ и кустарниковъ, соотвѣтственно абсолютной высотѣ данной мѣстности, такъ какъ въ этомъ отношеніи размѣщеніе породъ подчинено строгой послѣдовательности.

Глубина лѣсной почвы весьма раличная; мѣстами, гдѣ почва мелкая, а подпочва скалистая и пластъ ея лежитъ почти горизонтально, безъ трещинъ, глубина почвы ограничивается отъ $^3/_4$ — $1^1/_2$ арш.; при наилучшихъ условіяхъ она имѣетъ глубину до $2^1/_2$ арш. и даже болѣе $(^1)$. Скалистая почва повсюду лишена древесной растительности и только изъ разщелинъ скалъ кое-гдѣ поднимаются рѣдкіе и тощіе деревца и кустарники.

Поверхность почвы горъ безконечно разнообразная, то она волнистая, то совершенно ровная,—то съ сильною, то съ очень небольшою покатостью къ какой либо странъ свъта. Общій же наклонъ горъ, окружающихъ Ферганскую долину, спускается къ этой долинъ.

Горные лѣса Ферганской Области, приведенные до сихъ поръ въ извѣстность, по господству породъ, распредѣляются въ слѣдующемъ порядкѣ (2):

⁽¹⁾ Гориме льса Ферганской Области. В. И. Лисневскаго. 1885 г.

^(°) В. И. Лиспевскій. Loc. cit.

Арча занимаеть площадь 83.216	десятинъ.
Ель и пихта 8.683	
Урюкъ, яблони и другія фруктов.	
породы	-
Оръхъ	-
Береза и душистый тополь 5.320	-
Иргай, барбарисъ, ясень, кленъ и	
другія кустарныя и древес-	
ныя породы 3.829	_
Фисташковыя деревья 35.440	
Итого привелено въ извъстность: 333.012	дес.

При этомъ нужно замѣтить, что описаніе лѣсныхъ участковъ производилось глазомѣрно. Вслѣдствіе особеннаго характера здѣшнихъ лѣсовъ, подробная таксація ихъ почти невозможна. Подробная съемка лѣсовъ потребовала бы такихъ громадныхъ расходовъ, которые пикогда не окупятся, почему и приходится ограничиваться глазомѣрной съемкой.

Это только горные лѣса, такъ какъ въ долинѣ ихъ не существуеть. По этому разсчету, на одну квадратную версту площади Ферганской Области приходится горныхъ лѣсовъ около 4,93 десятинъ.

Если принять въ разсчетъ приблизительную цифру населенія въ Области, около милліона душъ, то на каждаго жителя приходится по 0,33 дес. древесной массы горныхъ лъсовъ. Очевидно, что такого количества слишкомъ недостаточно для полнаго обезпеченія населенія Ферганы лъсомъ. Если количество лъсовъ останется неизмъннымъ и на будущее время, то по мъръ увеличенія населенія и развитія производствъ въ Области, оно изъ года въ годъ будетъ все менъе и менъе удов-

летворять потребностямъ края, а потому необходимо вызвать въ средъ населенія соревнованіе къ разведенію, а не къ уничтоженію льсовъ.

Въ началъ этой главы было сказано, что Фергану когда-то покрывали большіе сплошные льса не только въ горахъ и предгорьяхъ, но даже по берегамъ ръкъ они спускались и въ долину; въ настоящее-же время они кое-гдъ сохранились въ горахъ, благодаря только

недоступности этихъ мъстъ.

Эти лъса, окаймлявшіе долину, служили защитой противъ вътровъ, дующихъ съ горъ, потому что густой лъсъ задерживаетъ напоръ вътра и послъдиій, достигнувъ конца его, становится совершенно неощутимымъ. Далъе, эти лъса защищали и питали ручьи и ръки, которые въ здъшней странъ всъ берутъ начало въ горахъ, вслъдствіе чего они приносили воды въ долину несравненно большее количество, нежели въ настоящее время. Эти-же лъса по предгорьямъ и въ долинъ, защищая почву отъ непосредственнаго вліянія солнечныхъ лучей, поддерживали въ ней болье влажности, въ силу чего въ то время предгорья были покрыты богатою луговою растительностью среди разнаго рода древесныхъ и кустарныхъ породъ.

Что эти лѣса оказывали вліяніе на климать и имѣли немаловажное значеніе на санитарное состояніе здѣшней страны,—это не подлежить сомиѣнію; но за неимѣніємъ никакихъ данныхъ за тотъ далекій періодъ времени, я, конечно, ничего не могу сказать и сравнивать въ этомъ отношеніи то время съ настоящимъ. А гіогі, возможно допустить, что Ферганская долина въ то время не отличалась здоровостью, а напротивъ, въ центральной ея части, если только встрѣчались участки сущи, то на пихъ малярійныя бользии должны были свиръпствовать еще съ большею интенсивностью, нежели въ настоящее время. Вслъдствіе обилья воды доставляемой съ горъ, долину покрывали сплошныя болота и стоячія озера, отъ которыхъ теперь остались только слъды.

За то предгорья, покрытыя роскошными лъсами, между которыми находились луга, орошаемые быстрыми ручьями, въроятно, славились какъ пріятностью климата, такъ и здоровостью этихъ мъстностей. Долина представляла собою малярійные очаги, отъ которыхъ жители предгорій были защищены, какъ возвышеннымъ мъстоположеніемъ, такъ равно стъною древесной растительности, чрезъ которую міазма не могла проникнуть.

Истребленіе лісовъ въ горахь, въ связи съ усыханіємъ вообще водъ въ Средней Азіи, повліяли на осущеніе долины и до нікоторой степени на оздоровленіе ея, но всему бываетъ предълъ. Дальнівищее истребленіе лісовъ, не замізняемое новыми насажденіями, можетъ приготовить печальную будущность этой странів. Изъ илодородной долины она превратится въ конців концовъ въ безплодную пустыню.

Наблюденія, сділанныя во всіхъ частяхъ світа, давно подтвердили, что изобиліє постоянныхъ водныхъ источниковъ зависить пепосредственно отъ ліспетыхъ горныхъ вершинъ и что при разчисткі лісовъ источники изсякали, а нікоторые и совершенно закрывались.

Въ настоящее время намъ нечего бояться равномърной прибыли воды въ нашихъ ръкахъ, которая можетъ произойти вслъдствіе носадокъ деревьевъ по ущельямъ и склонамъ горъ. При сознательномъ и умъломъ распредъленіи воды по пашнямъ и отводъ отработавшей къ Дарьв, она послужить къ благосостоянію жителей и не будеть заболачивать низменностей, вслъдствіе чего и не станеть развиваться въ значительной степени малярійная міазма. Избытокъ воды приносить главнымъ образомъ вредъ странв, въ смыслв развитія маляріи, если она не утилизируєтся и спускаєтся зря, вслъдствіе чего образуются болота, или мелкія озера, поросшія камышемъ и другими водяными растеніями.

Въ оросительной водъ у насъ недостатокъ, а потому прибыль ея послужитъ къ развитію земледълія на тъхъ участкахъ, которые въ настоящее время стоятъ безъ орошенія. Для насъ теперь гораздо опаснѣе наводненія, воду которыхъ мы не только не можемъ утилизировать, а даже не въ силахъ ее удержать и противодъйствовать разрушительному ея вліянію. Эти наводненія составляютъ послѣдствія уничтоженія лѣсовъ въ горахъ и ущельяхъ.

Лѣса защищаютъ и питаютъ ручьи и рѣки, но если вырубить лѣсъ на непроницаемой почвѣ, не обработывая ея, то земля съ трудомъ пропускаетъ дождевую воду и скоплясь дѣластъ мѣстность болотистою. Если-же поверхность паклонная, то вода быстро скатывается съ нея и собираясь въ ущельяхъ образуетъ потоки. Отъ сильныхъ ливней въ горахъ масса воды, собираясь въ одномъ мѣстѣ, образуетъ такъ называемый силь, который несется съ неимовѣрною быстротою въ долину, производя по пути разрушенія, о которыхъ уже было сказано.

Какъ метеорологическій факторт, нагорный лѣсъ имѣстъ преобладающее значеніе предъ лѣсомъ долины. Нагорный лѣсъ падъляетъ равнину водою по мѣрѣ надобности и спасаеть ее какъ отъ педостатка, такъ и отъ избытка воды. Поэтому принятіе мъръ противъ истребленія льсовъ нынь существующихъ и забота по разведенію новыхъ окажутъ благодьяніе здъшней странь, какъ въ экономическомъ, такъ и санитарномъ отношеніи. Что носадки въ этой мъстности возможны, мы видимъ примъръ на Самаркандской Области. Тамъ въ степи и въ предгорьяхъ безъ искусственнаго орошенія разведенъ льсь на пространствъ 400 десятинъ и гдъ онъ не только растеть удовлетворительно, но и совершилъ задачу задержанія силевыхъ потоковъ.

Лъсоистребленію въ Ферганъ способствовало главнымъ образомъ отсутствіе лъснаго хозяйства и лъсной администраціи. При ханахъ льсомъ могъ пользоваться каждый и только при продажъ опъ оплачивался особымъ сборомъ (такджой), взимаемымъ ханскими чиновниками.

По занятіи края Русскими, вначаль не было обращено вниманія на льсное дьло, а потому киргизы, главные эксплоататоры горныхъ льсовъ, вовсе съ нимъ не церемонились, точно также какъ и въ былое время, — брали и истребляли такое количество деревьевъ, какое имъ заблагоразсудилось. Они вырубаютъ льсъ не только для собственной надобности и продажи скупщикамъ, проживающимъ въ базарныхъ кишлакахъ, но весьма неръдко истребляютъ цълыя площади совершенно зря. Кочевники-виргизы часто уничтожаютъ огнемъ хвойные льса только потому, что желаютъ этимъ увеличить площадь выпаса.

Рубка лѣса производится иногда топоромъ такой конструкціи, что для облегченія валки круппыхъ деревьевъ порубщики принуждены бываютъ прибѣгать къ употребленію огня.

На углежжение, практикуемое киргизами въ широкихъ размърахъ, уничтожается громадное количество сырорастущаго молодаго и хорошаго лъса, такъ какъ угля въ Ферганъ расходуется весьма много. Киргизы и сарты не устраивають печей, а отопляють свои помъщенія (юрты и сакли) древеснымъ углемъ. Количество угля расходуемое Русскими на самовары ничтожно въ сравненій съ тъмъ, какое истребляютъ туземцы.

Во многихъ мъстахъ углежеги для облегченія работы и теперь еще опаливають лъсъ на корию, что и служить главною причиною лъсныхъ пожаровъ.

Началомъ лъснаго хозяйства въ Ферганской Области можно считать только 1881 годъ, когда быль учрежденъ нъкоторый надзоръ за казенными лъсами, но истребление его продолжается и по настоящее время. При скудности средствъ на лѣсоохраненіе, слъдить за целостью лесовъ, расположенныхъ въ педоступныхъ местахъ, - певозможно. Но эта недоступность не существуеть для топора здъшнихъ лъсоистребителей - жителей Ферганскихъ горъ, людей кръпкихъ, мускулистыхъ и привыкшихъ бродить по горамъ во всякое время и безъ всякой дороги.

Въ Ферганскихъ горахъ существуетъ до 80 раз- Аревесныя и личныхъ видовъ древесныхъ и кустарныхъ растеній, но нустарныя поглавнъйшіе изъ нихъ слъдующіе:

Арчи,-туземное название древовиднаго можжевельника, растущаго въ горахъ и ущельяхъ, преимущественно на Алайскомъ хребтъ. Его различаютъ 4 вида: Juniperus Cocanica, Jun. foetidissima, jun. pseudo sabina u jun. satina. Туземцы дёлять его тоже на 4 вида:

Кара-арча. Дерево 10—12 арш. вышиною, 12-18 вер. толщиною, -- напоминаетъ своею густою

кроною крону сосны; растеть въ ноясъ 4500—5500 ф. н. у. м. Вмъстъ съ нею растеть кустарникъ, но туз. загаза,—Ephedra distachia et monostachia.

Кизыло-арча, — походить на предыдущую и отличается большею граціозностью кропы и болье ръдкимъ расположеніемь плодовь на вверообразныхъ густыхъ вътвяхъ. Растеть между 4500—8000 ф. Встръчается по дорогь на переваль Кара-Казыкъ на высоть 8000 ф.

Сауръ-арча. Отъ 12—15 арш. вышиною и толщиною 4—8 верш.; крона похожа на крону лиственницы. Растетъ на высотъ отъ 3900—8000 ф.; древесина смолистъе всъхъ видовъ арчи. Плоды нохожи на juniperus communis. На высотъ около 8000 ф. съ ней растетъ береза и клёнъ.

Ургона-арча, — растеть выше прочихь и достигаеть 11.300 ф. н. у. м.—это верхній преділь ея по опреділенію Федченко. На большихъ высотахъ урюкъарча растеть кустомъ, а на болье низкихъ—въ видів дерева, со многими переходами между этими двумя формами. Съ ней растеть рябина.

Виды арчи, въ смъси съ другими древесными и кустарными породами, занимаютъ неръдко очень значительныя пространства во всъхъ уъздахъ Ферганской Области. Въ нъкоторыхъ мъстностяхъ встръчаются рощи арчи въ густомъ насажденіи, не менъе 9 саж. вышиною. Вообще арча растетъ медленно; стволъ 80—лътняго дерева имъетъ только 4 вершка въ діаметръ. Арча употребляется главнымъ образомъ какъ строительный матеріалъ и на водяныя сооруженія, а въ горахъ на топлино и выжиганіе угля.

Ель, (Picea Schrenkiana), по туз. карагай. Въ Ферганъ произрастаетъ два вида ели, отличающихся по

цвъту и величинъ зеленыхъ шишекъ. Оба вида растутъ преимущественно въ горахъ Наманганскаго уъзда, достигають крупныхъ размъровъ, до 30 саж. вышины и до 2 арш. въ діаметръ. Употребляется ель какъ строительный матеріалъ, но весьма трудно ее добывать и доставлять въ долину по той причинъ, что большею частью растетъ на кручахъ и въ глубокихъ ущельяхъ. Въ Ошскомъ уъздъ, въ Гульчинской волости, растетъ еловый лъсъ на высотъ 7000 ф.

Верхній преділь ели, по опреділенію Буняковскаго,—10.760 ф. н. у. м., а няжняя граница—6000 ф.

Изъ междоузлій молодыхъ еловыхъ деревъ выдѣляется сахаристый сокъ, который по виду, цвѣту и вкусу папоминаетъ карамель. Количество его у молодыхъ деревъ доходитъ до 3 лотовъ. Говорятъ (¹), что такой сокъ въ Ферганѣ выдѣляютъ и другія древесныя и кустарныя породы. Halimodendron argenteum (колючка) выдѣляетъ особенно много сахаристаго сока.

Пижта, по туз. тоже караѓай, растетъ б. ч. вивств съ елью въ горахъ Наманганскаго увзда, достигаетъ вышины 20 саж. при толщинв 16—20 вершковъ. Древесина и другіе вившиіе признаки сходны съ таковыми же признаками пихты, произрастающей въ Россіи.

Оргожъ, (Juglans Regia', по туз. янгакъ, растеть на высотѣ 1500—6000 ф. преимущественно въ Андижанскомъ уѣздѣ, гдѣ во многихъ лѣсныхъ дачахъ является господствующею породою. Деревья достигаютъ 16½ арш. вышины съ діаметромъ до 2 арш. Большія деревья имѣютъ средній поперечникъ площади отѣненія до 4 саженъ. Въ виду этого, туземцы въ долинѣ разводятъ эти

^{(&#}x27;) В. И. Лисневскій. Loc. cit.

деревья искусственно. Древесина оръха плотная, при просушкъ почти не колется, а потому употребляется для столярныхъ подълокъ. Въ особенности цънны наплывы, достигающіе на старыхъ деревьяхъ иногда 45 пудовъ въсу; они скупаются и вывозятся за границу.

Дикій миндаль, (Amygdalus), по туз. бадамъ. Въ явсахъ Ферганы растетъ 3 вида миндаля. Одинъ изъ нихъ древовидный встрвчается на высотв отъ 6000—7500 ф. н. у. м.

Рябина, (Sorbus Thianschanica), по туз. читтынт, растеть на высоть оть 7000-9000 ф. н. у. м.; на высотахъ въ 7000 ф. размъры ея достигають до 5 саж. при діаметръ 6—8 верш. Ягоды крупнъе, пежели въ Сибири и Россіи, но не такъ вкусны,—больше горечи.

Облюниха, (Нуррорнаё ramnoides), по туз. сарканакъ,—дерево и кустъ. Въ формъ дерева достигаетъ высоты 7500 ф. н. у. м. и имъетъ около 5 саж. вышины и 8-ми вершковъ толщины. Ягоды красноватыя, сидятъ въ пазухахъ листьевъ.

Вишня, (Prunus Mahaleb), по туз. альвали. Дерево до 8 арш. вышиною, растеть на высотт 5000 ф. Плоды въ видъ мелкихъ, повислыхъ черныхъ ягодъ, сладкогорьковатаго вкуса. Этотъ родъ вишпи нъкоторые ошибочно принимаютъ за черёмуху.

Изъ фруктовыхъ деревьевъ, растущихъ дико въ горныхъ лъсахъ, достойны вниманія слъдующія:

Люсная яблонь, по туз. алма, растеть на высоть оть 4500—5400 ф. **Дикая груша**,—альмруть, растеть на высоть оть 2000—4000 ф. **Слива**,—гайляну, растеть въ ущельяхъ Андижанскаго увзда на высоть отъ 2850 до 5500 ф. **Абрикосз**,—урюкъ, растеть на высоть отъ 3000—4600 ф. **Барбарисз**, (Berberis),

по туз. зиркъ, ивсколькихъ видовъ; растетъ на горахъ всвхъ увздовъ до высоты 5500 ф. н. у. м. **Фисташ-никъ**, (Pistacia vera), по туз. истя, растетъ по предгорьямъ до высоты 3740 ф. н. у. м.

Малина, — ходжакатъ, ежевика-мурмынджакъ, черная смородина — карахатъ и нъкоторыя другія ягоды встръчаются въ горахъ, гдъ растутъ среди прочихъ древесныхъ и кустарныхъ породъ.

Лѣса фисташковые, орѣховые и другихъ фруктовыхъ породъ, повидимому, щадятся порубщиками, такъ какъ ихъ илоды составляютъ для мѣстныхъ жителей предметъ продовольствія и торговли. Кора орѣха и яблони идетъ на добываніе красокъ, которыми окрашиваются туземныя матеріи. Сдираніе коры у этихъ древесныхъ породъ производится съ деревъ уже отжившихъ, а потому не оказываетъ вреднаго вліянія на общее состояніе лѣсовъ.

Кромѣ арчи и ели, о которыхъ уже было сказано выше, въ лѣсахъ Ферганы распространены и другія породы деревьевъ, которыя употребляются какъ строительный матеріаль и въ столярномъ производствѣ. Изъ нихъ болѣе употребительны слѣдующія:

Береза, (Betula Thianschanica), по туз. каинъ, растетъ на высотъ отъ 3550—8500 ф. н. у. м.; верхній предъть еп—12.700 ф. Въ Наманганскомъ уъздъ она встръчается въ большомъ количествъ и образуетъ цълыя рощи. Береза здъсь достигаетъ до 5 саж. вышины и до 12 верш. толщины. Она не имъетъ большаго примъненія у туземцевъ и большею частью идетъ на выжиганіе угля. Кора употребляется на обкладку съделъ, а также идетъ на производство дегтя.

Тополь, (Populus), по туз. терякъ, весьма распространенная порода деревьевъ въ вдёшнемъ краѣ; растетъ въ горахъ и разводится искусственно въ долинъ. Верхній предълъ его, по наблюденію Д. Л. Иванова,--11.400 ф.

H. Y. M.

Здѣсь встрѣчается нѣсколько видовъ тополя: бѣлый, серебристый, пирамидальный, татарскій, горный и пр. Опь требуетъ питательной почвы и много воды, но за то растетъ столь быстро, что въ 5 лѣтъ достигаетъ значительныхъ размѣровъ. Въ нѣкоторыхъ видахъ тополя средияя толщина годичныхъ слоевъ равняется 3½ лин. Вообще тополь сильно истощаетъ почву.

Populus diversifolia, но туз. туранга, легко переносить засуху, можеть расти на песчаной почвѣ, лишьбы подпочва была сырая. Онъ содержить много натроиныхъ солей, вслъдствіе чего горить желтымь пламенемъ.

Тополь въ Ферганъ въ большомъ ходу. Туземцы употребляють его на постройки, на столярныя издълія и на топливо; но во всёхъ этихъ производствахъ онъ оказывается мало пригоднымъ. Туранга не годится для построекъ, потому что имѣетъ пустой стволъ; въ Кашгаріи изъ нея дѣлаютъ ведра.

Ветла, (Salix), по туз. талъ. Деревья разныхъ видовъ; растутъ въ горахъ и разводятся въ долинъ; послъднія принадлежатъ къ виду Salix pentandra. Талъ разводится въ Ферганской долинъ въ значительномъ количествъ, какъ для скръпленія береговъ ирригаціонной системы, такъ равно для тъни и въ видахъ полученія дешеваго матеріала на топливо и дубленіе кожъ. Деревья 6 саж. вышиною имъютъ часто поперечникъ площади отъпенія до 10 саж. Верхній предълъ тала, по Съверцову, 12.500 ф. н. у. м.

Кленъ, (Acer Tartaricum), по туз. шаугать, растеть въ горахъ на высотъ 4400—5450 ф. по берегамъ гор-

ныхъ ръкъ и на склонахъ горъ. Изъ одного вида клена туземцы дълаютъ ободья для колесъ.

Псень, (Fraxinus Sogdiana и F. potamophila), но туз. шумталь, растеть по берегамь ръкъ между 3000-4500 ф., но туземцами не употребляется въ столярномъ производствъ.

Въ горахъ Наманганскаго увзда, на высотв отъ 5000—7000 ф, растетъ въ видв кустарника, а иногда въ видв деревца, **Асса-Муса**, что въ переводв значитъ жезлъ Моисея, ботаническое-же названіе мив не-извъстно. Въ немъ древесина кръпкая какъ кость, а потому туземцами употребляется на трости, ручки для нагаекъ и пр.

Кустарники жимолости (шильви) и иргая (Cotoneaster) употребляются на различныя издёлія кустарной промышленности.

Изъ въчно-зеденыхъ, кромъ хвойныхъ, встръчаются въ горахъ: Evonymus sp. и Celtis australis,—желъзное дерево, по туз. катарангу.

Нъкоторые изъ кустарниковъ хоти не имъютъ особаго примъненія, по часто встръчаются въ горахъ и предгорьяхъ, а потому интересуютъ публику; опи слъдующіе:

Бонрышника, (Crataegus) по туз. дуняна, растеть на высотъ отъ 3000—8000 ф. во всъхъ улздахъ Ферганской Области.

Шипосникъ, (Rosa caucasica), по туз. гурана и другіе виды весьма распространены между 3000-8000 ф., но достигають 11.000 ф. н. у. м.

Требенщикъ, (Тамагіх), по туз. юлгунъ, — кустарникъ до 3 арш. вышиною. Въ долинъ Ферганы растетъ нъсколько видовъ гребенщика по берегамъ ръкъ, а равно на солончаковыхъ и песчаныхъ почвахъ, въ горахъ до высоты 5500 ф., но иногда встрѣчается на высотѣ 13.500 ф. н. у. м. (Сѣверцовъ).

Изъ альнійской флоры, болье извъстны слъдующія: Erytrychium, Pedicularis, Scutelaria, Stachis, Lagochylos, Dryanthae Bungeana, а также разные виды: Acantholimon, Saxifraga и др. Между камнями моренъ растетъ крупный Epilobium latifolium, съ кистями розовыхъ цвътовъ. Часто встръчаема на европейскихъ альнахъ Gnaphalium leontopodium, подъ именемъ альнійской розы, растетъ и въ вдѣшнихъ горахъ.

Флора долины Алая состоитъ главнымъ образомъ изъ луговой растительности. Тамъ встръчаются: ковыль, кипецъ, оржаница и другіе злаки. Ближе къ водъ-мелкая осока (Carex physoides), а среди луговъ-незабудки, куриная слъпота, ромашка, одуванчики, богородская трава, разные горошки, клеверъ и чій (Lasiogrostis splendens). Послъдній имъетъ обширное примъненіе у киргизъ; изъ него дълаются ръшетки окаймляющія низъ юрты, а также цыновки.

Не смотря на разнообразіе древесныхъ породъ, произрастающихъ въ горахъ и долинъ Ферганской Области, здъсь вовсе не встръчаются сосна, дубъ, липа, ольха и осина. Въ послъднее время въ Маргеланскомъ питомникъ стали разводить искусственно и эти деревья, за исключеніемъ осины и, кажется, результатъ будетъ удовлетворительный.

Тайнобрачныя.

Трибовъ въ Ферганъ весьма мало. Изъ събдобпыхъ встръчаются въ долинъ только шампиньоны, сморчки и опанки. Попадаются и ядовитые. Знаю одинъ примъръ въ Маргеланъ, гдъ ручной медвъдь паълся грибовъ и черезъ два часа издохъ. Этяхъ грибовъ и не видъть, а потому не знаю, какіе это были сорта.

Въ лъсахъ, расположенныхъ въ съверныхъ горахъ, попадаются иногда грибы въ достаточномъ количествъ, по мит пеизвестно, къ какимъ сортамъ ихъ отнести. Мъстные киргизы упростили классификацію грибовъ до нельзя; у инхъ только два названія: айгырь-тельпакъ; въ переводъ значитъ жеребячья шапка, къ нимъ относятся всъ събдобные грибы и ишакъ-тельнакъ, -- ослиная шапка, къ которымъ причислены несъбдобные. Въ бывшемъ Чустскомъ увздв водятся грибы, по виду и вкусу напоминающіе наши бълые, по это одни изъ тіхъ, которые въ некоторыхъ местностяхъ Россіи называются абабками; тамъ-же встрвчаются и маслянники.

Мховъ здёсь тоже весьма мало, точно также какъ и папорогниковъ. Изъ последнихъ встречаются лишь изръдка Adiantum et Aspidium. Filix Mas совсъмъ не встръчастея. Въ этомъ отношении замъчается большая разница между Ферганой и Кавказомъ, гдв какъ извъстно, напоротники распространены въ значительномъ количествъ.

Медицинскихъ растеній въ Ферганъ встръчает- Медицинская ея довольно много въ дикомъ состояніи и разводится искусственно въ садахъ, но они не собираются пашими врачами. Ири современномъ направленіи теранія, различныя травы, употреблявшіяся въ медицинь, забыты и гніють въ антечныхъ шкафахъ, такъ что въ собираніи новыхъ не предстоить никакой падобности.

Изъ болве или менве извъстныхъ медицинскихъ растеній здашней флоры сладующія:

Асопітит вр. растеть преимущественно въ сѣверныхъ горахъ и пріобрѣлъ нечальную извѣстность въ смежной съ Ферганой Семирѣченской области нодъ именемъ иссыкульскиго порешки, употребляемаго съ злоумышленною цѣлью для отравленія. Много было случаевъ, гдѣ жены отравляли своихъ мужей, подсыная порошокъ этого корня въ водку, квасъ и другіе напитки, при чемъ происходило быстро отравленіе, оканчивающееся обыкновенно смертью. При вскрытіи и химическомъ анализѣ никогда нельзя было констатировать факта отравленія.

Amygdalus communis. Миндальное дерево б. ч. разводится въ садахъ. Оръхи употребляются только для приготовленія молока; горькій-же миндаль встръчается довольно ръдко и Aq. amygd. amar. на мъстъ не приготовляется.

Achillea millefolium. Тысячелистникъ.

Агтемізіа absinthium. Польнь. Разные виды распространены какъ въ долинъ, такъ и въ горахъ. Отъ одного изъ видовъ получается цитварное съмя, по туз. дармене. Этотъ видъ въ Ферганъ ръдко встръчается въ дикомъ состояніи и разводится въ садахъ, исключительно для полученія цитварнаго съмени; но въ Сыръ-Дарьинской Области, въ Чимкентскомъ и Туркестанскомъ уъздахъ, по берегамъ р. Арыса, онъ растетъ въ громадномъ количествъ. Въ Чимкентъ устроенъ заводъ для обработки съмени на сантопинъ.

Cannabis sativa. Конопля.

Capsicum annuum. Стручковый перецъ разводится въ большомъ количествъ и вывозится за предълы Области. Кромъ медицинскаго употребленія, онъ идетъ въ

приправу къ кушаньямъ, такъ какъ солдаты, а въ особенности казаки, очень любять пряную пищу.

Chamomilla vulgaris Ромашка.

Coriandrum sativum. Кишнецъ.

Datura stramonium. Дурманъ водится б. ч. въ садахъ.

Euriangium Sumbul. Сумбулъ употребляется какъ лекарство и служитъ для добыванія душистаго вещества, употребляемаго сартянками какъ духи.

Foeniculum. Укропъ.

Ferula foetidissima v. Assa foetida. Вонючка. Горные киргизы называють его ульянь и отличають отъ Scorodosma foetidum, которая у нихъ называется шаширь или сассырь. Первое растеть на жирной глинистой почвъ, въ горахъ на высотъ оть 4—5000 ф., а вторая—въ солощевато-песчаныхъ степяхъ.

Fraxinus cruis. Цвътоносный ясень (1) растеть въ горахъ. Изъ него можно добывать манну, но этимъ еще никто здъсь не занимался.

Glycyrrhiza sp. Солодковое дерево.

Gossypium herbaceum. Хлопчатникъ.

Gentiana. Горечавка дико растетъ на холмистыхъ мъстахъ.

Hyoseyamus niger. Белена.

Lavandula latifolia. Лавендула. Отличается нѣсколько отъ растенія принятаго нашею фармакопеею, но можеть быть употребляемо съ тою-же пользою. Растеть въ изобиліи по горнымъ долинамъ.

Linum sativum. Ленъ. Собираются съмена для добыванія масла и для принарокь.

⁽¹⁾ Н. Яворскій. Loc. cit. стр. 133. Говорить, что онъ растеть въ занадыму отрогаму Тянь-Шаня.

Malva sp. употребляется б. ч. въ красильномъ производствъ.

Mentha. Мята очень распространена въ долинъ, по исключительно М. aquatica. Въ пъкоторыхъ частяхъ войскъ употребляютъ ее въ квасъ.

Melissa eitrata. Мелисса лимонная растеть въ изобиліи въ горныхъ лиственныхъ лѣсахъ.

Melilotus officinalis. Донникъ.

Papaver somniferum. Макъ разводится въ садахъ и растетъ въ дикомъ состояніи.

Petroselinum. Иструшка.

Punica granatum. Гранатовое дерево. Корка корня дъйствуеть очень хорошо противъ ленточной глисты, Илодъ можетъ служить для приготовленія кислаго питья больнымъ и замънять лимонъ при леченіи цынги.

Rhamnus cathartica. Слабительная крушина растеть въ горныхъ лиственныхъ лъсахъ.

Ricinus communis. Клещевинникъ,--однолътнее растеніе, растетъ дико въ предгорьяхъ и разводится въ садахъ. Съмена вполнъ вызръваютъ и даютъ хорошаго качества масло. Бывшій Маргеланскій городовой врачъ Бунинъ добывалъ касторовое масло, но оно было темнаго цвъта, въроятно, вслъдствіе недостаточной очистки. Дъйствіе масла было вполнъ удовлетворительное. Послъ смерти этого врача (въ 1883 г.), никто не продолжаетъ этимъ заниматься и все количество масла для аптекъ выписывается изъ Россіи.

Rosa. Роза—различныхъ видовъ, разводится въ садахъ и растетъ въ дикомъ состояніи.

Rheum caspium et. Rh. Fedtschenkoi. Послъдній распространенъ на значительныхъ высотахъ, даже возлъ глет-

черовъ и киргизами называется руянъ-чекъ. Корпи обоихъ видовъ, по дъйствію, слабъе китайскаго ревеня.

Rubus idaeus. Малина растетъ въ горахъ въ дикомъ состояніи и разводится въ садахъ.

Salvia. Шалфей растеть въ числъ пъсколькихъ видовъ, но Salvia officinalis, кажется, не встръчается.

Taraxacum, Одуванчикъ.

Thymus serpyllum. Богородская трава.

Trifolim fibrini. Водяной трилистникъ.

Tussilago farfara. Мать-мачиха растетъ обыкновенно по берегамъ арыковъ, въ долинъ.

Valeriana officinalis. Въ Алайскихъ горахъ я видъль растеніе, корень котораго по виду похожъ на валеріяновый, по онъ пахнеть весьма сильно мускусомъ. Киргизы называютъ корень минь-тамыръ и употребляютъ какъ лѣкарство. Растеніе это я видѣлъ не во время цвѣтенія, а потому не въ состояніи былъ опредѣлить ботаническое названіе. При высушиваніи этотъ корень мало по малу терялъ свой запахъ.

Verbascum thapsiforme. Царскій скинетръ.

Viola tricolor. Фіялка. Иванъ да Марья, водится б. ч. въ садахъ.

ГЛАВА VIII.

Фауна Ферганской Области.

Подобно олоръ и фауна Ферганы весьма богата, какъ числомъ породъ, такъ и числомъ представителей. А. Н. Съверцовъ насчитываетъ въ Туркестанской фаунъ до 78 видовъ звърей и 450 видовъ птицъ; они же всъ почти встръчаются и въ здъшней Области. Многія породы имъютъ тождественную форму съ животными системы Гималаевъ, что замъчено было Семеновымъ и и барономъ Остенъ-Сакеномъ и подтверждено Федченко, а потому въ Ферганской фаунъ замъчается тоже явленіе какъ и во флоръ, т. е. совмъстное нахожденіе съверныхъ и южныхъ формъ. Даже на ледиикахъ, на высотъ 12.000 ф., Федченко находилъ животныхъ обитателей европейскихъ ледниковъ—подуры (desoria glacialis).

Въ отдълъ олоры было замъчено, что Н. А. Съверцовъ различаетъ 5 вертикальныхъ поисовъ: степной, культурный, лиственный, хвойный и альпійскихъ травъ (1). Каждому изъ этихъ поисовъ свойственна особенная фауна, при чемъ наиболье богатый—лиственный поисъ, разнообразіе котораго отчасти находится въ зависимости отъ геологическаго строенія почвы, потому что въ связи съ этимъ строеніемъ наблюдается разнообразіе лиственныхъ породъ.

Въ Андижанскомъ уъздъ, по верховьямъ ръчекъ, образующихъ Кара-Дарью и впадающихъ въ нее, легла самая богатая древесная растительность, а также лъса

^{(&#}x27;) Вертикальное и горезонтальное распредёленіе Туркестанскихъ животныхъ. Н. А. Сёверцовт. Москва 1873 г.

изъ фруктовыхъ деревьевъ, всладствіе чего въ тахъ мъстностяхъ водятся во множествъ, какъ млекопитающія животныя, такъ и различныя породы птицъ Многіе виды птицъ негорныхъ здёсь становятся не только совершенно горными, но даже исключительно гивздятся въ горахъ. Это явление отчасти объясняется климатическими и топографическими условіями, но вмість съ тъмъ въ немъ сказываются слъды того различія, кото. рое было между физической географіей Альновъ и Тянь-Шаня въ ледяной періодъ. Экспедиція Сфверцова нашла на Памиръ 112 видовъ разныхъ птицъ, тогда какъ въ Альпахъ на той-же высотъ насчитываютъ ихъ не болъе дюжины.

Не стану перечислять всё тё многочисленные роды и виды Ферганской фауны, такъ какъ размъръ настоящаго очерка и цёль его не допускаеть этого; кромъ того, я не обладаю для этого необходимыми спеціальными свъдъніями. Упомяну только о тъхъ, которые имъють какое либо значение въ бытовомъ, или гигіэническомъ отношеніи какъ туземцевъ, такъ и русскихъ, а равно войскъ здѣсь расположенныхъ.

Изъ дикихъ звърей на первомъ планъ стоитъ мленопитаютигръ, Felistigris, по туз. юлбарсъ, который по своей силь и свирьпости причиняеть иногда много бъдствій кочевникамъ. Опъ водится преимущественно въ горахъ Андижанскаго утзда и заходитъ туда изъ Семиртчья, но въ долину не спускается, или, покрайней мъръ, это случается весьма ръдко. Выше альнійскихъ луговъ, богатыхъ стадами, онъ не подымается никогда въ высокихъ горахъ Азіи (1), а потому и въ Ферганъ онъ исключительно придерживается м'встностей, въ которыхъ водятся

щія живот-

⁽¹⁾ Жизнь животныхъ А. Брэма. Т. I стр. 228.

кабаны, которыми онъ исключительно питается. Онъ нападаеть ипогда и на другихъ дикихъ животныхъ, которыми обилуютъ здъщнія горы, а подчасъ, если голоденъ, подходитъ къ кочевьямъ киргизовъ и уносить барановъ и прочій скотъ изъ ихъ стада. Обыкновенно здѣшній тигръ избѣгаетъ людей, по разъ человѣкъ ему попался на пути, то становится неминуемою жертвою. Замѣчено, что тигръ, поѣвшій человѣческаго мяса, станетъ предпочитать его всѣмъ другимъ и тогда старается нападать на людей при всякомъ удобномъ случаѣ. Подобныхъ тигровъ называютъ людоъдами.

Охота на тигра въ открытомъ мѣстѣ весьма онасная и пужно при этомъ обладать большимъ хладнокровіемъ и мѣткимъ глазомъ. При неудачномъ выстрѣлѣ тигръ мгновенно бросается на охотника и тутъ-же погончитъ съ нимъ, если только не спасетъ его какая-либо случайность. Въ Ферганѣ находятся 2 офицера Т. и Р., которые были въ ланахъ тигра, но, благодаря счастливой случайности, остались въ живыхъ. Залѣзаніе на дерево или на крышу сакли, къ чему прибѣгаютъ иногда киргизы, не предохраняетъ охотника отъ онасности, потому что тигръ дѣлаетъ такіе удивительные прыжки, при чемъ стаскивастъ жертву и растерзаетъ мгновенно.

Не смотря на такую опасность, киргизы иногда ръшаются ловить отставшихъ отъ матерей маленькихъ тигрятъ для продажи, рискуя поплатиться жизнью отъ разъяренной тигрицы, если только она замътитъ подобную кражу.

Менъе рискованной считается охота на тигра изъ засады, для чего первопачально нужно его выслъдить. Замъчено, что онъ не доъвши добычи непремънно возвращается къ ней на то же мъсто въ слъдующую ночь и туть охотники устраивають засаду, въ которой ожидають его прихода. Если засада не можеть считаться вполнѣ неприступной для тигра, то охотникъ тоже подвергается большой онасности, потому что при неудачномъ выстрѣлѣ легко раненный звѣрь непремѣнио бросится на своихъ преслѣдователей.

Киргизы часто ставять капканы и понавшаго въ него тигра убиваютъ, не рискуя своей жизнью. Въ 1889 г. въ Андижанскомъ уъздъ понавшійся въ кръпкій жельзный капканъ одной ланой тигръ старался разгрысть его, при чемъ переломаль себъ зубы, но, конечно, ничего не могъ сдълать и былъ убитъ подоспъвшими туда киргизами.

Мясо тигра не употребляется въ пищу туземцами, но жиръ считается полезнымъ отъ ревматизма. Когтями очень дорожатъ туземцы и носятъ ихъ на себѣ, какъ талисманъ. Шкура идетъ въ продажу, такъ какъ состоятельные употребляютъ ее вмѣсто ковра. Цѣна на нее здѣсь отъ 15 до 25 руб.

Существуетъ мивніе, что кошачья порода весьма живучая и если животное не будетъ убито на повалъ, то непремвнно выздоровветъ. О тиграхъ этого пельзя сказать. Его очень трудно убить на повалъ, для чего необходимо попасть въ мозгъ или сердце, но подстрвленный тигръ почти всегда впоследствіи околеваетъ отъ ранъ, хотя бы не былъ задётъ ни одинъ изъ важныхъ органовъ. Раны делаются злокачественными, появляется сильная лихорадка и онъ погибаетъ.

За тигромъ слѣдуетъ *горный барс* (Felis irbis), по туз. капланъ, который хотя уступаетъ въ величинѣ и силѣ тигра, но тѣмъ не менѣе тоже принадлежитъ

къ лютымъ звърямъ. У Брэма барсъ называется Leopardus Uncia.

Н. А. Съверцовъ видълъ слъды барса въ разныхъ мъстахъ Памира. М. Е. Іоновъ, охотясь на Памиръ, тоже замъчалъ много слъдовъ его, но самаго звъря не встръчалъ. Въ тъхъ мъстностяхъ, кромъ обыкновеннаго барса встръчается еще другой видъ его, который у киргизовъ называется ильбисъ. Онъ отличается отъ барса тъмъ, что у него туловище короче, ноги выше и хвостъ менъе длинный, нежели у барса. Мясо какъ того, такъ и другаго не употребляется въ пищу. Шкура цънится гораздо дешевле тигровой; ее можно купить рублей за пять.

Рысь (Felis lynx), по туз. силяусинь, водится въ горахъ окружающихъ Фергану и преимущественно въ съверныхъ, а также около Иркештана. Особенно онъ распространены къ С. З. отъ Ферганы, въ горахъ Кара-Тау. Рысь держится необитаемыхъ, скалистыхъ, горныхъ мъстностей, въ которыхъ много пещеръ и ущелій, заросшихъ лъсами и высокой травой, гдъ имъ удобно скрываться отъ охотниковъ. Неръдко онъ избираютъ себъ помъщеніями лисьи и барсучьи норы. На Памиръ тоже водятся рыси, о чемъ упоминаетъ Гордонъ.

Рысь наносить много вреда животнымъ, составляющимъ предметъ нашей охоты. Благодаря своей силѣ, она можетъ справиться не только съ мелкою, но и со всякою красною дичью тѣмъ болѣе, что она прыгаетъ на добычу сверху, неожиданно, вслѣдствіе чего нельзя предвидѣть нападенія и избѣжать его. Убивши большаго звѣря, рысь ѣстъ относительно мало, фунта 3—4, а остатки достаются въ добычу лисицамъ, волкамъ и хищнымъ птицамъ. На домашнихъ животныхъ рысь напа-

даетъ весьма ръдко, въроятно изъ боязни людей, оберегающихъ стада.

Здъшняя рысь бываеть длиною $1^3/_4$ аршина. Шкура цънится около 5-ти рублей и покупается охотно, потому что мъхъ считается очень теплымъ.

Барсукъ (Meles taxus), по туз. кашкулакъ, живетъ одиноко въ норахъ, выкапываемыхъ своими кръпкими когтями, на солнечной сторонъ лъсистыхъ склоновъ горъ. Эти норы устраиваются имъ весьма искусно; въ нихъ просторно, опрятно и даже продъланы отдушины. Онъбезвредное животное для кочевниковъ, такъ какъ вовсе не нападаеть на ихъ стада. Питается разными кореньями, растеніями, ягодами, отрываеть гивзда шмедей и ост, чтобы полакомиться сотами; но не брезгаетъ зайцами, мышами, ящерицами, змъями и т. п., чъмъ приносить извъстную пользу, уничтожая большое число этихъ вредныхъ животныхъ. Что-же касается до разныхъ фруктовъ, которые онъ повдаетъ охотно, то въ этомъ отношеніи не можеть произойти никакого ущерба, вслідствіе обилія дикорастущихъ плодовыхъ деревьевъ; при этомъ онъ не умъстъ лазить на деревья, а подбираетъ только плоды упавшіе на землю.

Мясо барсука туземцы не употребляють въ нищу, хотя оно довольно вкусное. Шкуру продають для обивки сундуковъ и тому подобныхъ вещей, а шерсть на щетки и кисточки. Сало употребляется туземцами какълъкарство.

Меденов (Ursus arctos), по Сѣверцову Ursus leuconyx, по туз. аюкъ, или аю. Онъ небольшаго роста, какъ наши муравейники, съ весьма пушистымъ, но негустымъ и худоцвътнымъ мѣхомъ. Питается мелкими звѣрями, которыхъ удастся поймать при своей неповоротливости, но въ боль-

шей части онъ разрываетъ норки сурковъ, когда они погружаются въ зимнюю спячку, выкапываетъ ихъ изъ норъ и убиваеть, перегрызая имь затылокь. Въ это время онъ до сыта набдается, а излишне убитыхъ забрасываетъ вырытой землей для запаса, къ которому при голодъ возвращается. Самъ онъ хотя и засыпаеть зимою, но не на все время, и чуть только становится потеплъе встаетъ и вылъзаеть изъ берлоги, чтобы поъсть и напиться. Лътомъ онъ не нуждается въ животной пище и питается яблоками, грушами, урюкомъ, оръхами, фисташками и разными ягодами. Иногда пытается полакомиться дикими поросятами, но это рѣдко ему удается, такъ какъ кабаны не допускають къ себѣ этого гостя, а со стадомъ разъяренныхъ свиней ему не сладить. Если поймаеть отставшаго поросенка, то удираеть съ нимъ на дерево, какъ самое безопасное мъсто отъ кабановъ, но при этомъ иногда ему приходится выдержать настоящую осаду, потому что стадо кабановъ окружаеть дерево и не даеть бъдному мишкъ сойти. Весьма ръдкій случай, что онъ тронеть скотину изъ киргизскихъ стадъ, развъ ужъ очень голоденъ.

На Памиръ водится много медвъдей особой породы, очень мелкихъ, но тъмъ не менъе кровожадныхъ, питающихся исключительно сурками. Они очень трусливы, избъгаютъ охотниковъ, но киргизы ихъ выслъживаютъ и убиваютъ не только изъ ружья, но даже дубинами.

Медвъжья шкура у туземцевъ считается почетнымъ подаркомъ, а потому охотники ръдко ее продаютъ Цъпа на нее отъ 7 до 10 руб. Туземцы не ъдятъ медвъжатины, но сало употребляется какъ лъкарство.

Волж (Canis lupus), по туз. бури, ведится во множествъ, а въ неприступныхъ горныхъ ущельяхъ неръд-

ко ветрѣчается и красный горный волкъ, (Canis alpinus), который по своему длинному хвосту и низкимъ ногамъ похожъ на громадную лисицу. Онъ—ночной звѣрь и такъ остороженъ, что почти никогда не попадается, хотя постоянно слѣдитъ за кочевками киргизовъ въ горахъ и при всякомъ удобномъ случаѣ выхватитъ кого нибудь изъ его стада. Но этимъ онъ пользуется только въ крайности, большею-же частью волки слѣдуютъ за стадами архаровъ и дикихъ козъ, при чемъ не упускаютъ случая поживиться этою дичью. За неимѣніемъ крупной дичи и домашняго скота, онъ не брезгаетъ и маленькими позвоночными животными, какъ-то: мышами, птичками и т. п.

Простой волкъ, усердно преслъдуемый киргизами, здъсь осторожнъе, чъмъ въ Россіи и ръже попадается охотнику, нежели неповоротливый медвъдь. Киргизы ловятъ маленькихъ волчатъ и продаютъ за безцънокъ.

Тисица (Canis vulpes и Canis melanotis), по туз. тульки. Здёшнія лисицы, кажется, принадлежать къ тому виду, который Брэмомъ называется vulpes Corsac. Не смотря на то, что мёхъ здёшнихъ лисицъ не высокаго достоинства, тёмъ не менёе киргизы и другіе охотятся на нихъ, хотя это сопряжено съ большими затрудненіями. Она въ силу своей хитрости, ловкости и удивительнаго присутствія духа, часто ускользаеть отъ преслъдованій.

Для охоты употребляются всевозможныя средства. Кромъ западней и силковъ, которые разставляютъ при входъ въ норы, на нее еще охотятся съ собаками, прирученными беркутами и соколами. Отъ этихъ пернатыхъ хищниковъ бъдная лиса уже никакими средствами не можетъ спастись.

Во время опасности иногда лисица обнаруживаетъ невъроятное мужество. Мнъ приходилось льчить киргиза, который гнался за лисицей, но та спряталась въ нервую попавшуюся нору. Послъдняя, въроятно, была неглубокая, такъ что наружу осталась часть хвоста, за которую киргизъ ухватился и сталъ тащить ее изъ норы, а она въ свою очередь сопротивлялась до такой степени, что здоровенный киргизъ употребилъ всю свою силу и оборвалъ хвостъ, почти у самаго основанія. Въ одно мгновеніе разсвиръпъвшая лиса бросилась на киргиза, изцарапала и искусала ему лицо и руки и убъжала безъ хвоста. Въ этотъ же день онъ пришелъ ко мнъ весь израненный и принесъ только трофей, т. е. прекрасный пушистый хвостъ. Впрочемъ раны были не опасны и онъ скоро выздоровълъ.

На Алаб и Памиръ водятся въ незначительномъ количествъ чернобурыя, или, правильнъе назвать, съробурыя и красныя лисицы; послъднія впрочемъ встръчаются весьма ръдко. Шкура обыкновенной лисицы продается здъсь отъ 80 к. до рубля, а чернобурой—не менъе 3 руб.

Киргизы часто ловять маленькихъ лисичекъ, но, не смотря на всъ старанія, неудавалось сдълать ихъ ручными; какъ только выростуть,—такъ и убъгаютъ на волю.

Куница, (Mustela martes), по туз. сумсаръ. Здъсь водятся 3 вида: Martes abietum, Martes foina и Martes intermedia; послъдняя—средняя между куницей и соболемъ. Онъ живутъ въ лъсистыхъ горныхъ мъстностяхъ Ферганы, но не въ большомъ количествъ. Питаются птица-

ми и мелкими животными, а также ѣдятъ охотно груши, вишни, сливы и другіе фрукты, которыми обилуютъ лѣса Андижанскаго уѣзда. Охотятся за ними ради мѣха, который продаютъ на городскихъ базарахъ, а оттуда вывозятся въ Россію. Шкурки куницы продаются здѣсь по 3 руб. 60 к. за штуку.

Хорекъ, (Foetorius putorius), по киргизски сасыкъкузенъ, водится въ здъшнихъ горахъ, но часто заходитъ въ дворы жилищъ, забирается въ курятники и
голубятни, гдъ производитъ опустошенія между этими
пернатыми. Если-же не можетъ достать этихъ птицъ,
то ъстъ мышей, крысъ, лягушекъ и змъй. Его охотно
убиваютъ какъ врага домашнихъ птицъ, а въ тоже время
и ради мъха Но такъ какъ онъ всегда прячется и его
по этому трудно застрълить, то употребляютъ капканы,
ловушки, западни и т. п. Мясо его никуда не годится,—
даже собаки не ъдятъ.

Еще водится алтайскій хорекъ (Foetorius alpinus), похожій на горностая, но крупнъе и длиннъе хвостъ. Живетъ между камнями большихъ обваловъ.

Торностай, (Mustela erminea). За ними охотятся ради шкурокъ, но эти маленькія животныя съ мужествомъ защищаются и бросаются на преслъдователей, кусаясь и царапаясь. Киргизы ловять ихъ въ ловушки, потому что стръляя дробью испортится вся шкурка. Горностаи преслъдуютъ и ъдятъ всъхъ мелкихъ млекопитающихъ и птицъ.

Выдра, (Lutra vulgaris), по туз. кундузъ, держится возят ръкъ и живетъ въ подземныхъ ходахъ, устраиваемыхъ самой сообразно своимъ нравамъ и вкусамъ. Питается рыбой, при чемъ очень искусно ее ловитъ. За недостаткомъ въ рыбъ, она питается лягушками, во-

дяными крысами, а также ловить плавающихъ утокъ, гусей и т. п. Ловять ее большею частью канканомъ, такъ какъ она весьма осторожная и не попадается охотнику на глаза; между тъмъ добыть выдру считается прибыльнымъ дъломъ, потому что мъхъ ея цънится богатыми сартянками, которыя оторачиваютъ имъ свои шубки. Мясо выдры не употребляется въ пищу.

Здъсь водятся и зайщы, по туз. куянъ, но это мелкая порода, Lepus talai, похожъ на L. Lehmanni, Sev. только уши немного короче, а хвостъ немного длиннъе. Туземцы зайцевъ не ъдятъ, какъ и большинство Русскихъ.

Всв поименованные звври доставляють обильный и разнообразный зввриный промысель. Охотятся то ради пріобратенія шкурь, то ради удальства и страсти, потому что охота на тигра, барса и т. п. представляєть собою много опасностей.

Русскіе и туземцы держать множество собакъ (canis familiaris), по туз. итъ, но породистыхъ и хорошихъ охотничьихъ весьма немного. Изъ мъстныхъ охотничьихъ особенно славится разновидность борзой—тазы.

Здъсь водятся еще сурки, (Arctomys baibacina) (1), тушканчи, (Dipodes), ежи, (erinaceus sp.), дикобразы, (Hytrix sp.), крысы, (Mus decumans), мыши, (Mus musculus, agrarius et sylvaticus), летучія мыши (vespertilio sp.) и множество другихъ.

Дикихъ кошекъ въ Ферганъ не много, онъ встръчаются иногда около Гульчи, но одичавшихъ домашнихъ кошекъ весьма значительное количество. Онъ истребляютъ массу птицъ, а въ особенности голубей и гор-

⁽¹) По Сѣверцову Ar. caudatus.

лицъ. Бывали случаи бъщенства кошекъ и онъ бросались на людей.

Мышей громадное количество какъ въ домахъ, такъ и поляхъ. Иногда ихъ распложается, или онъ откуда нибудь приходять, въ такомъ огромномъ количествъ, что причиняютъ значительный ущербъ земледъльцамъ. Въ 1879 и 1881 г. мыши громадными массами появились въ Наманганскомъ и Андижанскомъ убздахъ, опустошили поля, переплыли Сыръ-Дарью и удалились на съверъ. Много ихъ потонуло при переправъ черезъ быструю ріку, но громадныя массы прошли дальше; а между тъмъ не слышно было, чтобы онъ показались потомъ гдв нибудь въ такомъ значительномъ количествъ, чего слъдовало ожидать, если бы онъ продолжали плодиться. Я въ то время еще не былъ въ Ферганъ и не могу съ достовърностью сказать, точно-ли это были мыши изъ рода mus, или онв принадлежали къ породв обыкновенныхъ полёвокъ (arvicola arvalis), или другой видъ. На основаніи описанія жизни животныхъ А. Брэма, можно скорве заключить, что онв принадлежали къ роду полёвокъ. Н. А. Сѣверцовъ (1) въ 1887 и 1888 г. по всему Алаю и Памиру встръчалъ милліарды полёвокъ, особенно на Алав, гдв цвлыя квадратныя версты изрыты норами по 5-6 на квадр. сажень. Быть можеть, это онъ и переселялись на съверъ, но подобное переселеніе принесло громадный убытокъ населенію. Изъ въдомости о количествъ посъвовъ, истребленныхъ полевыми мышами, саранчей и поврежденныхъ вътромъ въ 1881 г., представленной Начальникомъ Андижанскаго увзда, видно, что вследствие названныхъ причинъ погибли урожаи 85.863 танаповъ, слъдовательно на сумму

⁽¹⁾ Замѣтки о фаунѣ позвоночныхъ Памира.

около 547 т. руб. Благодаря этой вѣдомости, мы имѣемъ понятіе о настоящемъ положеніи вопроса, о вредныхъ сельско-хозяйственныхъ животныхъ хотя по одному уѣзду.

Дикіе звъри, мясо которыхъ употребляется въ пищу, весьма распространены въ горахъ, окружающихъ Ферганскую долину, и они представляютъ собою неистощимый матеріалъ для охотниковъ.

Кабаны, (Sus scrofa aper), по туз. донгузъ, чучка,—водятся въ громадномъ количествъ какъ въ болотахъ долины поросшихъ камышемъ, такъ и въ гористыхъ мъстахъ, достигая иногда высоты 11.000 ф. п. у. м.

Туземцы въ силу предписанія корана не употребляють свинины, считая это мясо поганымъ, а потому кабаны плодились безпрепятственно, опустощая поля земледъльцевъ. Съ приходомъ сюда русскихъ, за кабанами часто охотятся и убивають ихъ въ громадномъ количествъ, чему содъйствуютъ и туземцы, радуясь избіенію ненавистныхъ имъ животныхъ. Киргизы при этомъ нередко ловятъ поросять живьемъ и продають русскимъ. Большіе съкачи, живущіе особнякомъ, достигаютъ громадныхъ размёровъ и бываютъ иногда вёсомъ въ 12-14 пуд., но охота на него не всегда бываетъ безопасной. Не говоря о томъ, что онъ всегда уничтожить нъсколько собакъ, но неръдко перекалъчить лошадь и поранить охотника. Вследствіе этого на подобныхъ охотахъ требуется храбрость и ловкость, а главное-мъткій глазъ, чтобы не дать промаха. Въ этомъ отношеніи болъе опасной представляется охота въ камышахъ; такъ какъ кабанъ можетъ выскочить изъ подъ ногъ лошади и охотникъ не успъетъ сдълать еще выстръла. какъ кабанъ уже поранитъ лошадь, а то и охотника. Изъ баталіоновъ, расположенныхъ въ Ферганъ, часто отправляются охотничьи команды подъ руководствомъ опытнаго охотника и неръдко привозять кабановъ штукъ по 20-ти, которые идутъ въ пользу той части, изъ которой находились на охотъ люди.

Средне-азіатскій кабанъ во всякомъ случав болье смирнаго нрава, нежели европейскій и онъ похожъ на домашнюю свинью. Пробуютъ приручать кабаньихъ поросять и выводить изъ нихъ домашнюю породу, но это пока единичные опыты. Ручные кабаны легко плодятся въ неволь, если ихъ держать не въ тьеномъ стойль, а въ загороди; но и родившееся отъ нихъ покольніе легко дичаеть, если ихъ выпускать также свободно, какъ домашнихъ свиней.

Въ киргизскихъ степяхъ, гдѣ много озеръ, охота на кабановъ своєобразная. Какъ только замерзнуть озера, киргизы стараются загнать стадо кабановъ на ледъ и тогда они становятся безпомощными, не могутъ сдѣлать и шага по скользкому льду, такъ что киргизы убиваютъ ихъ суюлами, т. е. толстыми дубинками и топорами.

Мясо старыхъ кабановъ, въ особенности съкача, жесткое, также какъ и сало, а потому оно по достоинству гораздо ниже домашней свинины. Молодыя животныя и поросята также вкусны, какъ и домашнія свиньи. Туземцы употребляютъ кабанью жёлчь какъ лѣкарство и очень цѣнятъ ее. Употребляется безразлично какъ отъ самцовъ, такъ и отъ самокъ. Кабаньи клыки носятъ какъ талисманъ. Щетина па базарахъ продается по 60 к. за фунтъ.

Домашнихъ свиней до прихода русскихъ здѣсь совсѣмъ не было и въ первое время поросенокъ считался

большою рѣдкостью; въ настоящее время ихъ развели въ достаточномъ количествъ.

На Памиръ и въ горахъ Андижанскаго уъзда водятся Aprаpы (Ovis Karelini) и Ravapы (Ovis Polii). Оба вида Брэмъ причисляетъ къ Caprovis Argali; здъщніе же киргизы различають между ними до 12-ти разновидностей. Названіе архаръ киргизы присвоили только самкъ, а самца называютъ кульджа. Длина качкара безъ хвоста около $6^{1/2}$ Ф., вышина въ плечахъ около 4 Ф, рога по сгибу доходятъ до 5 Ф. Прежде ихъ было очень много, но эпизоотія на Памиръ 1869 г. почти совсѣмъ истребила расу Ovis Polii; кромѣ того ихъ истребляютъ въ значительномъ количествѣ волки и другія хищныя животныя.

На верховьяхь Суякъ и Учъ-Ташъ-обиліе травы, а потому тамъ водится много дикихъ козъ и аркаровъ, которые большими стадами, до 200 штукъ и болве, встрвчаются нередко. На разсказу туземцевь, аркаровь тамъ сильно преследуютъ волки, которые для этого собираются большими стаями, окружають стадо аркаровъ и гонять ихъ по горамъ къ заранве намвленному пункту, въ которомъ спускъ оканчивается крутымъ обрывомъ. Подогнанное стадо аркаровъ, не видя другаго исхода для спасенія, бросается съ кручи внизъ, при чемъ порапенные или пришибленные аркары дёлаются добычею волковъ. Много ихъ погибаетъ въ междоусобной войнъ. Время случки сопровождается сильными драками между самцами; сильнъйшій безпощадно сталкиваеть слабыйшаго въ пропасть, если тоть не рышится искать спасенья въ бъгствъ. Время течки въ половинъ октября.

Страшная кругизна горъ, на которыхъ водятся ар-

кары и качкары, сильно ватрудняетъ охоту ва ними, вслъдствіе чего они пе напуганы, а потому подпускають съ подвътренной стороны па ружейный выстръль; кромъ того, послъ перваго выстръла ипогда на нихъ находитъ наника и тогда можно подойти довольно близко. Послъ втораго или третьяго выстръла они опомнятся и тогда пускаются бъжать. Если онъ бъжитъ отъ охотника, тогда не представляется возможности преслъдовать его, потому что онъ мчится съ удивительною довкостью по опаснъйшимъ карнизамъ, съ легкостью перепрыгиваетъ черезъ пропасти, а въ случав надобности быстро взбирается по такимъ крутизнамъ, по которымъ не въ состояніи взобраться даже привычный горецъ.

Мясо молодыхъ животныхъ очень вкусное, составляющее что-то среднее между бараниной и олениной; старыхъ-же— оно съ противнымъ мускуснымъ запахомъ.

Изъ мъха дълаютъ теплыя зимнія одежды и одъяла. Рога идутъ на выдълку ковшей, ложекъ и т. п. вещей.

Марко-Поло упоминаетъ объ этихъ животныхъ и говоритъ, что въ то время (¹) ихъ водилось такое множество, что киргизы убивая ихъ привозили не только громадныя кучи роговъ въ видъ трофеевъ, но даже дълали изъ нихъ ограду вокругъ лагеря.

Замѣчательная крѣпость и упругость роговъ у аркаровъ. Если пуля попадаетъ въ рога, то она или отскакиваетъ, или сплющивается, при чемъ если ударъбылъ боковой, то животное падаетъ, какъ мертвое, но скоро оправляется и бѣжитъ. Ударъ пули въ рогъ, повицимому, только оглушаетъ, производя сотрясение мозга.

^{(1) 1272—1275} г. по Р. Х.

Удары въ лобную сторону роговъ переносятся ими легко, потому что при ударъ спереди сотрясение головы тотчасъ передается всему тълу, велъдствие этого между самцами бываютъ такия жестокия драки, что рога обламываются, но сами они остаются невредимыми.

Маралъ, (Cervus maral), или южно-сибирскій олень, который по Съверцову (1) гораздо ближе подходить къ американскому Cervus canadensis, нежели къ европейскому сег. elaphus. У здъшнихъ киргизовъ самка называется маралъ, а самецъ—бугу. Маралъ тоже громадный звърь, ростомъ бываетъ съ порядочную лошадь, т. е. до 5 ф. вышины въ плечахъ. Огромные вътвистые рога имъютъ много отростковъ. Злъйшие враги ихъ—волки и рыси, но и киргизы охотятся за пими ради роговъ. Молодые еще мягкіе рога очень высоко цънятся китайцами какъ цълебпое средство, въ особенности при ослабленіи половой дъятельности, а потому они платятъ здъсь за пару роговъ 230 руб. Изъ старыхъ роговъ дълають украшенія для съделъ.

Мясо старыхъ самцовъ не вкусное, въ особенности во время течки, которая бываеть какъ у аркаровъ въ половинъ октября.

Мъхъ марала не употребляется, но шкура очень цънится туземцами, такъ какъ изъ нее выдълывается прекрасная замша.

Дикая коза, козуля, (cervus pygargus, cervus capreolus), по туз. иликъ,—водятся въ многочисленномъ количествъ. За ними охотятся какъ русскіе, такъ и туземцы, устраивая иногда охоту съ травлею. Боязливое животное прячется, чрезвычайно ръдко защищается своими рогами и никогда не нападаетъ на человъка. Кромъ

⁽¹⁾ Путешествія по Туркестанскому краю, Н. А. Сіверцова, стр. 128.

человька козулей преслъдують рыси и волки, а также лисицы и хищныя птицы. Первые нападають на большихь и маленькихь, а послъднія—только на дътенышей.

Козуля доставляеть охотнику вкусное мясо, шкуру и рога. Пойманныя маленькими опъ скоро ручнъють, но почему то большею частью погибають, чему я видъль нъсколько примъровъ.

Тэкъ (Capra sibirica), по туз. кінки, водится въ горахъ и умъеть себъ найти кормъ на вершинахъ, гдъ другія крупныя животныя были-бы не въ силауь прожить. Ихъ очень много на Памиръ и другихъ гориетыхъ мъстностяхъ Ферганы; но равнинъ онъ вообще избъгаютъ. Онъ очень сильны и выносливы. Охота за ними сопряжена съ большими затрудненіями, такъ какъ близко не подпускають, а перескакивають со скалы на скалу надъ пропастями. Огромные рога тэковъ, также какъ и аркаровъ, полезны имъ какъ для дракъ, такъ и для прыганья внизъ. Разсказываютъ, что эти звъри, прыгая сверху на какой нибудь уступъ скалы, ударяются объ него рогами, а потомъ уже ставятъ переднія ноги, чтобы ихъ не сломать. Молодыя животныя составляють очень вкусную дичь; старые же самцы съ такимъ же вонючимъ мясомъ, какъ и домашній козель.

Сайга, (Cervicapra Saiga), — тоже водится въ Ферганъ, но не въ такомъ значительномъ количествъ какъ въ смежныхъ степяхъ, въ которыхъ онъ встръчаются громадными стадами. Онъ очень осторожны и трусливы, такъ что на открытой мъстности не подпускаютъ на ружейный выстрълъ, но за то киргизы, спрятавшись за какой либо кустъ или камень, мимо котораго онъ должны проходить, убиваютъ палкою или камнемъ. Онъ очень нъжны и по этому достаточно самаго легкаго ра-

ненія, чтобы убить или, покрайней мірь, воспренятствовать біжать дальше. Я виділь, какъ пойманная сайга и привезенная въ городъ поскользнулась на полу въ комнать, при чемъ упала и сломала ногу. Не смотря на то, что переломъ былъ простой и наложена была соотвітствующая повязка ветеринарнымъ врачемъ, она все таки черезъ нісколько дней околіла. Въ этомъ случать достойна вниманія сила привычки. Сайга, которая бівгала по скаламъ и кручамъ, перепрыгивая пропасти и другія препятствія, поскользнулась на ровномъ деревянномъ полу и сломала ногу.

Мясо сайги очень вкусное; киргизы въ особенности любять ся морду, которая весьма нѣжная, напоминающая вкусомь телячьи ножки. При этомъ замѣчу, что мясо козули, тэка и сайги нужно, прежде чѣмъ жарить, сначала вымочить въ уксусѣ, тогда оно представляетъ собою гастрономическое кушанье; въ обыкновенномъ-же видѣ оно довольно жесткое и понахиваетъ козломъ.

Другихъ млекопитающихъ дикихъ животныхъ заслуживающихъ вниманія, сколько мнѣ извѣстно, не встрѣчается.

Птицы.

Одна изъ громаднъйшихъ хищныхъ птицъ вдъшнихъ горъ—это бородачъ или ягнятникъ (Gypaëtos barbatus), бълобрюхій, съ ярко-оранжевою грудью. Ростъ самца около 4 ф. длины и 9¹/4 ф. въ размахъ крыльевъ; самка значительно больше. Онъ нанадаетъ на овецъ, дикихъ козъ, оленей и другихъ животныхъ, а подчасъ бываетъ опаснымъ для одинокаго, невооруженнаго путника. Застигнувъ его на карнизъ, идущемъ падъ пронастью, онъ старается столкнуть человъка въ послъднюю, при чемъ трупъ становится добычею хищника. Сидячій бородачъ очень остороженъ, но на лету онъ

смъть и пролетаеть иногда въ 50 шагахъ; но можетъ быть убитымъ только пулею, потому что дробь на нихъ не дъйствительна. Она не пробиваетъ плотныхъ перъевъ и густого пуха.

Rymaii (Gyps nivicola)—тоже огромная хищная птица; водитея на Памир'в и въ съверныхъ горахъ Ферганы. Длина отъ конца клюва до конца хвоста 4,7 Φ .; размахъ крыльевъ $10^{1}/_{2}$ Φ . (Съверцовъ).

Терный грифъ (Vultur cinereus) немногимъ меньше кумая, съ четырех-аршиннымъ размахомъ крыльевъ и длиною отъ клюва до конца хвоста 4 фута и 3 дюйма.

Бородачи, кумаи и грифы ненавистны охотникамъ за крупнымъ звъремъ, такъ какъ они, помимо того что сами уничтожають много этой дичи, еще слъдять за охотниками, чтобы попользоваться убитымъ звъремъ. Охотникъ, убивши аркара, марала и т. п., не въ состояніи его унести на плечахъ, а потому оставляеть въ укромномъ мъстъ, чтобы прійти за нимъ съ лошадью или верблюдомъ; но не тутъ то было, -- эти хищники сейчасъ воспользуются отсутствіемъ охотника и покончать съ добычею. Поэтому опытные охотники стараются скрыть убитаго звіря подъ хворостомъ, ельникомъ и т. п., чтобы грифы не видёли, куда онъ его прячеть, тогда чутьемъ опи не могуть найти. Но если только они замътили, гдъ прикрыта добыча, тогда немедленно налетають на кучу хвороста, разворачивають его и уничтожають убитаго звъря. Иногда же имъ указывають спрятанную дичь сороки своимъ крикомъ, которыя тоже непримътно выематривають, куда охотникъ прячеть добычу, а грифы и бородачи внимательны въ этихъ случаяхъ къ сорочьему щекотанью.

Вообще гричы и бородачи нападають на большихъ

млекопитающихъ животныхъ въ случав крайности, т. е. очень голодныя, если же встрътятъ падаль, то вполив довольствуются этой пищей.

Маъ прочихъ хищныхъ птицъ болѣе или менѣе замѣчательныхъ встрѣчаются: могильникъ (Aquila imperialis), орелъ—карликъ (Aquila pennata), беркутъ (Aquila fulva), (печенку его туземцы употребляютъ какъ лѣкарство противъ собачьяго бѣшенства у людей) стервятникъ (Neophron perenopterus), соколъ (Falco peregrinus), сова (Strix flammea), ястребная сова (Surnia nisoria), ястребъ (Astur

palumbarius), коршунъ (Milvus ater).

Много еще встръчается видовъ, но всъ эти птицы не приносять намъ непосредственной пользы, такъ какъ мясо ихъ не употребляется въ пищу, а перья тоже не идутъ въ дъло. Кромъ того онъ убиваютъ множество млекопитающихъ животныхъ и птицъ, которыми человъкъ могъ-бы воспользоваться для своего стола. Но нельзя отказать этимъ хищникамъ и въ извъстной пользъ, доставляемой человъку косвеннымъ путемъ. Они освобождають насъ отъ массы вредныхъ грызуновъ и насъкомыхъ, вредящихъ землъдельцамъ и садоводамъ; они поъдаютъ до чиста падаль, которая валялась бы и разлагалась по дорогамъ и кругомъ селеній, потому что тувемцы еще не прониклись убъждениемъ относительно вреда, приносимаго гніеніємъ животныхъ остатковъ вблизи ихъ жилищъ.

Тоже самое можно сказать о вороновомъ семействъ. Едва-ли существуетъ какая либо другая птица, которую можно было-бы назвать всеядною, въ полномъ значеніи этого слова, какъ нашъ воронъ (Corax nobilis), по туз. пунгъ-карга. Онъ ъстъ плоды, зерна и вмъстъ съ тъмъ объявляетъ войну не только червямъ и малень-

кимъ позвоночнымъ животнымъ, но смъто нападаетъ, какъ на млекопитающихъ животныхъ, такъ и на птицъ превоеходящихъ его самаго величиною. Вмъстъ съ тъмъ воронъ не пропуститъ ни одной падали, потому что онъ ежедневно облетаетъ большое пространство, въ различныхъ направленіяхъ, что-бы отыскать себъ пищу.

Каменная ворона (Fregilus graculus) уничтожаетъ кузнечиковъ, сороконожекъ, пауковъ и даже скорпіоновъ. Не подлежить сомнѣнію, что наши вороны (Corvus cornix), по туз. карга, наносять своимъ хищничествомъ довольно значительный вредъ человъку, но тъмъ не менъе, въ силу своего обжорства, онъ уничтожаютъ всякую падаль и разные отбросы во дворахъ, которые, при неряшливости туземцевъ, гнили бы и заражали воздухъ; поэтому польза отъ нихъ несравненно выше причиняемаго вреда. Везъ нихъ сильно расплодились-бы мыши и членистыя животныя, которыхъ онв побдають въ громадномъ количествъ. Еще полезиће въ этомъ отношения грачи (corvus frugilegus), по туз. нузгунъ, которые успъшно уничтожаютъ майскихъ жуковъ, личинокъ, полевыхъ жуковъ и несметное количество разныхъ другихъ вредныхъ насъкомыхъ, а также охотятся за полевыми мышами.

Галки (Monedula furrium), по туз. захча, тоже уничтожають всякаго рода насъкомыхъ, улитокъ и червей, которыхъ собирають на поляхъ, лугахъ и даже со спины крупнаго скота. На улицахъ и во дворахъ разрывають кучи навоза и мусора, добывая различныя съъдобныя вещества.

Сороки (Pica caudata), по туз. ала-хака, хотя тоже питаются червями и прочими насъкомыми, по весною онъ причиняютъ больше вреда, уничтожая гиъзда итицъ, которыя слабъе ихъ. Скворим (Sturni), по туз. кара-падачи, настоящаго вреда никогда не наносять, такъ какъ пища ихъ состоить преимущественно изъ насъкомыхъ, червей и улитокъ, а потому многіе устраивають скворещницы возлѣ домовъ, чтобы они уничтожали этихъ насѣкомыхъ вблязи жилищъ и въ садахъ. Весьма полезны въ здѣшнемъ краѣ розовые скворим (Pastor roseus), по туз. сачъ. Они преслѣдуютъ саранчу на всѣхъ ступсияхъ ее развитія,—отъ яйца до совершеннаго состоянія, и убиваютъ въ громадномъ количествѣ, гораздо больше того, сколько могутъ съѣсть. Кромѣ того, скворцы доставляютъ нѣкоторую пользу стадамъ рогатаго скота, собирая у нихъ со спины разныхъ паразитовъ. Ипогда они бываютъ вредными, вслѣдствіе значительнаго опустошенія рисовыхъ полей.

Нельзя при этомъ не упомянуть о воробьяжа (Passer domesticus), по туз. чимчикъ, этихъ ненавистникахъ здёшнихъ земледёльцевъ. Большая честь людей привыкла смотръть на воробья, какъ на чрезвычайно вредную птицу и, для избъжанія расхищенія ими пшеницы на поляхъ, туземцы ставятъ пугала, которыхъ они, вирочемъ, не особенно боятся. Поэтому на поляхъ, далеко отстоящихъ отъ кишлаковъ, стараются засъвать тотъ сортъ пшеницы, который имбетъ большую ость. Джугара спеціально охраняется стариками и ребятами, крикъ которыхъ постоянно слышится при провздв по культурнымъ оазисамъ. Однако нътъ сомнънія, что воробы, уничтожениемъ громаднаго количества вредныхъ насъкомыхъ и гусеницъ, приносятъ немаловажную польву тъмъ-же земледъльцамъ. Въ течении цълаго лъта они способствують этимъ процвътанию садовыхъ деревьевъ и полей, такъ что польза, которую они приносять, пожалуй, перевъщиваетъ наносимый вредъ.

Мясо воробьевъ можетъ употребляться въ пищу, но туземцы ими пренебрегаютъ какъ обыкновенной пищей, а употребляютъ исключительно какъ лъкарство. По ихъ мивнію, жаренные воробьи полезны для возстановленія или укрвпленія силъ при половыхъ сношеніяхъ.

Много интереса въ гигіэническомъ и бытовомъ отношеніи представило-бы подробное изученіе образа жизни и привычекъ всего пернатаго царства, населяющаго и прилетающаго въ здѣшнюю страну, при чемъ, черезъ сопоставленіе и взвѣшиваніе различныхъ фактовъ, можно было бы вывести заключеніе о вредѣ или пользѣ, приносимыхъ человѣку каждымъ видомъ въ отдѣльности. Но, при такомъ несмѣтномъ количествѣ разныхъ представителей этого царства, подобный трудъ—непосильный для врача, необладающаго необходимыми познаніями и неимѣющему на столько свободнаго времени въ своемъ распоряженіи, чтобы заняться добросовѣстно этимъ предметомъ, а потому этотъ вопросъ еще долго будетъ открытымъ въ ожиданіи спеціалиста, который займется имъ и вырѣшить на основаніи точныхъ наблюденій.

Дикихъ птицъ, употребляемыхъ въ пищу, весьма много въ Ферганъ, но сравнительно весьма мало охотниковъ по профессіи. За ними охотятся съ ружьемъ, а также для этой цъли туземцы пріучаютъ беркутовъ, соколовъ и ястребовъ. Послъдній родъ охоты при ханахъ пользовался особымъ почетомъ и былъ достояніемъ людей богатыхъ и придворныхъ. Подобная охота практикуется нъкоторыми и въ настоящее время, представляя собою скоръе развлеченіе, а не необходимость въ пріобрътеніи дичи, потому что послъднюю возможно достать за умъренную плату отъ охотниковъ, промышъляющихъ этимъ дъломъ.

Улларъ — туз. названіе (Megoloperdix Nigellii); это ничто иное, какъ исполинская куропатка, по объему не менъе глухаря, въсомъ около 15 фунтовъ, а по словамъ г. Карелина, ветръчаются экземпляры до 30 фунтовъ. Живеть онъ исключительно на высотахъ 9—11.000 ф., по крутымъ травянистымъ склонамъ, съ зарослями стелящагося можжевельника и всегда на покатостяхъ, обращенныхъ къ Ю., ЮВ. и ЮЗ. Зимою спускаются ниже по бевснъжнымъ, или малоснъжнымъ солнцепекамъ. Кормитея, смотря по времени года, почками, цвъточными и съмянными головками альпійскихъ травъ, насъкомыми; вимою-же—можжевеловыми ягодами.

Мясо уллара бѣлое, нѣжное и превосходнаго вкуса, похожаго на индъйку, вслѣдствіе чего его здѣсь называють горнымъ индюкомъ. Если онъ питается луковицами дикаго чесноку, тогда мясо получаетъ сильный чесночный запахъ. Охота за нимъ нелегка; онъ утомляетъ охотника, бѣгая въ гору по крутымъ склопамъ и постоянно внѣ ружейнаго выстрѣла. Дробью его можно убить только на весьма близкомъ разстояніи, а то нужна пуля.

Въ кишечномъ каналѣ его встрѣчается много паразитовъ, а именно: ленточныхъ глистовъ (Taenia) и

круглыхъ (Heteralis sp.).

Горная куропатка (Perdix saxatilis var. chukar), по туз. кекликъ; русскіе обыкновенно ихъ называютъ рябчиками, но настоящихъ рябчиковъ (bonasia silvestris) здѣсь вовсе пѣтъ. Кеклики тоже водятся въ горахъ, бѣгаютъ по каменнымъ осыпямъ, прячутся между камнями и не охотно взлетаютъ. Отъ охотпиковъ бѣгутъ въ гору и по крутизнамъ ихъ трудно преслъдовать.

Мясо ихъ очень вкусное, но, если онъ питаются луковицами дикаго чесноку, тогда мясо, подобно улларамъ, пріобрътаетъ чесночный запахъ. Если кеклики продолжительное время питаются можжевеловыми ягодами, то мясо ихъ по вкусу становится похожимъ на рябчиковъ.

Сарты любять эту птицу и самцовь держать въ клъткахъ, пріучая къ бою, что доставляеть имъ большое удовольствіе. Каждый разъ, когда на базаръ устраивають подобный бой, толпы сартовь окружають ихъ,

любуясь этимъ зрълищемъ.

Сторая куропатка (Perdix daurica), по туз. чиликъ. Это тоже горная птица, какъ и кекликъ; подпимается до въчныхъ снъговъ, но только по безлъснымъ,
травянистымъ скатамъ. По предгорьямъ онъ спускаются
на поля. Мясо ихъ тоже бълое, чъмъ онъ отличаются отъ
нашей сърой куропатки

Степныя куропатки (Perdis sp.). Ихъ здъсь водится два вида. Одинъ по туз. карабаулъ, а другой, по русски саджа, а по туз. маргакъ. Послъдняя начи-

наетъ переселяться въ Европу.

Дражва (Otis tarda), по туз. туудакъ, —самая большая изъ дикихъ птицъ, употребляемыхъ въ пищу; въсомъ бывасть около 30 фунтовъ. Обыкновенно она степная птица, но въ Ферганъ водится въ горахъ, до высоты 8000 ф. Онъ очень быстро бъгаютъ, хорошо летаютъ и весьма осторожны и подозрительны, вслъдствіе чего ее трудно убить тъмъ болъе, что для этого пужна пуля. Охота за драхвою считается высокимъ удовольствіемъ не только по причинъ величины этой птицы, но и вслъдствіе трудности, съ которою соединена подобная охота. Осенью, когда онъ становятся очень

жирными, вслъдствіе чего менье подвижными, ихъ легче убить. Здъсь иногда за ними охотятся съ беркутами и соколами.

Драхва питается исключительно свменами и зерпами, а въ молодости насвкомыми. Она встъ всв полевые продукты, но въ долину рвдко спускается, изъ предосторожности. Мясо вкусное, если передъ жареніемъ вымочить въ уксусв, въ противномъ случав, старыхъ самцовъ—очень жесткое.

Стренет (Otis tetrax), по туз. тоже туудакъ, гораздо меньше драхвы, но имъетъ много съ нею общаго. У нихъ превосходное мясо, мало уступающее въ достоинствъ фазаньему.

Фазаны (Phasianus mongolicus), по туз. каргаулъ и кызылъ-таукъ, встръчаются какъ въ горахъ, такъ и предгорьяхъ, но въ долину ръдко залетаютъ, совершен по противоположно тому, что наблюдается въ другихъ мъстахъ Туркестанскаго края, въ которыхъ фазаны въ громадномъ количествъ водятся въ степныхъ мъстахъ. Въ Ферганъ больше всего ихъ около Гульчи.

Злъйшіе враги—лисица, куница и хищныя птицы, всяждствіе чего здёсь ихъ пемного. Мясо фазановъ очень вкусное.

Перепелки (Coturnix vulgaris), по туз. бидана, прилетають въ Фергану въ неемѣтномъ количествѣ и для жительства выбирають всего охотнѣе илодоносныя и засѣянныя хлѣбомъ или клеверомъ мѣста въ долинѣ. Сарты ловять ихъ сѣтями, а также маленькими ястребочками и продають за безцѣнокъ. Мясо ихъ вкусное и сарты, которые вообще не охотно ѣдятъ дичь, перенелокъ очень любятъ. Онѣ и живыя пользуются особенною симпатіей со стороны сартовъ, которые ихъ воспи-

тывають, лелеять и носять за пазухой. Держать также въ клъткахъ и пріучають самцовъ къ бою.

Пигалища-Чибесъ, (Vanellus cristalus), по туз. базгильдыкъ, прилетаетъ ранней весной, почти въ одно время съ жаваронкомъ. За ними охотятся не особенно ревностно, потому что мясо не очень вкусное, но туземцы любятъ ихъ яйна, а потому выслъживаютъ гвъзда и подбираютъ ихъ въ громадномъ количествъ.

Пысужа (Fulica atra), по туз. кашкалдакъ. Ихъ любять туземцы и вдять также охотно, какъ и перснелокъ.

Теть рева и глухари здёсь не встрёчаются. Въ болотистыхъ мёстностяхъ, которыхъ довольно много въ долинё, а также по небольшимъ озерамъ, разбросаннымъ какъ въ долинё, такъ и въ горахъ, водятся въ изобиліи дикіе гуси, всевозможные виды утокъ, бекасы, вальдшиенфы, гаршиены, кулики, а также лебеди, бёлыя и сфрыя цапли и много другихъ. Послёднія не употребляются въ нищу. Есть видъ бекасовъ похожихъ на дунелей, но настоящихъ дунелей, кажется, нётъ.

Аистовъ (Ciconia alba), но туз. ляйлякъ, прилетаетъ очень много, а ивкоторые остаются и зимовать. У туземцевъ онъ считается священной птицей и ни одинъ мусульманинъ не тронетъ его. Существуетъ повърье, что тотъ, кто убъетъ аиста, непремѣнно погибнетъ отъ насильственной смерти, или самоубійства.

Весьма обыкновенная здѣсь птица, очень красивая это удодъ (прира). Говорятъ, что мясо ихъ очень жирное и вкусное, но мусульманамъ и послъдователямъ моисеева закона оно запрещено.

Изъ-иввчихъ итицъ первое мъсто занимаетъ соловей (Luscinia philomela), по туз. бюльбюль, который въ майскія ночи услаждаєть слухъ любителей. Онъ питаєтся разнаго рода червями, личинками насъкомыхъ и маленькими гусеницами. Осенью фетъ разныя ягоды. Прилетаєть сюда, кажется, въ апрълъ. При сравненіи пънія здъщняго соловья съ тъми, которые водятся въ южной Россіи, оказывается, что Ферганскій соловей не такъ искусно выдълываеть трели, какъ южно-русскій.

Иволга (Oriolus galbala), по туз. заргальдакъ, тоже принадлежитъ къ числу самыхъ прилежныхъ пѣвцовъ. Она еще приноситъ пользу тѣмъ, что уничтожаетъ множество различныхъ насѣкомыхъ и гусеницъ.

Сорокопутто стерый (Lanius Excubitor). Они охотятся преимущественно за насъкомыми, но кровожадность ихъ на столько велика, что часто нападаютъ и душатъ маленькихъ птичекъ. Поютъ довольно плохо, однакожъ, подслушивая старательно пъсни другихъ птицъ, они иногда перенимаютъ и повторяютъ довольно удачно.

Кромъ этихъ еще водятся дрозды, синицы, щеглы, чижики и множество другихъ, оглашающихъ воздухъ

своимъ пъніемъ на вей лады.

Перелетныя птицы, прилетающія въ Фергану на

льто, слъдующія:

Аисты, ястреба, ласточки, жаворонки, соловьи, чибесы, перепелки, дрозды, розовые скворцы, сорокопуты, иволга, степная куропатка и друг.

Прилетають на зиму: лебеди, гуси, утки, атайки, грачи, бекасы и друг. Вороны и галки на лѣто улетають въ Сибирь, а къ зимѣ возвращаются.

Журавли, кроншнены, гальшнены только пролета-

ють черезъ Фергану.

Изъ домашнихъ птицъ въ настоящее врсит разво-

дятся курицы, гуси, утки и индыйки. До прихода Русскихъ, индыскъ здысь вовсе не было; а потому первое время, къ Пасхъ, за индюка платили по 12 р. Туземцы держали только куръ и въ незначительномъ количествъ гусей. Утокъ они тоже не любятъ, потому что онъ портятъ арыки. Много тоже водится голубей какъ домашнихъ, такъ и дикихъ, по туз. каптаръ, а равно горлицъ, которыхъ здъсь два вида: лъеная, по туз. гурракъ и го-

родская-мучичъ.

Прочитавшему этотъ очеркъ можетъ показаться, что при такомъ изобиліи разнаго рода дичи въ Ферганъ, мы городскіе жители завалены ею и не знаемъ куда ее дъвать, на самомъ-же дълъ мы чувствуемъ въ ней крайній недостатокъ. Причина этому заключается какъ въ недостаткъ охотниковъ, занимающихся исключительно этимъ промысломъ, такъ точно отъ орографическаго положенія и климатических условій здішняго края. Охотятся за дичью большею частью любители, т. е. офицеры и другіе служащіе ради своего удовольствія, а потому убитую дичь употребляють или сами, или раздають своимъ знакомымъ. Крупная дичь и въ особенности красная водится исключительно въ горахъ большею частью мало доступныхъ, такъ что привезти ее лътомъ въ Маргеланъ не представляется никакой возможности велъдствіе того, что она, при высокой температуръ въ долинъ, весьма быстро портится. Даже убитыхъ кабановъ въ камышахъ и болотахъ, расположенныхъ въ долинъ, приходится солить на мъсть, потому что въ однъ сутки мясо уже начинаетъ портиться и становится негоднымъ къ употребленію. Въ виду этого, наши охотники, отправляясь въ горы, убитою дичью продовольствуются какъ сами такъ и вся свита, остатки же бро-

саютъ, или отдаютъ киргизамъ, потому что въ нъкоторыхъ мъстахъ по карнизамъ и узкимъ тропамъ нельзя везти убитаго крупнаго аркара, марала и т. п. Точно также поступають и киргизы. Если кому нибудь изъ нихъ удается убить дикую птицу, или звъря, то они продають тамъ-же болве состоятельнымъ кочевникамъ, а за невозможностью продать събдають сами, такъ какъ изъ опыта имъ извъстно, что въ городъ не успъютъ привезти въ свъжемъ видъ, а протухшую придется выбросить, такъ какъ никто ее не купитъ. Вслъдствіе этого, многіе жители Маргелана, не бывшіе въ горахъ, о многихъ сортахъ дичи знаютъ только по наслышкъ. Въ зимнее время, появляются на базарахъ уллары, горныя куропатки (кеклики) и изръдка фазаны. Цъпа на нихъ въ Н. Маргеланъ слъдующая: уллары отъ 50-60 к. за штуку, кеклики отъ 10-15 к., фазаны отъ 60-75 к.

Рыбы.

Ръка Сыръ-Дарья и ея притоки изобилуютъ рыбой; точно также ее много во всъхъ озерахъ съ пръсной водой; но туземцы занимаются рыболовствомъ мало, неумъло и то исключительно для продажи русскимъ, потому что сами почти никогда не вдять рыбы. Русскіе этимъ промысломъ тоже не занимаются, а если по временамъ вздятъ рыбачить, то большею частью въ видв развлеченія.

Въ водахъ Ферганы преобладаетъ семейство карповыхъ (Cyprinodei), изъ котораго самыми распространенными являются сазаны (Cyprinus carpio). Эта рыба не особенно вкусная, костиявая, большею частью пахнеть болотомъ, но тъмъ не менъе, за недостаткомъ лучшей,

въ большомъ употреблении среди русскихъ.

Изъ семейства лососевыхъ, (Salmonoidei) водится въ ивкоторыхъ горныхъ рвкахъ форель (Salmo orientalis),

по туз. акъ-балыкъ, но въ водахъ долины она вовсе не встръчается. Особенно много форсли въ нъкоторыхъ притокахъ Кизылъ-су на Алав, а также въ притокв Нарына—Сусамырт. Въ одномъ изъ притоковъ Кизылъ-су, Дараутъ, Федченко нашелъ особый видъ Salmo oxianus, весьма вкусную, но недоступную жителямъ долины. Эту рыбу никакъ пельзя привезти въ долину въ свъжемъ видь, потому что по горнымъ дорогамъ невозможно проследовать съ большимъ грузомъ, т. е. съ кадками или бочками, наполненными водой, въ которой она могла-бы дойти живой. Безъ этого, въ теченіе ифсколькихъ дней пути, она портится. Въ тъхъ мъстахъ, гдъ водится форель, живуть только киргизы, которые не умъють солить или мариновать ее, а потому она вовсе не можетъ быть доставлена въ долину и жители, не бывавшіе въ горахъ, не имъють понятія объ этой рыбъ.

Изъ семейства сомовыхъ (Siluroidei), встръчастся только одинъ видъ сома (Silurus glanis), по туз. джаинъ, достигающій громадныхъ размѣровъ, такъ что купаться въ Сыръ-Дарьѣ бываетъ подчасъ небезопасно. Сомовину киргизы предпочитаютъ всѣмъ остальнымъ рыбамъ и только ее одну употребляютъ въ пищу, хотя мясо ихъ не особенно вкусное. У молодыхъ сомовъ опо жирное, а у взрослыхъ—жесткое и отзывается рыбъимъ жиромъ. По Аутенриту и Кольбе голова сома считается ядовитой (1), но мпѣ здѣсь не приходилось этого наблюдать, потомучто голову всегда очень тщательно отрѣзываютъ и выбрасываютъ.

Два вида изъ рода Barbus тоже встръчаются въ Ферганъ, а именно: Barbus lacertoides—усачъ съръні и Bar. brachycephalus—усачъ короткоголовый. Они

^{(&#}x27;) О ядовитыхъ рыбахъ и о средствахъ къ предупрежденію случаевь отравленія ими. Ю. Кноха. В. М. Журнатъ. 1888 г. Апр±ль.

употребляются въ нищу въ свѣжемъ и копченомъ видѣ; въ послъднемъ напоминаютъ собою по виду и вкусу копченаго сига.

Изъ семейства осетровыхъ, (Acipenseridae), въ Сыръ-Дарьв водится только одна разновидность осетра называемая шипомъ, (Acipenser Schipa), по туз. пильмай; но въ предвлы Области въ настоящее время онъ заходитъ весьма рѣдко, потому что рыбаки перехватываютъ его въ нижнемъ теченіи этой рѣки, для чего устраиваютъ особаго рода запруды. Настоящіе осетры, а также стерляди, вовсе не водятся въ здѣшнихъ водахъ. Скафирринхи, живущіе въ устьяхъ Сыръ-Дарьи и Аму-Дарьи, въ Фергану не заходятъ.

Кром'в вышепоименованных рыбъ, еще довольно распространены въ Ферган'в *шука* обыкновенная (Esox lucius), *османъ* (oreinus) и *маринка* (Schizothorax).

Въ Сыръ-Дарьв водятся судакт обыкновенный (Lucioperea sandra), окунь рвиной (perca fluviatilis), красноперка (Scardius erythrophthalmus) и друг., но они, въроятно, весьма рвдко заходять въ предълы Области, такъ какъ не случается ихъ встрвиать въ продажв.

Вообще ихтіологическая фауна Ферганы не отличается богатствомъ, въ особенности разнообразіемъ своихъ представителей. Туземцы, какъ уже было упомянуто, почему-то пренебрегаютъ рыбою; даже бъдняки ее не употребляютъ ни въ свъжемъ, ни въ консервированномъ видъ. У нихъ для многихъ родовъ и видовъ нъть вовсе и названій, а существуетъ общее наименованіе балыкъ, т. с. рыба.

Съ медицинской точки зрънія, особенно важное вначеніе имъетъ родъ Schizothorax, называемый здъсь маринкой, которая въ изобиліи водится въ ръкахъ и

озерахъ, какъ въ долинѣ, такъ и въ горахъ и не только въ Ферганѣ, но и въ прочихъ мѣстахъ Туркестанскаго края. Проф. Кесслеръ (¹) приводитъ кромѣ новыхъ породъ, водящихся въ р. Таримѣ, еще 8 въ Средней Азіи, но изъ нихъ, сколько миѣ извѣстно, только нѣкоторыя встрѣчаются въ Ферганѣ. Величина маринки бываетъ различная. Нѣкоторые виды, какъ напр. Schizothorax argentatus, достигаютъ до аршина, другіе-же--отъ полуфута до одного фута; въ маленькихъ рѣкахъ и арыкахъ водится обыкновенно незначительной величины.

Мясо маринки имъстъ пріятный вкусъ, если тотчасъ послъ улова вынуть икру и всѣ внутренности. Икра—крупновернистая, краспо-желтаго цвѣта, похожа больше всего на сиговью, очень вкусная, но обладаетъ въ высшей степени ядовитыми свойствами, что неоднократно было мною наблюдаемо какъ въ Ферганѣ, такъ и въ киргизской степи. Кажется, пе всѣ виды маринки въ одинаковой степени ядовиты; въ этомъ отношеніи болѣе другихъ извѣстны 3 вида ея: Schizothorax argentatus, Sch. orientalis и Sch. aksajensis. Послѣдній видъ водится въ притокахъ р. Тарима, а въ предѣлахъ Ферганы, кажется, его пѣтъ.

Относительно ядовитости самой рыбы не могу сказать ничего положительнаго. Большею частью употребляють ее, по видимому, безъ вреда для здоровья; но вмъсть съ тъмъ бывають иногда случаи отравленія при употребленіи исключительно одной рыбы, безъ икры. Быть можеть въ этомъ отношеніи играеть извъстную роль идіосинкразія, или то обстоятельство, что въ мясъ маринки, какъ и въ иъкоторыхъ другихъ, ядъ обра-

^(*) Путешествіе въ Туркестанъ. А. П. Федченко. вып. 3. т. П. ч. VI. Риби. родъ VIII. Марника.

вуется только въ извъстное время, а именно, —во время метанія икры.

Любители и потребители маринки увъряютъ, что если сейчасъ послъ улова выбросить икру, тщательно очистить отъ внутренностей, то она, будучи хорошо проваренной, можетъ употребляться людьми безъ всякаго вреда для здоровья. Относительно конченой маринки этого нельзя сказать, такъ какъ замъчались случан отравленія при употребленіи ее въ подобномъ видъ. Лично въ этомъ отношеніи я не компетентенъ, потому что вообще не люблю никакой рыбы и почти пикогда ее не ъмъ.

Если существуеть разногласіе въ мивніяхь относительно свойствъ самой маринки, то въ ядовитости икры ея никто не сомиввается. При ловяв икра и внутренности обыкновенно выбрасываются тутъ-же на берегъ, но ихъ не трогають даже вороны, хотя извъстно, на сколько эта птица прожорлива и не прихотлива въ выборъ пищи. Если же какая нибудь, по неопытности, нолакомится этой икрой, то скоро околъвасть, чему я быль свидътелемь еще въ киргизской степи. Икра не теряеть ядовитыхъ свойствъ отъ соленія и варенія; точпо также сохраняеть эти свойства и въ кръпкомь спирту.

Для опредъленія степени ядовитости икры рыбъ породы Schizothorax argentatus, Ю. Кнохъ (¹) производиль опыты кормленія ею мышей. При этомъ надо замьтить, что икра, которая для этого употреблялась, была еще не вполнъ созръвшая, т. е. не зерпистая. Опа бралась изъ рыбъ, находившихся почти полгода въ спиртъ, съ разръзаннымъ животомъ и обливалась предвари-

⁽¹⁾ Loc. cit.

тельно водой. Результатомъ опытовъ было то, что мыши, получавшія въ пищу эту икру, умирали черезъ 30 часовъ послѣ кормленія.

При вскрытіи отравленных таким образом мышей оказывалось слідующеє: слизистая оболочка желудка нокрыта клейкой массой темно-желтаго цейта, которая подь микросконом оказалась мелкозернистой, и нитеобразными остатками ткани яичника рыбы; въ тонких кишках тоже находилась слизь желтоватаго цейта, а въ толстых — темнострые комки кала овальной формы. Легкія были нісколько гиперэмированы; печень и почки нормальны, а мочевой пузырь содержаль небольшое количество мочи, которая передъ самой смертью отдівлилась въ виді ніскольких прозрачных канель сейтложелтаго цейта. Въ крови оказались палочкообразный бактеріи.

Икра, какъ уже было сказано, весьма вкусная, по виду мало отличающаяся отъ сиговьей и щучьей, а потому прівзжіе и незнающіе ся свойствъ весьма часто подвергаются отравленію, такъ что нашимъ врачамъ неоднократно приходилось подавать медицинское пособіє.

Вскоръ послъ употребленія икры маринки, въ умъренномъ количествъ, является боль въ животъ, рвота и поносъ, которые скоро прекращаются отъ обыкновенныхъ медицинскихъ средствъ, какъ-то: Боткинскихъ, Иноземцевыхъ, мятныхъ и т. п. капель. Однажды миъ пришлось въ Кокандъ застать повальное отравленіе. У командира баталіона К. на вечеръ, куда собралось все Кокандское общество, была подана къ закускъ, по невъдънію, прекрасная, свъжая икра и всъ гости, считая ее за щучью, ъли съ удовольствіемъ, не подозръвая дурныхъ послъдствій. Вскоръ послъ ужина, гости разъвхались по домамъ и провели ночь, точно также какъ и хозяева, въ страшныхъ мученіяхъ. У дамъ, съвшихъ но одному бутерброду съ этой икрой, припадки были умъренные, но за то у мужщинъ, которые повли всласть, картина бользии напоминала холеру. Впрочемъ, все обошлось благополучно: всъ выздоровъли.

Употребленіе при закускѣ водки, вопреки общераспространенному мнѣнію, пе предотвращаетъ дурныхъ послѣдствій, такъ какъ спиртъ не уничтожаетъ ядовитыхъ свойствъ икры и рыбы.

При неумъренномъ употребленіи икры маринки сначала появляется сильная и продолжительная рвота, потомъ поносъ, сильно истощающіе больнаго, при чемъ онъ не въ состояніи держаться на ногахъ. Вскоръ является сильная блъдность лица, судороги въ икрахъ и въ животъ, потомъ коллансъ, расширеніе зрачковъ, безсознательное состояніе и, наконецъ, смерть. Если же больной не умретъ, то выздоровленіе идетъ весьма медленно, въ теченіи не менъе пяти дней.

Изъ описанной картины видно, что она имѣетъ большое сходство съ припадками холеры, съ тою только разницей, что исходъ отравленія рыбами семейства Schizothorax рѣже смертельный, чѣмъ при азіатской холерѣ.

Мясо маринки, не достаточно проваренное, имѣстъ такое же дѣйствіе, какъ и икра, по крайней мѣрѣ, въ извъстныхъ случаяхъ. Въ 1886 г. одинъ изъ врачей Н. Маргелана III. чуть не сдѣлался жертвой, съѣвши иѣсколько маленькихъ копченыхъ рыбокъ, которыхъ онъ принялъ за форель, по которыя, по всей вѣроятности, принадлежали къ семейству Schizothorax. Черезъ часъ послѣ употребденія этихъ рыбокъ, онъ уже предчасть послѣ употребденія этихъ рыбокъ, онъ уже пред-

ставлять собою картину альгиднаго періода холеры: безъ пульса, безъ сознанія, съ ствененнымь дыхапіємь, афоніей и проч. Нѣсколько часовъ отваживались съ цимъ, пока удалось возвратить къ жизни:

Подобными же ядовитыми свойствами отличается икра османовъ (Oreinus), а потому и ее никто не упо-

требляеть.

Нужно сознаться, что сущность яда икры маринки еще не изследована, не смотря на важное его значение въ медицинскомъ и въ гигіэническомъ отношенія, особенно для жителей Ферганы и всего Туркестанскаго края. Не обладая опытностью въ этого рода изследованіяхъ и не располагая необходимыми для этого средствами, мы не имъемъ возможности произвести точный и всесторонній анализъ на мъстъ; при пересылкъ-же икры для этой цъли въ Петербургъ она испортится и въ ней произойдутъ извъстныя измъненія.

По всей въроятности, этотъ ядъ—изъ группы птомаиновъ, но онъ развивается не въ силу гніенія, или разложенія, потому что совершенно свъжая икра, только что вынутая изъ живой рыбы, обладаетъ всъми ядовитыми свойствами и вызываетъ вышеуномянутые припадки. Быть можетъ, точныя и всестороннія изслъдованія, т. е. химическое, микроскопическое и бактеріоскопическое, прольютъ свътъ на этотъ темный до сихъ поръ вопросъ и укажутъ средства для предотвращенія вреднаго вліянія этой рыбы на человъческій организмъ.

Ю. Кнохъ (1) говоритъ, что икра обыкновенной щуки (Esox lucius) и усача (Cyprinus barbus) тоже обладаютъ ядовитыми свойствами; но мнъ лично не приходилось никогда наблюдать принадковъ отравленія ии здёсь,

^{(&#}x27;) Loc. cit.

ни въ Сибири, хотя щучья икра въ большомъ употреблени. Можетъ быть иногда и случались разстройства желудочно-кишечнаго канала послъ употребления этой икры въ сыромъ видъ, но это принисывалось какой либо погръшности въ діэтъ.

Что же касается рыбнаго яда разложившихся несвѣжихъ рыбъ, то у меня нѣтъ никакихъ объ этомъ свѣдѣній, потому что туземцы, какъ было сказано, почти никогда не ѣдятъ даже свѣжей рыбы, а въ войскахъ она употребляется лишь въ исключительныхъ случаяхъ.

Многіе здась русскіе, точно также какъ и туземцы, никогда не употребляють рыбы въ пищу, завъряя, что она способствуеть разстройству пищеварительнаго канала и развитію лихорадокъ. Насколько это мивніе относительно лихорадокъ справедливо, не берусь отвътить съ положительностью, потому что въ этомъ направлении не было произведено научныхъ изслъдованій, но пренебрегать этимъ мивніемъ тоже не следуеть, такъ какъ быть можеть и существуеть нікоторая связь между маляріей и употребленіемъ болотной рыбы. Немаловажную роль играеть и то обстоятельство, что въ здешнемъ жаркомъ климатъ всякая рыба не можетъ долго сохраняться и бысгро подвергается порчъ, а не свъжая рыба, конечно, не можеть считаться безвредной, хотя бы она и не содержала рыбнаго яда. Подобная рыба можеть произвести разстройство желудочно-кишечнаго канала; а подобное состояніе въ малярійной містности, нарушивъ равновъсіе въ организмѣ, будетъ способствовать проявленію лихорадки, или вызоветь рецидивъ.

Земноводныя.

Раковъ въ Ферганъ вовсе нътъ, хотя мнъ кажется, что они могли бы водиться въ здъшнихъ арыкахъ.

Въ пъкоторыхъ мъстахъ встръчаются вемляныя че-

репахи, но онъ не употребляются въ пищу ни туземцами, ни русскими.

Изъ земноводныхъ водятся еще во множествъ, въ несчаныхъ и каменистыхъ мъстностяхъ, разныхъ видовъ ящерицы, между которыми особенно замъчательны громадныя двухъ-аршинныя ящерицы (Psammosaurus caspius), по туз. ичкимаръ. Эта ящерица, въ случав нападенія на нее, сначала убъгаетъ, но коль скоро будеть поставлена въ невозможность скрыться, то бросается на человъка и кусается.

Въ туземной медицинъ ящерицы употреблялись какъ лъкаретво, а потому первое время туземцы часто приносили къ нашимъ врачамъ разныхъ ящерицъ, полагая, что мы будемъ ихъ покупать для этой же цъли.

Лягушекъ въ долинъ громадное количество, чему способствуетъ съть арыковъ, въ которыхъ онъ имъютъ свое пристанище. Ихъ очень много уничтожаютъ аисты, змъи и другія животныя, но за всъмъ тъмъ онъ встръчаются на каждомъ шагу.

Змъй въ Ферганъ не особенно много и, сколько мнъ извъстно, онъ большею частью неядовиты. Въ теченіе 8-ми лътъ, мнъ ни разу не доводилось слышать или читать въ отчетахъ объ укушеніи людей ядовитыми змъями. Правда, что туземцы въ подобныхъ случаяхъ обращаются къ своимъ знахарямъ, а потому это и не запосятся въ нашу медицинскую отчетность.

А. П. Федченко (1) описываеть следующія породы вмей:

Taphrometopon lineolatum—весьма красивая, длинная, тонкая змъя, съ нъсколько желтоватыми линіями на

⁽⁴⁾ Путешествіе въ Коканцскомъ ханстві. стр. 108.

оливковомъ полв. Она не ядовита. Изъ ея шкурки киргизы ділають оправу для рукоятокъ нагаекъ.

Tropidonotus hydrus, водяной ужъ, обыкновенная европейская форма.

Elaphis dione—описанная еще Палласомъ изъ южной Сибири.

Zamenis Fedtschenkoi—очень крупная змъя, но совершенно безвредная.

Eryx jaculus, по киргизски кумъ-джилянъ,—толстая, съ очень короткимъ толстымъ хвостомъ. Принадлежитъ къ семейству нитоновъ, т. е. къ тому-же, куда—всъмъ извъстные удавы и боа.

Изъ ядовитыхъ водятся, кажется, только двѣ породы, а именно: Tryganocephalus halys, по туз. чагыри-гилянъ, принадлежитъ къ семейству crotalidae, т. е. къ тому-же, куда—и американская гремучая змѣя.

Vipera berus встръчается весьма ръдко.

Нъкоторыя изъ этихъ вмъй живутъ на землъ, другія попадаются въ водъ, въ купальняхъ, къ великому ужасу женщинъ и многихъ мужчинъ, которые боятся ихъ. Иногда пъкоторыя залъзаютъ на деревья, въ особенности на карагачи, такъ что ихъ за непроницаемой листвой невозможно замътитъ. Случается, что вмъя забирается подъ подушку или тюфякъ, потому что онъ любятъ отдохнуть на мягкой и теплой постели.

Пища ихъ состоить изъ насъкомыхъ, червей, лягушекъ, мышей, маленькихъ птицъ и ящерицъ.

На Памиръ изъ амфибій Н. А. Съверцовымъ встръчено два вида: Вибо variabilis, въ разныхъ мъстностяхъ, болъе у Яшиль Куля и тамъ же замъчена какая то жаба, похожая по общему виду на Rana temporaria. Что-же касается до R. viriabilis, то эта жаба на Башъ-Алаъ мно-

гочислениве, чемъ на Памиръ, гдъ однако поднимается до 13.000 Ф.

Изъ настоящихъ Reptilia, черепахахъ, змъй и ящерицъ не найдено ни одного вида на Башъ-Алав и Памиръ; но по сосъдству, у истоковъ Кашгаръ-Дарьи, какой то видъ Eremias поднимается до 11.000 ф. и достигаеть верхне-альпійскаго пояса (1).

Одно изъ полезнъйшихъ насъкомыхъ, водящихся насъкомыя и въ Ферганъ,—это *шелкопряда тутовый* (Вотьух mori), гусеница котораго называется шелковичнымъ червемъ, по туз. ефакъ-куртъ. Породу этихъ червей невозможно опредълить, такъ какъ воспитание ихъ, сортировка съмянъ и коконовъ ведется здъсь небрежно, вслъдствіе чего породы перекрещиваются и образуются помъси. Эти помъси перекрещиваются вновь, такъ что въ етоль продолжительное время, въ течение котораго существуеть шелководство, образовались такія породы, по которымъ трудно опредёлить первоначальный типъ червя. На сколько разнообразны виды червей, можно уже судить по цвъту коконовъ, по туз. (пильля); они бывають былые, сфроватые, желтые и розоватые, -- по-

Родиной шелководства считается Китай; но существуетъ преданіе, по которому оно искони существовало въ Ферганской долинъ и перешло въ очень отдаленныя времена изъ Хотана. Нельзя ручаться за достовърность этихъ преданій, но нельзя также и опровергать ихъ.

хожіе на ломбардскіе.

Молодыхъ вылупившихся червей со второго дня начинають кормить тутовыми листьями. Хотя и нъкоторые другіе листья, какъ напр. айлантусъ, крапива

черви.

⁽¹⁾ Заметви о фауне позвоночных Памира. Н. А. Северцова.

и т. п. могутъ служить кормомъ червей, но при этомъ шелкъ бываетъ недоброкачественный, а потому предпочитаются тутовые листья.

Шелковичные черви въ Ферганъ также подвержены разнымъ бользнямъ, какъ и европейскіе, по туземцы насчитываютъ только четыре бользни, тогда какъ у европейскихъ бываетъ до 12-ти.

Въ Н. Маргеланъ въ 1887 г. устроена гренажная станція, на которой производится сортировка янчекъ, т. е. микроскопическое изслъдованіе ихъ, при чемъ больные уничтожаются. Этими мърами, по всей въроятности, усовершенствуется шелководство въ нашемъ краъ. Завъдываніе этой станціей принялъ на себя врачъ П. К. Янушкевичъ.

Шелководство, какъ и прочія производства, совершаются сартами кустарнымъ способомъ. Тѣ изъ жителей, которые имѣютъ свои тутовыя деревья, могутъ отъ продажи коконовъ на базарѣ получить извѣстный заработокъ. Для полученія пуда сырыхъ коконовъ необходимо два золотника яичекъ, а на прокормленіе червей необходимы листья изъ 7-ми тутовыхъ деревьевъ (¹).

Этими цифрами не всегда можно руководствоваться. Въ Н. Маргеланъ, ванимающіеся шелководствомъ, передавали миъ, что для полученія одного пуда сырыхъ коконовъ нужно не менѣе 3-хъ волотниковъ грены, такъ какъ всегда часть червей погибаетъ и не завьется въ коконы. Для прокормленія червей, изъ которыхъ получится пудъ сырыхъ коконовъ, нужно листьевъ, по крайней мѣрѣ, отъ 14 тутовыхъ деревьевъ, такъ какъ, по вычисленію въ Наманганскомъ уѣздъ, тутъ средней ве-

^(*) Туркестанская справочная кинга на 1885 г. ч. И. стр. 142.

личины можеть прокормить червей, дающихъ $2^{1}/_{2}$ фун. коконовъ (1).

Во всякомъ случав, для тувемцевъ, имвющихъ свои тутовыя деревья, шелководство представляется весьма выгоднымъ. Для полученія пуда сырыхъ коконовъ они затрачивають на нокупку грены, устройство полокъ и другихъ приспособленій не болве 4-хъ рублей, а цвна за пудь этихъ коконовъ на базарѣ отъ 12 до 18 руб. Такъ какъ выводомъ червей и уходомъ за ними занимаются туземныя женщины, то это составляетъ большое подспорье въ ихъ домашнемъ хозяйствѣ. При покупкъ тутовыхъ листьевъ выгода будетъ значительно меньше, такъ какъ для полученія пуда сырыхъ коконовъ нужно истратить на эти листья отъ 5—7 руб. (2).

Изъ одного пуда сырыхъ коконовъ, при замариваніи гусеницъ паромъ, получается около $^{1}/_{3}$ сухихъ коконовъ, а при замариваніи подъ вліяніємъ солнечныхъ лучей получается сухихъ коконовъ всего $^{1}/_{4}$. Послъдній способъ, не смотря на убытокъ, чаще всего практикуется туземцами. Цѣна сухимъ коконовъ при размоткъ получается около $^{1}/_{4}$ п. шелка.

По вычисленіямъ одного шелковода, дёлавшаго опыты надъ наровою и солнечною сушкою, оказалось: изъ одного пуда и трехъ фунтовъ коконовъ наровой сушки получалось 11 фун. 11 волот. шелка, изъ одного же пуда коконовъ солнечной сушки получено только 5 фун. 40 вол. шелка (3). За пудъ здёшняго шелка въ Москвё платятъ отъ 150 до 255 руб.

⁽¹⁾ Очеркъ экономическаго состоянія Наманганскаго у'єзда. П. А. стр. 11.

⁽²⁾ См. выше стр. 282.

⁽в) Турк. справ. книга на 1885 г. стр. 142.

Медицинскія пінеки (Hirudo medicinalis), по туз. зюлюкъ, водятся въ достаточномъ количествѣ, въ особенности въ небольшихъ озерахъ Андижанскаго уѣзда. Онѣ темнобураго цвѣта, небольшой величины и обладаютъ хорошими качествами. Ловля производится обыкновенно весною, въ апрѣлѣ; но такъ какъ нѣкоторыя озера не замерзаютъ, вслѣдствіе теплыхъ ключей, то въ крайнихъ случаяхъ можно добыть ихъ и зимою. Сарты относятся съ довѣріемъ къ кровоизвлеченіямъ помощью піявокъ, а потому они ихъ сохраняютъ на зиму въ домахъ.

Въ арыкахъ и купальняхъ много встръчается піявокъ, (Наеморія vorax M), но онъ не имъютъ никакого примъненія.

Ленточные и круглые *глисты* встръчаются весьма часто; изръдка наблюдается и filaria medinensis, о чемъ будетъ сказано при описаніи патологіи здъшняго края.

Трижины до сихъ поръ не наблюдались.

Шпанскія мужи (Lytta vesicatoria), появляются изрѣдка, но въ такомъ незначительномъ количествѣ, что онѣ вовсе не собираются, а для медицинскаго употребленія привозятся изъ Россіи.

Разные виды пауковъ водятся въ громадномъ количествъ; изъ нихъ болъе достопримъчательны: скорміонъ, (Androctonus caucasicus), по туз. чаянъ; живетъ въ темныхъ мъстахъ, подъ камнями, въ глиняныхъ заборахъ, въ потолкахъ туземныхъ сакель, а неръдко заходитъ и въ дома русской постройки, забираясь въ постель, въ платье и т. п. Они по ночамъ выбъгаютъ за добычею, которая состоитъ изъ насъкомыхъ, ящерицъ, лягушекъ и проч. Свою добычу умерщвляютъ ядомъ, изливаемымъ изъ крючковатаго острія, находящагося на концѣ хвоста. На людей сами они никогда не нападають, а жалять только тогда, когда человѣкъ случайно на него наткнется, или захочеть взять его въ руки, словомь онъ въ подобныхъ случаяхъ употребляеть это средство для самозащиты.

Укушеніе скорпіона въ здѣшнихъ мѣстахъ весьма болѣзненное; сравниваютъ это ощущеніе, какъ будто въ тѣло вонзили раскаленный гвоздь. Вскорѣ послѣ этого появляется воспаленіе кожи и образуется сильная болѣзненная опухоль. По мнѣнію туземцевъ, скорпіоны бываютъ болѣе всего ядовитыми въ концѣ лѣта и, хотя они разсказываютъ, что иногда отъ ужаленія скорпіономъ послѣдствіемъ бываетъ смерть, но мнѣ ни разу не доводилось слышать ни отъ врачей, ни отъ русскихъ жителей о подобныхъ исходахъ. Весь процессъ ограничивается жестокою болью и опухолью, которыя проходять отъ втиранія деревяннаго масла.

Если скорпіонъ ужалить въ руку, или погу, то туземцы немедленно перевязывають весьма туго выше этого мъста, а рану высасывають сами или кто либо

другой.

Филинга, (Solpuga araneoides), по туз. бузау-башъ. Ихъ очень много въ степяхъ, но зачастую проникаютъ и въ жилыя мъста. Ядовитость ихъ тоже сомнительная, такъ какъ, по заявленію А. П. Федченко, въ нихъ не открыто ядоотдълительныхъ органовъ; но, не смотря на это, бываютъ иногда смертельные случаи отъ ихъ уку- шенія. Мнѣ извъстенъ одинъ только примѣръ, гдѣ отъ ужаленія фалангой въ шею умеръ фельдфебель 1-го стрѣлковаго баталіона въ Ура-Тюбе. Такъ какъ этого случая самъ я не видѣлъ, то и не могу съ точностью сказать, умеръ-ли онъ собственно отъ яда, или отъ того,

что образовавшаяся сильная опухоль шеи могла придавить важные сосуды и нервы, вслёдствіе чего произошель смертельный исходь.

При ужаленіи фалангой употребляется тоже втираніе деревяннаго масла. Большою цілебною славою пользуются при ужаленіи фалангой масло, настоенное на фалангахъ, а при ужаленіи скорпіонами—масло на скорпіонахъ. На сколько эти настои дійствительнів простого масла,—не умізю сказать, потому что никто изъ врачей, сколько миї извістно, не ділаль параллельныхъ опытовъ.

Тарантулъ (Trachosa singoriensis), по туз. бій, живеть въ земляныхъ норахъ, по пустырямъ и туземцами считается тоже ядовитымъ. Въ здъшнемъ крав мив не случалось слышать, чтобы когда нибудь появлялись разнообразные и странные припадки, описанные ивкоторыми писателями подъ именемъ тарентизма, а равно чтобы практиковалась при этомъ пляска до изнеможенія, которая будто бы ослабляетъ дъйствіе яда.

Достоинъ вниманія маленькій научокъ (Lathrodectus tredecempunctatus), по татарски кара-куртъ (¹). Въ долинъ его нѣтъ, а встрѣчается въ травянистыхъ предгорьяхъ и горахъ, окружающихъ долину съ сѣвера. Особенно ихъ много въ долинахъ Александровскаго хребта. Укушеніе кара-курта туземцы считаютъ безусловно смертельнымъ, такъ что даже верблюдъ погибаетъ въ нѣсколько часовъ. Но въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ ихъ много, киргизы относятся къ укушенію гораздо равнодушиѣе и излѣчиваются, натирая мѣсто укуса опіумомъ ін subst., а также принимая его внутрь въ довольно значитель-

⁽¹) Латинскія названія тарантула и кара-курта заимствованы изъ циркудяра мәдицинскаго департамента, отъ 30 Мая 1888 г № 5446.

номъ количествъ. Врядъ-ли опій играєть въ данномъ случать роль противоядія; скорте опъ служить какъ болеутоляющее и успоканвающее средство, потому что ужаленіе кара-курта бользненнте, нежели скорпіона и фаланги, а главное,—что оно обнаруживаєтся весьма тяжелыми нервными припадками. Изъ этого можно заключить, что опасность отъ ужаленія этимъ паукомъ птесколько преувеличена.

Нашимъ врачамъ весьма ръдко приходилось наблюдать больныхъ, ужаленныхъ каракуртомъ, но изъ ивскелькихъ случаевъ, свъдънія о которыхъ мит были доставлены, я могу заключить, что если ужаленіе и небезусловно смертельное, то тъмъ не менте, оно сопровождается весьма тяжелыми и опасными припадками.

На мѣстѣ укуса не появляется опухоли, какъ при укушеніи скорпіономъ или фалангою, а только жесточайшая боль въ этомъ мѣстѣ и распространяющаяся по направленію нервовъ. При этомъ появляется страхъ, замираніе сердца, стѣсненіе дыханія и волосы на головѣ ощетиниваются.

Въ 1884 г. врачъ Гевеке, будучи съ 6-мъ полкомъ Оренбургскаго казачьяго войска въ горахъ Андижанскаго увзда, на урочищъ Кара-Куль, наблюдалъ укушеніе у двухъ казаковъ, при чемъ припадки были совершенно тождественны. Случилось это слъдующимъ образомъ: оба они находились въ числъ другихъ казаковъ съ полковыми лошадъми, въ нъсколькихъ верстахъ отъ мъста расположенія лагеря. Проспулись опи внезапно отъ сильной боли, происшедшей какъ-бы вслъдствіе укушенія какимъ-то насъкомымъ, котораго имъ однако не удалось увидъть. Вскоръ къ этому присоединились одышка, судороги и жесточайшая боль въ нижнихъ конеч-

ностяхъ. При объективномъ изслъдованіи прежде всего обращалъ на себя вниманіе довольно значительный ціанозъ лица, который вскоръ смѣнился мертвенною блъдностью. Пульсъ былъ медленный и слабый, дыханіе замедленное и неправильное.

Мъсто укуса представляло собою очень незначительное, красноватое пятнышко, въ одномъ случаъ—на передней брюшной стънкъ, а въ другомъ—на передней стънкъ грудной клътки. Наружные признаки на мъстъ укуса были выражены чрезвычайно слабо; опухоли совершенно не замъчалось, гиперемія кругомъ была тоже весьма незначительная.

Что же касается субъективныхъ явленій, то въ моментъ изслъдованія больные жаловались больше всего на стъсненіе дыханія, судороги и боль въ нижнихъ конечностяхъ на столько сильную, что молодые, кръпкіе люди громко кричали и плакали. Послъ двухъ пріемовъ внутрь Т-гае Орії, по 15 капель, больные вскоръ почувствовали облегченіе и черезъ нъсколько часовъ совершенно оправились, уснувъ кръпкимъ сномъ.

Хотя въ данномъ случав неизвъстно, какимъ насъкомымъ они были ужалены, но врачъ В. М. Осиповъ, наблюдавшій три случая укушенія кара-куртомъ въ Семиръчьи, при чемъ былъ убитъ этотъ паукъ на мъстъ преступленія, обрисовалъ мнъ бользпенные принадки въ такомъ же видъ. Нътъ сомньнія, что эти два казака были ужалены кара-куртомъ, такъ какъ въ той мъстности ихъ очень много, а скорпіоны и фаланги не встръчаются; змъй тоже весьма немного и всъ онъ неядовиты.

Изъ тысяченожекъ есть форма, считающеяся у тувемцевъ ядовитою; это—сколопендра, которая, по Федченко, составляетъ новый видъ. Относительно ея ядовитости мив ничего неизвъстно и случаи ужаленія не были наблюдаемы нашими врачами.

Въ предгорьяхъ и нагорныхъ долинахъ Тянь-Шаня водится паразитъ, по киргизски называемый ала-куртъ, зоологическос-же названіе мнѣ неизвѣстно. Онъ зимою живетъ въ шерсти домашнихъ животныхъ, отъ чего они сильно страдаютъ и вслѣдствіе этого будто-бы къ веснѣ среди нихъ открываются повальные падежи.

Разнаго рода насѣкомыхъ въ долинѣ и горахъ такое обиліе и разнообразіе, что они представляють неистощимый матеріалъ для энтомологовъ. Какое вліяніе оказывають разныя породы этихъ насѣкомыхъ на людей вполнѣ еще не уяснено, а потому ограничусь перечисленіемъ тѣхъ, которыя жалять и причиняють безпокойство какъ людямъ, такъ и животнымъ.

Комары (Culex), по туз. маша, водятся здѣсь въ громадномъ количествѣ, въ особенности въ сырыхъ болотистыхъ мѣстностяхъ, поросшихъ камышомъ, такъ что въ теченіе лѣта тамъ немыслимо существованіе. Кицчаки, каракалпаки и другіе полукочевники, имѣющіе осѣдлость въ этихъ мѣстахъ, уходятъ весною съ своими стадами въ горы и возвращаются только позднею осенью, когда уже не бываетъ этихъ насѣкомыхъ.

Различныхъ видовъ оводовъ (Oestrus) и слъпней (Tabanus) здѣсь тоже очень много, вслѣдствіе чего коченики всегда выбираютъ мѣста для стоянокъ въ открытыхъ мѣстахъ, подальше отъ всякихъ зарослей.

Осы, шмели, мухи, муравьи и т п. причиняють тоже значительное безпокойство въ теченіе жаркаго времени.

Ичело (Apis mellifica), по туз. ары, —много, по онъ

въ дикомъ состояніи и пчеловодство у туземцевъ не прививается, хотя въ гористыхъ мѣстностяхъ оно могло бы развиться съ успѣхомъ, чему видимъ примѣръ въ смежной съ нами Семирѣченской Области, откуда къ намъ и доставляютъ медъ.

Терные тараканы (Blatta orientalis) водится въ домахъ, но красныхъ таракановъ (Blatta germanica) въ Тур-кестанскомъ крат до прихода Русскихъ вовсе не было. Теперь они появилясь во многихъ мъстахъ въ весьма значительномъ количествъ, но въ Ферганъ еще ихъ пе много.

Вложа (Pulex irritans), по туз. бурга,—миріады, чему способствують земляные полы въ помѣщеніяхь туземцевъ. Вши (Pediculus capitis, pubis et vestimenti), по туз. битъ, между туземцами въ большомъ распространеніи, въ особенности среди бѣднаго класса, а преимущественно у киргизовъ. И у болѣе зажиточныхъ людей въ одѣялахъ—главное ихъ пристанище, вслѣдствіе чего, останавливаясь ночевать у нихъ, слѣдуетъ быть весьма осторожнымъ при употребленіи постельныхъ принадлежностей.

Не смотря на нечистоплотность туземцевь, постельнаго клопа (Acanthia lectularia) ме было въ здѣшнемъ краѣ. Съ приходомъ русскихъ они начали появляться и въ настоящее время они распространились повсюду. По всей вѣроятности солдатки въ своихъ сундукахъ съ вещами занесли сюда какъ клоповъ, такъ и таракановъ. За то здѣсь водится клопъ, (Argas sp.), по туз. кана, пріобрѣвшій себѣ историческую извѣстность вслѣдствіе того, что ими были переполнены клоповники (тюрьмы) при ханахъ.

Саранча, по туз. чауртка, принадлежить къ

тремъ видамъ: Pachitylus migratorius, Р. cinerascens и Coloptenus italius. Къ нимъ слъдуетъ причислить и кузнечика Stenobothrus sp. Этотъ бичъ земледъльцевъ нерѣдко посъщаетъ Фергану, производя страшныя опустошенія, а потому появленіе ея издавна считается однимъ изъ величайшихъ бъдствій. Помимо того, что эти насѣкомыя пожираютъ все, къ чему только не прикасаются, по они еще вредны тѣмъ, что многочисленные ихъ трупы, подвергаясь гніенію, производятъ зараженіе воздуха и распространяютъ при этомъ отвратительный запахъ. Туземпы разсказывають, что если лошади пасутся на травъ падъвденной неокрыленной саранчей, которая оставляетъ слизь и свои изверженія, то онъ заболѣваютъ повальнымъ дифтеритомъ.

Нельзя не упомянуть еще о вредномъ насѣкомомъ— это **моли** (Tinea tapetzella и Т. sarcitella). Ее здѣсь такое огромное количество во всѣхъ помѣщеніяхъ, что если не принять самыхъ серьезныхъ мѣръ для ея истребленія, то въ теченіе лѣта она уничтожитъ до тла всѣ мѣховыя и суконныя вещи.

Всь перечисленныя насъкомыя, относительно причиняемаго безпокойства,—ничто въ сравненіи съ мошемими, изъ рода Phlebotomus, по туз. паша, которыя составляють истинное мученіе. Онъ маленькія, едва замьтныя простому глазу вслъдствіе ихъ пѣжности и желтоватаго цвъта. Хоботь у нихъ, относительно величины тъла, длините, чъмъ у комара. Онъ нападають миріадами по вечерамъ и ночью на спящихъ людей, чтобы насосаться крови. Въ особенности ихъ много налетаеть въ комнаты, если вечеромъ зажечь огонь. На открытомъ воздухъ, въ особенности если дуетъ малъйшій вътерокъ, ихъ не бываеть и этимъ только пользуются,

чгобы заснуть покойно. Уколы ихъ сильно шутся и покрываются прыщами. Жалять опъ по преимуществу лицо, шею, оконечности рукъ и ногъ; туловища почти не трогаютъ. Я думаю, что при укусахъ онъ выдъляютъ какое нибудь ядовитое вещество, такъ какъ величина прыщей и вообще раздражение кожи иссоотвътствуютъ уколу такого маленькаго насъкомаго. Это гъ осебенности замъчается на вновь прибывши: ъ въ здёшній край, у которыхъ велёдъ за этими укусами кожа покрывается прыщами, какъ въ натуральной оспъ. При случайномъ или умышленномъ сцарапываніи этихъ прыщей иногда образуется язва, долго не заживающая. Въ следующе года укусы только зудятся и на мъстъ ихъ образуются лишь маленькіе пунырышки (papulae), исчезающіе черезъ два, три дня. Чемъ дольше челов'єкъ живеть въ здёшнемъ край, тёмъ онъ какъ будто привыкаеть и уже отъ укусовь не образуются прыщи, какъ въ первый годъ, а только-зудъ.

Въ особенности подвергаются ихъ нападенію женщины и дѣти, у которыхъ кожа нѣжпѣе, чѣмъ у мужчинъ, хотя и послѣдніе сильно страдаютъ отъ нихъ. Есть личности, которыхъ не тронетъ ни одна мошка. Я знаваль братьевъ, весьма похожихъ другъ на друга, изъ которыхъ одинъ не имѣлъ понятія объ укусахъ мошекъ, тогда какъ другой былъ истиннымъ мученикомъ отъ нихъ, проводя безсонныя ночи, потому что онѣ не давали покоя. Какая причина подобной симпатіи и аптинатіи—не извъстно.

Свиръпствують онъ въ теченіе 3-хъ жаркихъ мъсяцевъ,— мая, іюня, іюля; въ августъ начинаютъ уменьшаться и, наконецъ, исчезаютъ до слъдующаго лъта. Этихъ мошекъ такое множество только въ долинъ; въ мъстностихъ же болъе возвышенныхъ, а въ особенности въ горахъ, ихъ вовее нътъ. Поэтому многіе, сильно обижаемые ими, уъзжаютъ въ горы, чтобы хотя на время избавиться отъ подобныхъ мученій и отдохнуть.

Изъ всѣхъ предохранительныхъ средствъ, которыя мною были испытаны, отдаю преимущество керосину. Передъ спомъ слѣдуетъ помазать имъ лицо, волосы на головѣ, руки и ноги и ни одна мошка не тропетъ. На нефтяныхъ источникахъ я не видѣлъ ни одной мошки и тамъ люди совершенно отъ нихъ избавлены.

Вообще въ здёшнемъ край такое множество разныхъ червячковъ и насъкомыхъ, дёлающихъ вредъ человъку, что онъ не въ состояніи съ ними совладать. Опи объёдаютъ листья на деревьяхъ и огородныя растенія, уничтожаютъ посъвы, подтачиваютъ балки и прочія деревянныя части построекъ,—словомъ, не возможно перечислить всёхъ тёхъ вредныхъ дѣйствій, которыя приходится переносить человъку отъ этихъ маленькихъ, по многочисленныхъ враговъ.

Этимъ заканчиваю краткій очеркъ фауны Ферганской Области. Весьма возможно допустить, что миріадылихъ насъкомыхъ, наполняющихъ Фергану и представляющихъ въ настоящее время только интересъ для энтомолога, оказываютъ также вліяніе прямымъ, или косвеннымъ путемъ на развитіе нѣкоторыхъ болѣзней; или, наоборотъ, уничтожая низшіе организмы, ослабляютъ болѣзненнотворныя причины, вызываемыя послѣдними. Но это—вопросъ будущаго, такъ какъ въ настоящее время мы не имѣемъ по этому предмету никакихъ научныхъ данныхъ. Мы переживаемъ періодъ такихъ неожиданныхъ и великихъ открытій, что при обогащеніи напихъ біологическихъ знаній вообще и бактеріологи-

ческихъ въ частности, навърное въ непродолжительномъ будущемъ выяснится то участіе, которое принимаютъ въ этіологіи заразныхъ бользней различныя насъкомыя, на которыхъ мы въ настоящее время не обращаемъ вниманія, а подчасъ, быть можетъ, однихъ напрасно уничтожаемъ, тогда какъ другихъ—сберегаемъ.

ГЛАВА ІХ.

Скотоводство въ Ферганской Области.

Естественныя условія Ферганской Области, очерченныя въ предыдущихъ главахъ, неодинаковыя наклонности различныхъ племенъ поселившихся на этой территоріи и борьба за существованіе должны были разграничить все населеніе на скотоводовъ и земледъльцевъ.

Долина Ферганы испоконъ въка не представляла собою благопріятныхъ условій для развитія скотоводства, а потому оно сосредоточилось въ предгорьяхъ и горахъ, окружающихъ ее, въ которыхъ по всей въроятности, уже въ глубокой древности обитали кочующіе номады. Богатыя привольныя настбища, покрывающія горныя долины и ущелья, обиліе хорошей воды и чистый горный воздухъ, привлекали кочевниковъ съ ихъ стадами въ эти завътныя для нихъ мѣстности.

Марко - Поло, путешествовавшій черезъ Памиръ 1272—1275 г.г. по Р. Х., говорить, что тамъ во многихъ мѣстахъ лучшія настбища въ свѣтѣ, такъ какъ тощія лошаденки жирѣютъ на нихъ въ 10 дней. Султанъ Бабуръ писалъ въ 1494 г. по Р. Х.: "Фергана окружена отовсюду горами, и въ горахъ этихъ имѣются хорошія лѣтнія кочевья" (1). И это не удивительно, потому что трава въ тѣхъ мѣстахъ должна быть несравненно питательнѣе, нежели въ другихъ мѣстахъ. Карлъ Крамеръ (2), относительно кормоваго достоинства альпійскаго сѣна, собраннаго съ высоко расположенныхъ альпій-

(3) Очерки Ферганской долины А. ф.-Мидлендорфа. стр. 337.

^{(&#}x27;) Фергана по запискамъ султана Бабура. Н. Н. Пантусова. Изд. 1884 г.

скихъ луговъ, говоритъ, что содержаніе протеина и жира значительно больше, а клѣтчатки поразительно мало сравнительно съ содержаніемъ ихъ даже въ хорошемъ сънъ съ долинныхъ луговъ. По изслъдованіямъ Lorenz'a (1), произведеннымъ въ Зальцбургскихъ альнахъ, оказалось, что содержаніе протеина въ сънъ возрастаетъ вмѣстъ съ высотою надъ уровнемъ моря, а именно:

На высотѣ 3000 ф. — $10,4^{0}/_{0}$. — 3.500 ф. — 10,6— — 4000 ф. — 14,6— — 5.500 ф. — 14,9— — 6.500 ф. — 15,3—

Хотя у насъ, къ сожалвнію, еще нвтъ подобныхъ изслъдованій, но а ргіогі слъдуетъ допустить, что и наши горныя травы гораздо питательнѣе, о чемъ по опыту знаетъ всякій киргизъ. Они указываютъ на горную долину Арпа, въ смежности съ Ферганой, на которой свойство кормовыхъ травъ таково, что, какъ бы ни была истощена лошадь отъ безкормицы, она тамъ отъ-вдается въ теченіе недъли.

Кочевники не могутъ долго оставаться на одномъ мъстъ съ своими стадами, потому что въ извъстное время вся трава будетъ скормлена, вслъдствіе чего они должны перекочевывать на новыя настбища. По этому киргизы и прочія кочевыя племена, подобно всъмъ кочевникамъ, живущимъ въ стеняхъ, перекочевываютъ съ своими стадами съ мъста на мъсто. Здъшнимъ киргизамъ пътъ надобности, подобно степнякамъ, переходить большія пространства въ горизонтальномъ направленіи; они только то поднимаются на горы до 10.000 ф. и болъе, то спускаются ниже, смотря по времени года.

⁽¹⁾ Тамъ-же.

Въ ихъ распоряжени густо-покрытыя травою предгорыя, въчно-зеленые, сочные альпійскіе луга и безконечныя степи плоскогорій. Они-же взбираются на Алайскую долину, гдъ на высотъ отъ 8—11.000 ф. н. у. м. насуть свои общирныя стада. На Алав кочусть льтомъ множество ферганскихъ киргизовъ, но изъ верхняго Алая опи уходять назадъ черезъ 60 дней и только въ Среднемъ и Нижнемъ Алав остаются дольше; а многіе изъ нихъ имъють тамъ и зимовки.

Памирскіе киргизы кочують на высоть $14^{1}/_{2}$ тысячь футовь, а зимують на 11 тысячахь футовь. Причина стремленія ихъ забираться повыше заключаєтся въ томь, чтобы избавить скотину оть болотистой мѣстности, гдѣ ее одольвають оводы, слѣпни и комары и чтобы воспользоваться питательнымь ковыльнымь кормомь. Лѣтовки на Алаѣ богаты кормовыми травами, особенно въ южныхъ горахъ, которыя преимущественно любять киргизы, потому что травы не высыхають до осени. Весною они посыщають въ горныхъ цѣпяхъ стремнистые, озаренные солндемь склоны скаль, въ особенности глинисто-сландевыя стѣпы, которыя рапѣе прочихъ освобождаются отъ спѣга и тѣмъ спасають свой скотъ отъ голодной смерти.

Не смотря на такія, повидимому благопріятныя условія, скотоводство Ферганской Области стоить на довольно низкомъ уровнѣ какъ въ отношеніи числа домашнихъ животныхъ, такъ и качества ихъ. Причиной незначительнаго развитія скотоводства у осѣдлаго населенія служатъ топографическія условія культурной полосы долины, о которыхъ было уже говорено. Осѣдлость и земледѣльческая культура Области обусловливаются исключительно возможностью имѣть въ данномъ пунктѣ

воду для орошенія полей, безъ чего здінняя почва не производительна; а потому рядомъ съ прекрасно возділанными зеленівощими полями лежитъ безводная, лишенная почти всякой растительности, лессовая, щебневая или солончаковая пустыня.

Такимъ образомъ въ мѣстномъ сельскомъ хозяйствѣ не имѣется главныхъ условій для скотоводства,—
луговъ, настбищъ и выгоновъ для скота. Очевидно, что
какъ бы ни была интенсивна земледѣльческая производительность, все таки никакое хозяйство не въ состояніи безъ настбищъ и луговъ содержать даже самое необходимое для него количество скота, а безъ него самое
существованіе хозяйства дѣлается не возможнымъ.

Единственно что даеть устойчивость земледѣльческому хозяйству въ Ферганѣ,—это тѣсная связь, существующая между хозяйствомъ земледѣльца сарта и скотоводствомъ кочевника киргиза. Въ общемт, связь эта выражается въ томъ, что необходимый для земледѣлія скотъ осѣдлое населеніе получаетъ отъ кочевниковъ, взамѣнъ хлѣба и произведеній кустарной промышленности; при чемъ всѣ выгоды таковаго обмѣна всецѣло лежатъ на сторонѣ земледѣльца. Послѣднее обстоятельство вредно вліяетъ на скотоводство у осѣдлаго населенія въ томъ отношеніи, что, давая возможность пріобрѣтать за низкую цѣпу скотъ у кочевниковъ, не поощряєть къ улучшенію породъ скота и возвышенію его продуктивности (¹).

Кромѣ не благопріятныхъ топографическихъ условій, еще и способъ веденія сельскаго хозяйства не вызываетъ необходимости широкаго развитія скотоводства

⁽¹⁾ Взглядъ на скотоводство Ферганской Области, изложенный въ этомъ очеркъ, основанъ на запискъ, составленной по этому предмету встеринарнымъ врачемъ Логиновскимъ, а также на личныхъ моихъ наблюденіяхъ.

у осъдлаго населенія. Удобреніе получается главивишимъ образомъ путемъ орошенія и затопленія полей, что отчасти даетъ возможность обходиться безъ удобренія, доставляємаго скотомъ. Раздробленность земли между отдёльными хозяйствами, при чемъ средній душевой надъль удобной земли не превышаеть 1/2 десятины, исключаеть надобность въ большомъ количествъ рабочаго скота. Воздълываемые сорта растеній: рисъ, пшеница, фруктовыя деревья и т. п. сами по себъ на столько цінны, что не представляють выгоды перерабатывать ихъ въ животные продукты путемъ скармливанія скотомъ. Наконецъ, въ Области нътъ техническихъ, сельско-хозяйственныхъ производствъ, дающихъ отбросы, пригодныя для откармливанія скота въ большомъ количествъ. По изложеннымъ причинамъ, осъдлое населеніе содержить весьма незначительное количество домашнихъ животныхъ и скотоводства, въ смыслъ разведенія скота, у него нътъ, кромъ обыкновеннаго приплода лошадей и рогатаго скота, содержащихся при домъ.

Для кочевого населенія скотъ составляєть все: молокомъ и мясомъ его кочевникъ питается, шерстью и кожей защищаетъ себя отъ непогоды, а продажею избытка, всего вмъстъ взятаго, пріобрътаетъ либо деньги на покупку хлъба, одежды и прочихъ необходимыхъ предметовъ, либо непосредственно обмъниваетъ на все необходимое для своего домашняго обихода и, наконецъ, платитъ подати. Но не смотря на это, скотоводство у кочевниковъ годъ отъ году тоже падаетъ. Количество скота уменьшается, киргизы бъднъютъ и начинаютъ переходить къ земледълію, сначала какъ къ простой поддержкъ своего хозяйства, а затъмъ уже какъ къ главному и болъе надежному средству для достиженія экономическаго благосостоянія; при полной несостоятельности дълаются настухами скота осъдлыхъ жителей.

Упадокъ скотоводства составляетъ несомнънный фактъ не только по отношенію къ киргизамъ Ферганской Области, по и по отношению къ кочевникамъ всего нашего зауралья. Причины объдненія и упадка скотоводства кочевниковъ нужно отнести къ неудовлетворительности системы скотоводственнаго хозяйства, не отвъчающей настоящимъ условіямъ экономическаго, бытового и общественнаго строя кочевниковъ. Въками сложившаяся система кочевого хозяйства основывается исключительно на величинъ занятаго кочевниками раіона, полной свободъ перекочевокъ и численности стадъ. При этой системъ не имъютъ мъста попечение, со стороны кочевниковъ, объ искусственномъ размножении и сохраненіи домашнихъ животныхъ, объ улучшеніи породъ, продуктивности скота и способахъ выгоднъйшей эксплоатаціи животныхъ продуктовъ. Доходность отъ скотоводства и благосостояніе кочевника зависять единственно отъ числепности скота.

Въ Ферганской Области, раіонъ занятый кочевниками опредъляется съ одной стороны удобными для пастьбы скота пространствами, лежащими въ окаймляющихъ долину горныхъ кряжахъ и предгорьяхъ, а съ другой—землями удобными для земледълія, занятыми осъдлымъ населеніемъ.

Въ недалекомъ прошломъ, въ скотоводственный раіонъ кочевниковъ входило большое количество земли вполнъ удобной для земледълія, принадлежащей въ настоящее время осъдлымъ жителямъ. Въ то время кочевники представляли главную экономическую и политическую силу страны, не признавая никакихъ иныхъ

правъ, кромъ права сильнаго. Всякій дефицить въ ховийствъ киргиза пополнялся барантой (грабежемъ) между осъдлыми сосъдями—сартами. Съ теченіемъ времени условія эти измънились. Возрастаніе осъдлаго населенія потребовало новыхъ мъстъ для земледълія, а высшая культурность земледъльца и большая устойчивость его экономическаго быта повели къ экономической зависимости отъ него кочевника, вмъстъ съ чъмъ и политическая сила перешла на сторону осъдлаго населенія. Прежде всего это выразилось въ переходъ болъе удобныхъ земель отъ кочевниковъ къ осъдлому населенію. Переходъ этотъ совершался путемъ разныхъ легальныхъ сдълокъ. Безпечный кочевникъ, въ глазахъ котораго земля неимъла особенной цънности, легко уступалъ свои права на нее за ничтожное вознагражденіе.

Не подлежить сомивнію, что въ самое послѣднее время, съ занятіемъ нами Ферганы, въ строй жизни кочевниковъ внесено много новыхъ началъ. Введеніе гражданскаго порядка, новыя административныя системы, понятія о правѣ, внесенныя русскимъ судомъ и властью,—все это требуетъ новыхъ приспособленій со стороны кочеваго населенія въ сферѣ экономической его жизни; но, не смотря на такое рѣзкое измѣненіе всѣхъ условій, система хозяйства кочевника остается прежняя. Она все также, какъ 100 лѣтъ тому назадъ, разсчитана на безпредѣльную свободу передвиженія стадъ и численность скота, а не на качества его и получаемые отъ него продукты, вслѣдствіе чего возвысилась бы его цѣнность.

Въ настоящее время, всё удобныя для земледёлія земли находятся въ рукахъ осёдлаго населенія и кочевники, нёкогда врёзывавшіеся съ своими стадами въ самый центръ долины, отодвинуты къ периферіи, — въ предгорья, гдв находятся ихъ зимовки. Съ наступленіемъ весны киргизы уходять съ своими стадами въ горы, гдв пасуть ихъ до поздней осени, когда снова спускаются къ долинв.

Главными мъстами кочевокъ служатъ горныя долины Алая, Чаткала, Нарына и другія. Круглый годъ скотъ содержится на подножномъ кормъ. На зиму дѣлаются лишь небольшіе запасы сѣпа и камыша только для верблюдовъ, ѣзжалыхъ лошадей и незначительнаго количества другого скота, содержимаго при зимовкахъ. Большая частъ скота зимуетъ въ поименованныхъ и другихъ горныхъ долинахъ, подъ присмотромъ остающихся тамъ на зиму пастуховъ и собакъ.

Между киргизскимъ скотомъ по численности преобладають овцы, за ними следують лошади, рогатый скоть и верблюды. Было упомянуто, что вследствіе упадка скотоводства кочевники начали заниматься хльбопашествомъ. Къ таковымъ принадлежатъ: кипчаки, каракалнаки и другіе, населяющіе по преимуществу съверныя части Наманганскаго и Андижанскаго убздовъ, у которыхъ имъются небольшіе участки земли, годной для земледёлія. Они составляють такъ называемое полукочевое населеніе. Они имъютъ постоянныя запашки, но по старымъ традиціямъ держутъ возможно большее количество скота, съ которымъ літомъ уходять въ горы, на искони опредъленныя лътпія пастбища (джайляу). Эти полукочевники служать вместе и пастухами для скота оседлыхъ жителей, отправляющихъ съ ними на пастьбу весь свой скоть, за исключениемъ дойныхъ коровъ и взжалыхъ лошадей.

Въ послъднее время замъчено, что всъ вообще ко-

чевники начали дълать посъвы преимущественно проса и ячменя, хотя въ весьма крайне ограниченномъ размъръ. Многіе видять въ этомъ желательный признакъ перехода киргизъ къ земледълію, а мы видимъ въ этомъ весьма нежелательный признакъ крайняго объдненія и разоренія хозяйства кочевниковъ.

Территорія занятая въ настоящее время кочевымъ населеніемъ, въ силу почвенныхъ и климатическихъ условій, самой природой предназначена для кочевника и его стадъ. Образчикомъ подобной мъстности, занятой киргизами, можетъ служить долина Алая, занимающая около 1680 квадратныхъ верстъ (1). Она лежитъ на высотъ отъ 8 до 11.000 футовъ н. у. м. Спътъ стаиваетъ въ концѣ мая и снова выпадаеть въ сентябрѣ, хотя неръдко и среди лъта, въ течение ночи, онъ покрываетъ поверхность земли довольно толстымъ слоемъ. Днемъ термометръ поднимается до+25°, а ночью падаетъ ниже 00. Долина Алая доступна только въ лѣтніе мѣсяцы и то путь исключительно выочный и крайне затруднительный; между тъмъ въ лътніе мъсяцы эта долина покрывается такой роскошной растительностью, что въ состояніи прокормить скоть 65.000 киргизь, кочующихъ псилючительно въ той мъстности. Подножный кормъ, пріобрѣвшій историческую извѣстность и другія условія оказываются на столько благопріятными для скота, что самыя истощенныя животныя, после несколькихъ педъль пастьбы на Алаъ, поправляются до неузнаваемости.

Алайское плоскогорье не составляетъ исключенія; такихъ горныхъ долинъ, но меньшей величины, весьма

⁽¹⁾ Туркестанскій врай, Л. Ө. Костенко. Т. І. стр. 115.

много въ горной системъ Тянь-Шаня. Очевидно, что мъстность съ таковымъ характеромъ можетъ быть эксплоатируема только путемъ скотоводства, а земледъльческая культура здъсь не можетъ имъть мъста.

Въ силу климатическихъ и почвенныхъ условій извъстныхъ мѣстностей, находящихся въ пользованіи кочевниковъ, они имѣютъ естественное право на существованіе, а скотоводство должно представлять самостоятельный видъ промышленности, подобно земледѣлію у осѣдлаго населенія.

Если признать, что упадокъ скотоводства у кочевниковъ есть результать измъненія прежняго порядка вещей, вследствіе чего старая система хозяйства оказалась непримънимой, а новая, сообразно съ нынъшними условіями, еще не выработалась, то следуеть облегчить кочевому населенію приміниться къ новымъ жизненнымъ условіямъ и выработать иную систему хозяйства. Но это нужно совершить исподволь, безъ ръзкихъ симптомовъ экономическаго кризиса и никакъ не переходомъ кочевниковъ къ земледълію и осъдлости, нотому что при этомъ въ долинъ не хватитъ мъста для хлъбопашцевъ, а скотоводство придетъ къ окончательному упадку. Уже въ настоящее время Фергана кормится баранами, пригоняемыми въ большомъ количествъ частью изъ Семиръчья, частью изъ киргизскихъ степей; слъдовательно своихъ, разводимыхъ въ предблахъ Области, оказывается недостаточно. При переходъ всъхъ кочевниковъ къ земледелію и оседлости, скотоводство окончательно погибнеть и тогда эта богатая страна, относительно скота, будеть въ полной зависимости отъ сосъдей.

Упадокъ скотоводства въ Ферганъ за послъдніе годы

не есть плодъ фантавіи и теоретическихъ соображеній, а на него указывають факты и цифровыя данныя. По отчету Туркестанскаго Генераль - Губернаторства въ 1878 г. въ Ферганской Области числилось скота:

Верблюдовъ .	16.5					38.294.
π		13311		2 3 %		213.760.
Рогатаго скота	1 (10)			N _e ero	0.	220.717.
Овенъ					0.	1.260.138.

Въ приложения ко всеподданнъйшему отчету по Ферганской Области за 1885 г. числилось:

Верблюдовъ						16.295.
Лошадей						
Рогатаго скота.				3.1	Sili	172.720.
Овецъ и козъ .	2 igu	. =	1		T2• 31	513.850.
Accommodate from the property of	1 22					

По отчету за 1888 г. числилось:

реролюдовь	•		- 55	1.0	5(0.0)	20.20
Лошадей	•			5.05	33 * 3	152.447.
Рогатаго скота.						
Овенъ и козъ				340	3	630.019.

Овенъ и козъ . .

Слъдовательно за 10 лътъ убыло: верблюдовъ-28.107, лошадей-61.313, рогатаго скота-46.321, овецъ-630.119, а всего убыло-765.860 головъ, т. е. почти половина всего скота въ Области. Стоимость всего скота въ 1878 г. оцънивалась въ 12.818.129 руб. По этому разсчету, цънность народнаго состоянія въ Области, по отрасли скотоводства, въ течение 10-ти лътъ уменьшилась на сумму около 6 милліоновъ рублей.

По офиціальнымъ свёдёніямъ, за эти 10 лётъ въ Фергант только одинъ разъ была въ $18^{81}/_{82}$ году эпизоотія чумы и падежъ скота у кочевниковъ, отъ такъ называемой безкормицы, по киргизски джютъ, велъдствіе суровой зимы. Но по тёмъ же источникамъ, отъ этихъ причинъ пало скота всего 178.000; слъдовательно убыль остальныхъ сотепъ тысячъ скота должна быть всецъло отнесена къ систематически, постоянно дъйствующимъ причинамъ, вредно вліяющимъ на скотоводство края и его производительность. Хотя означенныя цифры показывають убыль скота у кочевниковъ и осъдлаго населенія, но мы безошибочно можемъ сказать, что за исключеніемъ убыли рогатаго скота, унесеннаго у осъдлаго паселенія эпизоотіей $18^{81}\!/_{\!82}$ годовъ, вся остальная убыль должна быть отнесена на счеть скота кочеваго песеленія. По трудности добыть върныя статистическія свъдънія вообще, такъ какъ онъ собираются тузенной администраціей, мы придаемъ значеніе означеннымъ цифрамъ только въ смыслъ подтвержденія мнѣнія объ упадкъ скотоводства въ Области и неудовлетверительномъ экономическомъ положения кочеваго населения.

Вопросъ о скотоводствъ у кочевниковъ и значеніи его въ экономической жизни въ Области, по своей общирности и высокой важности, требустъ особаго всесторонняго, спеціальнаго изслъдованія, но это выходить изъ предъловъ моей программы и спеціальныхъ знаній. Но этому, ограничиваясь вышеизложеннымъ общимъ взглядомъ на распространеніе и состояніе скотоводства въ Ферганъ, скажу вкратцъ о породахъ разводимыхъ здъсь домашнихъ животныхъ и способахъ содержанія скота.

1) Лошади, по туз. ать. Для туземцевъ лошадь имъстъ весьма важное значеніе; она служить не только какъ средство для передвиженія, какъ рабочая сила въ земледъліи, но и мясо ея употребляется въ пищу, а изъ молока приготовляется любимъйшій напитокъ кочевниковъ, обладающій цълебными свойствами,—кумызъ.

Лонадиное мясо, въ особенности стараго животнаго, до того жесткое, что только киргизы, съ крвикими зубами и жевательными мускулами, въ состояніи имъ питаться. Но за то молодой жеребенокъ не можетъ сравниться по вкусу ни съ однимъ мясомъ домашнихъ животныхъ.

Лошадь составляеть самый ценный предметь въ инвентаръ туземца и служитъ внъшнимъ признакомъ благосостоянія и даже общественнаго положенія. Чемъ состоятельные и родовитые туземець, тымь лучше его верховая лошадь и богаче съдельный приборъ. Состоятельные туземцы всегда вздять верхомъ и у нихъ считается предосудительнымъ ходить ибшкомъ, даже на близкое разстояніе. Самымъ дорогимъ и почетнымъ подаркомъ въ Средней Азіи всегда считался конь. Не смотря па это, хорошихъ лонадей въ Области весьма мало. Встръчаемыя хорошія лошади обыкновенно приводятся изъ Сыръ-Дарьинской и Самаркандской Областей и, по мёсту ихъ родины, извёстны подъ именемъ: Ауліэ-атинскихъ, Ура-тюбинскихъ, Матчинскихъ и т. д. Самые ценные экземпляры, исключительно верховыхъ лошадей, получаются изъ Бухары и Туркменіи. Коневодство существуеть только у киргизъ. По свъдвніямъ отъ туземцевъ, до занятія Русскими Ферганы, у хана, бековъ и приближенныхъ къ нимъ людей имълось большое число прекрасныхъ верховыхъ лошадей и существовало ивчто въ родв случныхъ конюшень, изъ которыхъ населеніе, при извъстной протекціи и плать, могло пользоваться производителями. Дъйствительно, и въ настоящее время случается встрътить у арбакешей (возчиковъ) и другихъ туземцевъ низшаго класса, лошадей бросающихся въ глаза некоторыми статьями, указывающими на примѣсь высокой крови благородныхъ производителей. Въ нихъ проглядываетъ кровь арабская, такъ какъ эта порода, по всей въроятности, произошла отъ арабской лошади. Подтвержденіемъ этому могутъ служить иѣкоторые выдающіеся экземиляры съ прекрасной сухой головой, тонкими, но крѣпкими, какъ бы выточенными, ногами, не особенно широкой, но высокой, по длинной оси, грудью, среднимъ ростомъ и красивымъ крупомъ. При ханахъ было обыкновеніе, что богатые богомольцы, возвращаясь изъ Мекки, приводили съ собою арабскихъ лощадей въ подарокъ своему повелителю. Отъ нихъ то, въроятно, и остались эти помьси, ръзко отличающіяся отъ мѣстной породы.

Г. А. Арандаренко говорить (1), что повсемъстно, въ оазисахъ Сыра и Аму, коневодство идеть къ упадку, замътно утрачивается количество представителей наиболье типичныхъ породъ. Верховыя лошади перевелись; теперь съ трудомъ достанешь изъ Бухары за 200—300 руб. такую лошадь, которая оцънивалась прежде въ 60—100 руб.

Лошади Ферганы могуть быть разділены на 2 породы—киргизская и сартовская. Подь сартовской лошадью туземцы и живущіе здісь Русскіе разуміноть рабочую и верховую лошадь сельскаго и городскаго населенія. Мы группируємь этихь лошадей въ особую породу только въ отличіе отъ киргизской лошади и по невозможности причислить ихъ къ какой либо изъ установившихся породъ. По всему віроятію, это—помісь киргизской съ какою либо другой породой, развившейся при содійствій корма и другихъ містныхъ вліяній въ

^{(&#}x27;) Loc. cit. crp. 114.

отдъльную породу. А. ϕ .-Миддендор ϕ ъ называетъ ихъвозовыми лошадьми (1).

Сартовскія лошади не имѣютъ характерныхъ родовыхъ признаковъ и типичности, которые передавалисьбы въ поколѣніе и давали-бы основаніе для выдѣленія ихъ въ особую породу. По такому отсутствію типичности, трудно характеризовать признаки этого сорта лошадей. Въ общемъ, это — большая лошадь, выше 2-хъ аршинъ, узковатаго склада, на высокихъ ногахъ, съ пеширокою грудью, иногда съ прекрасной прямой легкой головой, нерѣдко съ горбатой и тяжелой, съ весьма разнообразной постановкой головы и шеи, слабымъ задомъ и поясницей, широкимъ пахомъ, тонкой кожей, съ гладкой шерстью, жидкимъ хвостомъ и гривой. По складу лошадь средняя между верховой и упряжной, какъ это впрочемъ и требуется родомъ ея работы.

Тлавный недостатокъ сартовской лошади составляють порочныя ноги и копыта; рѣдко можно встрѣтить лошадь съ крѣпкими и правильными ногами. Особенно часто встрѣчаются хроническія заболѣванія скакательнаго сустава, извѣстнаго подь общимъ названіємъ шпата. Этотъ важный педостатокъ сартовскихъ лошадей, въ значительной степени обусловливается способомъ запряжки, практикуемой у туземцевъ. У туземной телѣги, двухколесной арбы, колеса имѣютъ сажень въ діаметрѣ; накатъ такихъ колесъ очень великъ. На арбу кладутъ обыкновенно грузъ отъ 25—30 пудовъ. При спускѣ съ горы отъ лошади требуются громадныя усилія и упоръ погами, тѣмъ болѣе, что вся тяжесть при этомъ держится на одномъ черезсѣдельникъ, такъ какъ шлея пе употребляется. Тоже можно сказать и при подъемахъ, когда

^{(&#}x27;) Loc. cit. crp. 277...

платформа арбы перетягивается назадъ и поднимаетъ оглобли, которыя соединены неподвижно съ арбою. По перовной дорогѣ, массивная арба съ грузомъ, разсчитаннымъ при укладкѣ на равновѣсіе, по обѣ стороны оси, толстыми оглоблями толкаетъ лошадь изъ стороны въ сторону, при чемъ удары не ослабляются короткими, не представляющими никакой упругости, гужами, вслѣдствіе чего лошадь весьма скоро разбивается на ноги.

Между сартовскими лошадьми различають кокиндскую лошадь, выдъляемую нъкоторыми даже въ особую породу. Эта возовая лошадь, встръчаемая въ Кокандъ и другихъ большихъ городахъ, отличается крупнымъ ростомъ и большею массивностью, по пе имъетъ никакихъ признаковъ для выдъленія ея въ особую по-

роду.

Киргизская лошадь Ферганы должна быть несена къ той многочисленной расст носящихъ это названіе лошадей, къ которой принадлежать лошади киргизъ степей Урала, Западной Сибири и мъстностей занятыхъ Тургайской, Семиръченской и Сыръ-Дарьинской Областями. Какъ ни велика на первый взглядъ разница между рослымъ конемъ, кочующимъ въ мъстноети, прилегающей къ съверо-восточному углу Каспійскаго моря, Адаевскаго киргиза и маленькимъ пони, такъ называемой Кашгарской лошадью, встръчаемой у киргизъ предгорій Алая, но несомитино, что они принадлежать къ одной рассъ и разница между отдёльными сортами киргизской лошади обусловливается только разницею топографическихъ, климатическихъ и другихъ условій, весьма разнообразныхъ на огромномъ пространствъ ел распространенія. Общіе признаки киргизской лошади Ферганы можно очертить такъ: лошадь небольшая, не выше двухъ аршинъ, длинная, на соразмърно невысокихъ ногахъ, съ короткой спиной, кръпкой, горбатой поясницей, широкой емкой грудью, сухой пропорціональной головой, толстой кожей, съ грубой шерстью, густымъ хвостомъ и гривой. (2-хъ аршинъ 2-хъ верш. роста киргизскія лошади досгигаютъ весьма ръдко).

Отъ степныхъ киргизскихъ лошадей, которыя болье общеизвъстны, горная киргизская лошадь Ферганы отличается большею сухостью, легкостью склада и между ними часто встръчаются лошади замъчательно красивыхъ формъ. Какъ у сартовской лошади главный недостатокъ составляютъ порочныя поги и копыта, такъ у киргизской лошади главное достоинство въ безукоризненныхъ ногахъ и обыкновенно кръпкихъ копытахъ. Переднія ноги очень прямы, съ длиннымъ подплечіємъ и короткимъ берцомъ, что обусловливаетъ большой захвать, бабка короткая и хорошо поставленная, копыто очень хорошее и кръпкое. Киргизы никогда не куютъ своихъ лошадей, но разъ она была подкована, то копыта утрачивають свои свойства обходиться безъ ковки. Ноги вообще бывають очень сухи и средней толщины. Сухожилія очень ясно отдёляются на берці. Заднія ноги большею частью бывають прямы и редко саблей, по при томъ не очень кривы; поставлены бываютъ очень хорошо, — не вывернуты и не косолапы. Задъ широкъ, иногда съ очень выпуклыми ягодицами и чрезвычайно кръпкій.

Въ горахъ, гдѣ пѣтъ колеснаго пути, киргизская лошадь служитъ подъ верхомъ и выокомъ, при чемъ необыкновенно свободно ходитъ по каменистымъ тро-

пинкамъ, опаснымъ кручамъ и карпизамъ, и, если у нихъ не испорчены поги и онъ не изнурсны до крайности, то очень ръдко спотыкаются. Нужно хоть разъ побывать въ тъхъ мъстахъ, чтобы оцънить достоинство этой лошади, которой внолиъ ввъряешь свою жизнь.

Въ долинъ киргизская лошадь обращается въ прекраснаго возовика, свободно везущаго по ровной дорогъ 50—60 пудовъ груза. Вьючный грузъ лошади равпяется 8 пудамъ, но на высокихъ горахъ и перевалахъ

на нее выочать только 4 пуда.

Киргизская лошадь отличается особенною собранностью и легкостью движеній на всёхъ аллюрахъ. Шагомъ киргизскія лошади ходятъ прекрасно и иногда весьма быстро. Восемь версть въ часъ не считается особенно быстрымъ шагомъ. Иногда вмёсто шага бываетъ родъ ипоходи, когда ноги одной стороны почти одновременно становятся на землю (но все-же задияя пога прежде передней); этотъ аллюръ здёсь называется "ходою". Онъ не такъ покоенъ, какъ простой шагъ, но все же гораздо пріятнёе, чёмъ небольшая рысь, которая, впрочемъ, у киргизскихъ лошадей весьма мягкая. Встръчается также много иноходцевъ съ очень сильнымъ и иногда даже замѣчательнымъ бѣгомъ; такія лошади проходятъ версту въ 11/2 минуты.

Иногда рысь у киргизскихъ лошадей бываетъ очень быстра. Не трудно найти такихъ лошадей, которыя, будучи выъзжены въ упряжь, сдълають въ одиночку

версту въ $2^{1}/_{2}$ минуты (1).

Растянутый галопъ у киргизской лошади тоже очень покоенъ. Быстротою скачки киргизскія лошади

^{(&#}x27;) Туркестанскій край. Л. Ө. Костенко. Т. ІІІ. стр. 108.

пе отличаются, по переносять труды съ особенною легкостью, будучи въ состояніи пробътать огромныя прсстранства безъ корма, воды и отдыха. Бывають примъры, что лошади этой породы, пробъжавъ такимъ образомъ сто верстъ, не погибаютъ. Какъ примъръ особенно замъчательный по быстрой ъздъ можно привести слъдующій (1): послъ сраженія при Чупанъ-Ата, подъ Самаркандомъ, въ 1868 г. былъ посланъ въ Ташкентъ джигитъ, доъхавшій туда въ сутки, сдълавъ на одной лошади, молодомъ четырехъ или пятилътнемъ жеребцъ, около 280 верстъ.

Киргизскія лошади вполив пригодны какъ для кавалеріи, такъ и для артиллеріи. Л. Ө. Костенко говорить (1): "Киргизскія лошади не нуждаются въ опытахъ для того, чтобы быть допущенными въ нашу армію, гдв почетное мвсто и безъ того должно принадлежать имъ по праву, -- онъ взяли его съ бою. Не забудемъ, что на этихъ лошадяхъ покорены и умиротворены Коканъ, Бухара и Хива; что на нихъ служитъ въ Средней Азіи вся наша конница, вся артиллерія, почти всъ начальники и офицеры; что ни одно движение не совершилось безъ того, чтобы всв предварительныя сведения не были собраны на этихъ же лошадяхъ, при чемъ имъ неръдко приходилось дълать по 200 версть въ сутки; что, наконецъ, вев безъ исключенія молодецкіе походы, упрочившіе за ними господство въ Средней Азіп, сдъланы исключительно при помощи этихъ лошадей".

Коневодство у киргизъ исключительно косячное; на 15—20 матокъ въ косякъ придаютъ одного жеребца. Жеребята оставляются подъ матками не долъе 10 дней,

^{(&#}x27;) Тамъ-же. стр. 124.

а затыть отнимаются отъ нихъ. Матки ежедневно доятся 3 раза въ день и молоко идетъ на приготовленіе кумыза. Передь началомъ доенія кобылъ, жеребята припускаются на нъсколько минутъ къ маткамъ, а остальное время кормятся травой. Раннее отнятіе жеребять служить причиною большой смертности между ними, въ нервомъ возрасть и задерживаеть ихъ развитіе. Ъздить на жеребятахъ начинають очень рано, на 2-мъ году.

Лошадь у киргизъ содержится круглый годъ на нодножномъ кормъ. Забота кочевника о прокормленіи табуна, выражается единственно въ перегонкъ его съ вытоптаннаго и выбитаго мъста на свъжее пастбище.

Въ послъднее время, съ уменьшениемъ численности табуновъ, киргизы, наученные горькимъ опытомъ, начали понемногу заготовлять съно на зиму. Вообще зимою лошади сильно истощаются отъ недостатка кориа; но весною, съ новою травою, необыкновенно быстро поправляются. Въ суровыя, снъжныя зимы, при плохомъ урожав травъ предшествовавшаго лъта, лошади не выдерживаютъ безкормицы и падаютъ отъ изнуренія.

У осъдлаго населенія лошади пользуются хорошимъ содержаніемъ и внимательнымъ уходомъ. Въ кормъ дають люцерну, ячмень и джугару (Sorghum cernuum). Разница въ пищевомъ отношеніи между джугарой и ячменемъ не выяснена, ни практикою, ни научнымъ путемъ. Преобладающимъ верновымъ кормомъ служитъ ячмень, по въ отдъльныхъ мъстностяхъ, гдъ распространены посъвы джугары, кормятъ послъднею. Суточная дача рабочей лошади у сартовъ 3—4 снопа люцерны (18—25 фунтовъ) и отъ 7—10 фун. ячменя. Джугары даютъ до 15 фунтовъ, уменьшая соотвътственно дачу люцерны.

Нъкоторые туземцы дають лошади въ сутки 15 ф.

люцерны,—15 ф. мелкой соломы (саманъ), 10 ф. зерна и кусокъ соли. По ихъ мивнію, одна люцерна безъ соломы ділаеть лошадь безсильною и развиваеть разныя болізни.

Оба означенные сорта зерноваго корма лошадей, въ пищевомъ отпошеніи, стоятъ ниже овса, въ особенности въ отпошеніи усвоенія организмомъ, по послѣдній въ здѣшнемъ краѣ вовсе не употребляется.

Зерна кукурузы, содержащія питательныхъ веществь болье, нежели овесь на $10^{\circ}/_{\circ}$ (по Вольфу), могуть идти въ кормъ лошадямъ, но въ Ферганѣ этотъ кормъ не въ употребленіи. Встеринаромъ докторомъ Клейномъ въ Берлинѣ, замѣчено, что рабочія лошади, вскормленныя кукурузою взамѣнъ овса, держали лучше тѣло, уставали гораздо рѣже, а послѣ работы казались бодрыми, питаніе мускуловъ было замѣтно лучше, волосъ отличался гладкостью, глянцевитостью и сравнительной короткостью, даже зимою. Кромѣ того кормленіе кукурузой оказывало благопріятное вліяніе на здоровье лошадей; колики были рѣже, чѣмъ при кормленіи овсомъ и смертность отъ этой болѣзни была гораздо меньше (1).

По сосъдству съ Ферганой, въ Кашгаріи, какъ уже было упомянуто выше, кукуруза употребляется въ кормъ лошадямъ. При движеніяхъ въ высокихъ горахъ какъ выочнымъ, такъ и верховымъ лошадямъ туземцы даютъ по пемногу кукурузы. Вообще слъдуетъ ее задавать лошадямъ нъсколько меньше ячменя и непремънно раздробленною, такъ какъ выяснено, что цъльныя зерна производятъ различнаго рода разстройства пищеварительныхъ

⁽¹) Земледъльческая газета 1876 г. № 28.

органовъ; а съ другой стороны, слишкомъ измельченная въ муку, обращается въ кишкахъ животнаго въ плотные, липкіе комки, вслъдствіе чего происходять запоры.

Состоятельными туземцами держутся еще лошади особой породы-карабаиры, какъ парадныя лошади, исключительно для верховой фады. Онф адфеь не разводятся, а получаются изъ Бухары. Эта порода произошла отъ помъси аргамака съ киргизской лошадью. Карабаиръ отличается наилучшими скаковыми качествами, физической крипостью, выновливостью, способностью къ большимъ и продолжительнымъ передвиженіямъ. Лучшія скаковыя лошади этой породы проходять четырехверстный кругь ипподрома въ 6 минутъ, сохраняя способность скакать и на 30 верстъ. Онъ способны проходить подъ верхомъ 100 верстъ въ день, съ небольшими отдыхами для разстояній въ 1000-1500 версть. Не обладая способностью бъга рысью, карабаиры имъютъ правильный галопъ и часто большой шагъ, до 91/2 версть въ часъ. Лошади съ аллюромъ, называемымъ здѣсь хода (юрга), т. е. особенной иноходью, развивающейся у нъкоторыхъ до способности бъга, дълають по 16 версть въ часъ (1).

Порода *аргамакъ*, по мнѣнію туземцевъ, здѣсь вовсе нѣтъ. Аргамаки, или иначе туркменскія лошади, происходять отъ арабскихъ.

Какъ особенность въ содержаніи туземцами лошадей, можно отмѣтить общераспространенный обычай покрывать ихъ попонами. При дальнихъ переѣздахъ и во время работъ, задъ лошади всегда покрытъ попоной. По возвращеніи лошади съ работы самый бѣднѣйшій сартъ покрываетъ всю лошадь попоной, а за

⁽¹⁾ Г. А. Арандаренко. Loc. cit. crp. 122.

неимъніемъ ее, какой либо трянкой, а то халатомъ. Чъмъ большую цънность представляетъ лошадь, тъмъ съ большей тщательностью она кутается попонами. Кажется, обыкновеніе это вытекаетъ изъ необходимости предохранить лошадь съ одной стороны отъ палящихъ лучей солнца, а съ другой—отъ вліянія ръзкой разницы между температурой дня и ночи.

Нельзя не упомяпуть, что состоятельные и знатные сарты, какъ при ханахъ, такъ и въ настоящее время, не вздятъ ни рысью, ни карьеромъ, такъ какъ эти аллюры не согласуются съ ихъ достоинствомъ и солидностью. Быстрая взда, но ихъ мивнію, прилична только джигитамъ, почтарямъ и прочему мелкому люду; поэтому туземцами такъ и цвнятся ходистыя лошади (юришликъ). Этотъ аллюръ весьма покоенъ для всадника, потому что центръ тяжести животнаго переносится впередъ, почти въ горизонтальномъ направленіи, а твмъ не менве лошадь идетъ довольно быстро. Ходистая лошадь обыкновенно идетъ ходой отъ 10—11 верстъ въ часъ, но встрвчаются, какъ было сказано, которыя дълаютъ до 16 верстъ.

Сартинки самостоятельно не вздять верхомъ, а обыкновенно садятся верхомъ позади мужчины и держутся за послъдняго. Киргизки большею частью—лихія навздницы и не уступають въ этомъ мужчинамъ. Вздять онъ исключительно верхомъ по-мужски и о женскихъ съдлахъ не имъютъ понятія.

Мужчины и женщины осъдлаго населенія ъздятъ тоже на арбъ, въ которую обыкновенно запрягается одна лошадь. На арбу садится 4—6 человъкъ, поджавши ноги.

Цена обыкновенной лошади въ среднемъ отъ 20-40

рублей. За кровныхъ карабаировъ и друг. цъпа иногда возрастаетъ до 300 рублей.

Рогатый скоть. Относительно происхожденія рогатаго скота, разводимаго по системамъ ръкъ Аму и Сыръ-Дарьи, а слъдовательно и Ферганской Области, существують два мижнія: одни признають его за киргизскій скоть, а другіе склонны считать его происхожденіе съ юга, отъ скота индъйскаго и персидскаго, признавая родоначальникомъ его зебу. А. ф.-Миддендорфъ (1) полагаеть, что ферганскій скоть принадлежить къ киргизской породъ, только иначе развившейся, велъдствіе условій кормленія. Въ среднихъ переходныхъ формахъ нътъ недостатка. Но при этомъ нельзя не замътить, что и противоположное мнѣніе имѣетъ свои основанія. Дъйствительно, въ массъ скота несомнънно киргизской породы попадаются отдёльные экземпляры и цёлыя группы скота съ признаками, указывающими на иное происхожденіе. Весьма возможно, что древнъйшіе аборигены-таджики, принадлежащие къ иранскому племени, въ глубокой древности, переселившись съ юга, привели съ собою скотъ индъйской рассы и только въ послёдствіи, въ силу историческихъ и экономическихъ причинъ, получила преобладание киргизская порода позднъйшихъ пришельцевъ тюрко-монгольскаго племени.

По вышеизложеннымъ сельско-хозяйственнымъ условіямъ, а отчасти по бытовымъ, рогатый скотъ не имъетъ того первенствующаго значенія въ сельскомъ хозяйствъ Области, какое принадлежитъ ему въ земледъліи другихъ странъ. Осъдлое населеніе содержитъ самое ограниченное количество дойнаго и рабочаго скота.

Содержаніе рогатаго скота крайне неудовлетвори

⁽⁴⁾ Loc. cit. crp. 290.

тельно. На долю коровъ въ Ферганъ выпадаютъ лишь остатки и отбросы, которыхъ въ экономномъ хозяйствъ сартовъ весьма не много, а потому эти коровы имъютъ жалкій, несчастный видъ. Подчасъ, одолъваемыя голодомъ, онъ питаются конскихъ навозомъ. Само собою понятно, что при подобномъ кормѣ здѣшнія коровы малосильны и дають незначительные удои молока. Хотя скотъ ежедневно выгоняется въ поле, но это дълается скорте въ силу традицій, нежели для дъйствительной надобности. Вокругъ оазисовъ, представляемыхъ кишлаками, съ прилегающими къ нимъ воздъланными полями и садами, лежить мертвая, выжженная солицемъ пустыня, которая и служить для скота містомь выгона, гдъ только ранней весной онъ находить ръдкіе побъги полыни, колючки и другихъ сорныхъ травъ. Рабочій скотъ, при первой возможности, отправляется на пастьбу къ киргизамъ, или на собственныя урочища, лежащія за десятки версть оть осбдлыхъ пунктовъ, въ предгорьяхъ. Не удивительно, что при такомъ содержаніи дойная корова сарта кажется теленкомъ и выродилась до трудно распознаваемаго въ ней типа киргизскаго скота.

Если бы туземцы стали побольше свять кукурузы, тогда опи въ побочномъ продуктъ пріобръли бы кормъ для своего скота. Извъстно, что заквашенные стебли кукурузы составляютъ превосходный и питательный кормъ для рогатаго скота и овецъ (¹). Съ десятины засъянной кукурузой, при среднемъ урожав, получается до 3000 пуд. стеблей съ листвой. Во Франціи приготовленіе квашенаго корма получило большое распространеніе, въ южной Россіи тоже начинаютъ его употреблять, а по-

⁽¹⁾ Г. А. Арандарсико. Loc. cit. стр. 322.

тому желательно, чтобы оно привилось и въ здѣшнемъ краѣ, такъ какъ примѣненіе его на практикѣ принесло бы неоспоримую пользу въ туземномъ хозяйствѣ. Слѣдовало бы испробовать заквашиваніе стеблей и листьевъ джугары, которые тоже быть можетъ оказали бы услугу въ этомъ дѣлѣ.

При удовлетворительномъ уходѣ и содержаніи, мѣстный скотъ проявляетъ всѣ признаки хорошаго, молочнаго скота. Лучшіе экземпляры мѣстныхъ коровъ, содержимые русскими, даютъ до ведра молока. Телята, рожденные отъ содержимыхъ русскими коровъ, оказываются гораздо болѣе рослыми своихъ матерей; изъ пихъ всегда выходятъ хорошія дойныя коровы.

Было уже сказано (1), что коровы, кормленныя мукой изъ съмянъ хлопчатника, даютъ молоко, изъ котораго получается прекрасное масло. Здъсь это еще не практикуется, не смотря на то, что этихъ съмянъ такъ много и они столь дешевы, что употребляются на топливо.

Мъстныя коровы отличаются еще тою особенностью, что доятся только въ присутствіи своего теленка, еслиже послъдній падаеть, или будеть заръзань, то въ большинствъ случаевъ матки перестають давать молоко; вслъдствіе этой причины, здъсь трудио имъть къ столу хорошую, молодую телятину, если-же продають въ мясныхъ лавкахъ телятину, то она почти что отъ годовалаго теленка.

Рогатый скоть у киргизъ отличается отъ киргизскаго скота другихъ мъстностей меньшимъ ростомъ и болъе легкими формами, въ чемъ выразилось вліяніе

^{(&#}x27;) См. Флора. стр. 256.

горныхъ пастбищъ. У пихъ тоже преобладаетъ скотъ слабый и жалкій на видъ, чему способствуєть какъ недостатокъ корма въ теченіе зимняго времени, такъ и то, что онъ долженъ служить поперемѣнно то вьючнымъ, то верховымъ животнымъ. Содержится у нихъ рогатый скотъ круглый годъ на подножномъ кормѣ, какъ и весь остальной скотъ кочевниковъ.

Пи сарты, ни киргизы не откармливаютъ рогатаго скота, а потому трудно судить о продуктивности его какъ убойнаго скота.

Туземцы весьма рѣдко употребляютъ въ пищу мясо рогатаго скота, которое почти исключительно идетъ на продовольствіе войскъ и русскихъ жителей. На бойни г. Н. Маргелана, въ которомъ главнымъ образомъ сосредоточено русское паселеніе и войска, скотъ пригоняется изъ Ошскаго уѣзда, и Каратигена, а также изъ г. г. Коканда и Стараго Маргелана. На базары поступаютъ преимущественно негодные къ работъ быки и нетельныя коровы окрестныхъ кишлаковъ. Послѣдняго рода убойный скотъ даетъ весьма плохое мясо и при томъ часто бываетъ заражено паразитными болѣзнями, преимущественно глистами печени и финами (Hydatidosis cellulosae. Cysticercus taeniae mediocanellatae).

Цвна на говядину въ Н. Маргеланв отъ 1 р. 40 к. до 2 рублей за пудъ; сало говяжье 2 руб. 80 коп. до 3 р. 60 к. за пудъ; кожи отъ 1 руб. 50 к. до 3 руб. за штуку; масло коровье не топленое 5—6 руб. за пудъ, топленое—7—8 руб. Скопы масла двлаются преимущественно киргизами. Въ маслъ почти постоянно встръчается примъсь сала.

Корова стоитъ 12—20 рублей, рабочій воль 18—30 рублей.

Якт, или длиношерстный быкъ (Bos grunniens), по Брэму, Роёрhagus grunniens, по туз. кутасъ. Родина его, кажется, Тибетъ, по разводится въ незначительномъ количествъ киргизами на Алаъ и Намиръ, которые составляютъ съверо-западную границу его распространенія (1). Онъ не переноситъ жаровъ, а потому не можетъ жить ниже 8000 ф. н. у. м.

Многіе зоологи относять его къ буйволамъ, но Н. А. Съверцовъ (2) говоритъ, что по оригинальному сочетанію признаковъ, яка пельзя отнести ни къ буйволамъ, ни къ быкамъ, ни къ зубрамъ, ни къ овцеводамъ, всего върнъе составить для него особый пятый родъ въ семействъ быковъ.

Это весьма драгоцѣнное животное для горпыхъ высотъ, гдѣ онъ замѣняетъ и быка, и лошаь, и верблюда. На перевалахъ выше 17.000 ф. лошадь, уже не въ состояніи нести выока, а якъ свободно съ нимъ веходитъ на гору, не смотря на значительное разряженіе воздуха. Кромѣ того, когда дорога и переваль покрыты глубокимъ снѣгомъ, такъ что лошади не въ состояніи пройти, то киргизы отправляютъ впередъ яковъ, которые протаптываютъ дорогу, послѣ чего могутъ двигаться и лошади.

Якъ доставляетъ мясо, которое отъ старыхъ животныхъ очень жесткое, но отъ молодыхъ, годовалыхъ весьма вкусное. Молоко не можетъ сравниться ни съ однимъ изъ домашнихъ животныхъ,—это настоящія сливки. Изъ молока дълають сыръ, употребляемый кочевниками Памира и Алая.

Киргизы разсказывають, что корка на этомъ сыръ

⁽¹⁾ Путешествіе въ Туркестань, А. П. Федченко. Т. І. Ч. П. стр. 159.

⁽²⁾ Путешествіе по Туркестанспому краю, стр. 359.

отъ времени дълается на столько кръпкой и властичной, что горцы иногда дълаютъ изъ нее подковы, которыя могутъ выдержать нъсколько дней ъзды по камнямъ. Что корка кръпкая, до невозможности ее разжевать,— это фактъ; что-же касается до дъланія изъ нее подковъ, то не могу за это ручаться, такъ какъ киргизы весьма часто угощаютъ насъ гиперболическими разсказами.

Шерсть у яка длиниая, черная, нъсколько грубъе, но киргизы ее стригутъ. Хвостъ какъ у лошади, но волосъ тоньше конскаго; онъ продается китайцамъ и идетъ у нихъ для кистей на шапки и для опахалъ. Цънится очень дорого.

Голосъ у яка не похожъ ни на мычаніе быковъ, ни на блеяніе овецъ, ни на ржаніе лошадей; его можно сравнить только съ хрюканьемъ свиньи, хотя звуки издаваемые якомъ нѣсколько глуше и однообразнѣе послѣдней.

Овиры, по туз. баранъ—кой, овца—саглыкъ. Овцеводство составляетъ не только важнъйшую отрасль скотоводства Области, но имъетъ большое значение въ экономическомъ отношении вообще, такъ что овца все еще служитъ мъновой единицей въ киргизской торговлъ. На нихъ киргизъ вымъниваетъ все необходимое для существования, но, какъ было уже упомянуто, что скотоводство, а также овцеводство сильно падаетъ.

Баранина составляетъ почти исключительную мясную пищу населенія. Бараньи шкуры выдѣлываются на тулупы и полушубки, а изъ бараньихъ кожъ приготовляется общераспространенная здѣсь обувь (ичиги) и выдѣлывается особый родъ замши, идущей на приготовленіе чамбаръ (шароваровъ), которые приняты и въ войскахъ Туркестанскаго Округа. Шерсть служитъ для

наласовъ, кошемъ, войлочныхъ шляпъ, каповъ (мѣшковъ), куржумовъ (переметныхъ сумъ), аркановъ и т. п. У кочевниковъ изъ кошемъ сдѣлана юрта, въ которой они живутъ; словомъ, для кочевника бараны доставляютъ пищу, одежду и жилище.

Овцеводствомъ занимаются только кочевийки. Осъдлое население является потребителемъ и отчасти кустаремъ по отношению сырья, доставляемаго кочевниками.

Мъстныя овцы принадлежать къ курдючной, киргизской породъ.—Ovis aries steatopyga. Отличительные признаки ихъ-крупный ростъ, красно-бурая шерсть, висячія уши, горбатая голова и толстый жирный хвость, въсящій свыше полнуда. Среди этихъ овецъ встръчаются тоже черныя, былыя и пыгія, что указываеть на помъси. Большая продуктивность сала и мяса составляетъ достоинство киргизскихъ овецъ, а грубая шерстьихъ недостатокъ. Содержатся овцы, какъ и остальной скотъ кочевниковъ, весь годъ на подножномъ кормъ. Овчарень и другихъ закрытыхъ помѣщеній для овецъ не устраивается. Зимою на ночь отары загоняются въ какую нибудь ложбину, пещеру, или подъ выступъ скалы. Отъ зимней безкормицы овцы сильно худъютъ и нъкоторый проценть болье слабыхъ всегда къ веснъ падаеть отъ истощенія. Въ суровыя, ситжныя вимы, особенно при гололедицъ, овцы падаютъ отъ недостатка корма десятками тысячъ.

Киргизы тщательно наблюдають, чтобы овцы ягнились къ веснѣ, съ наступленіемъ тепла и кормовъ. Ягнята остаются при маткахъ до 3-хъ недѣль, а затѣмъ насутся отдѣльно. Матки доятся два раза въ сутки. Молоко овецъ составляетъ весьма важный предметъ пищи для кочевника, но не употребляется въ сыромъ видѣ, а всегда особеннымъ способомъ заквашивается, при чемъ получается продуктъ, называемый катыкъ. Изъ молока овецъ, съ прибавленіемъ коровьяго и козьяго, приготовляется киргизами твердый и кислый сыръ, называемый крутъ, о которомъ будетъ сказано въ отдѣлѣ о пищѣ. Другой сортъ сыра, называемый еремчикъ, сладковатаго вкуса употребляется въ видѣ лакомства съ чаемъ, или послѣ пищи.

Стригуть овець два раза въ годъ весною и осенью. Отъ старыхъ овецъ получается шерсти около 3 фунтовъ, а съ молодыхъ около 2-хъ фунтовъ. Овцеводство Области далеко не удовлетворяетъ мъстныхъ потребностей и значительное количество овецъ пригоняется изъ Семиръченской и Сыръ-Дарьинской Области, а иногда изъ Западной Сибири. Въ 1885 г, по офиціальнымъ свъдъніямъ, изъ Ауліэ-атинскаго уъзда Сыръ-Дарьинской Области, а также изъ Върненскаго и Токмакскаго уъздовъ Семиръченской Области пригнано барановъ въ Фергану 276.983 головъ.

Въ началъ лъта, закупленныя крупными промышлениками въ означенныхъ мъстностяхъ отары овецъ, черезъ перевалы Чаткальскаго хребта, спускаются въ долину и здъсь раскупаются по частямъ болъе мелкими торговцами, служа до поздней осени предметомъ торговыхъ спекуляцій на всъхъ базарахъ Области. Цъны на барановъ въ теченіе года весьма различны. Лътомъ изъ первыхъ рукъ покупаются отъ 3 руб. 50 к. до 5 руб., а весною тъже бараны, хорошо кормленные въ теченіе зимы, такъ называемые бурдаки, стоятъ 12, 15 даже 20 рублей за голову. Такое колебаніе цънъ обусловливается тъмъ, что изъ первыхъ рукъ, отъ кочевниковъ, можно купить барановъ только лътомъ и раннею осенью;

зимою и весною киргизы не продають барановъ, да и покупать нътъ разсчета, вслъдствіе крайней худобы ихъ отъ недостатка корма. Такимъ образомъ весной и зимой на базары поступають только бараны откармливаемые промышленниками, мъстными жителями, имъющими болъе или менъе значительную запашку земли. По условіямь мъстнаго хозяйства, о которыхъ сказано выше, прокормить зиму барана стоить такъ дорого, что цёна на него къ веснъ возвышается до означенныхъ размъровъ. Туземцы отъ барана требуютъ кромъ мяса еще значительнаго количества сала, а потому по пригонъ ихъ въ долину откармливаютъ люцерной съ прибавленіемъ жмыховъ. Курдючный баранъ, хорошо откормленный, цаеть сала по въсу столько, сколько и мяса, а при хорошихъ условіяхъ даже и больше. Обыкновенная цъна баранины на базаръ около 5-ти копъекъ за фунть и всегда она выше, чемъ говядины, на которую меньше спроса.

Нужно замѣтить, что здѣшняя баранина вкуснѣе, нежели въ Россіи и другихъ странахъ. Многіе Русскіе, не употреблявшіе прежде баранины, по прибытіи въ здѣшній край ѣдять ее наравнѣ съ говядиной. А. Вамбери говорить (¹): "мясо здѣшней овцы я нахожу лучше и вкуснѣе, чѣмъ въ другихъ извѣстныхъ мнѣ частяхъ Азіи. Съ нимъ не можетъ сравняться въ этомъ отношеніи ни столь извѣстный въ Турціи кивидржикъ и караманъ, ни даже южно-персидская овца, которою такъ особенно гордятся персы".

По климатическимъ условіямъ Ферганы возможно тонкорунное євцеводство, но для этого иѣтъ предпріим-

⁽¹⁾ Очерки Средпей-Азін. А. Вамбери. 1868 г. стр. 233.

чивыхъ людей среди туземцевъ, желающихъ воспользоваться разведеніемъ тонкорунныхъ овецъ. Принято поступать такъ, какъ поступали ихъ дъды и отцы.

Козы (Capra hircus), по туз. козель—теке, коза—ичке. Онѣ не составляють самостоятельной отрасли скотоводства, а какъ-бы побочную вѣтвь овцеводства. При каждомъ стадѣ овецъ держатся козы, которыя служать путеводителями этихъ стадъ. Бѣднѣйшіе изъ кочевниковъ, при ограниченномъ количествѣ другаго скота, содержатъ преимущественно козъ, по ихъ неприхотливости къ корму и выносливости; но сарты, занимающіеся древоразведеніемъ, избѣгаютъ этихъ исгребительницъ древесной растительности.

Козы доставляють мясо, молоко, шерсть и весьма ценный пухь. Мясо употребляется только киргизами; но изъ молодаго козленка, вымоченнаго предварительно въ уксусе, получается вкусное жаркое. Изъ кожъ выдёлываются тёже предметы, какъ изъ бараньихъ, но онё прочнёе и цёнятся выше бараньихъ. Изъ цёлыхъ шкуръ козловъ киргизы дёлають особаго рода мёшки (турсуки), въ которыхъ держатъ воду при переёздахъ. Въ нихъ приготовляютъ и сохраняютъ кумызъ; эти же турсуки употребляются и при переправахъ, какъ объ этомъ было сказано выше.

Средне-азіатскія козы имѣютъ большое сходство съ тибетскими, но только выше и крѣпче ихъ. Тонкорунныхъ ангорскихъ и кашмирскихъ козъ вовсе не разводятъ въ Ферганѣ, не смотря на то, что послѣднія живутъ въ сосѣдствѣ, а потому могли упрочиться здѣсь, принося неизчислимыя выгоды. Я говорю, что кашмирскія козы живутъ въ сосѣдствѣ, потому что Форсайтъ выяснилъ намъ, что родина этихъ козъ не Гималай, а

съверные склоны высокихъ плоскогорій, которые ограничивають съ юга примыкающій къ Ферганъ бассейнъ Тарыма. Кашмиръ служитъ лишь мъстомъ сбыта и пе-

реработки шерсти (1).

Верблюды, по туз. тюя, разводятся въ Средней Азіи повсемѣстно и представляютъ собою животныхъ на сколько безобразныхъ, на столько полезныхъ, такъ какъ безъ нихъ не могли-бы поддерживаться торговыя сношенія съ странами, отділенными обширными песчаными пустынями. Не смотря на то, что они глупы, вздорны, упрямы, а подчасъ свиръпы, кочевники съумъли ихъ обуздать и подчинить своей воль, такъ что пользуются ими въ широкихъ размърахъ какъ средствомъ для передвиженія, такъ и для транспортированія тяжестей. Послёднее производится главнымъ образомъ навьючиваніемъ на верблюда, но иногда ихъ впрягаютъ въ арбу и даже въ дорожные тарантасы. Нужно при этомъ замътить, что у здёшнихъ верблюдовъ нётъ ни столько хитрости, ни злости, сколько у аравійскихъ верблюдовъ, но за то они уступають въ силв и быстротв последнимъ и именно-геджацкой породъ. Верблюды устають не скоро, но если отъ тяжести ноши устанутъ, то нътъ возможности поднять ихъ съ мъста и приходится бросить на дорогв.

Обыкновенно на верблюдъ ъздятъ верхомъ, но для непривычнаго, это самое ужасное верховое животное, какое только можно себъ представить. При его неуклюжей походкъ иноходью, всаднику приходится качаться совершенно особеннымъ образомъ сверху внизъ, а также взадъ и впередъ, что производитъ тошноту, рвоту, головокруженіе,—словомъ, морскую бользнь. При бы-

⁽¹⁾ А. ф.-Миддендорфъ. Loc. cit. стр. 297.

строй вздв рысью, качка въ сторону прекращается, а потому легко переносится всадникомъ; но верблюжій галопъ еще невыносимве, чвит походка шагомъ и при этомъ непривычный вздокъ большею частью падаетъ съ свдла на землю.

Верблюды плохо плавають, а потому не могуть быть употребляемы при переправахъ черезъ глубокія ръки.

Неприхотливость верблюдовъ къ корму общеизвъстна. Они фдять такія степныя растенія, до которыхь лошади и не дотронутся и довольствуются самою скверною водой. Но верблюды весьма чувствительны къ холоду и особенно вредно вліяеть на нихъ дождь, снъть и вообще всякая влажность; кром'в того, верблюдъ не можеть, подобно копытнымъ животнымъ, добывать зимою кормъ изъ подъ снъга. Эти обстоятельства вынуждаютъ кочевника обращать внимание и заботиться о соотвътственномъ содержаніи ихъ. Верблюдовъ не оставяяють на зиму въ высоколежащихъ горныхъ долинахъ, а держатъ всегда при зимовкахъ, предохраняя отъ холода попонами изъ старыхъ кошемъ и разнаго тряпья. Запасають для нихъ на зиму камышь, колючку, полынь и другой кормъ, негодный для лошадей и рогатаго скота. Верблюды ночью не вдять, а потому на ночь ихъ сгоняють съ пастьбы къ юртамь и кладуть всегда на сухомъ мѣстѣ, для чего зимою очищаютъ землю отъ спъга, а иначе животныя простужаются и гибнутъ.

Спариваются верблюды обыкновенно въ февралъ; самка носитъ 13 мъсяцевъ, слъдовательно рожденіе приходится весною, въ мартъ. Первыя 3—4 недъли верблюженокъ очень слабъ и не въ состояніи держаться на ногахъ. Въ это время онъ требуетъ особеннаго за со-

бою ухода; его обертывають кошмами, держать въ юрть и берегуть не только отъ всякихъ вредныхъ вліяній, но даже никому не показывають изъ постороннихъ, такъ какъ существуеть повърье, что его легко могуть сглазить. Мъсяца черезъ два верблюженокъ начинаетъ ъсть траву, но вмъстъ съ тъмъ кормится и молокомъ матери до году и даже болъе. На 3-емъ году молодого верблюда вьючатъ, но грузъ не превышаетъ 10-ти пудовъ. На 5-мъ году верблюдъ считается вполнъ взрослымъ и несетъ обыкновенно вьюкъ отъ 16—18 пудовъ.

Мясо и молоко верблюдовъ употребляется въ пищу кочевниками, но по высокой цѣнности животнаго киргизы рѣдко рѣжутъ ихъ на мясо, развѣ только старыхъ, негодныхъ къ работѣ, или искалеченныхъ и безнадежно больныхъ. Мясо стараго верблюда жестко и непріятнаго вкуса, но мясо верблюженка считается киргизами гастрономическимъ блюдомъ и употребляется богачами въ исключительныхъ, весьма рѣдкихъ торжественныхъ случаяхъ. Молоко густое и жирное, такъ что вкусъ его непріятный для непривычнаго, хотя М-те Федченко, во время путешествія по Кокандскому ханству съ мужемъ, напилась верблюжьяго молока и не разобрала, полагая, что это коровье (¹). Осенью, въ хорошій удой, можно получить отъ верблюдицы около ¹/4 ведра молока въ сутки.

Въ началъ весны верблюды линяютъ, шерсть спадаетъ и они становятся почти совершенно голыми.

Лѣтомъ верблюдовъ стригутъ, при чемъ съ каждаго получается до 12 фунтовъ шерсти. Шерсть идетъ на изготовление такъ называемаго верблюжьяго сукна, различныхъ достоинствъ и особаго рода матеріи, похожей на камлотъ, называемой армячиной.

^{(&#}x27;) А. П. Федченко. Loc. cit. стр. 140.

Верблюжья шерсть употребляется вмѣсто ваты для подбивки теплой одежды и она гораздо теплѣе послѣдней, но за то тяжелѣе. Худшій сортъ ея идетъ на приготовленіе кошемъ. У маленькихъ верблюжатъ кожа покрыта длинными, густыми, мягкими, шерстистыми волосами и такъ какъ много ихъ гибнетъ въ дѣтствѣ, то изъ шкурокъ дѣлаютъ полушубки, одѣяла и проч. На сколько я имѣлъ возможность испытать свойство этого мѣха, въ Сибири при 30—400 мороза, могу сказать, что это самый теплый мѣхъ.

Цѣна верблюда въ Ферганѣ отъ 30—60 руб. Въ Области, какъ уже было упомянуто, верблюдовъ считалось въ 1888 г. 10.187 головъ; изъ нихъ больше всего двугорбыхъ (Camelus Bactrianus), по туз. айры. Они употребляются для перевозки тяжестей исключительно въ низменныхъ мѣстахъ; для горныхъ мѣстностей, особенно каменистыхъ, двугорбый верблюдъ негодится, потому что скоро сбиваетъ и ранитъ свои мягкія подошвы.

Одногорбые верблюды (Camelus Dromedarius), по туз. наръ, цѣнятся дороже двугорбыхъ, потому что они сильнѣе, выносливѣе и употребляются киргизами при перекочевкахъ на Алай. Здѣсь они требуютъ заботливаго ухода, способны лѣтомъ оставаться безъ водопоя до 3-хъ сутокъ. Наръ проходитъ обыкновеннымъ караваннымъ ходомъ, безъ приваловъ 18 верстъ; въ сутки пройдетъ около 40 верстъ. У нихъ хотя тоже мягкія подошвы, но почему-то выносливѣе и не такъ ранимы, вслѣдствіе чего переносятъ горный путь.

Наръ живетъ среднимъ числомъ 20 лътъ. Самка даетъ за этотъ періодъ времени приплодъ въ 5 штукъ.

Скрещиваніе одногорбаго верблюда съ двугорбымъ даетъ приплодъ, который киргизами называется лёхъ;

помѣсь лёха съ двугорбымъ даетъ приплодъ называемыя кошмакъ. А. Вилькинсъ пишетъ, что верблюженокъ, происходящій отъ скрещиванія между двумя родами верблюдовъ, всегда выходить одногорбымъ (¹).

Ослы (Equus asinus), по туз. ишакъ, довольно распространены какъ у осъдлаго, такъ и кочеваго населенія. Мѣстные ослы принадлежатъ къ мелкой породъ, выродившейся отъ неудовлетворительнаго содержанія, но тѣмъ не менѣе чрезвычайно сильные и выносливые. Бѣлыхъ ословъ, видѣнныхъ А. Вилькинсомъ въ Бухарѣ, я нерѣдко встрѣчалъ и здѣсь. Средняя продолжительность жизни ишака 14 лѣтъ. Самка приноситъ въ свой вѣкъ до 12 штукъ потомства.

Въ городахъ и кишлакахъ, особенно въ горныхъ, ишаки служатъ туземцамъ для поъздокъ на базаръ, на ближайшее поле и вообще для внутренняго сообщенія, а при неимъніи лошади они употребляются и для дальнихъ переъздовъ. На нихъ ъздятъ исключительно верхомъ и перевозятъ тяжести выюкомъ, при чемъ ишакъ несетъ до 6-ти пудовъ; но при дальнихъ переходахъ навыючиваютъ не болъе 4-хъ пудовъ.

При ханахъ, проживающимъ здѣсь евреямъ, запрещено было ѣздить верхомъ на лошади, а разрѣшалось только на ишакахъ.

Здѣшніе ослы чрезвычайно неприхотливы; они довольствуются самой дурной и скудной пищей. По офиціальнымь свѣдѣніямь за 1885 г. ословь и муловь въ Области считалось 7.612 головь; но такъ какъ муловъ чрезвычайно незначительное количество, то вся почти означенная цифра относится къ осламъ. Цѣна въ Ферганѣ на осла отъ 3—8 рублей.

⁽⁴⁾ А. ф.-Миддендорфъ. Loc. cit. стр. 300.

Мясо и молоко ословъ не употребляется въ пищу, даже бъдными туземцами. Кожи имъютъ примъненіе,— изъ нихъ выдълывается сортъ кожи, идущей на пояса и подпруги.

Мулг, по туз. качиръ;—метисъ отъ кобылы и осла, цънится не менъе 120 р., но ихъ здъсь очень мало. Въ Кашгаръ мулы въ большой цънъ. За хорошаго мула платятъ тамъ тысячу руб.

Патологія домашнихъ животныхъ.

Наши свъдънія по патологіи домашнихъ животныхъ въ Области крайне скудны, вслъдствіе недостатка наблюденій, что въ свою очередь обусловливается неимъніемъ отдільныхъ ветеринарныхъ врачей для населенія Области. Лично я не имълъ случая наблюдать въ Области ни одной изъ эпизоотическихъ болтаней, за исключеніемъ нісколькихъ коровъ въ Маргеланів, одержимыхъ чумою въ 1882 г. По офиціальнымъ свідініямъ, за последніе 10 леть, въ Области только въ 1881 и 1882 г.г. была эпизоотія чумы рогатаго скота и дизентеріи, отъ которыхъ въ то время пало у одного осъдлаго населенія болье 15 тысячь головь рогатаго скота. У кочеваго населенія, вмість съ эпизоотіей, открылся падежь скота отъ безкормицы, вслъдствіе суровой и снъжной зимы, такъ что по офиціальнымъ источникамъ трудно выяснить, въ какихъ случаяхъ скотъ кочевого населенія падаль отъ эпизоотіи и въ какихъ отъ недостатка корма. Отъ объихъ причинъ въ 1882 г. пало въ Области скота 178 тысячъ, на сумму свыше полутора милліона рублей (¹). Причины возникновенія эпизоотіи остались не выяснены.

По вопросу о возможности самостоятельнаго возникновенія чумы въ Фергапъ, мы не имъемъ никакихъ данныхъ для какого либо доказательнаго мнѣнія. По условіямъ мѣстнаго скотоводства, трудно также допустить, чтобы чума существовала въ Области постоянно, въ видъ разевянной заразы, какъ это предполагается по отношенію къ скоту обширныхъ степныхъ пространствъ. По всей вфроятности, чума проявляется въ Области путемъ занесенія изъ обширныхъ степей Сыръ-Дарьинской и Семиръченской Областей. Скотъ обыкновенно пригоняется черезъ перевалы Чаткальскаго хребта и попадаеть въ Наманганскій увздь, а потому эта бользнь первоначально появляется тамъ, а оттуда уже распространяется по Области. Не мало способствують развитію этой бользни привозныя кожи, за которыми не существуетъ никакого надзора.

Кромъ чумной эпизоотіи въ Области, въ 1884 г. наблюдался ящуръ (Aphtae epizoot.), имъвшій сильное распространеніе, но протекающій благополучно.

Отдёльные случаи сапа, время отъ времени, обнаруживаются между войсковыми казенными лошадьми, которыя, по всей вёроятности, заражаются отъ лошадей туземцевъ. Между туземными лошадьми сапъ представляеть довольно распространенную болѣзнь, а заразительность и другія свойства болѣзни—хорошо имъ извѣстны. Развитію сапа между лошадьми туземцевъ способствують съ одной стороны отсутствіе всякихъ мѣръ къ ограниченію болѣзни, а съ другой—скученность осѣдлаго

⁽¹⁾ Отчетъ Военнаго Губернатора за 1882 г.

населенія по городамъ и кишлакамъ, при сравнительно большомъ количествъ содержимыхъ лошадей. Туземцы лъчатъ сапъ вливаніемъ кумыза въ ноздри и прокалываніемъ въ разныхъ мъстахъ грудныхъ мышицъ. Особымъ довъріемъ въ этой бользни у нихъ пользуется кабанья желчь.

На казенныхъ лошадяхъ, за послъдніе 10 лътъ, наблюдались только 2 случая Anthrax acutus, но эпизоотіи сибирской язвы не было, хотя широкое развитіе въ Области перемежающихся лихорадокъ указываетъ на существованіе условій, благопріятныхъ для возникновенія этой бользни. Туземцы льчатъ эту бользнь слъдующимъ способомъ: выдерживаютъ больныхъ лошадей въ водъ по брюхо, спускаютъ на кормъ только ночью и примъшиваютъ къ корму поваренную соль; конечно, это средство не приноситъ пользы.

При большомъ количествъ собакъ у осъдлаго и кочевого населенія, а въ особенности бродячихъ, опъ не ръдко заболъваютъ бъшенствомъ, которое черезъ укушеніе передается другимъ животнымъ, а иногда и человъку.

Имъются наблюденія, указывающія на частыя забольванія домашнихъ животныхъ паразитными бользнями, особенно: Destinatosis hepaticus, Hydatidosis cerebri и hydatidosis cellulosae porataro скота.

Самая обыкновенная изъ бользней домашнихъ овецъ—это вертежъ, постигающая всего чаще молодыхъ животныхъ. Она происходитъ отъ пузырчатыхъ глистовъ (соепигиз сегеbralis) въ головномъ мозгу. Кромъ того киргизскія овцы падаютъ въ незначительномъ количествъ отъ копытянки, бользни выражающейся растрескиваніемъ копытъ и происходящею отъ того опухолью ногъ

повыше кольнъ. Причина этой бользни неизвъстна.

Какъ причина смертности овецъ и прочаго скота въ долинъ, по мнънію туземцевъ, представляютъ пыльные ураганы. Осенью 1881 г. сильная буря съ С. В., длившаяся въ теченіе нъсколькихъ дней, все покрыла толстымъ слоемъ пыли, вслъдствіе чего между пасущимся скотомъ появилась страшная смертность (¹). Туземцы сообщаютъ о смертельныхъ дифтеритныхъ явленіяхъ у скота, появляющихся повально, причиной чему они считаютъ изверженія и слизь, остающіяся на тростниковыхъ побъгахъ, послъ нашествія неокрыленной саранчи.

Джють, или ють-туземныя названія означающія падежь отъ безкормицы, который является какъ слъдствіе безпечности и ліности кочевниковь. Для дойныхъ коровъ, овецъ и козъ, а также верблюдовъ и ѣзжалыхъ лошадей устраиваютъ глинобитные загоны, а иногда и съ крышей, но они мало защищаютъ ихъ отъ стужи и прочихъ неблагопріятныхъ вліяній. Для нихъ они заготовляють незначительное количество свна и дикаго овса, достаточнаго лишь для корма впроголодь, остальной весь скотъ всю зиму ходитъ на подножномъ корму, добывая изъ подъ снѣга высохшую траву. Если зима многоснъжная, а весна съ дождемъ и послъдующими заморозками, то скотъ не въ состояніи пробить толстую ледяную кору, подъ которой могъ бы найти хотя скудное продовольствіе, вслідствіе этого отъ голода онъ изнуряется до послъдней степени и начинаетъ массами валиться, превращая хозяевъ, изъ довольно зажиточныхъ-въ байгушей (бъдняковъ).

Между лошадьми туземцевъ весьма часто появляется

^{(&#}x27;) А. ф.-Миддендорфъ. Loc. cit. стр. 294.

паршъ (котуръ), который открывается обыкновенно послъ зимней худобы. Употребляется при этомъ обмазывание саломъ, дегтемъ, настоемъ табаку и т. п.

Ноготь (уль) лѣчатъ кровопусканіемъ изъ уха. Вообще киргизскіе коновалы весьма часто употребляютъ кровопусканія изъ различныхъ частей тѣла, при разныхъ болѣзняхъ.

Болѣзнь у лошадей называемая джамандать считается киргизами одною изъ самыхъ опасныхъ (1). Признаки ея: грудная опухоль, которая поднявшись къ горлу причиняеть смерть. Съ появленіемъ желваковъ, ихъ тотчасъ прокалываютъ, но если послѣ этой операціи замѣтятъ распространеніе опухоли вверхъ, то дальнѣйшее лѣченіе считается безполезнымъ и лошадь закалывается и съѣдается. Эта болѣзнь, по всей вѣроятности,—сибирская язва.

Холощеніе жеребять у киргизь производится небрежно, отчего большой проценть ихъ чахнеть. При этой операціи киргизы употребляють только бичевку, золу и ножь. Послів операціи отпускають жеребенка прямо въ табунь.

Относительно повальныхъ болъзней между верблюдами мив не случалось слышать. Сибирская язва, поражая лошадей и рогатый скотъ, верблюдовъ не касается (2). Гололедица причиняетъ безусловно гибель верблюдамъ, а потому киргизы запасаютъ имъ на зиму неприхотливый кормъ. Впрочемъ, они могутъ обгладывать верхушки камыша и кустарниковъ.

Къ числу болъзней свойственныхъ верблюду принадлежить сарпъ, при которой отпадаетъ у животнаго

^{(&#}x27;) Л. Ө. Костенко. Т. Ш. стр. 116.

⁽²⁾ Тамъ-же. стр. 137.

подошва ноги. Болѣзнь эту лѣчатъ слѣдующимъ обравомъ: промывъ больную ногу верблюжьимъ же молокомъ, надѣваютъ на нее наполненный топленымъ овечьимъ саломъ сапотъ, подошву котораго, снаровленную по ногѣ, плотно пригоняютъ къ отвалившейся верблюжьей подошвѣ и верхъ зашиваютъ. Если послѣ этой перевязки верблюдъ пользуется отдыхомъ, то рана, хотя и медленно, заживаетъ.

Между бользнями казенныхъ лошадей въ войскахъ преобладаютъ бользни желудка и кишекъ, въ формь коликъ и остраго воспаленія. Эти формы забольваній часто вызываются ячменемъ и люцерной, замьняющими здъсь овесъ и съно. Ячмень, вслъдствіе своей твердости, неудовлетворительно пережевывается лошадьми, проглатывается цъликомъ и производитъ запоры; тоже можно сказать про толстые комки люцерны.

Затъмъ по числу заболъваній слъдують катарры дыхательныхъ путей, обусловливаемые, въроятно, ръзкой разницей температуры дня и ночи, при неудовлетворительныхъ помъщеніяхъ. Конюшень въ Области, для казенныхъ лошадей,—нътъ, а только крытые навъсы, которые не могутъ защитить лошадей отъ вліянія холода и сырости.

Солнечный ударъ служитъ довольно часто причиною падежа лошадей; но вообще болъзненность и смертность между лошадьми войскъ незначительны.

Въ Ферганской Области, точно также какъ въ Сыръ-Дарьинской и Самаркандской, по административно-полицейскому управленію, вовсе нѣтъ ветеринарнаго врача. При отсутствіи правильно организованной встеринарной части, не представляется возможнымъ принятія раціональныхъ мъръ къ предупрежденію эпизоотій

и прекращенію ихъ въ случат обнаруженія. Весьма сомнительно, чтобы при невъжествъ населенія, въ случаъ появленія эпизоотических бользней было-бы доводимо объ этомъ до свъдънія администраціи. Огромная убыль за последніе годы общаго количества скота въ Области, о чемъ было сказано выше, при отсутствіи офиціальныхъ свъдъній о существованіи въ это время эпизоотій, быть можеть, до некоторой степени объясняется темь, что население скрываеть, или по невѣдению не находить нужнымъ доводить до свёдёнія русской администраціи о заболъвающемъ скотъ. Только падежъ, развившійся до грандіозныхъ разміровъ эпизоотіи 1881/82 г., вынуждаетъ туземцевъ заявлять о народномъ бъдствіи. Между тъмъ едва-ли гдъ найдутся болъе благопріятныя условія для борьбы съ эпизоотіями, какія представляеть Ферганская Область. Она со всёхъ сторонъ окружена высокими горными хребтами, проходимыми лишь по немногимъ переваламъ и съ единственнымъ свободнымъ выходомъ около Махрама. Занятые осъдлымъ населеніемъ оазисы отдълены другъ отъ друга необитаемыми пустынями. Скотъ кочевниковъ пасется по совершенно изолированнымъ горнымъ долинамъ, а промышленный скотъ приходить въ Область изъ сосъднихъ мъстностей только чрезъ немногіе опредъленные пункты, обойти которые нельзя, въ силу географическихъ условій мъстности. Такія мъстныя условія дають полную возможность, при самыхъ ограниченныхъ средствахъ, предотвратить заносъ въ Область заразныхъ бользней домашнихъ животныхъ, или, покрайней мъръ, ограничить распространение ихъ тъмъ пунктомъ, гдъ онъ обпаружились. Организація ветеринарной части въ Области потребуетъ незначительныхъ расходовъ, а польза отъ нея-несомивина.

Недостатокъ въ Области ветеринарной части ощушается не только по отношенію практическаго приложенія ея въ дълъ мъропріятій противъ эпизоотій, но не благопріятно вліяеть на научно-практическую д'вятельность медицинской части вообще. Если мы для изученія патологіи населенія данной містности считаемъ необходимымъ знать геологическія, топографическія, климатическія и вев остальныя условія, взаимодействіе которыхъ обусловливаетъ здоровье и болёзнь, жизнь и смерть, то на сколько-же болве важно въ этомъ отношении знать нормальныя и патологическія явленія жизни въ ближайшемъ къ человъку животномъ міръ, представляемомъ нашими домашними животными. При нъкоторомъ знакомствъ съ ветеринаріей оказывается; что, кромъ группы бользней извъстныхъ подъ названіемъ животныхъ ядовъ, нашимъ домашнимъ животнымъ свойственны такія бользни какъ туберкулозъ, дифтеритъ, оспа, корь, скарлатина, тифъ, рожа, не говоря про весьма распространенныя паразитныя бользни и огромное число спорадическихъ забольваній, свойственных одинаково человьку и животнымъ. Не зная апатоміи, физіологіи, зоогигізны, методовъ изследованія больныхъ и вообще клиники домашнихъ животныхъ, врачъ лишенъ возможности научнаго наблюденія и діагноза заболъваній домашнихъ животныхъ раіона его д'ятельности. Не желательныя посл'яствія этого очевидны сами по себѣ, а потому необходимо, чтобы параллельно съ медицинскою частью органивовалась ветеринарная часть, взаимно пополняя одна другую, имъя однъ научно-практическія задачи.

Конецъ перваго тома.

ornabnehie.

Глава І.—Границы, пространство, административное дѣ-	1 2
леніе, высота надъ уровнемъ моря	1—5.
тура II — Топографія, орографія и геологія Ферганской	
Тонографическое и орографическое описание.—	
Горинд дороги и перевалы.—Геологическое описание.—	
Поина Ферганской полины.—Постъ-плющеновыя и со-	
променныя образованія.—Щебневыя пустыни.— Солон-	
постыни. — Песчаныя пустыни. — Культурная	
чочие —О происхождении различныхъ формации въ	
Фенгана	5—56.
Глара III — Гилпоглафія. — Ръчныя системы. — Ръки. —	
Орошеніе.—Пруды.—Ключи.—Болота. — Озера. — Под-	
почвенная вода.—Замерзанія и вскрытія ръкъ.—Разли-	
вы ръкъ и наводненія. — Силь. — Физическія химическія и	
гигіэническія свойства воды.—Способъ переправы.—	
Минеральные источники	57—132
Глава IV. Климатъ Ферганской Области — Температура. —	
Состояніе неба и осадки.—Испареніе.—Вѣтры.—Гармъ-	3 340
силь.—Пыльные туманы.—Электричество.—Грозы.—Ог-	
силь.—Пыльные туманы.—Электрической гроский наблюдения.— ненные шары.—Озонъ.—Барометрический наблюдения.—	
ненные шары.—Озонъ.—Варометрическия исследения	
Метеорологическія познанія туземцевъ.—Вліяніе климата	133-174
на здоровье людей	100
Глава V.—Мъста въ Ферганской Области, пользующія-	
ся лучшими климатическими условіями въ санитарномъ отно-	
Горинд местности.—Пределы высоты на кото-	
рой возможно пребывание. — Горный недугъ. — привычка	
ва восхождению на горы и къ пребыванию въ разръжен-	

Глава VI Минералогія Ферганской Области.—Драгоцівные камни.—Золото.—Руды.—Свра. — Мраморъ и гипсъ.—Глины.—Селитра.—Квасцы.—Поваренная соль.— Нефтяные источники.—Озокеритъ.—Каменный уголь. Графитъ.—Палеонтологія	ной атмосферъ.—Благопріятныя гигіэническія условія Стр.
цънные камни.—Золото.—Руды.—Съра. — Мраморъ и гипсъ.—Глины.—Селитра.—Квасцы.—Поваренная соль.— Нефтяные источники.—Озокеритъ.—Каменный уголь. Графитъ.—Палеонтологія	горныхъ мъстностей
гинсь.—Глины.—Селитра.—Квасцы.—Поваренная соль.— Нефтяные источники.—Озокерить.—Каменный уголь. Графить.—Палеонтологія	
Нефтяные источники.— Озокеритъ.— Каменный уголь. Графить.— Палеонтологія	
Графить.—Палеонтологія	гинсъ.—Глины.—СелитраКвасцыПоваренная соль
Глава VII. Флора Ферганской Области.—Общій обзоръ.—Полеводство.—Цѣна на землю и ея доходность.— Огородничество.—Садоводство.—Туземные сады.—Доходность земли подъ садами.—Лѣсоводство.—Древесныя и кустарныя породы.—Тайнобрачныя.—Медицинская флора	
зоръ. — Полеводство. — Цѣна на землю и ея доходность. — Огородничество. — Садоводство. — Туземные сады. — Доходность земли подъ садами. — Лѣсоводство. — Древесныя и кустарныя породы. — Тайнобрачныя. — Медицинская флора	Графить.—Палеонтологія
Огородничество.—Садоводство.—Тувемные сады.—До- ходность вемли подъ садами.—Лъсоводство.—Древесныя и кустарныя породы.—Тайнобрачныя.—Медицинская флора	Глава VII. Флора Ферганской Области.—Общій об-
ходность земли подъ садами.—Лъсоводство.—Древесныя и кустарныя породы.—Тайнобрачныя.—Медицинская флора	
и кустарныя породы.—Тайнобрачныя.—Медицинская флора	
флора	
Глава VIII. — Фауна Ферганской Области. — Млекопитающія животныя. — Птицы. — Рыбы. — Земноводныя животныя. Насъкомыя и черви	и кустарныя породы.—Тайнобрачныя.—Медицинская
тающія животныя.—Птицы.—Рыбы.—Земноводныя животныя. Насѣкомыя и черви	
вотныя. Насѣкомыя и черви	
Глава IX. Скотоводство въ Ферганской Области.— Взглядъ на скотоводство и причины упадка его. Лошади.—Рогатый скотъ.—Овцеводство.—Козы. — Верблю-	
Взглядъ на скотоводство и причины упадка его. Лоша-ди.—Рогатый скотъ.—Овцеводство.—Козы. — Верблю-	вотныя. Насъкомыя и черви
ди.—Рогатый скотъ.—Овцеводство.—Козы. — Верблю-	
ды.—Ослы.—Патологія домашнихъ животныхъ 357-402.	
	ды.—Ослы.—Патологія домашнихъ животныхъ 357—402.

Замфченныя опечатки.

Стран.			Напечатано.	Должно быть.
Стран. 69. — 71 77 83 84 86 103 107 109 121 — 123 — 131 132 148 149	Строк	а 8 сверху. 13 — 13 — 1 снизу. 15 сверху. 2 — 10 снизу. 11 — 12 сверху. 10 — 4 снизу. 8 сверху. 8 снизу. 5 снизу. 10 — 1 — 15 сверху.	онв. всасываванія, ес. большое. преграждаемое. преграду. багарныя. они. быстрой. ненадежная. Стрепеть. онв. пустыни. образуется. ППахидана. этого. на полненнаго	они. всасыванія. ея. большое озеро. преграждающее. преграды. багарными. онв. быстротой. ненадежна. Стрепета. они. пустынв. образуеть. Шайдана. его. наполненнаго.
176	=	16 — 17 —	на оборотъ. Биксію.	наоборотъ. Биксіо.
175 226 227	=	12 — 15 — 12 —	эскулапа. А. Ө. Костенко. А. Ө. Костенко.	Эскулапа. Л. Ө. Костенко. Л. Ө. Костенко
280 302 375	=	9 — 5 — 5 енязу.	испаряются. А. Н. Съверцовъ. за ними.	испаряють. Н. А. Сѣверцовъ за нами.