Отдъльный оттискъ изъ т. ХХХ

Extrait du tome XXX Извъстій Геологическаго Комитета des Bulletins du Comité Géologique

№ 200.

Д. Мушкетовъ,

ВОСТОЧНАЯ ФЕРГАНА.

(Съ 2-мя таблицами).

D. Mouehketow.

LE FERGANA ORIENTAL.

(Avec 2 planches)



• С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-Литографія К. Бирквы вльда (Вас. Остр., 8-я лин., № 1). 1911.

Восточная Фергана.

Предварительный отчеть о работахъ 1909—1911 гг.

Д. Мушкетовъ.

(Le Ferghana oriental. Par D. Mouchketow).

Въ 1909 году Геологическій Комитеть, признавая возможнымъ начать систематическія геологическія изслѣдованія въ Туркестань, постановиль въ основу этихъ работъ положить изданіе геологическихъ карть десятиверстнаго масштаба (не придерживаясь строго рамокъ листовъ 10-ти-верстной карты) тѣхъ площадей Туркестана, которыя имѣютъ съемки болье крупныхъ масштабовъ.

Въ первую очередь рѣшено было поставить изслѣдованіе южной и юго-восточной окраины Ферганской долины, командировавъ для этого двухъ геологовъ — В. Н. Вебера и меня.

Такимъ образомъ, лично мнѣ было поручены работы по составлению 10-тиверстной геологической карты восточной и юго-восточной Ферганы. Точнѣе, эта площадь, приходясь на Андижанскій и Ошскій уѣзды области, охватывается двумя листами 10-ти-верстной карты Туркестана, а именно: рядъ VI, листъ 7 и р. VII, л. 7.

На основаніи однако различныхъ соображеній, доложенныхъ мною Присутствію и имъ утвержденныхъ, опирающихся

главнымъ образомъ на наличность и качество картографическаго матеріала, а также на естественныя условія, изъ этихъ двухъ листовъ выдѣлена мною площадь, равная одному. Ея географическое положеніе опредѣляется координатами $40^{\circ}-41^{\circ}20'$ сѣв. широты и $42^{\circ}-44^{\circ}15'$ вост. долг. Пулк., т. е. $2^{\circ}15'$ по широтѣ и $1^{\circ}20'$ по меридіану, или всего около 27,000 кв. верстъ.

Откидывая отъ этого числа 7.000 кв. верстъ, каковой суммой выражаются мѣста, не подлежащія съемкѣ, т. е. обширныя долины, китайскія владѣнія и части Семирѣченской области 1), получаемъ кругло 20,000 кв. верстъ. Принимая, на основаніи данныхъ опыта, однолѣтнюю производительность геолога, при 5 мѣсяцахъ полевой работы, не болѣе 3.000 кв. верстъ, изслѣдованія означенной площади могутъ быть закончены въ 7 лѣтъ и суммированы на 10-ти верстной картѣ съ полнымъ описаніемъ ея.

До этого представляется возможнымъ опубликование лишь предварительныхъ, частичныхъ отчетовъ, не претендующихъ на детальную разработку столь разнообразныхъ въ этой области геологическихъ вопросовъ. Первымъ изъ такихъ отчетовъ, не считая годовыхъ ²), и является предлагаемый.

Считаю еще полезнымъ указать масштабъ точности съемки въ отношеніи количества верстъ маршрутовъ къ площади (въ кв. верстахъ), ими пересъченной.

Для низменностей и легкодоступныхъ предгорій въ предвлахъ $^{1}/_{2}$ верстной съемки это отношеніе у меня — равно $^{1}/_{1}$, а для высокихъ горъ въ предвлахъ 2-хъ верстной съемки — $^{1}/_{3}$.

Въ настоящемъ отчетъ мною затрогивается центральная часть всей площади, преимущественно для выясненія ея тек-

¹⁾ Последнія захвачены работами К. И. Аргентова.

²) См. Изв. Г. К., т. XXIX, стр. 154 и т. XXX, стр. 260-265.

тоники, на основаніи собственныхъ трехлітнихъ наблюденій, а также всіхъ, наиболіве существенныхъ, данныхъ другихъ лицъ.

Въ виду указаннаго уже выше характера этого описанія, я не даю здѣсь ни исторіи изслѣдованій области, ни детальной сводки литературы, а привожу лишь по мѣрѣ надобности тотъ матеріалъ, который дѣйствительно помогаетъ мнѣ разобраться въ тѣхъ или иныхъ вопросахъ.

Положеніе мое усложняется тѣмъ, что часть матеріала, которымъ мнѣ приходится пользоваться, заключается въ ненапечатанныхъ дневникахъ, рукописяхъ и замѣткахъ моихъ старшихъ товарищей — Ө. Н. Чернышева, В. Н. Вебера, К. В. Маркова и А. В. Фааса, посѣтившихъ нѣкоторыя мѣста области въ 1903 г. при изученіи причинъ Андижанскаго землетрясенія. Считаю своимъ пріятнымъ долгомъ выразить здѣсь имъ всѣмъ искреннюю благодарность за любезное предоставленіе мнѣ своего матеріала, принадлежность котораго тому или иному лицу будетъ указываться въ текстѣ.

Ни маршрутовъ, ни подробныхъ разрѣзовъ, ни палеонтологической обработки здѣсь не приводится, равно какъ и нѣтъ дѣленія работы по годамъ.

I.

Въ виду чрезвычайно тѣсной зависимости орографіи разсматриваемой области отъ ея тектоники я предпочитаю изложить ихъ совмѣстно и для удобства предварительно дамъ самую краткую характеристику всѣхъ стратиграфическихъ свитъ.

Древнѣйшими осадочными образованіями, доказанными фаунистически, являются нижнедевонскія ¹), типично-герцинскія, содержащія богатую фауну трилобитовъ, платицератовъ, брахіо-

¹⁾ Имъются нъкоторыя данныя и за верхній силурь, пока лишь для одного мъста—Тахта-Сулейманъ.

подъ, коранловъ и криноидей ¹) и выраженныя бёлыми и св'єтлосёрыми, толстослоистыми известняками.

Герцинскіе известняки согласно прикрыты мощной свитой кремнистыхъ сланцевъ, сланцеватыхъ известняковъ и кристаллическихъ тонкихъ, доломитовыхъ, чрезвычайно бѣдныхъ фауной, но по нѣкоторымъ ея находкамъ сопоставляемыхъ Ө. Н. Чернышевымъ со стрингоцефаловымъ горизонтомъ Урала и Зап. Европы. Верхній девонъ замѣченъ лишь въ одномъ пунктъ, въ видѣ бѣлаго фарфоровиднаго кристаллическаго известняка, переполненнаго гастроподами, цефалоподами, пелециподами, и одиночными кораллами прекрасной сохранности; мощность известняка не болѣе 10 саж. и, по простиранію выклиниваясь, онъ нигдѣ болѣе не появляется.

Характеръ фауны однако пока неясенъ, ибо она содержитъ много представителей нижнекаменноугольныхъ.

Весь этоть девонскій комплексь согласно прикрывается мощными, сѣрыми, слоистыми нижнекаменноугольными известняками съ богатой, хотя однообразной, фауной, преимущественно продуктусовой (Pr. latissimus Lar., Pr. ex gr. giganteus Mart., Pr. striatus Fisch.), обычно же переполненными члениками лилій и рѣже кораллами.

Приведенный комплексъ отлично наблюдается въ группъ уединенныхъ возвышенностей къ W (въ 20 вер.) отъ г. Оша, — Чиль-устунъ, Чиль-майрамъ, Хаджибекъ, Манакъ и Курпе-тау, гдѣ онъ былъ изученъ впервые Ө. Н. Чернышевымъ въ 1903 г. ²), а затѣмъ мною, хотя, конечно, для детализаціи здѣсь остается еще широкое поле.

 $^{^{1})}$ См. «Андижанское землетрясеніе $^{3}/_{16}$ дек. 1902 года». — Труды Геол. Ком. Новой серіи Вып. 54, стр. 56—57.

 $^{^2}$ См. Труды Геолог. Комитета. Новой серіи Вып. 54. «Андижанское землетрясеніе 3 /16 декабря 1902 г., стр. 55—57.

Къ S отъ гряды Чиль-устунъ тянется еще подобная — Тышикъташъ — Кызъ-кууды — Какликъ-учаръ, — въ которой опять фигурируетъ D₁; далѣе на югъ по ущелью р. Араванъ, къ сожалѣнію, послѣ перерыва, идетъ болѣе связный разрѣзъ, начинающійся (съ N) уже верхнекаменноугольными известняками, прикрытыми нѣмой свитой песчаниковъ, песчаниковыхъ брекчій и конгломератовъ, которая такимъ образомъ и является, повидимому, верхнимъ, заключительнымъ членомъ палеозойскихъ отложеній.

Не описывая разр'яза р. Араванъ, что будетъ сдулано въ полномъ отчетъ, а еще ранъе составитъ предметъ описанія И. А. Рейнвальда — исключительно имъ занимавшагося, я лишь укажу, что благодаря нему является возможность связать отдъльные Ошскіе выступы съ массивомъ Алайскаго хребта. На сфверномъ склонф последняго также намечаются палеозойскія зоны, пока лишь D₁ и C₁ (по р. Чиле), и постепенно прослѣживаются на большихъ пространствахъ. Палеозойскія отложенія къ SO и O отъ Оша рисуются пока еще болье смутно. Фауна хорошая D, и C, здёсь найдена лишь въ немногихъ местахъ, — ущелье Акъ-Буры, г. Алдыяръ и др., а въ остальной площади, особенно Ферганскаго хребта, почти никакой, за исключеніемъ немногочисленныхъ брахіоподъ (каменноугольныхъ?), да ничего почти не говорящихъ разрезовъ криноидныхъ стеблей. Эти находки происходять изъ сфрыхъ слоистыхъ известняковъ съ р. Джилангачъ (верховье р. Алабуги) и съ р. Таръ (у урочища Ойталъ). Известняки эти всегда лежатъ весьма мощной, къ сожальнію, пока фаунистически охарактеризованной, свить различных сланцевь - кремнистыхь, глинистыхъ, перемежающихся съ песчаниками, туфами и съ покровами діабазовъ, обыкновенно сильно перемятыхъ; нижнимъ горизонтомъ этихъ сланцевъ представляются слюдистые, хлоритовые и тальковатые --- метаморфизованные, лежащіе на свѣтлорозовомъ, мраморизованномъ, массивномъ, нѣмомъ известнякѣ

(ущелье Кипчальма). Всю эту мощную, нѣмую палеозойскую свиту, играющую главную роль въ строеніи массива Ферганскаго хребта, приходится пока считать девонской, по ея отношенію къ С₁. Почти всегда несогласно на палеозов лежитъ свита песчаниковъ и сланцевъ тріасоваго — юрскаго возраста, для которой лучше всего пока придерживаться термина Зюсса «ангарскихъ слоевъ». Характерными отличіями этой песчанико-сланцевой свиты отъ таковой же палеозойской служатъ.

- 1. Полное отсутствіе известняковъ.
- 2. Присутствіе только глинистыхъ мелколистоватыхъ сланцевъ, иногда лишь слюдистыхъ.
- 3. Грубые, частью аркозовые, брекчіевидные («пуддинги») и конгломератовые песчаники, обычно свѣтлые.
- 4. Отсутствіе кливажа, плоскостей отд'вльности, смятости по простиранію.
- 5. Почти постоянная наличность, хотя бы и плохихъ, растительныхъ отпечатковъ и иногда пластовъ каменнаго угля.

Опредѣленіе, собранной мною до сихъ поръ, флоры, любезно сдѣланное А. Н. Криштофовичемъ ¹), дало слѣдующій списокъ:

- 1. Equisetites sp.
- 2. Schizoneura hoerensis His.
- 3. Cladophlebis Fontanei Seward.
- 4. Cladophlebis sp.
- 5. Coniopteris hymenophylloides Brongn.
- 6. Clathropteris meniscoides Brongn.
- 7. Pterophyllum cf. inconstans Goepp.
- 8. Ginkgo concinna Heer.
- 9. Czekanovskia rigida Heer.
- 10. Phoenicopsis angustifolia Heer.
- 11. Podozamites lanceolatus Lr. & H.

¹⁾ Пользуюсь случаемъ выразить здесь глубокую благодарность А. Н. Криштофовичу за его постоянное и ценное содействие.

Флора является смѣсью нижнеюрскихъ и рэтскихъ типовъ, съ преобладаніемъ послѣднихъ.

При налеганіи на палеозой, эта свита очень часто имѣетъ общій съ нимъ азимутъ паденія, но почти никогда не равны углы паденія.

Мощность свиты, равно какъ и составъ ея, весьма измѣнчивы и не поддаются точному учету. Такъ, напримѣръ, на р. Чангет-су, около угольнаго мѣсторожденія Маркай, ея мощность равна 120 саж., изъ которыхъ 90 саж. приходится на сплошную толщу грубо-слоистыхъ, кварцево-кремнистыхъ, крупно-зернистыхъ, брекчіевидныхъ, свѣтло-сѣрыхъ песчаниковъ, и лишь 30 саж. на окружающіе ихъ тонкослоистые желѣзисто-слюдистые песчаники и сланцы.

Этотъ типъ сохраняется по широтъ до перевала Яссы, но далъе на SO довольно быстро смъняется другимъ, значительно болъе мощнымъ (раза въ 3—5) и состоящимъ уже преимущественно изъ сланцевъ, съ отдъльными ръзковыдъляющимися горизонтами аркозоваго желъзистаго песчаника и безъ конгломератовъ. Преобладаніе сланцевъ надъ песчаниками и уменьшеніе грубости послъднихъ замътно усиливаются далъе на SO—въ верховьяхърр. Яссы, Кара-Кульджи, Кулуна.

Съ неопредъленностью песчаниково-сланцевыхъ свить верховъ палеозоя и, низовъ мезозоя Ср. Азіи сталкивались многіе изслъдователи, и, какъ извъстно, Гризбахомъ предложено было даже названіе «пермо-тріасъ», примѣнимость котораго однако въ данномъ случаъ является сомнительной 1). Эта же свита описана подъ названіемъ тріасъ—И. Мушкетовымъ 2) въ верховьяхъ рр. Алайку и Суека, куда она, очевидно, и про-

¹⁾ Относительно возможной синхроничности свиты съ растительными остатками и тріаса высказывался и Я. Эдельштейнъ—«Верхнепалеозойскіе слои Дарваза», стр. 337.—(Матеріалы для геологіи Россіи, т. XXIII).

²) «Туркестанъ»—т. II, стр. 162—166.

стирается вполнѣ правильно, судя по моимъ наблюденіямъ на р. Терекъ. Издали, громадныя обнаженія—въ нѣсколько сотъ саженей — этой свиты весьма характерны (особенно между перевалами Горумды — Читты — Шильбели) рѣзковыступающими свѣтлыми полосами песчаниковъ на черномъ сланцевомъ фонѣ, чрезвычайно наглядно рисующими складчатость.

Описанная свита съ растительными остатками, въ средней части предгорій Ферганскаго хребта, всегда согласно прикрывается толщей перемежающихся кирпично-красныхъ конгломератовъ, песчаниковъ грубыхъ и мелкихъ діагонально-слоистыхъ и мергелей; чередованія эти не представляютъ какойлибо правильности: иногда преобладаютъ одни члены свиты въ ущербъ другимъ; въ равной степени мощность сильно мѣняется — отъ 500 до 100 саж.

Лучшія обнаженія «красной» толщи и ея отношенія къ «сѣрой» — юрской находятся: по р. Чангетъ-су у Маркая, р. Зергеръ у Таранъ-базара, въ устьв р. Донгузъ-тау и на р. Яссы у Кошъ-булака, на р. Кара-кульджв у таможни, р. Бозъ-альды, Кульдукъ, Токсанъ-кампыръ и др.

Песчаники эти часто слюдистые, иногда известковистые, нерѣдко съ очень угловатой красной галькой и свѣтлымъ цементомъ; діагональная слоистость ихъ особеннно ярко выступаетъ при наличности свѣтло-желтыхъ пылевидныхъ прослойковъ, пересѣкающихся подъ уголомъ 20° — 25° ; среди общей массы одного пласта рыхлаго песчаника, достигающаго среди мергелей иногда мощности 10—15 саж., выдѣляются часто $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ —аршинные пропластки чрезвычайно плотнаго оруденѣлаго (Fe), сливного песчаника-кварцита, разбитые на параллелепипеды (Фазылманъ). Образованіе это живо напоминаетъ стяженія, иногда пластообразныя, желѣзистаго кварцита среди красныхъ и желтыхъ песковъ полтавскаго яруса палеогена южной Россіи.

По направленію къ W-къ середин'в долины Ферганы, -

можно подмѣтить преобладаніе мергелей и сланцеватыхъ глинъ съ бѣлыми налетами различныхъ солей, дающихъ горько-соленые источники,— надъ песчаниками и конгломератами, остающимися лишь въ низахъ свиты (устье Куршаба, г. Ташъ-ахуръ)...

Наконець, палеонтологически, эта толща всегда абсолютно нѣмая; тѣмъ не менѣе я считаю вполнѣ возможнымъ приписывать ей мѣловой возрастъ, въ частности, не моложе сеномана, Основаніемъ къ этому, помимо имѣющихся намековъ въ литературѣ ¹), служитъ постоянное правильное подлежаніе «красной» свиты верхнемѣловой, фаунистически опредѣленной, толщѣ мергелей; самостоятельнаго ея залеганія или связи только съ нижележащей «рэтической» не наблюдалось ²).

Аналогичное, хотя литологически не тождественное проявленіе нижнем'вловых отложеній, въ видѣ красныхъ нѣмыхъ, мощныхъ песчаниковъ, я видѣлъ еще въ 1905 г. въ хребтахъ Петра Великаго, Дарвазскомъ и къ западу отъ послѣдняго.

Своеобразный характеръ «красной» свиты невольно наводять на мысль объ условіяхъ ея образованія, повидимому, поясняемыхъ гипотезами J. Walther'a въ «Gesetz der Wüstenbildung» и указывающихъ на максимальную континентальность страны въ началѣ мѣловой эпохи.

Непосредственно налегающіе на красную свиту мергеля начинаютъ собой связный разрѣзъ морскихъ отложеній, заклю-

¹⁾ См. «Андиж. землетр.», стр. [54—указаніе на сходство съ «нубійскимъ песчаникомъ» Африки и неокомскимъ краснымъ песчаникомъ Хорассана и С. Афганистана—по G. L.Griesbach. Records of the Geol. Survey Ind. 1887 г., XX, р 95).

²⁾ Сатадуетъ замътить, что стратиграфическое положение красныхъ свитъ мезозойскихъ и третичныхъ, благодаря своей неясности, породило уже цѣлый рядъ противоръчивыхъ толкованій со стороны многихъ изслѣдователей Тяньшаня (Фридрихсенъ, Кейдель и др.). Подробнѣе этотъ вопросъ затрагивается мною въ статьъ «Изъ Пржевальска въ Фергану», имѣющей появиться въ одной изъ ближайшихъ книжекъ «Извѣстій Геол. Ком.» 1912 года.

чающій цілый рядь фаунистически охарактеризованных горизонтовь, начиная съ (сеномана?) турона и кончая (олигоценомъ?) эоценомъ.

Наиболье полно фауна эта разобрана Г. Д. Романовскимъ 1), А. В. Фаасомъ 2) и Д. В. Соколовымъ 3), повторять ихъ данныя здъсь не мъсто, а базируясь на нихъ и сопоставляя съ собственными наблюденіями по совокупности съ данными В. Вебера, М. Бронникова и К. Маркова, я лишь укажу основныя стратиграфическія группы, удерживающіяся въ разръзахъ, хотя и сильно варьирующей мощностью. Группировка эта, конечно, является лишь временной—облегчающей оріентировку въ массъ разръзовъ большой площади.

Нѣкоторые горизонты, встрѣчающіеся только къ западу отъ меридіана г. Оша, отмѣчены буквой W; римская нумерація горизонтовъ начинается сверху, кончаясь непосредственно выше «красной» свиты.

I. «Глинисто-мергельная толща выше ферганскаго известняка», сверху красная, ниже зеленая, мощностью отъ 20 саж. и значительно болье (W), содержить:—Ostraea cyathula Lam., Ostraea thianschanensis Rom., Gryphaea Sewerzowi Rom., Turritella cf. angulata Sow., много другихъ мелкихъ пелециподъ, и гастроподъ, фораминиферы, мпанки, остракоды, краббы и зубы акулъ.

II. «Ферганскій ярусъ» — эоденъ — отъ 2 до 6 желто-бѣлыхъ известняковъ, перемежающихся съ зеленоватыми глинами. Мощность около 30 саж. довольно постоянна. Содержитъ фауну преимущественно въ нижней части: Gryphaea Kaufmani Rom. =

^{1) «}Матеріалы для геологіи Туркестана».

²) «Андиж. землетрясеніе...», стр. 43—53.

^{3) «}Къ вопросу о ферганскомъ арусъ». (Bull. de la Soc. Impér. des Natur. de Moscou, t. XXIII).

- = Gr. Romanovskii J. Böhm, Gr. Esterházyi v. Pav., Ostraea turkestanensis Rom., мелкія пелециподы и гастроподы. Иногда, благодаря изобилію этой мелкой фауны, известняки им'ьють видъ ракушниковь—то рыхлыхъ желтыхъ глинистыхъ, то плотныхъ сахаровидныхъ; въ подобныхъ случаяхъ вышеприведенные крупные представители устричныхъ или отсутствуютъ, или въ весьма скудномъ количествъ.
- III. «Верхняя гипсоносная свита», состоящая изъ красноватыхъ глинъ, съ прослоями гипса, мощнаго чистаго гипса, мѣстами кристаллическаго и свѣтло-сѣраго доломитоваго известняка, проникнутаго кристаллами гипса. Мощность отъ 40 до 100 саж., обычно . Ostraea cf. hemiglobosa Rom., Gryphaea cf. navia; весьма много мелкихъ гастроподъ и пелециподъ въ доломитовомъ известнякѣ, представляющимъ вътакомъ видѣ очень постоянный горизонтъ въ NO части района.
- IV. «Радіолитовый горизонть» песчаноглинистый, бѣловатый, чаще охристый пористый известнякь, съ выдѣленіями кристалловъ кальцита (а также целестина и стронціанита Сузакъ) въ пустотахъ. Болѣе плотныя его разновидности лишены фауны.

Обыкновенно выдъляется ръзкимъ карнизомъ надъ подстилающими его красноватыми глинами. Мощность колеблется около 7 саженей; иногда совершенно выклинивается. Характерныя въ Сузакъ и вообще, видимо, на W ядра Radiolites сf. Muschketovi Noetling и брахіоподъ (въ грядахъ Чигирчикъ—А. Ф.) не являются однако повсемъстно присущими, и гораздо чаще—на О-ъ-известнякъ содержитъ лишь довольно крупныя ядра и отпечатки пелециподъ — Pectunculus, Vola, Arca, Modiola, гастроподъ и ръдко брахіоподъ. Горизонть этотъ А. В. Фаасъ (l. с., стр. 52) отождествляетъ, по Нэтлингу, съ верхнимъ сенономъ Белуджистана (Pathanische Stufe).

V. «Глинистоизвестняковая толща» — перемежаемость из-

вестковистаго песчаника и коричневатыхъ глинъ. Горизонтъ непостоянный и нѣмой. Въ Сузакѣ по единичнымъ экземплярамъ Cassidulus ferganensis Faas и Trigonia cf. indica Stoliczka—опредѣленъ, какъ соотвѣтствующій верхнимъ слоямъ Arrialoor group—сенонъ. Мощность до 30 саж.

VI «Средняя гипсоносная свита». Перемежаемость гипса, гипсоваго песчаника, зеленовато-коричневыхъглинъ, свътлаго плитня-коваго моргеля. Мощность около 20 саж.; фауны не найдено.

VII. «Пестрая песчано-глинистая свита». — Сланцеватыя глины и рыхлые песчаники — красные, зеленые, сърые, бълые. Мощность до 100 саж. Нъмая.

Ея присутствіе всегда характеризуется плохого качества родниками и обиліємъ оползней и оплывинъ.

VIII. «Экзогировый ярусь». — Перемежаемость плотныхъ песчаниковъ известковистыхъ, мергеля, глины и известняка зеленаго цвъта. Мощность до 35 саж.

Ярусъ весьма постоянный, стратиграфически надежный. Онъ разбивается обычно еще на три слоя.

- а) Устричный—мелкія Ostraea prominula Rom. и близкія ей въ отличной сохранности и массами; O. prominula сохраняется и въ нижеслѣдующихъ слояхъ, но въ меньшихъ количествахъ; Pecten, Spondylus.
- b) Пелециподовый слой, переполненный ядрами Cardium kokanicum Rom., Crassatella, Cucullaea, Cyprina, Corbula, Lucina, Modiola, Panopaea, Pholadomya, Venus, Nucula, а также—Enopsephaca, Turritella. Voluthites. Кром'в того недурныя Gryphaea vesicularis Lmk., съ наросшими мшанками и серпулидами, и Plicatula multicostata Forbes и М. Flattersi Сод. Посл'єднія три формы однако еще бол'є присущи сл'єдующему слою.
 - с) Экзогировому. Онъ прежде всего постоянно охаракте-

ризованъ большимъ количествомъ, иногда въ видѣ сплошныхъ банокъ, Exogyra columbina Rom., typ. и var. formosa, а также ребристой Ex. olisiponensis Scharpe. Почти обязательно присутствуетъ и Ostraea prominula Rom. Болѣе рѣдкими, но интересными, находками еще являются— нѣсколько видовъ аммонитовъ (Placenticeras Fritschi Grossouvre) и Echinobrissus Markowi Faas.

На основаніи всей фауны «экзогировый яруст» параллелизуется А. В. Фаасомъ съ Trichinopoly group Южной Индіи т. е. съ нижнимъ сенономъ или верхнимъ турономъ.

Не всегда однако эти три слоя удерживаются, но зеленый мергель, изобилующій Exogyra columbina и Ostraea prominula, просліживается повсем'єстно, представляя неоціненныя удобства при картированіи, такъ какъ эти двъ прочныя формы видны и при отсутствіи ясныхъ обнаженій, прямо даже на полів. Прочныя дайки этихъ пластовъ різко выдівляются среди рыхлыхъ, выше — и нижележащихъ, образованій и зачастую, съуживая різки, даютъ возможность туземцамъ базировать на нихъ свои примитивные мосты.

IX. Желтоватые, пористые, раковистые известняки— «подъэкзогировые». Мощность отъ 2 до 6 саж.; съ ядрами большихъ Nerinca; Turritella, Turbo, Modiola; возможно—сеноманъ?

X. (W) «Нижняя гипсоносная свита»—пестрыхъ известняковъ, мергелей, глинъ и гипса. Отъ 30 до 115 саж. мощностью (Муянъ, Канъ).

XI. «Красная» — малиновая свита, уже вышеописанная. Слъдуетъ замътить, что въ предгорьяхъ Алайскаго хребта она сильно уменьшается до 25—60 саж. (Чакмакъ — Наукатъ) и даже 10 саж. и 1 саж. (въ Маргеланскомъ уъздъ, по даннымъ В. Вебера).

Весь описанный комплексъ, представляясь довольно опредъленнымъ по своему возрасту, прикрывается отложеніями, во

многомъ напоминающими подчиненную ему «красную свиту» — XI. Я говорю о мощныхъ красновато-сърыхъ конгломератахъ, перемежающихся съ рыхлыми желто-сърыми песчаниками, и играющихъ главную роль въ сложеніи центральной равнинной части Ферганы и нижнихъ, первыхъ, увалистыхъ предгорій въ ее окружающихъ — «адырахъ», по мъстной терминологіи. Если не считать лёсса ¹), часто прикрывающаго конгломераты, то они являются младшимъ членомъ длиннаго ряда осадочныхъ образованій разсматриваемаго района; при этомъ возникаютъ опять, конечно, два вопроса — ихъ возрастъ и ихъ генезисъ. Сначала я позволю себъ однако дать краткое описаніе одного изъ лучшихъ обнаженій толщи (вообще довольно однообразной), находящагося по р. Кокъ-Джангакъ — притоку р. Кара-Кульджи, около кишлака Ширдахъ.

Мощность видимая (несомивно значительно меньшая истинной) здъсь 180 саж.; свита издали ръзко дълится на двъ части: верхняя—темная, красноватая, съ эффектными столбами, колоннадами и т. п., нижняя—свътлая, желтоватая съ отчетливой слоистостью. Вблизи же наблюдается кромътого слъдующее.

Верхняя треть состоить изъ сплошного, очень грубаго конгломерата; преобладающее количество сильно-окатанной гальки, величиной съ яйцо и кулакъ, но есть валуны въ $^1/_4$, $^1/_2$ и даже-рѣдко $^3/_4$ метра (два встрѣтились по 1 метру діаметромъ!); несмотря на такую разнокалиберность гальки, видна все же слоистость. Конгломератъ снизу рѣзко отграниченъ толщей красно-

¹⁾ Слѣдуеть однако замѣтить, что лёссовый вопросъ за послѣднее время въ рукахъ почвовѣдовъ, получаетъ совершенно новое освѣщеніе; лёссъ уже трактуется какъ геологическое образованіе, не современное. Одновременно оспаривается даже и золовое его происхожденіе вообще, съ чѣмъ пожалуй уже труднѣе согласиться—вѣроятнѣе наличность двухъ видовъ его генезиса. См. Не устр у е въ. Почвенно—географ. очеркъ Чимкентскаго уѣзда»... СПБ. 1910 г. Подробиѣе вопросъ разобранъ нынѣ въ статъѣ В. А. Обручева. «Къ вопросу о происхожденіи лёсса» (Въ защиту золовой гипотезы) 1911 г.

ватаго глинистаго песка (15 саж.), содержащаго лишь прослои конгломерата, аналогичнаго верхнему, выклинивающієся, раздувающієся и т. п. и не превышающіє 1 метра мощности. Наконець, нижняя половина состоить изъ очень рыхлыхъ, средне-зернистыхъ, частью глинистыхъ, свѣтлыхъ, желтоватыхъ, ясно-слоистыхъ (не діагонально) песчаниковъ, падающихъ вполнѣ согласно съ верхними; они содержатъ иногда тоже гальку, но не крупнѣе яйца, а чаще орѣха, расположенную рѣдкими тонкими рядами или же просто въ одиночку.

Имъщеся и въ нижнихъ, и въ верхнихъ песчаникахъ глинистые слои обусловливаютъ возникновение водоносныхъ горизонтовъ, слабыхъ, и, по мнънию жителей, недоброкачественныхъ; вода въ пластъ же оставляетъ какие то бъловатые налеты.

Составъ гальки конгломератовъ довольно однообразный. Доминируютъ темные плотные известковистые песчаники и кремнистые известняки палеозойскіе, рѣже желѣзистые и брекчіевидные песчаники тріасо-юры и еще рѣже желто-бѣлые мѣловые мергеля.

Вся толща согласно падаетъ на NW 300-310° / 10-15°, налегая, какъ это видно выше по Кара-Кульджѣ, на третичные и мѣловые известняки. Такимъ образомъ возрастъ ея опредѣляется скорѣе всего верхнетретичнымъ; подобныя же отношенія можно наблюдать и въ иныхъ мѣстахъ, какъ то: по долинѣ р. Куршаба, начиная отъ мазара Кочкаръ-ата и до Хадыршамугаль, на Пакана-адырѣ, у устья р. Ялпакъ-ташъ, у оз. Капланъ-Куль и т. д. Однимъ словомъ, всѣ эти данныя вполнѣ согласуются съ описаніемъ И. Мушкетова («Туркестанъ», І томъ—въ главѣ о Ферганѣ многократно, особенно с. 498) «нижнихъ—третичныхъ» конгломератовъ. Что же касается «верхнихъ—потретичныхъ» (см. Ibid.), — роль ихъ выяснена недостаточно, и, повидимому, значительно меньшая, чисто мѣстная, зависящая отъ случайныхъ условій каждаго даннаго района. Вѣрнѣе

всего, что на ихъ долю выпадаютъ просто всв древнія річныя терассы 1), устьевые выносы, отложенія озеровидныхъ 2) расширеній рікь, съ временнымъ застоемъ воды и т. п. Уже благодаря такому происхожденію, конгломераты потретичные не могуть имъть сколько-нибудь постоянной мощности, habitus'a и правильности распространенія, но пріурочиваются лишь къ важнымъ воднымъ артеріямъ, залегая по бокамъ ихъ долинъ, современныхъ или уже историческихъ, повидимому, исключительно горизонтально. Такъ, повидимому, понималъ ихъ И. В. Мушкетовъ и въ I томъ, а еще яснъе это видно во II т. (напримъръ, начало главы VI и др.). Мнъ кажется весьма существеннымъ именно подчеркнуть эту двойственность и совершенно различную роль конгломератовъ, а также то, что третичные дислодированы, а потретичные (четвертичные) - натъ, по крайней мъръ не настолько, чтобы это можно было опредълить глазомъ и компасомъ 3).

Такого типа четвертичные конгломераты наблюдались мною въ Наукатской котловинѣ, у г. Оша до ущелья р. Акъбуры, гдѣ они отчетливо несогласно лежатъ на круто падающихъ болѣе древнихъ слояхъ (третичныхъ-мѣловыхъ), вверхъ по этой же рѣкѣ въ ея расширеніяхъ, по р. Талдыку, на берегахъ р. Кара-дарьи въ верстѣ ниже Кампыръ-равата (особенно на правомъ берегу, гдѣ ясное несогласіе съ мѣломъ), по р. Кокъ-джангакъ и въ низовьяхъ Тара и Кара-кульджи, гдѣ опять ясно несогласіе съ третичной свитой.

Въ большинствъ этихъ несогласій нътъ перекрыванія дислоцированныхъ осадковъ потретичнымъ конгломератомъ, но

Тогда и понятно частое присутствіе гальки кристаллическихъ породъкоренные выходы которыхъ находятся весьма далеко.

²) Объ этомъ ниже, а также см. мою статью въ Изв. И. Р. Геогр. О-ва-1911 г. «Ледниковая область восточной Ферганы».

³⁾ Вопроса этого весьма внимательно касается В. Веберъ. См. Изв. Геол. Ком., т. XXIX. Геол. изсл. въ Ферганф въ 1909—1910 гг.

онъ расположенъ относительно низко въ притыкъ къ нимъ: на Кокъ-джангакѣ онъ, будучи горизонталенъ, съ мощностью отъ ложа рѣки около 4 саж., притыкается къ третичнымъ известнякамъ, падающимъ подъ угломъ 75°. У Кампыръ-равата онъ залегаетъ подобнымъ же образомъ, но выше надъ рѣкой (10 с.), и тамъ хорошо еще виденъ его составъ: сильно-окатанная галька и валуны, до ½ аршина діаметромъ, переслаиваются съ неправильнаго вида удлиненными, плоскими линзами сѣровато-желтой, лёссовидной, известковистой, рыхлой породы, заключающей песчинки и мелкую малоокатанную гальку.

Всѣ, даже незначительныя рѣчки, большую часть года безводныя (вродъ Талдыка), стекающія въ долину Ферганы съ опоясывающихъ ее хребтовъ, имъютъ колоссальные, непропорціональные потокамъ, устьевые выносы. Они представляють собой площади разнокалиберной гальки, по нъскольку десятковъ и даже сотенъ квадратныхъ верстъ, часто соединяющіяся другъ съ другомъ въ одно целое, -- для ясности следуетъ лишь взглянуть на 10-ти верстную карту Ферганы въ целомъ виде; кром'т того, поперечныя расширенія долинъ, отъ изм'тненія базиса эрозіи, или отъ возникшихъ препятствій и т. п. чинъ (разобранныхъ ниже), съ подпоромъ ли воды озера, или наоборотъ, при блужданіи русла, у столь значительныхъ рекъ, какъ Кара-Дарья, могутъ быть грандіозными, порождая опять таки обширныя галечныя накопленія. Отличный примъръ этому можно видъть съ высокихъ точекъ по берегамъ Кара-дарьи: около кишлаковъ Аима, Сузака, Ханабада, Султанабада — передъ глазами растилается ровное сфрое пространство гальки, около 100 квадратныхъ верстъ площадью, по которому зеленоватыми зм'вями извиваются многочисленныя русла мощной рѣки.

Если мы спустимся на эту равнину, то увидимъ, что она вся изръзана этими руслами, прихотливо сходящимися и рас-

ходящимися, по большей частью сухими; нѣкоторыя изъ нихъ по нѣскольку разъ въ годъ снова оживляются, другія долго стоятъ сухими, покрываясь растительностью; уровень рѣки колеблется днями и часами, причемъ въ выборѣ своего пути она необычайно капризна, именно: моменты наибольшаго половодья совпадаютъ съ наибольшимъ же количествомъ несомаго взвѣшеннаго матеріала, и послѣ каждаго послѣдующаго спада воды или отклоненія русла остаются большія количества осажденнаго, мелко-слоистаго, мучнисто-глинистаго лёссовиднаго матеріала 1).

Такимъ образомъ, одни и тѣ же отложенія мы имѣемъ въ руслахъ и террасахъ современныхъ рѣкъ, въ конгломератовыхъ толщахъ четвертичныхъ и конгломератовой свитѣ третичной; въ послѣдней однако все въ болѣе крупномъ масштабѣ; не показываетъ ли эта общность ихъ характера на одинаковой способъ образованія?

При всемъ томъ я пока не касался лёсса, sensu stricto, мощнаго, неслоистаго (по Шариханъ-саю его обнаженія превосходять 10—12 саж. высотой), всетаки, въроятно, эоловаго происхожденія и совершенно несвязаннаго съ какимъ либо опредъленными отложеніями, а просто лишь потому покрывающаго чаще третичныя, что онъ самъ, какъ и тѣ, пріуроченъ къ центральной части Ферганы. Возрастъ главной его «культурной» толщи я думаю заключенъ между конгломератами четвертичными и современными; этому нисколько не противоръчитъ нахожденіе неслоистаго лёсса, въ видѣ уже уплотнившейся мергелистой породы, между слоями конгломерата адыровъ 2), дислоцированными (третичными), совмъстно съ лёссомъ слоистымъ. Мнѣ непонятно, почему всѣ типы породъ могутъ быть

¹⁾ Всё эти процессы детально трактованы въ I т. «Туркестана», особенно стр. 513—514, а также въ вышеприведенной стать В. Обручева.

²) См. «Андижанское землетрясеніе...», стр. 43 и «Туркестанъ», I т., 487—488.

различнаго возраста, а для лёсса нужно ставить какія то опредъленныя рамки. Допустимъ, довъряя компетенціи почвовъдовъ, что въ данное время лёссъ 1) не образуется, но чтобы онъ не могъ образоваться ранъе въ нъсколько пріемовъ и періодически, въ концъ третичнаго времени и послъ него, я не вижу причинъ 2).

Эта періодичность его отложенія вполн'є совпадаеть, какъ мы вид'єли, съ таковой же трехъ родовъ галечниковъ; съ другой стороны, горизонты его, заключенные среди дислоцированныхъ конгломератовъ, мен'є мощны и малоп ригодны для землед'єльца по залеганію на неудобныхъ къ орошенію адырахъ, и, сл'єдовательно, главную роль «культурной формаціи» играетъ лёссъ потретичный, неслоистый, эоловый, далеко однако не единственный.

Мы разсмотрѣли всѣ группы осадочныхъ образованій района, причемъ даже изъ этого схематическаго изложенія, я думаю, выяснилось то важное обстоятельство, что условія и характеръ ихъ генезиса мѣнялисъ рѣдко и неоднократно; мы видимъ мощныя отложенія морскихъ известняковъ, кремнистыхъ (возможно, глубоководныхъ радіоляріевыхъ) сланцевъ, громадныхъ свитъ песчаниковъ и сланцевъ, безъ слѣдовъ животной жизни и безъ извести, но съ растительными остатками, снова песчаники, красные, уже безъ всякихъ слѣдовъ жизни, діагональнослоистые, съ горизонтами глинъ, обогащенныхъ солями; эта красная мертвая пустыня быстро заливается мелкимъ верхнемѣловымъ моремъ,

¹⁾ Во всяколъ случав только воловый. Д. М.

²⁾ Весьма убъдительныя и витересныя даннныя сообщены А. А. Матисеномъ—«Путешествіе въ Персію въ 1904 г.» Изв. И. Р. Г. О. XLI, с. 545. Авторъ наблюдалъ обильное выпаденіе лёсса, въ холодную и тихую ночь, подъ защитой-камешковъ, травинокъ и т. п. въ видъ «длинной тъни». На другой день этотъ осъвшій лёссъ былъ снова унесенъ вътромъ, такъ какъ ночва, не будучи влажной, не могла его удержать на мъстъ. Выдвигается значеніе росы въ накопленіи лёсса.

съ спорадическими банками устричныхъ, скопленіями мелкой фауны, частыми интеркаляціями гипсовъ, песчаниковъ, ныхъ мергелей и конгломератовъ: пестрый составъ, варьирующая мощность, спорадичность фауны. указываеть на мелкіе вытвящіеся заливы 1), удерживающіеся до конца эоцена или начала олигоцена. Тогда происходитъ ихъ отступаніе, и начинается интенсивная ръчной денудаціи, накопляющая въ освободившемся громалныя галечно-песчано-илистыя толщи, среди которыхъ чъмъ пальше, тъмъ больше появляются неслоистыя эоловыя образованія; это первоначальное обиліе, стекающей съ окружающихъ высокихъ хребтовъ, воды уменьшается періодически, но видимо такъ, что каждый последующій періодъ прибыли меньше предыдущаго; процессъ этотъ продолжается до сихъ поръ и находится уже въ зависимости отъ ледниковыхъ явленій, весьма отчетливо рисующихся во всёхъ верхнихъ частяхъ долинъ 2). Спорный теперь вопросъ высыханія страны всетаки рисуется геологическими данными; окончился ли онъ, или мы имбемъ сейчасъ лишь еще одинъ изъ многихъ влажныхъ этаповъ 3), не нарушающихъ общаго теченія, -судить не геологу.

¹⁾ Вырисовывающиеся теперь постепенно и на картъ.

²⁾ Не находя возможнымъ затрагивать здѣсь этотъ самостоятельный, сложный вопросъ и отсылая къ спеціальнымъ статьямъ—Huntington—A geologic and Phisiographic Reconnaissance in Central Turkestan»—(въ «Explorations in Turkestan» R. Pumpelly—1905.) и моей въ Изв. И. Р. Геогр. О-во 1911 г., я лишь скажу, что наличность значительно большаго прежияго развитія, сильнаго отмиранія, періодически прерывавшагося все болѣе слабыми моментами наступленія и соотвѣтственно успливавшвимися фазами междуледниковаго оживленія рѣчной дѣятельности, для Ферганскаго и Алайскаго хребтовъ,—почти несомиѣниы. Вътой же статьѣ на стр. 162—166 стратиграфическая схема и выводы изъ нея для Тянь—Шаня п Кашгаріи, близко совпадающіе съ моими.

³⁾ См. Л. Бергъ. «Аральское море» и другія статьи, посвященныя послъднему увеличенію влажности Туркестана, суммированныя только что въ Землевъдъніи «Объ изитненіяхъ климата въ историческую эпоху».

Это уже сфера метереологіи, ботаники, зоологіи, въ которую я надѣюсь внести лишь малую долю работы наблюденіями надъ ледниками 1).

11.

Въ предшествовавшемъ изложени неоднократно употреблялся терминъ «центральная или равнинная Фергана». Физико-географическая характеристика этого пространства, детально трактованная, имъется въ I т. «Туркестана» и «Очеркахъ Ферганской долины» Миддендорфа, не считая литературы послъднихъ дней.

Согласно даннымъ въ указанныхъ трудахъ опредѣленіямъ, въ разсматриваемый здѣсь районъ эта центральная, (чему равносильна и культурная Фергана) входитъ лишь своей незначительной восточной оконечностью; послѣдняя лежитъ, по моему, даже западнѣе меридіана Узгена — около Султанабада. Ширина ея здѣсь всего 20 — 30 верстъ, да и то еще по срединѣ около половины пространства занято грядой при-андижанскихъ адыровъ «Ала-Мышикъ», что значитъ «полосатая кошка» и весьма подходитъ къ внѣшнему виду этихъ неприглядныхъ бугровъ, съ сѣрыми полосами конгломератовъ среди свѣтло-желтаго фона перемежающихся съ ними песчаниковъ (см. выше). Такимъ образомъ на долю собственно равнины, и то съ покатой поверхностью, приходится сравнительно очень небольшая площадь, около 1000 квадратныхъ верстъ, сплошь покрытая интенсивной земледѣльческой культурой на мощномъ лёссѣ. Кромѣ

¹⁾ Въ пользу такого предположенія говорять послѣднія извѣстія о пониженіи Балхаша, и мои наблюденія, конечно поверхностныя, надъ усыханіемъ мелкихъ озеръ Ошскаго района, отмираніемъ ледниковъ, повальнымъ высыханіемъ ело выхъ лѣсовъ и т. д.

упомянутаго адыра Ала-Мышикъ, имфющаго высоту абсолютную съ небольшимъ 2000 футъ, подобные адыры — Япалакъ, Отузъадыръ, Пакана, Тульчи-опоясываютъ равнину съ S и SO, но уже до абсолютной высоты въ 4000 футъ. Все это область преимущественнаго развитія третичныхъ и потретичныхъ конгломерато-песчано-лёссовыхъ образованій сглажено-увалистаго рельефа обыкновенно безводная и малозаселенная. Благодаря образному составу толщи, слагающей адыры, формы денудаціи ихъ также поразительно однородны и правильны. Безчисленное количество совершенно одинаковыхъ, равно другъ отъ друга отстоящихъ и направленныхъ по одному азимуту 1), овраговъ бороздять ихъ съверные склоны; изъ моря этихъ съро-желтоватыхъ волнъ одиноко возвышаются мрачныя совершенно оголенные острова палеозоя. Общая площадь адыровъ 3000 квадратныхъ верстъ. Они развиты несравненно сильнъе въ предгорьяхъ Алайскаго хребта, нежели Ферганскаго; зато въ следующей зоне, более высокихъ, хотя тоже сглаженныхъ, предгорій, сложенныхъ мезозойскими отложеніями, димъ обратную зависимость. У Алайскаго хребта они почти отсутствуютъ, тогда какъ на SW склонъ Ферганскаго представляють доминирующій типь рельефа, особенно въ полосв между р. р. Кугартъ и Яссы, гдв онъ доходитъ мъстами до гребня хребта, т. е. до 10-11.000 футь абсолютной высоты.

Наконецъ, все остальное пространство обоихъ хребтовъ, равно какъ и второстепеннаго Узгенскаго Э являясь преимущественной областью развитія палеозойскихъ и кристалическихъ (Алай) породъ скалистаго, сильно разсѣченнаго, недоступнаго

¹⁾ Къ SW и SO отъ Оша онъ NW 330°.

Этимъ пменемъ я называю высокій узкій, скалистый гребень, съ высотами до 14000 футъ, протягивающійся къ О отъ Узгена между рѣками Яссы и Кара-Кульджой.

рельефа, съ высотами до 18.000 футъ, постоянными снѣгами и ледниками, относятся уже къ настоящимъ «высокогорнымъ формамъ» Е. Рихтера. Вмѣстѣ съ тѣмъ его же положеніе ¹) о раздвиганіи границъ соприкосновенія «высокогорныхъ формъ» и, характеризующихся связнымъ растительнымъ покровомъ, «формъ горъ средней высоты» пропорціонально сухости климата—тоже находитъ себѣ мѣсто; мы встрѣчаемъ здѣсь (Алай) промежуточный поясъ осыпей (Schuttregion), отсутствующій въ Альпахъ, но, видимо, гораздо меньшій нежели въ Тянь-Шанѣ, по свидѣтельству Фридрихсена ²).

Съ другой стороны, нельзя вполнѣ согласиться съ утвержденіемъ Рихтера, можетъ быть безупречнымъ для Альпъ, о полной независимости формъ рельефа отъ ихъ геологическаго строенія ³) (l. с., стр. 70). Наоборотъ, зависимость эта въ разбираемой области чрезвычайно велика и съ накопленіемъ геологическихъ фактовъ все болѣе выясняется. Эта тема настолько благодарная и широкая, что могла бы *составить предметъ цѣлаго большого труда въ духѣ новѣйшей «Topologie» Berthaut.

здѣсь отдѣльныя было бы Выхватывать ея клочки обидно, особенно безъ иллюстрацій, и поэтому совершенно опуская детали и отдъльное изложение роли каждой группы породъ въ созданіи рельефа, я обрисую вопросъ въ самыхъ общихъ чертахъ, въ особенности, поскольку онъ связанъ съ тектоникой.

¹⁾ Ed. Richter. «Geomorphologische Untersuchungen in den Hochalpen», 1900. Ergänzungsheft № 132 zu «Peterm. Mitt.», crp. 73.

²⁾ M. Friedrichsen. «Forschungreise in den zentralen Tian-Schan und Dzungarischen Alatau» 1912. Mitteil. der Geogr. Gesellsch. in Hamburg. B. XX, p. 160.

³⁾ Очевидно, потому что роль одеденёнія у насъ не доминирующая. Фририхсенъ и Hundington (l. с.) признають возможнымъ указывать на мёстное не силошное, соотвётствующее лишь позднёйшему Альпійскому.

III.

Самый поверхностный взглядъ на карту восточной Ферганы сразу улавливаетъ два направленія, въ которыя суммируются всѣ линіи рельефа — оро — и гидрографіи. Эти два направленія NW-ое и NO-ое красной нитью проходятъ какъ въ морфологіи, такъ и тектоникѣ, изъ чего уже ясно, что первая всецѣло зависить отъ второй. Направленія эти не мѣстныя; роль ихъ давно уже понята въ Средней Азіи, многократно трактована различными авторами, начиная съ Рихтгофена, какъ для всего континента, такъ и для отдѣльныхъ его частей.

Сводка всего этого богатаго матеріала уже исполнена мастерски Э. Зюссомъ въ III томѣ «Das Antlitz der Erde», и тѣмъ болѣе интересно теперь, опираясь на такую стройную, логическую схему, освѣщать значеніе новыхъ геологическихъ фактовъ и находокъ въ отдѣльныхъ, сравнительно небольшихъ, областяхъ. Подвергая ихъ этому анализу и постепенно систематизируя, съ удовлетвореніемъ видишь, какъ всѣ явленія все болѣе сплетаются между собой и гармонируютъ, какъ многія прежнія гипотезы падаютъ, а другія, наоборотъ, уже отброшенныя, оказываются не лишенными основанія при новомъ освѣщеніи.

Основными сочиненіями, занимавшимися указаннымъ вопросомъ въ восточной Ферганѣ, являются — Сѣверцова ¹) И. Мушкетова ²), и В. Вебера ³).

Кром'в того н'вкоторыя аналогіи и подтвержденія находятся у авторовь, работавшихь въ окружающихь областяхь, — у Эдель--

^{1) «}Орографическій очеркъ Памирской горной системы. Зап». И. Р. Геогр. О. т. XIII, 1886 и также «Путешествія по Туркестанскому краю» 1873 г.

^{2) «}Туркестанъ», т. 1 и II.

^{3) «}Краткій предв. отчеть о повздкі въ Фергану въ 1902 г. Изв. Г. К. XXII; «Геол. изслід. въ Сыръ-Дарьинской обл. въ 1904 г.» Изв. Геол. К. XXIV; «Андиж. землетрис...», 1, с.

штейна 1), Мейстера 2), Преображенскаго 3), Фридрихсена 4), Голубятникова 5), Кейделя 6), и Аргентова 7).

Обративъ прежде всего вниманіе на рѣки, мы замѣтимъ слѣдующее: всѣ стекающія въ долину съ сѣвернаго склона Алая, между меридіанами Андижана и Гульчи, направлены параллельно — NW $330^{\circ} - 320^{\circ}$, острый же треугольникъ съ вершиной у могилы Кулунчакъ сложенъ рѣками: Таръ — направленіе — 300° , Кара-Кульджа — 270° , Яссы — 240° , т. е. обнаруживается поворотъ въ SW-ое направленіе, которое и удерживается у всѣхъ правыхъ притоковъ, доходя у Кугарта до SW 220° . Замѣтивъ далѣе, что всѣ эти рѣки стекаютъ перпендикулярно къ направленіямъ соотвѣтствующихъ хребтовъ Алая и Ферганскаго, — мы получаемъ простираніе этихъ послѣднихъ — NO 50° — 60° и NW 310° .

Переходъ изъ NW въ SW направление въ треугольникъ Тара-Яссы указываетъ на уголъ, образуемый схождениемъ— столкновениемъ хребтовъ, а дальнъйшее течение р. Кара-Дарьи въ почти широтномъ направлении совпадаетъ съ равнодъйствующей обоихъ азимутовъ, обусловливая вмъстъ съ тъмъ покатость боковой долины Ферганы къ ея серединъ и общий ея наклонъ къ W. Простая эта схема, будучи однако весьма характерной, была приписана еще Съверцевымъ большинству долинъ Тянь-Шанской системы 8).

^{1) 1.} с.—«Верхнепал. слон Дарваза».

^{2) «}Геологическое описаніе маршрута Семипалатинскъ-Вѣрный». Труды Геол. Ком. — Нов. серія Вып. 51.

³) «Породы Кандыкъ-Таса» Изв. Геол. Ком., т. XXIX, № 3,—1910.

⁴⁾ l. c

⁵) Годовой отчеть Геол. Ком. 1906 г., стр. 76.

⁶) «Aus den wissenschaftlichen Ergebnissen der Merzbacherschen Tian-Schan-Expedition».—Abhandl. der Mathem. phys. Klasse der. K. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, B. XXIII—1909.

⁷⁾ Личныя сообщенія и Горн. Журналь 1911 г. № 1 и № 6.

⁸⁾ l. c., стр. 36.

Вглялываясь внимательнее, мы подметимъ однако некоторыя осложненія. Посл'в описанной выше обширной площади у устья Кугарта, Кара-Дарья, быстро съужаясь, прорезываеть поперекъ адыръ Ала-Мышикъ, въ наиболе широкой его части: вмъстъ съ тъмъ общій уклонъ долины, повидимому, существовалъ ранъе на SW отъ Султанабада къ Ассаке, согласно грандіозному арыку Шариханъ-саю, существующему съ незапамятныхъ временъ, врядъ ли совершенно искуственному и, конечно, возникшему лишь благодаря упомянутому склону долины; последній, возникшій при одномъ изъ новейшихъ NW-ыхъ поднятій 1), быль затымь измынень NW-мь, заставившемь рыку вь поискахъ пути прорвать адыръ по кратчайшему направленію. Такъ какъ такихъ прорывовъ адыровъ три--- Шариханъ-сая, Андижанъсая и Кара-дарьи, то возможно, что эти явленія чередовались неоднократно; следуетъ при учете ихъ принять во внимание еще слѣдующее: ІПариханъ-сай чрезвычайно углубляетъ верхнюю часть русла, всь три прорыва адыра лежать на продолжении теченій ръкъ — Аравана, Акъ-буры, Талдыка — и все въ SW направленіи.

Въ виду всего сказаннаго ясно, что чередованіе обоихъ направленій поднятія имѣло мѣсто, которое же было послѣднимъ не опредѣлено. Авторы «Андиж. землетряс.» считаютъ NW-ое направленіе старшимъ, говоря на стр. 42 «— . . . мы для плейстосейстовой области землетрясенія ²) имѣемъ новѣйшую NO антиклинальную складку, которая встрѣтила около прорыва Кара-Дарьи у Чангыръ-Таша болѣе древнюю складчатость ³), помѣшавшую спокойному NO-ому складкообразованію, слѣдствіемъ чего должны были произойти сложныя складки и разрывы».

Далье указывается что «образование складокъ (слъдов. NO-хъ)

¹⁾ NO и NW—Алайское и Ферганское поднятія въ смыслѣ простиранія ихъ, а не направленія силы.

²) Расположенной вдоль упомянутаго адыра, преимущественно съ W его стороны.

³⁾ т. е. след. NW-ую.

относится къ новъйшему геологическому періоду, настолько недавнему, что мы не можемъ утверждать, чтобы этотъ процессъ не происходилъ и теперь».

Въ этихъ, а равно и предшествующихъ (1. с., стр. 40—42) логическихъ построеніяхъ, категорическое утвержденіе старшинства NW-го направленія поднятій мнѣ все-таки кажется сомнительнымъ.

Абсолютно не затрагивая высоко-точныхъ наблюденій уважаемыхъ авторовъ и не вступая въ полемику, я позволю себъ лишь зам'втить, что даже столь детальное изучение тектоники, какъ произведенное ими надъ Сузакской складкой, но надъ ней одной, безъ обобщеній съ ближайшими ей, родственными элементами, врядъ еще даетъ надежное основание для ръзкаго, односторонняго приговора. Сравненія съ Ташкентъ-Чимкентскимъ райономъ, по причинамъ изложеннымъ ниже, не могутъ быть рышающими, равно какъ и со складчатостью южной части Ферганы; даже наиболье сильный аргупри-алайской ментъ — исчезновение и успокоение поперечныхъ NW складокъ Сузака «съ удаленіемъ на NW отъ свода продольной антиклинали» (=NO-ой), приводящее авторовъ къ кардинальному ¹) выводу, тоже еще можеть поколебаться, если принять во вниманіе частые случаи 2) однообразнаго наклона осей однотипныхъ складокъ въ силу различныхъ сложныхъ отражательныхъ, задерживающихъ и интерференціонныхъ явленій, такъ затуманивающихъ элементарный процессъ. Скажу проще, выразивъ зд'ясь же мою основную мысль, поясняемую дальн в шимъ изложеніемъ: -- въ сложныхъ, интерференціонныхъ складчатыхъ

^{1) «}Если бы NW-ое направленіе было новѣе NO-го, то складки перваго направленія шли бы и дальше; ... при образованіи антиклинали по NO, вдоль Кугарта, въ описываемомъ мѣстѣ была задержка, выразившаяся только въ тенденціи къ складкообразованію по NW-ому направленію».

 $^{^2)}$ См. ниже, а также на картѣ къ W—у и О отъ м. Кулунчакъ, Кумъбель и т. п.

районахъ, вродѣ восточной Ферганы, дѣйствіемъ тангенціальной силы одного направленія могуть образовываться, помимо складокъ ему присущихъ, другія, свойственныя второму—перпендикулярному направленію; или иначе—не всякая «алайская» складка обязана «алайскому» же поднятію въ чистомъ его значеніи, и слѣдовательно опредѣленіе относительнаго возраста самаго поднятія, особенно на небольшомъ участкѣ, можетъ быть и ошибочнымъ.

Не предрѣшая этихъ запутанныхъ вопросовъ въ ту или иную сторону, перейдемъ къ дальнѣйшему разсмотрѣнію матеріала, рисующагося и на прилагаемой картѣ.

Прослѣдивъ съ S на N линію рр. Гульчи-Куршаба и Кугарта отъ ур. Кызылъ-Курганъ до перевала Кугъ-Артъ, длиной около 200 верстъ, мы увидимъ большую пологую дугу съ выпуклостью, обращенной на западъ, составленную однако изъ нѣсколькихъ чередованій направленій:

- 1. Отъ Кызылъ-Кургана до Гульчи NO-ое.
- 2. Отъ Гульчи до Кочкаръ-ата N-ое.
- 3. Оть Кочкаръ-ата до устья Куршаба— NW-ое.
- 4. Далъе до Сузака 1) NW-ое.
- 5. Отъ Сузака уже NO и подъ конецъ ONO-ое.

Если мы сравнимъ эти линіи съ линіями простиранія палеозоя по тому же пути, то уб'єдимся въ полномъ ихъ совпаденіи; повидимому, онъ собранъ зд'єсь въ дв'є—три очень крупныя сжатыя складки (какъ это зам'єтно въ разныхъ м'єстахъ, лучше же всего между Кампыръ-роватомъ и Кулунчакомъ ²), вполн'є отчетливо уже проявляющіяся въ NO крыл'є дуги, между перевалами Кызылъ-су—Кугъ-артъ— Аубекъ; тамъ видны три

¹⁾ Пункты 4 и 5, можетъ быть, втрите дягутъ на Ханабадъ — и далте по р. Чангетъ-су, и долина Кугарта будетъ лишь витиней концентрической дугой. Полная размытость этихъ мъстъ усложняетъ вопросъ недостаткомъ наблюденій.

²⁾ Сплыная перемятость сланцевъ мѣшаетъ безупречному ихъ установленію— слоистыхъ же известняковъ здѣсь нѣтъ.

антиклинали (ONO-го простиранія) съ углами паденія отъ 10° — 60° , т. е. бол'є спокойныя и, соотв'єтственно, занимающія бол'є широкую полосу.

Возможно также, что это расхожденіе ихъ начинается именно съ устья Куршаба, порождая въ дальнъйшемъ рядъ параллельныхъ складокъ N-го и NON-го направленія въ возвышенностяхъ Сюрюнъ-тюбе; указаніе на это же мы находимъ, измѣряя простиранія въ горахъ Сугандэ по правому берегу Кара-дарьи, постепенно мѣняющіяся съ W на O, на протяженіи 6 верстъ, NW 320° до NO 20°; по серединѣ, а равно и противъ нея на лѣвомъ берегу простираніе меридіональное, параллельное теченію Куршаба.

Какъ бы тамъ ни было, но за чрезвычайную сдавленность этого мѣста (крайняго западнаго выгиба дуги), обусловленную дѣйствіемъ тагенціональной силы съ NO на SW, говорять слѣдующіе факты:

- 1. Крупныя складки съ отвъсными или поджатыми западными крыльями; отличный примъръ этого узкая, въерообразная, съ отжатымъ ядромъ, падающая на W антиклиналь въ оврагъ Кинъ-зилга.
- 2. Сильно развитый кливажъ, падающій очень правильно на SW; иногда же въ толстослоистыхъ, грубыхъ туфовыхъ (?) песчаникахъ видны двѣ системы правильныхъ трещинъ, заполненныхъ кальцитомъ, въ $^{1}/_{2}$ 1 сант. толщиной; построеніе равнодѣйствующей направленій паденія ихъ плоскостей даетъ азимутъ силы, шедшей съ NO 50° — 60° на SW 230° — 240° .

Жилы плотнаго діабаза (около Кампыръ-равата — Куль-Назаръ) прорѣзываютъ сланцы съ меридіональнымъ простираніемъ; также меридіонально расположены всѣ овраги. Мало того, аналогично же оріентированы многочисленные родники въ г. Сугандэ (что въ переводѣ значитъ «напился воды»); линейность же замѣчается и въ расположеніи горячихъ (очень слабо желѣзисто-сѣрнистыхъ — почти индифферентныхъ) источниковъ Хазретъ-Аюбъ. Послѣдніе вытянуты съ SSW на NNO — 15° на 3 версты, совершенно параллельно съ намѣченными выше складками, послѣ ихъ окончательнаго поворота на NNO. Возможность здѣсь продольныхъ нарушеній вполнѣ, слѣдовательно, вѣроятна и подтверждается еще опрокинутой складкой юрскихъ песчаниковъ, констатированной еще Ө. Н. Чернышевымъ.

Расположеніе молодыхъ свить около этого же мѣста, ясное безъ описанія, изъ карты, вполнѣ подтверждаеть все изложенное; можно лишь подчеркнуть основныя черты:

- 1. Доминирующее вліяніе силы съ NO видно въ характерѣ складокъ, проявленіяхъ вторичной ихъ плойчатости, направленной радіонально отъ препятствій, часто параллельно давленію, и въ наклонахъ осей складокъ.
- 2. Всѣ, даже противорѣчащія другъ другу, направленія обязаны возникновеніемъ въ данномъ случаѣ одностороннему давленію и отраженіямъ его отъ препятствій; иначе говоря, молодые осадки, отложившіеся среди палеозойскихъ массивовъ, уже построенныхъ по этому плану, при послѣдующихъ движеніяхъ испытывали, кромѣ внѣшней NO-ой, силы, еще и мѣстныя внутреннія.
- 3. Названные процессы захватили всѣ рѣшительно осадочныя образованія, разобранныя въ началѣ статьи, за исключеніемъ потретичныхъ 1) рѣчныхъ конгломератовъ, т. е.— «Ферганскія» NW поднятія несомнинно продолжались вплоть до конца третичной эпохи.

Естественно, что именно этимъ ослабленнымъ мѣстомъ перегиба дуги въ Кампыръ-роватъ воспользовался выводной каналъ громаднаго водосборнаго бассейна восточной Ферганы,

¹⁾ Не современныхъ.

съ площадью въ 10.000 кв. версть, заключающей гребни съ постоянными сивгами и ледниками; неоднократно, очевилно. возобновлялась складчатость, каждый разъ создавая новую работу Кара-дарь в и временно подпружая и теперь болотистую площадь Узгенскаго междурьчья; этоть же геологическій элементь «Куршабской» дуги и ея прорыва отразился и на другихъ географическихъ и этнографическихъ явленіяхъ. У нея кончается равнинная Фергана вмёстё съ осёдлымъ сартскимъ населеніемъ и его интенсивной землед'вльческой культурой; — за нею, въ обособленномъ, защищенномъ гребнями, мощными ръками и топкими болотами Узгенъ, могла возникнуть и долго просуществовать крошечная независимая монархія, державшая въ повиновеніи горныхъ кочевниковъ і); съуженіе Кампыръровата издавна использовано для отведенія громадныхъ оросимагистралей Шариханъ-сая и Андижанъ-сая, которыми и сейчасъ питается и живетъ одинъ изъ лучшихъ хлопковыхъ (не говоря о всемъ другомъ) районовъ Туркестана, площадью до 200.000 десятинь, и весь городь Андижань. Вышеуказанные меньшіе перегибы нашей дуги у Конуръ-тюбе и Кара-ташъ -- оба связаны съ выступами палеозоя и облекающими ихъ периклинально падающими молодыми отложеніями. Какова судьба Куршабской дуги ²) дальше въ сторонѣ? NO-ое крыло, мнв неизвъстное, можетъ быть, уходитъ въ Акъ-шійрякъ-

¹⁾ Значеніе культурнаго и торговаго центра для громадной горной округи, конечно, въ соотвътствіи лишь съ ея примитивными запросами. Узгенъ сохраниль и до сихъ поръ. О быломъже его расцвътъ можно судить по хорошей архитектуръ мечетей XIV въка, изобилію археологическихъ находокъ, большимъ многочисленнымъ укръпленіямъ, охватывающимъ его кольцомъ, съ удивительно талаптливой стратегіей, и многое другое, до сего времени почему то не обратившее вниманія спеціалистовъ.

²⁾ Указанія на нее и ей парадледьныя находятся въ І т. Туркестана, стр. 500—501, но несколько смутны, на карточке въ «Анд. землетряс.» она тоже частью намечена, но неточно.

тау, S-ое, поимѣющимся даннымъ И. Мушкетова, Ө. Чернышева и моимъ, вскорѣ за Кызылъ-Курганомъ заворачиваетъ на SSW и затѣмъ SW и WSW, слагая высокіе гребни Туюкъ-су, главнаго Алая до перевала Киндыкъ, а можетъ быть и дальше, вполнѣ ясно очерчиваясь и орографически.

Куршабская дуга является верхней половиной римскаго S съ яснымъ давленіемъ съ O; въ нижней его же половинѣ доказано давленіе обратное съ WNW и NW^{-1})—обстоятельства эти весьма важны и интересны.

Изгибъ южной части дуги видънъ также и въ параллельныхъ ей, по объ стороны, долинахъ, типично продольныхъ, заполненныхъ мъловой и третичной свитой, очевидно, отложившейся въ этихъ длинныхъ палеозойскихъ синклиналяхъ и затъмъ уже сжатой; во всъхъ обнаженіяхъ (вдоль по большой Памирской дорогъ, особенно южнъе Суфи-Кургана, и др.) отчетливо видна эта зажатостъ молодыхъ осадковъ, часто съ опрокинутостью на SO и въ видъ полуторныхъ складокъ, т.-е. антиклиналь синклиналь, иногда какъ бы подстилающихъ девонскіе известняки. Названныя синклинальныя долины тянутся такъ:

1) Ходжа-Келянъ-Мурдаш≱ Кызылъ-Курганъ ²). 2) Ольгинъ лугъ, Суфи-Курганъ-Мулла-бель. Обѣ онѣ, соединяясь южнѣе

¹⁾ Не приводя здѣсь подробныхъ разрѣзовъ и описанія, укажу лишь вкратцѣ: во всѣхъ разрѣзахъ Вебера 1902 г. (1. с., стр. 45—3) видна опрокинутость мезозойскихъ и третичныхъ складокъ къ SO, въ отчетѣ же за 1909 г. (годовомъ) имъ указано, что палеозой, наоборотъ, опрокинутъ къ N; по совокупности же данныхъ Черны шева, Маркова и моихъ для бассейновъ рр. Аравана, Акъбуры, Талдыка и Гульчи, совершенно отчетливо рисуется наростаніе складокъ къ SO—опрокидываніе и поджатость южиыхъ ихъ крыльевъ.

²⁾ И. Н. Рейнвальдъ, пересъкшій льтомъ 1911 г. Алайскій хребеть по меридіану Науката, сообщиль мнь, что въ верховьь долины восточнаго Кичикъ Алая, подъ переваломъ Агт-артъ имъ также встръчены мыловыя отложеніи и очевидно, юрскія съ каменнымъ углемъ. Такимъ образомъ узкая полоса мезозея, повидимому, очень длинна, хотя въ настоящее время отдыльные ей участки уже и разобщены другъ съ другомъ.

Гульчи, протягиваются далье на Аджике, Токубай къ р. Таръ. Обстоятельство это было въ общихъ чертахъ подмъчено еще Съверцевымъ: на стр. 204, мы читаемъ у него, что «Кур-шабскій мелкосопочникъ», которымъ «наполнено все пространство между снъжными массивами Терекъ-даванскимъ и Кчи-алайскимъ... — можно считать неровностями дна широкой меридіональной долины, раздъляющей объ только что названныя горныя группы» 1).

Вторая м'вловая синклиналь ограничивается съ О чрезвычайно высокой, сплошной грядой Беляули, повторяющей все т'в же направленія: она начинается у перевала Талдыкъ съ ОNО простираніемъ и м'вняетъ его на NO между Шартъдаваномъ и Терекъ-даваномъ; дал'ве, около пер. Беляули и с'вверн'ве вид'внъ переходъ простираній въ NW.

Простираніе породъ и на этотъ разъ согласуется съ орографіей; къ востоку имѣется снова объемлющая полоса мезозоя (укр. Иркештамъ), съ тѣми же характерными чертами залеганія, какъ и раньше указанныя. Итакъ, изъ этого краткаго невольнаго отступленія за предѣлы нашей карты явствуетъ главнымъ образомъ S-образное простираніе свитъ; главный перегибъ ихъ восточнѣе меридіана Гульчи и почти на ея широтѣ — у западныхъ дугъ южнѣе, у восточныхъ сѣвернѣе. Оставляя южную ихъ половину, какъ мало еще намъ извѣстную, разберемъ подробнѣе имѣющіяся сейчасъ данныя о сѣверной.

Въ самой вершинкъ р. Донгузтау-Саза весьма отчетливо видна палеозойская антиклиналь NO простиранія, съ наклонной къ SW осью; сперва ея смытое SO крыло, а на Кумъбелъ и гребень, несогласно прикрыты сърыми грубыми песча-

¹⁾ Далье Съверцевъ указываетъ связь «мелкосопочника» съ съдловиной Кызылъ-арта, поперекъ Алайской долины, для установленія меридіональнаго хребта Белаули-Терекъ-даванъ-Памиръ, что является врядъ ли пріемлемымъ.

никами и глинистыми сланцами, съ оруденѣлыми (Fe) песчаниками, растительными отпечатками рэтическаго возраста и углемъ; толстая пелена этой свиты, разнообразно плавно волнуясь, занимаетъ все пространство верховьевъ Зергера, Донгузтау и Каргаши, не спускаясь въ долины и ограничиваясь лишь верхними частями водораздѣловъ; вездѣ изъ-подъ нея ниже выходитъ крутостоящій палеозой съ NO простираніемъ.

Двигаясь къ низовьямъ упомянутыхъ рѣкъ, мы видимъ слѣдующее: простираніе палеозоя постепенно загибаетъ въ N и NNW, простираніе мезозоя слѣдуетъ тому же, но лишь съ несогласными, меньшими углами паденія; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ спускается абсолютно ниже 1) и, будучи смытъ съ высшихъ точекъ, занимаетъ уже склоны и долины. Къ юрской свитѣ на р. Яссы прибавляются всѣ вышележащія, и весь комплексъ тянется на SO къ рѣкамъ Кара-Кульджѣ и Тару, вступая вскорѣ за послѣднимъ въ меридіональную Беляулинскую часть (см. выше).

Мы видимъ полный параллелизмъ съ Куршабской дугой; назовемъ эту вторую Кульдукской. Рѣка Кульдукъ въ своей нижней половинѣ вполнѣ слѣдуетъ дугѣ; противъ ея устья, въ правомъ берегу Яссы отлично видна полуторная складка мезозойскихъ песчаниковъ («сѣрыхъ» и «красныхъ»)— она же еще лучше выражена въ правомъ берегу Кара-Кульджи у устъя Секелека, гдѣ вдобавокъ видно и палеозойское вертикальностоящее ядро маленькой антиклинали; во всѣхъ случаяхъ крылья SW вдвое круче и даже въ верхнемѣловой свитѣ имѣютъ уголъ 60°. Если отъ описанныхъ складокъ мы поѣдемъ вверхъ по Яссы, то красныхъ мѣловыхъ песчаниковъ мы не встрѣтимъ нигдѣ; если сдѣлаемъ тоже на р. Кара-Кульджѣ, то увидимъ

 $^{^{1})}$ Въ верховьяхъ Саза онъ не ниже $5800\,$ футъ абсол. в., а въ устьb—уже $3500\,$ ф. и ниже.

ихъ дважды, черезъ равные промежутки, съ тѣмъ же угломъ паденія, оба раза согласно подстилающими и покрывающими палеозой.

Ръчка Кокъ-джангакъ разсъкаетъ лишь первую полосу, верхняя половина Кульдука — обнажаеть объ.

Перевалы Кокъ-джангакъ ¹), Бозъ-алды ¹), и Токсанъ-Кампыръ, а также долинки, одноименныя двумъ послѣднимъ, обязаны своимъ существованіемъ этимъ полосамъ мезозоя. Въ висячемъ боку каждой полосы палеозойская свита обнаруживаетъ сильное возмущеніе, на продолженіи же этихъ линій къ NW, въ ущельи Ничке, — въ видѣ антиклинальной смѣны паденій.

Единственно возможнымъ объясненіемъ совокупности этихъ странныхъ явленій служитъ, по моему, допущеніе складчатыхъ сбросовъ ²) съ плоскостями, падающими на WSW, и вдобавокъ, осложненныхъ опусканіемъ по поперечнымъ трещинамъ.

Оставляя Кульдукскую дугу, переходимъ дальше на востокъ и видимъ опять-таки какъ будто странную картину: палеозойская свита обнаруживаеть запутанное, иногда периклинальное залеганіе, съ сохраняющейся однако выпуклостью простираній на W, тогда какъ надъ ней тянутся правильныя, длинныя волны рэтической свиты. Простираніе этихъ складокъ чисто NW-ое $(300^{\circ} - 330^{\circ})$, и всё онё ясно наклонены къ SW; такимъ образомъ, мы достигли настоящей «Ферганской» складчатости, несомнънно мезозойскаго и третичнаго двигавшейся съ NO, а вмёстё съ темъ и Ферганскаго хребта. Гребень его, удерживая въ общемъ то же простираніе, отодвинулся къ NO отъ своего первоначальнаго положенія, совпадавшаго, в фроятно, съ одной изъ наибольшихъ антиклиналей ближайшую плоскую синклиналь; приходится чаще на болье энергичное размывание SW склона хребта видно

¹⁾ Иначе-Келенчекъ и Джошаликъ.

^{2) «}Plis failles"=Regime imbriqué"-Haug. Traité de Géologie», т. І, рис. 55.

сейчасъ. Слъдовательно, здъсь Ферганскій хребетъ тектоническій, хотя и измъненъ денудаціей. Переваливъ черезъ него, мы снова сталкиваемся съ ясно выраженнымъ NW направленіемъ сперва въ долинахъ р. Джилангачъ, Пчана (=Кокъ-кія) и Кылъ-дау, и, наконецъ, въ узкой полосѣ выходовъ массивнокристаллической породы (сіенитъ — монцонитъ), прорывающей каменноугольные известняки, —очевидно внутренній край «Ферганской» дуги—Іппенгано Зюсса.

Мы видѣли проявленіе NO-ой силы, т. е. NW-ыхъ, «Ферганскихъ поднятій», на всѣхъ отложеніяхъ, кончая третичной, преимущественно складчатостью, такъ сказать, въ сферѣ чистаго ея вліянія. Посмотримъ теперь, проявляется ли она въ чужой области, въ сферѣ вліянія NW-ой силы, т. е. NO-ыхъ «Алайскихъ поднятій»— особенно же на ихъ новѣйшихъ отложеніяхъ.

На всемъ пространствѣ къ W отъ Куршаба, въ предгорьяхъ Алая, обнаруживаются складки NO-го простиранія, какъ палеозоя, такъ и мезозоя, включительно до третичныхъ конгломератовъ; вторыя ясно наклонены къ SO. Если же мы взглянемъ на карту, то увидимъ мѣстами сдвинутость частей одной складки относительно другъ друга. Попробуемъ установить направленія этихъ сдвиговъ.

А) Урочище Чакмакъ — правая (О) оконечность мѣловой антиклинали ясно передвинута къ NW и опущена; — у кишлака Ташъ-ата палеозойская гряда Чиль-майрамъ передвинута къ NW и опущена относительно Чильустуна; на это указываютъ всѣ данныя измѣренія и стратиграфіи, собранныя шестью наблюдателями, и сильные родники 1), пріуроченные только къ этой линіи.

¹⁾ Къ востоку отъ Андижана у кишлака Экинъ-чекинъ, около прорыва адыра, авторами «Андиж. землетряс.» опредъленъ его эпицентръ. (1. с., стр. 60). Тогда же въ кишлакъ Кара-Калпакъ В. Веберъ, наблюдалъ спльный ключъ холодной воды. лежавшій среди площади, въ 3 в. длиной и 400 саж. шириной, выходовъ сърныхъ источниковъ; оба эти пункта находятся на продолженіи линіи указанныхъ сдвиговъ и могутъ находиться съ ними въ связи.

В) Далве къ востоку можно указать: небольшія анрушенія и сбросы NW-го направленія Турпакъ-бель, около Кочкаръ-ача на р. Куршабъ, на р. Будалыкъ и др., а также слъдуетъ замьтить, что отголоски сильнаго нарушенія Кульдукской дуги, по NW же направленію, и тоже всегда съ опусканіемъ SW стороны, замьчаются въ верхней части Зергера (соединеніе Турпесу и Талды-су) и на львомъ берегу Кугарта, противъ устья Кызылъ-су (см. на карть красный пунктиръ).

Многія изъ этихъ NW-ыхъ линій нарушенія совпадаютъ съ долинами рѣкъ и возможно что они окажутся своего рода Lineament'ами въ духѣ Hobbs'a. Для выясненія вѣроятной причины указанныхъ сбросовъ выслушаемъ рядъ мнѣній въ цитатахъ:

«Поперечныя линіи Тянь-Шаня»— (ergo — Алая?)— «параллельны съ линіями простиранія Кара-Тау» (Сѣверцовъ. Путеш. въ Туркест. край, стр. 79).

Въ Ташкентскомъ районѣ В. Веберъ 1) находитъ, что ... «мѣстами Каратаусское (=NW) старое 2) простираніе удержало въ этомъ направленіи и простираніе сбросовъ» — повидимому, однако, только въ палеозоѣ. Онъ же, въ годовомъ отчетъ 1909 года 3), констатируетъ для Маргеланскаго уѣзда присутствіе, кромѣ продольныхъ, и поперечныхъ небольшихъ сбросовъ въ палеозоѣ.

И. Мушкетовъ и Д. Голубятниковъ указывають на NW сбросы— уже въ мѣлу и эоценѣ— на нефтеносной площади Майли-сая. Обращаясь къ болѣе отдаленнымъ, но родственнымъ областямъ, находимъ чрезвычайно интересные выводы у четырехъ новѣйшихъ излѣдователей: А. Мейстеръ 4), въ нѣкоторомъ согласіи съ прежними указаніями В. Обручева и Зюсса,

¹⁾ l. c. (4)-crp. 359.

²) Объ этомъ ниже.

³⁾ Изв. Геол. Ком. Т. XXIX, стр. 154.

⁴⁾ l. c., стр. 69 и др.

приписываеть весьма важное значение въ Тарбагата и Джунгарскомъ Алатау дизъюнктивнымъ линіямъ двухъ направленій, съкущимъ соотв тственныя дв категоріи складокъ и обусловливающимъ собой основныя черты рельефа.

Преображенскій ¹) находить громадное значеніе NW-ой дизьюнктивной дислокаціи въ Чу-Илійскихъ горахъ и полную невозможность приписывать ей до-мѣловой возрастъ ²), въ смыслѣ столь долгаго сохраненія первоначальнаго рельефа — грабена р. Копы.

Наконець, какъ Кейдель (l. с.), такъ и Аргентовъ говорять о NW сбросо-сдвигахъ, разсѣкающихъ однообразныя NO-ыя складки Тянь-Шаня.

Такимъ образомъ, мы видимъ постоянно, при столкновеніи двухъ вѣтвей (NW и NO), проявленіе вліянія одной изъ нихъ на складкахъ другой, въ видѣ— дизъюнктивной дислокаціи, сопровождающей складчатость первой.

Путемъ всѣхъ изложенныхъ разсужденій, весьма конечно схематическихъ, мы обнаружили у Ферганскаго хребта всѣ необходимые и достаточные признаки самостоятельной пликативной дуги Зюсса, образованной дѣйствіемъ силы съ NO; мы имѣемъ внутренній край, съ прорывомъ кристаллической породы, складчатую цѣпь, съ опрокидываніемъ въ сторону движенія и все большей выпуклостью ея концентрическихъ дугъ, и наконецъ, переднюю часть, съ полосами параллельныхъ нарушеній.

Что же это за дуга, каково ея отношеніе къ общему Тянь-Шанскому плану, и что встрѣчаетъ она въ своемъ стремленіи къ SW? И. Мушкетовъ (I т., стр. 37) опредѣляетъ

¹⁾ l. c., etp. 320.

²⁾ Синхронизируя съ «Каратаускимъ-древнимъ» поднятіемъ Вебера.

ее, какъ начало самой большой — окраинной Тянь-Шанской дуги, отъ 43° вост. долг. протягивающейся хребтомъ Кокъ-Шалъ до $49^{4}/_{2}^{\circ}$ в. д. — m. е. какъ NW-ую вътвъ, и тамъ же говорится, что Алайская дуга отъ 30° в. д. доходитъ до 44° (р. Алайку), т. е. пространство между 43° и 44° в. д. является мъстомъ столкновенія двухъ направленій складчатости, которыя здѣсь грандіознѣе чѣмъ гдѣ либо (l. с., стр. 478).

Къ этому мъсту пріурочены разобранныя выше меридіональныя части Куршабской и Кульдукской дугъ, гребни Туюкъ-су и Беляули, съ заключеннымъ между ними «мелкосопочникомъ», которые отклоняются затёмъ на SW; въ дугахъ этихъ, около массива Тастаръ-ата $(43^{\circ} 15')$ в. д. и $40^{\circ} 16'$ свв. шир.), происходить, следовательно, какъ бы спаивание NW-ой ветви одной большой дуги съ NO-ой другой, при этомъ первая скорфе деформируетъ вторую, отграничиваясь отъ нея довольно правильно своей касательной, проведенной примърно отъ Гульчи на SO къ укрѣпленію Улугчать $(43^{\circ} 55' \text{ в. д. и } 39^{\circ} 49' \text{ с. ш.}).$ У Улугчата наблюдается быстрая сміна NO-го простиранія— NW-ымъ, переходящимъ въ широтное около 44° 15' в. д.; последнее сохраняется почти до меридіана Каштара (45° 30'), заворачивая далъе на NO. Между Улугчатомъ и Кашгаромъ, около 45° в. д., мы имъемъ южную оконечность нашей ферганской дуги, чрезвычайно отчетливо охарактеризованную, по свидетельству О. Н. Чернышева, опрокинутыми на S складками, очень крутыми, въерообразными, со сдвинутыми въ NS направленіи частями; лучше всего это проявляется какъ разъ по серединъ всего разстоянія, около угольныхъ копей Канъ-су Каргашинъ-кани, гдв кромв того констатируется полное тождество свитъ съ развитыми въ Андижанскомъ районъ. Тъ же стрые песчаники съ глинистыми сланцами и углями (Маркай), подстилающіе мощную (200 с.) малиново-красную свиту, прикрытую устричнымъ мергелемъ, затѣмъ розовымъ песчаникомъ и, наконецъ, известняками «Ферганскаго» яруса.

Слѣдовательно, складчатая цѣнь нашей дуги, помимо связи простираній, вполнѣ удерживаетъ и весь комплексъ осадочныхъ образованій, присущій внѣшней части ея NW-ой вѣтви, т. е. именно фаціи предгорій Ферганскаго хребта, а не Алайскаго.

Для полноты лишь добавлю, что выступы изверженныхъ породъ къ N отъ Кашгара, т. е. по внутренней сторонѣ дуги, найдены Столичкой, Богдановичемъ, Чернышевы мъ и др., и что эпицентръ Кашгарскаго землетрясенія 1902 г. былъ вытянутъ изъ него на NW.

Какъ же собственно происходитъ столкновеніе Ферганской и Алайской дугъ—отвътомъ на это, пока, я думаю лучше всего можетъ быть ссылка на Зюсса и сравненіе съ областью стеканія — «Herabfliessens» Тянъ-Шанскихъ вътвей по западной сторонъ NW-го конца Яркендской дуги, послъ ихъ столкновенія у Мустагъ-ата, совпадающей, въ свою очередь, съ классической «Scharung» у Yhelum 1).

Констатировавъ такимъ образомъ безусловную самостоятельность NW-ыхъ подъемовъ въ восточной Ферганѣ, перейдемъ къ опредѣленію ихъ возраста. Всѣмъ предыдущимъ изложеніемъ, однако, на это уже отвѣчено: поднятія происходили многократно, начиная съ древнѣйшаго времени и по третичную эпоху включительно—возможно, что и послѣ нея.

Относительно Алайскихъ NO поднятій приходится сказать буквально то же, и, слѣдовательно, ни одно изъ нихъ нельзя называть старшимъ; NW-ыя и NO-ыя поднятія однородны

¹) См. І. с. III т., стр. 349 и 390.

между собой и происходили всегда многократно, то чередуясь, то совпадая.

Для полноты освъщенія вопроса обратимся еще разъ къ литературъ.

У Сѣверцева мы находимъ почти буквально і) нашъ выводъ: — «подъемы каждаго направленія повторялись, не измѣняя направленія, по нѣскольку разъ, въ перемежку съ осѣданіями, въ разные геологическіе періоды, до позднѣйшихъ включительно».

Прежде чѣмъ высказать эту общую мысль, тотъ же авторъ относительно при-Чиркинскихъ хребтовъ поднялъ вопросъ о старшинствѣ одного изъ поднятій, а И. Мушкетовъ опредѣлялъ для «чулей» два пересѣкающихся.

Эта тема обратила особое вниманіе В. Вебера ²), который на основаніи тщательнаго изученія Ташкентско-Чимкентскаго района пришелъ къ слідующимъ выводамъ:

- 1. Каратауское поднятіе стар'вйшее, происшедшее до отложенія юры и между юрой и м'вломъ второй разъ, Чаткальское же (NO-ое) поднятіе—третичное, отступанія отъ котораго лишь въ перемычкахъ куполовъ.
- 2. Кара-тау даетъ убъдительныя доказательства въ пользу этого положенія.
- 3. Юрскія угленосныя отложенія пріурочены къ NW простиранію.
- 4. Послѣпалеозойскую складчатость надо строго отдѣлять отъ послѣтретичной.

Правильность всѣхъ положеній по отношенію къ этому только району оспаривать сейчась никто не вправѣ, но если

^{1) 1.} с., стр., 9-только онъ принималъ четыре самостоятельныхъ направленія подъемовъ.

^{1) 1.} с., Изв. Геол. Ком. Т. XXIV, стр. 360-др.

только понятіе Каратауское и Чаткальское поднятія, съ приписанными имъ свойствами, распространить внѣ самихъ Каратау и Чаткала, то несоотвѣтствія возникають сразу.

Два такихъ примъра, выше разобранные, уже имъются въ статьяхъ Преображенскаго и «Андиж. землетрясеніе». Ни 1), ни 4) т. е. основные пункты Вебера тогда не оправдываются.

Причина этого мнѣ представляется въ томъ, что, къ сожалѣнію, В. Веберу не удалось изучить самаго угла—столкновенія Кара-Тау и Таласскаго-Алатау, составляющаго предметь этой статьи.

Возможно предположить еще, что Кара-тау, въ качествъ NW вътви другой, болъе съверной дуги, чъмъ Ферганская, раньше этой остановился въ своемъ движеніи и наростаніи, но данныя Преображенскаго этому противоръчать.

Повторю только, что строеніе восточной Ферганы этимъ положеніямъ безусловно противоръчить.

Въ заключеніе, вспомнимъ воззрѣніе И. Мушкетова, что два направленія поднятія составляють одно цѣлое и есть результать однихъ и тѣхъ же геологическихъ процессовъ, происходившихъ одновременно, а потому выдѣленіе двухъ самостоятельныхъ системъ неумѣстно и повторяетъ старую ошибку Гумбольдта и Рихтера.

Къ этому же всецьло присоединяется и Зюссъ, лишь добавляя, что несомнънная интерфенція NW и NO складокъ указываеть, что, помимо общаго большого движенія всѣхъ Тянь-Шанскихъ дугъ, каждая отдѣльная часть должна имѣть и имѣла, до извѣстной степени, собственное движеніе, проявлявшееся временами при особыхъ обстоятельствахъ и вызвавшее интерференцію образованіемъ новѣйщихъ вторичныхъ складокъ («протискиваніе складокъ»). Но эта интерференція соотвѣт-

ствуетъ не постороннимъ вліяніямъ, а лишь росту основныхъ дугъ.

Въ заключение суммирую свои возгрѣнія:

- 1. Ферганскій хребеть есть нетолько різко выраженная орографическая единица, но и тектоническая—южніве Кугарта.
- 2. Какъ таковая, онъ въроятно является NW-ой оконечностью одной изъ большихъ Тянь-Шанскихъ дугъ, составляя съ нею неразрывное цълое въ общемъ движеніи на S.
- 3. Соотв'єтственная составляющая этой силы для Ферганскаго хребта—NO-ая обусловливаеть все его строеніе, въ частности же, всей площади восточной Ферганы, или еще точніє, Узгенскаго края.
- 4. Проявленія этой силы видно на всёхъ осадочныхъ породахъ, начиная, отъ нижняго девона.
- 5. Южнъе и западнъе Гульчи начинается столкновение нашей вътви съ NO вътвью Алайской дуги; выражающееся въ дизъюнктивной дислокаціи второй по направленію первой.
- 6. Морской жизнью страна жила съ нижняго девона по верхній карбонъ и съ турона по олигоценъ.
- 7. Всѣ элементы Ферганы обязаны своей формой и строеніемъ одному, повсемѣстному, продолжительному и повторявшемуся, процессу складчатости и послѣдующей дизъюнктивной дислокаціи. Въ каждомъ отдъльномъ мъсть важно преобладаніе извъстнаго направленія, а не древность его, вездъ одинаковая.

Полезныя ископаемыя.

Въ нижеслѣдующемъ содержатся лишь краткія общія данныя о распространенности и характерѣ залеганія имѣющихся въ районѣ полезныхъ ископаемыхъ.

Уголь. Относительно даннаго небольшого района приходится, къ сожалѣнію, сказать почти то-же, что говорится о Туркестанѣ вообще ¹): количество каменноугольныхъ мѣсторожденій велико, но цѣнность ихъ въ большинствѣ случаевъ ничтожна, или по нарушенности, или по плохому качеству.

Лучшее до сихъ поръ извъстное, повидимому, Маркайское, по р. Чангетъ-су, въ 90 верстахъ отъ г. Андижана. Описаніе его содержится на стр. 54—55 «Андиж. землетряс.», и все, сказанное о характеръ угленосной свиты, остается въ силъ и для другихъ мъсторожденій; обычно она состоитъ изъ толщи около 5—10 саж., жельзистыхъ песчаниковъ и глинистыхъ сланцевъ, отпечатками растеній (тріасъ-юра) и пропластками угля. Толщина, количество и качество последнихъ даже на маленькихъ разстояніяхъ міняются чрезвычайно. По сдъланнымъ мною наблюденіямъ, угленосная толща, непосредственно налегая на палеозой, иногда обманчиво согласно (см. выше), подчинена свить толстослоистыхъ, свътло-сърыхъ, кварцевыхъ и кремнистыхъ песчаниковъ, грубозернистыхъ или брекчіе- и конгломератовидныхъ; отсутствуетъ же въ иномъ петрографитинъ тріасо-юрской свиты «агатанскомъ», гораздо болъе мощномъ, состоящемъ преимущественно изъ сланцевъ, горизонтами средне - и мелкозернистыхъ красноватыхъ, СЪ слоистыхъ песчаниковъ, и развитомъ по самому Ферганскому хребту.

Соотвътственно такому распредъленію, угленосная толща занимаеть лишь среднюю часть предгорій Ферганскаго хребта: изъ этого слъдуеть еще исключить мъста сильнаго смыва и интенсивной дислокаціи. Въ концъ концовъ, остается лишь пространство между рр. Кугартъ и Яссы, ограниченное меридіа-

¹⁾ И. Мушкетовъ, І. с., ІІ Т., стр. 298.

нами 42° 45′, и 43° 30′, в. д. и то еще состоящее изъ ряда отдъльныхъ разобщенныхъ площадокъ. Причинами этой разобщности, какъ это явствуетъ изъ карты, являются два фактора—складчатость и денудація, та и другая весьма интенсивныя; къ нимъ еще присоединяется третій немаловажный—сильное развитіе оползней и оплывинъ, именно, пріуроченное къ мъстамъ залеганія угленосной свиты.

Въ виду того, что последняя, въ верхней части состоя изъ пластовъ, сильно водопроницаемыхъ, а въ нижней - водоупорныхъ глинистыхъ, обычно залегаетъ на плотныхъ палеозойскихъ сланцахъ ничемъ не удерживаемыми лепешками, то разрушенія чрезвычайно сильны; свита превращается буквально въ тъсто, сползающее съ крутыхъ склоновъ громадными площадями, во время весенняго снеготаянія, въ особенности же по гладкимъ круго стоящимъ плитамъ палеозоя 1), уничтожая совершенно уголь и усыпая подножье склона песчаника. Съ параллелепипедами толстослоистаго тельствомъ этимъ безусловно следуетъ считаться углепромышленникамъ; всв видвиныя мною мъсторожденія были неблагополучны и въ этомъ отношеніи. Живой же прим'єръ неудачнаго выбора угленосныхъ площадей имфется на р. Донгузътау; три столба были пеставлены заявщикомъ исключительно уцѣлѣвшими на территоріи оплывины, съ немногими лишь «свидьтелями», тоже весьма угрожаемыми.

Оговариваясь о такой, зависящей отъ различныхъ причинъ, недоброкачественности угольныхъ мъсторожденій, перечислю лишь нъкоторыя.

¹⁾ Одинъ изъ лучшихъ примъровъ находится на р. Кугартъ, у Таранъ-базара, гдъ неосмотрительно проведенный по песчаникамъ спускъ къ мосту въ теченіи 5 лътъ исчезъ; зигзаги колесной дороги, стоившей много, безслёдно сплыли по ровной (даже блестищей) крутой плоскости кремнистаго сланца.

Все сказанное (l. с.) о Маркав, я вполню раздёляю, считая, что наибольшаго довёрія заслуживаеть площадь къ западу и сверу отъ настоящихъ работъ. Кстати, со времени посвіщенія Маркая Бронниковымъ и Веберомъ въ 1903 г., по сіє время существенныхъ измёненій тамъ не произошло: уголь нёсколько разъ въ годъ добывается г. Спечовымъ, въ небольшихъ количествахъ открытыми работами, и отвозится на ослахъ для мёстнаго потребленія, особенно же въ Джалабадъ. Мощность пласта Маркая—до 13/4 метра, при 10 прослойкахъ пустой породы, въ 13,5 сантиметровъ общей толщины, лучшаго изъ до сихъ поръ видённыхъ по качеству угля.

Другія проявленія свиты находятся или ожидаются по среднимъ теченіямъ рѣчекъ Джиланды, Ничке, Зергеръ, Джангыръ (между нимъ и Торіельгой) Донгузъ-тау,—на водораздѣлахъ, между ней и Зинданъ-су, а также послѣдней и Улугчатъ, около гряды Чааръ-Ташъ, вплоть до перевала этого имени, по р.р. Сазъ, Турпе-су и Талды-су.

Между двумя послѣдними залежь Кумъ-бель давно извѣ-стна, но по причинамъ смыва, выше указаннымъ, аналогично Маркаю испорчена; перевалъ Кумъ-бель, представляя антиклиналь палеозоя, приподнявшуюся затѣмъ уже вмѣстѣ съ отложившейся угленосной свитой, сверху ею облеченъ. На его гребнѣ и продолженіи Комеръ-ташъ свита горизонтальна, на южномъ склонѣ падаетъ SO (∠20—25°), спускаясь къ руслу Турпе-су; здѣсь часто видна на оползняхъ сажа; на сѣ-верномъ склонѣ паденіе на NW почти совпадаетъ съ рельефомъ и сильно размыто; за то продолженіе этого крыла въ правомъ берегу Талды-су, недалеко отъ Долона-мазаръ, должно быть надежнѣе, — паденіе NNW ∠15°. Пластъ около 1¹/₂—2 арш.

Схематическій разрѣзъ Кумъ-бельской угленосной свиты сверху внизъ:

	саж.	apm.
1) Брекчіевидный грубый, сёрый песчаникъ болёе.	10	
2) Голубовато-стрые, свттлые, рыхлые, мелкозер-		
нистые песчаники, книзу охристые	4	
3) Глинистые сланцы съ растительными отпечат-		
ками, ръдкими и плохими		1
4) Сажа 1,5 арт. до .		2
5) Толща охристых песчаниковъ, большей частью		
глинистыхъ, мелкозернистыхъ и сланце-		
ватыхъ, частью же сильно оруденѣлыхъ		
(Fe), плотныхъ — отдъльными болъе тол-		
стыми пластами среди первыхъ; первые		
лишь съ поверхности покрыты бурой кор-		
кой съ разводами, внутри же сърые; вто-		
рые очень темные тяжелые, содержать		
наилучшіе растительные отпечатки въ		
большомъ количествъ	30	 '
6) Глинисто-песчанистые сланцы, вродѣ (3), съ		
- тонкой сажей	1	
7) Глина пепельнаго цвѣта		2
8) Сажа около		1
9) Глинистые сланцы, съ растеніями и сажей .	'	1
10) Сърые и охристые слоистые песчаники.		

Восточные названныхъ мысть я не считаю возможнымъ нахождение угля—да, въ сущности, это было бы и вообще безполезно по недоступности.

Следуеть заметить, что ведь и все указанныя места находятся въ весьма неблагопріятномъ положеніи въ смысле доставки: во-первыхъ, minimum 90 версть отъ железной дороги, изъ коего разстоянія ²/з арбяной дороги, затемъ трудная переправа черезъ Кара-дарью, не всегда возможная, и остальная ¹/з вьючнаго пути съ большими спусками и подъемами.

При такихъ условіяхъ я думаю совершенно нельзя разсчитывать на постановку крупнаго дела съ вывозомъ на жельзную порогу, мелкая же кустарная добыча можеть быть и не безвыгодной, такъ какъ 1) работы почти вездё могутъ быть или открытыми, или вестись штольнями; 2) въ прилежащихъ мъстахъ есть удовлетворительный лёсь для крёпленія; 3) уголь всегда будеть спускаться въ долины; 4) качество угля весьма влетворительно, если только не слишкомъ много прослойковъ; оно выше всвхъ другихъ имъющихся въ Ферганв, по малозольности, хорошему коксованію и чрезвычайной крупости. Вторымъ качествомъ очень дорожать многочисленные кузнецы туземцы, платящіе до 80 к. за пудъ, въ виду недостатка и все уменьшающагося количества древеснаго угля. Третье качество необходимо при выочной варварской перевозкъ и долгомъ храненіи.

Всѣ эти преимущества отсутствують у углей Алайскихъ предгорій, обычно представляющихъ изъ себя, особенно послѣ недолгаго даже пребыванія на воздухѣ, просто угольный мусоръ, совершенно уже разрушаемый перевозкой. Не касаясь этой полосы углей въ ея цѣломъ, что сдѣлано уже другими ¹), и постепенно дополняется, я укажу лишь на три мѣсторожденія моего района.

1) Въ NO углу большой Наукатской котловины (на SW отъ Оша), по объ стороны р. Кыркъ-колъ, около зимовки Іятанъ имъются небольше выходы угля неяснаго залеганія; повидимому, однако, онъ зажатъ въ ядръ крутой палеозойской синклинали и почти смытъ. Количество во всякомъ случав ничтож-

¹⁾ См. В. Веберъ. «Краткій предвар. отчетъ о потядкт въ Фергану въ 1902 г.». Изв. Геол. Ком. XXII, № 1.

М. Бронниковъ. «Предвар. кратк. отчетъ о развѣд. работахъ на ископаемый уголь въ Туркестанскомъ краѣ». Изв. Геол. Ком. XXII, № 1.

ное; одно время добывался владъльцемъ упраздненнаго также здъсь, стекляннаго завода (Шоттъ).

Эта же полоска проходить и дал $\dot{\text{}}$ ве къ W къ p. Ишки-джанъ съ еще худшимъ качествомъ.

2) Чрезвычайно похожее на предыдущее мъсторожденіе, болье однако удовлетворительное, на оврагь Алмалыкъ (въ 18 верстахъ къ SW отъ Оша), принадлежавшее ранье г. Спечову, послъднее же время разрабатываемое г. Артемьевымъ. Опять имъется очень маленькое поле угленосной свиты, зажатое въ палезойской синклинали. Ширина его не болье 100—150 саж. (вкрестъ простиранія), длина же можетъ достигнуть и 3—5 верстъ; но развъдками это не подтверждено и, конечно, гадательно, въ виду мелкости самой синклинали и чрезвычайной близости пласта отъ поверхности, съ одной стороны, и сильной денудаціи оврагами вкресть—съ другой.

Вертикальными шахтами, въ 8 саж. и меньше, открыто 3 пласта на разстояніи 6 и 8 арш. другь отъ друга, съ мощностью отъ 2 до 2½ арш.; уголь очень хрупкій, даже въ забоѣ съ прослоями глинистаго сланца (до ¼ арш.) и сѣрнаго колчедана, до 4 мм. Паденіе въ работахъ на 8 подъ угломъ, мѣняющимся отъ 10° до 30° волнообразно. Кровля—прочный песчаникъ; выше песчаника верхняго горизонта пластъ плотнаго конгломерата. Воды нѣтъ, работы удобныя. Въ углѣ стволы деревьевъ, до 14 сантим. діаметромъ. Доставка ослами въ Андижанъ. Въ сосѣднихъ къ W оврагахъ была обнаружена шурфами лишь сажа. Вообще уголь можетъ быть найденъ лишь тамъ, гдѣ не уничтоженъ еще покровъ конгломерата.

3) Однако и въ подобныхъ случаяхъ качество плохое тому примъръ послъдняя развъдка Спечова на Япалакъ или Джатымчакмакъ (на Ошъ-Наукатской дорогъ). Здъсь выходитъ кончикъ антиклинали съ синклиналью, сдвинутыхъ, видимо, съ продолженія Кызылъ-кунгей Кыркъ-кола. Такимъ образомъ, ни по паденію, ни по простиранію разсчитывать не на что, а имѣю-щееся совершенно иегодно — угольный мусоръ, совершенно сдавленный въ крутой складкѣ, да еще и смытый. Разрѣзъ здѣсь по оврагу съ N на S при паденіи N 350 W \angle 15° сверху внизъ:

здысь по оврату сь и на в при падении и	000	2	_ 10
сверху внизъ:			
	саж.	арш.	вершк.
1) Конгломерать, очень грубый, съ валунами до $\frac{1}{2}$ арш. Мощность	5	_	
2) Остроугольная брекчія, кремнисто-кварце-			
вая, съ желъзистыми скорлуповатыми желваками.	1		
•		1/4	
3) Синевато-пепельный мергель	_	-/4	
4) Брекчіевидный свѣтло-сѣрый песчаникъ, съ бѣлымъ известковистымъ цементомъ,			
очень легко разсыпающійся	8		
5) Пластъ дряблой сажи, переслоенной углисто-			
глинистымъ сланцемъ, съ желтыми вы-			
цвѣтами (S) и корками гипса		2	6
6) Зеленовато-сърый глинистый рыхлый пес-			
чаникъ, съ немногими отпечатками тон-			
кихъ стеблей	:	_	6
7) Слой сажи, подобный—5, около		3	
8) Красный наносъ	·		
Далъе вверхъ по оврагу, паденіе мъняето высокіе горизонты, уже мъловые, такъ какт		•	
поджато.			
Лишь пля полноты сифпиати упоматить о	TINE	3110100	vu 110-

Лишь для полноты следуеть упомянуть о признакахъ палеозойскаго угля, или верне, графита, недалеко отъ Чакмака, въ ущельице Киргиштакъ, где около выхода изверженной породы въ палеозойскихъ глинистыхъ сланцахъ видны тончайшія жилки сажи, извивающіяся среди вертикальныхъ слоевъ; въ верстъ выше залегаютъ, какъ бы вкрестъ сланцамъ, среди послъднихъ плоскія линзы черной порошкообразной массы.

На эти м'єсторожденія им'єются тоже заявки. Наконецъ, по даннымъ И. Рейнвальда, каменный уголь добывается киргизами въ верховьи Кичикъ-Алая, но туда и налегк'є трудно пробхать изъ Оша. Описаннымъ исчерпываются им'єющіяся пока св'єдінія, довольно конечно неут'єшительныя для промышленности.

Нефти. Завъдомое мъсторожденіе, и только одно, находится между кишлаками Чангыръ-Ташъ и Сузакъ, на правомъ берегу Кара-дарьи, къ NO отъ Андижана.

Н'ькоторая надежда на ея нахожденіе еще можеть быть пока у урочища Ялпакъ-Ташъ и къ SO отъ него.

Асбесть, върнъе змъевиковый хризотилъ, встръчается небольшими массами различнаго, иногда удовлетворительнаго, достоинства, довольно часто въ контактъ діабазовъ съ палеозойской сланцевой свитой. Напримъръ: около ущелья Кара-Кокты гребня Тюямуюнъ, по ущельямъ Косъ-Чана, Киргизъ-ата-Ишкиджана, Чиле, Туруку и др.

Гипсъ— въ грандіозныхъ количествахъ, отличнаго качества, находится очень часто въ низшей полосѣ всѣхъ предгорій, какъ непремѣнный членъ верхне-мѣловой свиты (см. выше). Запасы его необычайно велики.

Соль каменная— въ данномъ районѣ отсутствуетъ, но изобилуетъ къ NO отъ Ферганскаго хребта, въ предѣлахъ Пржевальскаго уѣзда.

По лѣвому берегу р. Алабуги, начиная отъ р. Мона-гильды, тянется, съ NO простираніемъ, крутая антиклиналь, съ пережатымъ, опрокинутымъ къ SO сѣдломъ; свита, ее слагающая, состоитъ изъ красныхъ конгломератовъ, песчаниковъ и глинъ,

содержащихъ въ верхней части гипсъ и соль; мѣстами ея штокообразныя массы весьма значительны; большей частью соль однако загрязнена глинистыми включеніями и годна лишь для скота, но мѣстами совершенно чистая, прозрачная.

Правильной добычи нѣтъ; мѣстные киргизы берутъ для своей надобности и лѣтомъ для продажи проходящимъ скотопромышленникамъ, причемъ привозятъ ее вплоть до верховья Кара-Кульджи.

Мпдь — чрезвычайно часто, особенно въ видѣ мѣдной зелени, примазками, иногда на жилахъ кварца или вмѣстѣ съ кальцитомъ наблюдается среди палеозойскихъ кремнисто-глинистыхъ сланцевъ въ присутствіи, залегающихъ среди нихъ, діабазовъ и туфовъ. Тутъ же слабые признаки свинцоваго блеска.

Подобныя находки неоднократно дѣлались къ югу отъ Оша по ущельямъ Турука, Малаго-Алая и другихъ столь же мало доступныхъ мѣстъ, напримѣръ, Чалъ-Куйрюкъ, гдѣ даже поставлены столбы, но куда и пѣшему добраться трудно.

Лѣтомъ 1910, въ подобныхъ же мѣстахъ, сдѣланы рудныя находки г-номъ В. А. Зильберминцъ і), имѣющія тоже, очевидно, болѣе теоретическій интересъ; на сѣверномъ склонѣ труднѣйшаго перевала Киндыкъ, немного ниже снѣговой линіи, т. е. на 10—12000 футъ найдены «выходы мѣднаго колчедана въ метаморфизованномъ известнякѣ съ большими скопленіями граната, роговой обманки и еще двухъ силикатовъ изъ той же группы» — предполагается въ контактѣ съ гранитомъ; по р. Кичикъ-Алай у устья р. Тамбы-колъ обнаружена жила сурьмяного блеска съ содержаніемъ свинца, а около «пласты графита съ примѣсью сѣры, залегающіе почти горизонтально».

^{1) «}Предварительный отчеть о поводкъ въ Ю. Фергану».

Присутствіе мѣдныхъ примазокъ замѣчено было также много разъ въ палеозойскихъ сланцахъ у Кампыръ-ровата и по р. Кара-Кульджѣ.

Изъ рудныхъ богатствъ слѣдуетъ упомянуть о мѣсторожденіи радіоактивныхъ минераловъ среди девонскаго массивнаго известняка Тюя-муюнъ (р. Араванъ).

Мраморъ—чрезвычайно высокаго достоинства имъется въ хребтъ Киргизъ-ата въ контактъ каменноугольнаго известняка съ діабазомъ; плохого же качества весьма частъ.

Горячіе источники — почти индифферентные у кишлака Джалабадъ — Хазретъ-Аюбъ, пріуроченные, вѣроятно, къ мѣстной дислокаціи NNO направленія.

Всевозможныя горько-соленыя воды въ скудныхъ количе-ствахъ всегда присущи мѣловой свитѣ.

RÉSUMÉ. La présent article et la carte y relative donnent des renseiguements préliminaires sur la tectonique assez compliquée du Ferghana oriental.

La région est presque toute entière constituée par des roches sédimentaires d'âge très différent. Le premier rôle revient aux dépôts paléozoïques qui forment les chaines des monts Alaïsky et Ferghansky. Quoique sur divers points la division en dépôts dévonieus et carboniférieus soit manifeste, les différentes assises sont néanmoins indiquées sur la carte par la même couleur. En se basant sur la faune, on peut assurer la présence du dévonieu inférieur de type heersien caractéristique, ainsi que du carbonifère inférieur, également représenté par de puissants calcaires. Moins nets sont le dévonieu moyen et le dévonieu supérieur offrant des schistes siliceux intercalés de calcaires, de diabases et de tufs. La présence du silurien supérieur est hypothétique. Le carbonifère inférieur supporte une assise, dépourvue de fossiles, de schistes silicéux et

arglieux. Toutes les couches paléozoïques sont stratifiées en concordance, fortement disloquées et cà et là mètamorphisés. Lés dépôts d'eau douce, provisoirement rapportés au jurassique ne renferment que des débris végétaux; ce sont des grès et des schistes argileux. Leurs faciés ont subi de fortes modifications. Les couches, qui renferment parfois du charbon, reposent partout sur le paléozoïque en discordance, tout en étant recouvertes en concordance par toutes les assises superposées. La partie inférieure des dépôts crétacés, jusqu'ici mal connue, se compose de puissants (jusqu'à 1000 métres) conglomérats d'un rouge vif, de grès et de marnes sans fossiles, peut-être terrigènes. Ces roches sont remplacées par une brusque transgression du turonien (?) et du sénonien. Les niveaux sénoniens, caractérisés par Exogyra Colombina, Ostrea prominula, Gryphaea resicularis, Placenticeras Fritschi, etc., sont très constants et au Sud de la Goultcha pénètrent sous formes d'étroits golfes dans l'intérieur des monts Alaïsky. Au point de vue lithologique, c'est une assise bigarrée de marnes, de calcaires, de grès, d'argiles et de gypses, ces derniers puissants jusqu'à 40 mètres. Enfin le sénonien passe en concordance à l'étage ferghanien caractérisé par Gryphaea Esterhazyi Pav. (=Gr. Kaufmani Rom.), Ostrea turkestanensis, O. tianshanensis, Gryphaea navia, etc. Cet étage, formé d'une série de calcaires marneux et d'argiles, est recouvert d'une puissante assise de grès friables et de conglomérats. C'est uniquement à cette série éocène de calcaires, comprise entre le sénonien et les conglomérats, qu'il convient de donner le nom de «Férghanien», remarque importante en raison de la diversité des opinions émises dans ces derniers temps (Böhm, Sokolow, Wadasz)


En outre sont très développés de puissants dépôts horizontaux de terrasses fluviales, ainsi que des sédiments fluvio-glaciaires.

La partie centrale de la région est couverte d'une épaisse couche de loess.

La région explorée occupe l'angle formé par les chaïnes des monts Alaïsky et Ferghansky, la première, au Sud, étendue du SW au NE. la seconde du NW au SE. On constate les mêmes orientations dans les deux systèmes de plissement «Alaïsky» et «Ferghansky». En se basant sur ses propres observations et sur les reuseignements publiés jusqu'ici, l'auteur démontre que ces deux

s ystèmes sont d'égale importance et du même âge. Dans l'un comme dans l'autre on constate deux périodes d'activité. l'une après le carbonisère, l'autre après le posttertiaire. Là où les deux systèmes apparaissent, il n'y pas lieu de se préoccuper de leur différence d'âge, mais uniquement de la prédominance de l'un ou de l'autre. Si l'on se base sur ce principe, un simple lever géologique suffit pour se reconnaître aux points d'interférence des deux systèmes, si compliqués qu'ils semblent de prime abord. Le remplacement définitif des plis «Alaïsky» par les plis «Ferghansky» à lieu à l'Est de l'Ousghen et de la Goultcha, approximativement sur le méridien 43° 15'. Au Sud du col Yassa, la chaîne des monts Ferghansky montre un arc plicatif typique (dans le sens de E. Suess), ainsi que le fait voir la coupe transversale à la direction. A l'intérieur de l'arc (Innenrand) on observe une bande de diabases également orientée NW et tous les plis sont rejetés vers le Sud-Ouest; à l'extérieur (Aussenrand) on remarque des failles et des Graben se répercutant au loin, même sur les plis «Alaïsky» qui sont toujours renversés vers le Sud. L'auteur considère la chaîne Alaïsky, au Sud de l'Och-Goultcha orientée vers le NE, comme l'extrémité nord-orientale de l'un des arcs plicatifs, et la chaîne Ferghansky comme l'extrémité nord-occidentale de l'autre qui se prolonge plus loin en Kachgarie. Ces deux arcs entrent comme membres de valeur égale dans la série des arcs gigantesques de l'Asie.

Типо-Литографія К. Бирккноваьда (Вас. Остр., 8-я динія, д. Ж 1). Напечатано по распоряженію Геологическаго Комитета.



Pazinoso Depicinckaro xpedma omo p. Traino go p. Rapa Ryroggen.

Масштабы пориментальный и вертинальный равны

\$68.4 0 4 3 5 1 6cc.

O Sosnarenia.

Mpenterson gonnescepanoi

Mpemuruas u bepane runobas chuma usbecmushobs nuprenni, runn u runobi

Hustene surrobne apparente nevarun

Пессаници и сланим съ растительными ситатрами рэтичесцию возрыста Палеозочицие сланцы и пистаници

Tarevsvácyic (namennogramme) usbecommagu

Genums-monyonums.

BULLETINS DU COMITÉ GÉOLOGIQUE.

ST. PÉTERSBOURG.

XXXI.

извъстія

En 5

ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА.

31

1912 годъ.

томъ тридцать первый.

(Съ 26 таблицами и 1 портретомъ).

>0.++.0

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-Литографія К. Биркенфельда (В. О., 8-я л., № 1). 1912.

11011

1912.

IX.

Изъ Пржевальска въ Фергану. Д. Мушкетовъ.

(De Prjévalsk au Ferghana. Par D. Muchketov).

Весною 1911-го года мив пришлось, въ качествъ улена экспедиціи К. И. Богдановича по изследованію последняго Семиръченскаго землетрясенія, побывать въ районъ Иссыкъкуля. Сдёлавъ маршрутъ отъ г. Вёрнаго черезъ долины Чу, Б. Кебина, Б. Аксу, деревни Сазановку и Преображенское, съ цѣлью опредѣленія линій разлома, въ Кунгей Алатау 1), я 13-го мая прибыль въ г. Пржевальскъ, закончивъ вмъстъ съ твмъ свое участіе въ экспедиціи Богдановича. Въ виду того, что въ теченіи всей остальной части літа мні предстояло продолжать свои геологическія изслідованія восточной Ферганы, я ръшилъ провхать туда прямо черезъ западную часть Тянь-. Шаня — Нарынскій край; путь этотъ представлялся мнѣ весьма интереснымъ, какъ въ общемъ геологическомъ отношеніи, такъ и по выясненію южныхъ предёловъ землетрясенія, не говоря уже о возможности изб'єжать, такимъ образомъ, вторичной пытки, при движеніи по пресловутому В'врненскому почтовому тракту.

Проведя въ Пржевальскъ 5 дней за ликвидаціей предъиду-

¹⁾ См. отчеть о землетрясенін.

щаго маршрута, проявленіемъ фотографій, снаряженіемъ каравана, маленькими экскурсіями, мы со студентомъ Горнаго Института Д. В. Наливкинымъ 19 мая выступили въ дальнъйшій путь.

Къ 25-му мая мы дошли до Орто-такоя, почти все время держась южнаго берега Иссыкъ-куля, 27-го миновали Нарынское укрѣпленіе и, двигаясь по «большой» дорогѣ, 1-го іюня уже перевалили въ Фергану черезъ Кугартъ, а къ 3-му іюня достигли города Ошъ.

Въ дальнъйшемъ изложены наблюденія вдоль этого пути, по необходимости отрывочныя, поверхностныя ¹) и являющіяся лишь скуднымъ пополненіемъ имѣющагося уже литературнаго матеріала по данной области. Послъдній однако тоже весьма еще не великъ и ограничивается по существу немногими страницами въ пяти работахъ:

- 1) И. В. Мушкетовъ— «Туркестанъ», т. II, стр. 70 74.
- 2) M. Friedrichsen—«Forschungsreise in dem zentralen Tien-Schan und Dzungarischem Alatau im Sommer 1902»,
 - 3) W. M. Davis «A Journey across Turkestan» 1905.
- 4) К. И. Аргентовъ «О геологическихъ изслъдованіяхъ въ Семиръченской области въ 1909 г. г. Горн. Журн., кн. 1, 1911 г.
- 5) G. Prinz. Die Vergletscherung des nördlichen Teiles des zentralen Tien-Schan-Gebirges.

Во всёхъ этихъ работахъ намѣчаются три основныя и интересныя темы, а именно: правильное зональное простираніе всѣхъ геологическихъ образованій сѣвернаго склона хребта Терскей - Алатау, морфологія его и исторія озера Иссыкъкуль; послѣдніе два вопроса, какъ увидимъ ниже, весьма близко соприкасаются. Въ изолированномъ и наименѣе благопріятномъ по степени научнаго освѣщенія положеніи находится соб-

Длина маршрута около 800 версть; пройденъ онъ въ 15 дней, т. е. скорость передвиженія свыше 50 версть въ день.

ственно Нарынскій край, или область средняго теченія р. Нарынь и р. Алабуги.

Въ этой посл'ядовательности основныхъ четырехъ вопросовъ я и попытаюсь суммировать свои впечатл'янія.

Покинувъ Пржевальскъ, мы въ первый день прошли вверхъ по р. Джиты-огузъ до горячихъ источниковъ, того же имени. Эта поперечная долинка даетъ довольно хорошій разр'взъ, чрезвычайно близко совпадающій съ разр'взомъ по долинъ р. Джуука (Заука), приведенномъ И. В. Мушкетовымъ на стр. 74 (l. с.) и являющимся вообще характернымъ для с'верныхъ предгорій Терскей-Алатау.

Начиная отъ устья, видны отлѣльные клочки горизонтальныхъ Иссыккульскихъ отложеній (см. ниже), состоящихъ здесь, какъ и восточне въ устью р. Джергаланъ, преимущественно изъ мощной толщи свътло-желтой лёссовидной, известковистой глины; въ верхнихъ горизонтахъ появляется красныйоттънокъ, въ нижнихъ же попадаются скудно разсъянные прослойки мелкой гальки. Въ нижней части долинки эти клочки Иссыккульскихъ отложеній еле зам'ятны, смыты и прикрыты горизонтальными же, болбе песчанистыми, отложеніями ръки; выше же они видны яснъе, но вскоръ исчезають совершенно, несогласно прикрывая, върнъе притыкаясь къ красной свить песчаниковъ и конгломератовъ, надающей на NW полъ углами отъ 20° до 25°. Эта красная свита, именуемая И. В. Мушкетовымъ Буамской, условно относится имъ къ мѣловому и третичному возрастамъ. Она же породила цълый рядъ недоум'вній и разнор'вчивых толкованій среди посл'вдующихъ немногочисленныхъ изследователей. Затрудняющимъ ея опредѣленіе обстоятельствомъ, конечно, является отсутствіе какихъ-либо органическихъ остатковъ и точныхъ стратиграфическихъ признаковъ; неудачными же являлись и примъненныя названія, совершенно случайныя, то слишкомъ узко-

мъстныя, какъ «Буамскія породы» 1), то уже чрезмърно широкія, какъ «ханхайскія отложенія» (Friedrichsen) и Gobisedimente (Keidel, см. ниже). Единственнымъ ръзкимъ, ей присущимъ признакомъ является красный цвъть, но и онъ-то, повидимому, породиль много недоразумвній. Дело въ томъ, что красные песчаники, безъ болве точнаго опредвленія ихъ, находятся очень часто въ весьма различныхъ по возрасту и генезису отложеніяхъ Туркестана, и, будучи всегда мертвыми, даютъ широкія возможности къ смішеніямъ ихъ. Посліднее происходить тымъ легче еще оттого, что до сихъ поръ всв изслъдованія Тянь - Шаня ограничиваются большими маршрутными экспедиціями; всё путешественники встречали лишь случайныя обнаженія, не им'тя общей схемы разріза, сопоставляли ихъ съ литературными данными такихъ же экспедицій и, конечно, не вина этихъ лицъ, что они поневолѣ внесли нѣкоторую запутанность въ данный вопросъ. Читая соотвътственныя описанія, весьма трудно уловить однородную точку зрѣнія и опредъленность взглядовъ. Наиболъе полно данный вопросъ разработанъ геологомъ экспедиціи Мерцбахера--Keidel (Ein Profil durch den nördlichen Teil des zentralen Tian-Schan, Abhandl. d. K. Bayer. Akad. d. Wiss. B. XXIII 1909 r., p. 117-128 и др.) на основаніи всей литературы и собственных наблюденій. Однако, и у него сразу встрівчаются недоразумінія. На стр. 112 онъ параллелизируетъ пестрыя отложенія Джиты-огузъ съ Буамскими, т. е. мѣловыми и мергелями Сартъ - Джолъ, которымъ самъ же приписываетъ каменноугольный возрасть. Посътивъ первыя два мъста, я, конечно, не могу раздълять выводовъ автора и даже принужденъ сомнъваться въ принадлежности къ карбону пестрыхъ гипсоносныхъ мергелей Сартъ-

¹⁾ Оно имћетъ за собой лишь то преимущество, что съ разсматриваемыми отложеніями всё путешественники, проникающіе въ Тянь-Шань по почтовому тракту, встрѣчаются впервые лишь въ Буамѣ (Бомѣ).

Джолъ, а также и въ тѣхъ широкихъ умозаключеніяхъ, кои изъ этой принадлежности развиваются. Этотъ примѣръ служитъ однимъ изъ яркихъ доказательствъ крайней ненадежности метода литературныхъ обобщеній безъ точныхъ данныхъ и невозможности общихъ выводовъ въ Тянь-Шанѣ, пока не осуществится сплошная геологическая съемка его. Мы встрѣчаемъ среди красныхъ песчаниковъ какъ завѣдомыхъ, такъ и сомнительныхъ членовъ палеозоя, мезозоя, третичныхъ и послѣтретичныхъ свитъ; среди послѣднихъ вдобавокъ, несомнѣнно, имѣются образованія двоякія—большихъ замкнутыхъ бассейновъ и рѣчныя.

Положеніе осложняется еще тімь, что всі эти отложенія, будучи весьма рыхлыми, всегда интенсивно размывались, смывались, сохранились обрывочно, а также каждое послідующее представляеть собой перемытый матеріаль предыдущаго, мало чімь рознясь оть него по составу.

Мнѣ лично пришлось видѣть красные песчаники, непосредственно подчиненные каменноугольнымъ известнякамъ съ продуктусовой фауной (см. ниже), по Нарыну; такіе же песчаники, по фаунистически пе отграниченные въ Каратау, подобные же, но лишь известковые песчаники среди нижнекаменноугольныхъ, съ фауной, известняковъ у ключей упомянутой рѣчки Джиты-огузъ.

Тройной комплексъ красныхъ песчаниковъ наблюдался мною по Буамскому ущелью, а также вокругъ всего Иссыкъ-куля; вполив отчетливо онъ дълится на:

а) дислоцированные, мощные песчаники съ конгломератами (не всегда) ясно пластовые, рыхлые, непосредственно налегающіе на угленосные сланцы и пуддинги съ юрскими растеніями, совершенно аналогично тому, какъ оно повсемѣстно наблюдается въ Ферганъ. Согласно этой аналогіи, дислоцированной красной свитъ Буама и Иссыкъ-куля можно приписывать мъловой возрастъ, ближе, однако, неопредѣлимый; является-ли

эта аналогія полной, т. е. репрезентируєть ли Буамская свита лишь нижній мѣль до турона ¹), или всѣ мѣловыя, а пожалуй и третичныя отложенія, сказать сейчась невозможно.

- в) Трансгрессивно на а), имѣя внизу горизонтъ конгломерата, горизонтально залегаетъ также красная песчанистая свита; ближе къ Иссыкъ-кулю она становится болѣе глинистой и свѣтлой, доходя до соломеннаго и бѣлаго цвѣта, въ мѣстахъ же непосредственнаго налеганія на мѣловую, мало чѣмъ отъ нея отличается, кромѣ недислоцированности. Эти отложенія, уже разъ упомянутыя, озерныя иссыккульскія послѣтретичныя.
- с) Непосредственно на и около а) и b) им'вются красныя же отложенія р'вкъ.

Красныя же, песчано-конгломерато - глинистыя отложенія, большой мощности, вѣроятно, воднаго происхожденія, заполняють обширный бассейнъ Нарынскаго края (см. ниже, стр. 466); они могуть имѣть возрасть оть нижнемѣлового и до верхнетретичнаго, не параллелизуясь съ вышеописанными свитами ни Буама, ни Ферганы.

Наконець, въ Кашгаріи мы встрѣчаемъ несомнѣнныхъ красныхъ представителей мѣлового разрѣза Ферганы, но вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣе молодыя свиты третичныя и послѣтретичныя (Gobiablagerungen?).

Такимъ образомъ, разсматривая красныя свиты Туркестана, мы видимъ, что по возрасту онъ распредълены отъ карбона и понынъ, а по генезису имъемъ всевозможныя варіаціи между осадками міровыхъ морей, замкнутыхъ соленыхъ и пръсныхъ бассейновъ, долинъ и въроятными образованіями пустынь и осыпей склоновъ. Послъднее толкованіе дается Фридрихсеномъ именно для красной— ханхайской»

Въ Фергант красная свита отграничена сверху точно установленнымъ разръзомъ морского типа отъ турона до эоцена. См. «Восточная Фергана» Д. И. Мушкетовъ Изв. Геол. Ком. 1911 г.

свиты съвернаго склона Терскей-Алатау; констатируя угловатость матеріала конгломератовъ и отсутствіе признаковъ воднаго отложенія, онъ опредъляєть ее, какъ— «subaërische Schuttablagerungen von verwittertem Material», причемъ даже фактъ наклона слоевъ имъ объясняется не дислокаціей ихъ, но непосредственнымъ отложеніемъ спускавшагося со склоновъ хребта рыхлаго матеріала, по наклоннымъ краямъ мульды Иссыкъкуля. Эта же гипотеза образованія «ханхайскихъ отложеній» развивается Фридрихсеномъ и дальше (стр. 161—163) до универсальности, на основаніи ознакомленія съ общирными площадями осыпей— «Schuttregion»— области Сары-Джаса; авторъ, на основаніи собственныхъ наблюденій и цитатъ изъ Аlmasy, придаетъ чрезвычайно важное значеніе, какъ въ морфологическомъ, такъ и литогенетическомъ отношеніи, общирнымъ, насыщеннымъ водой, осыпямъ, сползающимъ со склоновъ.

Признавая это вообще, мнѣ кажется однако весьма труднымъ объяснять такимъ путемъ именно «ханхайскія отложенія» южнаго берега Иссыкъ-куля. Не говоря уже о невозможности образованія осыпями правильно слоистой, довольно однородной свиты на громадномъ протяженіи до 200 верстъ, гипотезѣ этой безусловно противорѣчатъ три факта:

- 1)—свита не только окаймляеть хребты, но и вдается явными заливами въ нихъ (Буамъ);
- 2)—наклонъ слоевь обусловлень не отложеніемъ ихъ на покатой поверхности (до 40°!), но пликативными силами, о чемъ свидѣтельствуютъ отчетливыя складки, видѣнныя мною и по сѣверному, и по южному берегу Иссыкъ-куля; наклонъ свиты къ озеру, введшій автора въ заблужденіе на Джиты-огузѣ, не является единственно распространеннымъ.
- составъ свиты не зависитъ всецѣло отъ породъ прилежащаго склона хребта.

Я вижу въ толкованіи Фридрихсена одну изъ попытокъ

объясненія нікоторой части разбираемых отложеній, которая можеть гдів нибудь и оправдаться, но непримінимую ни на побережьи Иссыкъ-куля, ни, тімь боліве, въ качествів обобщающей гипотезы.

Продолжая прерванный нами путь вверхъ по р. Джитыогузъ ¹), мы, въ 18 верстахъ отъ устья, встръчаемъ каменноугольныя отложенія, какъ будто согласно подстилающія красную мезозойскую свиту. Судя однако по другимъ, извъстнымъ мнѣ, обнаженіямъ, я склоненъ считать это согласіе за случайное.

Долина въ этомъ мѣстѣ, конечно, суживается до ущелья, въ которомъ еле умѣщаются маленькіе домики незатѣйливаго курорта, усердно посѣщаемаго жителями г. Пржевальска.

У самаго ваннаго зданія, на правомъ берегу, высится большое обнаженіе, легко доступное и изобилующее фауной ²) (Spirifer bisulcatus Sow. и Productus longispinus Sow.). Паденіе пластовъ NW 340° ∠ 24°. Обнаженіе состоить изъ перемежающихся, съ темными известняками, тонкослоистыхъ красноватыхъ сланцевъ и кремнисто-известковистыхъ песчаниковъ.

Вскорѣ за ваннами къ югу свита согнута въ небольшую антиклиналь - флексуру, съ паденіемъ на SO \angle 15°, но вслѣдъ затѣмъ снова падаетъ на NW \angle 35°, пока не исчезаетъ вовсе (въ $1^4/2$ вер. выше ваннъ); мы вступаемъ въ полосу красныхъ крупнозернистыхъ гранитовъ, прорывающихъ или подпирающихъ карбонъ.

Пересвченій хребта Терскей-Аалтау я не двлаль, и что идеть за гранитами не знаю, но приведенную последователь-

2) См. также у Аргентова, 1. с., стр. 19 и 24.

¹⁾ Джиты-огузъ—семь быковъ; этимъ названіемъ мѣстность обязана семи фантастическимъ фигурамъ, ниже ключей, образовавшимся изъ крутопадающаго, размытаго пласта разобранныхъ выше красныхъ песчаниковъ. Фигуры вывътриванія песчаниковъ этихъ вездѣ, а здѣсь особенно, весьма причудливы и живописны.

ность породь наблюдаль и по другимъ долинамъ сѣвернаго склона хребта; о томъ же свидѣтельствуютъ и всѣ вышеупомянутые авторы.

Повидимому, есть также основаніе предполагать, что многочисленные горячіе источники сѣвернаго склона Терскей-Алатау 1) пріурочены именно къ линіи контакта каменноугольныхъ известняковъ съ красными гранитами.

Перевхавъ съ р. Джиты-огузъ въ верховья р. Кызылъ-су и спустившись по последней снова къ берегу Иссыкъ-куля, мы вторично пересвкли изложенный разрезъ; къ полосе красныхъ дислоцированныхъ песчаниковъ пріуроченъ рядъ продольныхъ долинокъ со сглаженными легкими перевалами.

Горизонтальныя — озерныя отложенія у Покровскаго (= Сливкиной) достигають большого развитія.

Чрезвычайно отчетливо виденъ все тотъ же основной разръзъ по низовью ръки Каджи.

Отвѣсная темная стѣна карбона прорѣзана узкимъ каньономъ; къ ней прилегаютъ ничтожные остатки красной дислоцированной свиты. Послѣдняя лучше сохранилась западнѣе, въ устъѣ р. Кукеликъ; это наиболѣе южный пунктъ проникновенія Иссыкъ-куля въ Терскей-Алатау, поэтому бухта и нижняя врѣзавшаяся часть рѣчки вскрываютъ красную свиту большими обнаженіями; паденіе слоевъ на SO ∠ 30°; прикрыты они мощной горизонтальной иссыккульской толщей.

Далѣе къ западу на р. Тонъ и Аксай полоса известняковъ карбона какъ бы замѣщена по простиранію, прилегавшими къ нимъ съ юга красными гранитами. Имѣется ли здѣсь сбрососдвигъ NW направленія, или известняки какъ-либо уничтожены—смыты, сказать сразу трудно; возможенъ также сдвигъ

 ⁽Арасаны» — Акъ-су, Джиты-огузь, Кызылъ-су, Джелы-су Каджи. (См. Аргентовъ). Температуры якъ отъ 24 до 46° Ц.

съ появленіемъ второй полосы гранитовъ, уже между карбономъ и озеромъ.

Съ этимъ же мѣстомъ, мнѣ кажется, совпадаетъ выгибъ(конечно, обращенный выпуклостью на S) тектонической дуги
Терскей-Алатау. Во всякомъ случаѣ простиранія красной свиты
къ такому заключенію приводятъ, ибо мѣняются отчетливо изъ
NO—70°—SW-ое (Джиты-огузъ и Заука) черезъ О—W-ое
(Каджи и Кукеликъ) въ SO—110°—NW-ое (Аксай); именно
здѣсь, на лѣвомъ берегу р. Аксай, видна отчетливая антиклиналь этого простиранія, съ болѣе крутымъ южнымъ крыломъ,
вдобавокъ разбитая продольнымъ сбросомъ. Даже на правомъ
берегу той же рѣки (устье Тона) антиклиналь уже широтнаго
простиранія. Такимъ образомъ на р. Тонъ красная свита непосредственно прилегаетъ къ полосѣ красныхъ гранитовъ, протягивающейся рѣзко выраженной грядой далѣе на NW (отдѣльныя части этой гряды носятъ названія горъ Акъ-Пакши, Кунгей, Куканъ-адыръ и Тегерекъ).

Къ югу отъ нихъ протягивается общирная котловина Конурленъ и Алабашъ, въ юго-западномъ углу которой снова показываются известняки, однако иного вида, — мертвые, темные, плотные, въроятно, принадлежащие не карбону, а болѣе древней, метаморфической свитъ.

Перевалъ Алабашъ приходится почти на ея контактѣ съ вышеупомянутыми гранитами, равно какъ и вся дальнѣйппая дорога по продольной долинкѣ, къ перевалу Семизъ-бель; на этомъ послѣднемъ выходитъ полоса свѣтлаго кварцита, NW-го простиранія, протягивающаяся и въ горахъ Карагоу, 1) вплоть до р. Чу.

Граниты этой части Терскея (отъ Алабашъ до Орто-Такоя) довольно оригинальны своей полосатостью: издали рѣзко бросаются въ глаза черныя полосы роговообманковой по-

На схематической карть въ названии этомъ опечатка: вмѣсто Карагау слѣдуетъ читать Карагоу.

роды, на красномъ фон\$ гранита, правильно простирающіяся также WNW 1).

Совершенно подобную же картину мы между прочимъ, наблюдали и по съверному берегу Иссыкъ-куля, между р. Турайгыръ и Кабарга — въ грядъ Джолъ-джилга. Такой-же, красный гранитъ, сильно разрушающійся, съ матрацевидной отдъльностью, разсъченъ вдоль гряды рядомъ полосъ—темной, плотной, мелкокристаллической роговообманковой породы — въ 2—5 саж. мощности; простираніе гряды, плоскостей отдъльности гранита и темныхъ полосъ—все широтное или WNW-ое.

Къ гранитамъ г. Карагоу, видимо переходящимъ, съ NW простираніемъ, черезъ долину р. Чу въ Александровскій хребеть 2), прислонена съ S мощная свита сфрыхъ песчаниковъ и черныхъ глинистыхъ сланцевъ, тонкослоистая и сильно изогнутая, съ преобладающимъ, однако, паденіемъ на WNW 3). Какъ по литологическому характеру, такъ и по плохимъ флористическимъ остаткамъ, эта песчанико-сланцевая свита живо напоминаетъ аналогичныя «ангарскія отложенія» (рэтъ) верховьевъ р.р. Кара-Кульджи и Тара, въ южной части Ферганскаго хребта. По свидътельству Аргентова (1. с., стр. 17), къ этой свить должна относиться богатая угленосная полоса урочища Сюгать-те, между р.р. Каджи и Тосоръ: простираніе складокъ въ ней SW-NO-ое, при очень крутыхъ паденіяхъ; пластовъ каменнаго угля до 12, не менте 2 четвертей мощностью. Такимъ образомъ, съверный склонъ хребта Терскей-Алатау составленъ рядомъ узкихъ полосъ разныхъ геологическихъ обра-

¹⁾ См. И. Мушкетовъ, І. с., стр. 70.

Къ востоку отъ почтоваго тракта по серединъ перегона Орта-Такой
Кумъ-бель-ата.

³⁾ На стр. 70 «Туркестана», П т., эта свита вполит правильно параллелизпрована съ угленосными отложеніями Буама; къ сожаленію, въ обовкъ случаняъ, по несомитиному недоразуменію, свита отнесена къ палеозою. Примечанія В. Обручева хотя и указывають на это, но недостаточно категорично.

зованій, видимо протягивающихся по всей его длинь; по мивнію Кейделя 1), онъ разбить также рядомъ длинныхъ сбросовъ, подъ очень острыми углами рѣжущихъ простиранія породъ. Такъ ли это, или сбросы совпадаютъ съ простираніемъ, все же въ этомъ обстоятельствѣ кроется нѣчто весьма существенное. Я могу лишь подтвердить и распространить мысль К. И. Богдановича 2), что «менѣе устойчивыми» (сравнительно съ озеромъ) «могутъ быть, въ случаѣ возникновенія напряженія подъ Терскей-Алатау, его сѣверные отроги, и тогда Пржевальскъ окажется въ положеніи Вѣрнаго въ 1887 г. и 1910 г.г.». Мнѣ кажется, что тогда наиболѣе возможною линіей разлома явится именно упомянутая иолоса контакта гранита 3) и известняковъ, подозрительная въ смыслѣ сброса, усѣянная горячими источниками и проходящая лишь въ нѣсколькихъ верстахъ южнѣе города Пржевальска.

Въ предшествовавшемъ изложеніи уже неоднократно упоминалось объ озерныхъ иссыккульскихъ отложеніяхъ, обрамляющихъ, мѣстами широкой полосой, современное озеро. Отличныя обнаженія этой характерной горизонтальной толици можно видѣть уже въ долинѣ Чу, выше ст. Кокъ-Майнакъ, въ устъѣ р. Джергаланъ, у Сливкиной, между устьями р.р. Тосора и Тона; ей удѣлено уже много вниманія всѣми изслѣдователями (см. G. Prinz, l. с.) и я лишь прибавлю нѣсколько словъ. Сличая многочисленныя обнаженія свиты, мнѣ кажется въ ней съ постоянствомъ удерживаются три горизонта — снизу:

- Сѣрый конгломерать и грубый аркозовый песчаникъплитнякъ.
 - 2) Толстый свътло-желтый, неслоистый, лёссовидный пласть.

¹) L. с., стр. 188.

²⁾ К. И. Богдановичь. Землетрясеніе 22-го Декабря 1910 г. въ съверныхъ цъняхъ Тянъ-Шаня между Върнымъ и Иссык-кулемъ. 1911 г. Извъстія Геолог. Комитета. Т. XXX, стр. 330—419.

³) Вполит слъд, аналогичная главной линіи разлома 1910 г. — «Кебинской» — въ Кунгей-Алатау.

3) Верхняя часть, въ видѣ красноватыхъ глинъ.

Въ верхней части галька почти отсутствуетъ или попадается изръдка тонкими прослоями и въ одиночку, равно какъ и угловатые, почти неокатанные, обломки. Лёссовидная часть неръдко становится сильно песчанистой, даже прямо глинистымъ слоистымъ мелкимъ пескомъ (Тосоръ) съ ржавыми прослоями; въ посл'яднемъ наблюдался плехой остатокъ Limnaeus'а; иногда же мы имвемъ лессъ, ничвмъ не отличимый отъ того. который, также чередуясь съ галечниками, слагаетъ увалистыя гряды Ферганской долины, именуемыя тамъ «адырами». Нижележащій аркозовый грубый песчаникъ содержить всё элементы гранитовъ Терскея, а часто и большіе куски ихъ, окатанные и угловатые; большія плиты этого плотнаго песчаника, съ хорошими волноприбойными знаками, вываливаясь и обнажаясь изъ болъе рыхлой окружающей ихъ среды, устилають побережье между р.р. Сары-булакъ, Барскаунъ, Тамга, Тосоръ и Тонъ. Около устья Сары-булакъ эти плиты, лежащія близко къ водъ, не отличающіяся ничьмъ по составу отъ матеріала современнаго пляжа, наводять на мысль о современномъ же ихъ и образованіи, однако въ обнаженіяхъ устьевъ болѣе западныхъ рѣкъ видно, какъ уже сказано, плитняковый горизонть не въ пляжъ, а среди свиты первой терассы. Вообще иссыккульскія отложенія южнаго берега слагають везд'є дв'є весьма отчетливыхъ разныхъ терассы (не считая современнаго берега). Правильность ихъ конфигураціи, а еще болве состава, нарушается только въ устьяхъ ръкъ, особенно болъе значительныхъ, какъ Заука, Барскаунъ, Тамга, Тосоръ. Здёсь дёятельность озера перебита різчной: дві постоянныя озерныя терассы превращаются или въ нъсколько или въ одну громадную — до 50 саж., мелкій, правильно слоистый матеріаль смъняется болъе разнокалибернымъ, грубымъ, разночередующимся продуктомъ галечныхъ выносовъ.

Около устьевъ коренныя породы, обычно уничтоженныя, отступають далеко оть озера, но въ междурфиныхъ частяхъ онъ зато ближе къ нему и, разрушаясь, даютъ немало угловатаго матеріала, создавая м'встами подобіе щебневой пустыни. Матеріалъ этотъ, присыпая горизонтальными слоями иссыккульскія отложенія, со временемъ тоже можетъ войлти въ ихъ составь, который такимъ образомъ получится троякимъ, какъ по habitus'v, такъ по генезису и возрасту. Изложенная картина мнъ кажется весьма поучительной именно для пониманія нъкоторыхъ, еще спорныхъ отложеній Туркестана, въ частности Нарына и Ферганы; новъйшія (но уже дислоцированныя) образованія этихъ мість содержать лёссь, гальку, валуны, глинистый песокъ и щебень, чаще правильнаго пластованія, иногда выклинивающагося и, повидимому, легче всего объяснятся предыдущей схемой отложенія осущающагося бассейна. При такомъ смѣшанномъ происхожденіи вполнѣ естественно уживаются другъ съ другомъ такія веши какъ лёссъ, щебень и валуны. казалось бы противоръчивыя.

Возвращаясь снова на берегъ Иссыкъ-куля, къ устьямъ упомянутыхъ рѣкъ, мы видимъ, что террассы, ихъ окаймляющія, грандіозны по мощности, зачастую несоотвѣтствующей скромнымъ размѣрамъ рѣки и ея бассейна. Всѣ устья одного и того же рѣзко выраженнаго типа: нижняя часть затоплена озеромъ, въ видѣ бухты, вдающейся отъ 1/2 в. до 3 верстъ въ берегъ, узкой, вполнѣ по формѣ долины, такъ что боковые берега бухты слагаютъ рѣчныя терассы; внутренняя же часть бухты ограничена низкимъ (1—3 арш.) узкимъ (1—5 саж.) галечнымъ баромъ—пересынью, съ однимъ лишь узкимъ выводнымъ каналомъ рѣки, обычно расположеннымъ сбоку. Сзади бара имѣется или озерко, или длинная болотистая луговина (прибѣжище скота среди окружающей пустыни); ширина этой части долинъ, прорѣзанныхъ въ галечникахъ на 50 саж. глубины,


обычно около 100-200 саженей, тогда какъ жалкія виляющія по ихъ дну р\$чки въ двадцать разъ у́же и мелки. Явленія эти выдвигають два вопроса:

- 1. объ изм'вненіи базиса эрозіи р'вкъ и
- 2. изм'вненіи ихъ режима въ сторону сильнаго упадка.

Дъйствительно ли, послъ долгаго пониженія, базись эрозіи. т. е. уровень озера, теперь повышается, — сказать, конечно, трудно, хотя характерь устьевь на это и указываеть, равно какъ и зрѣлость рѣкъ. Съ другой стороны, по сѣверному берегу Иссыкъкуля подобныхъ же примъровъ почти не найдти, изъ чего, я думаю, вытекаетъ преимущественная роль не самаго озера, но соотвѣтственныхъ обоимъ берегамъ хребтовъ, или, вѣрнѣе, различію между ними. Различіе это, весьма существенное, заключается въ несравненно большемъ оледенвніи, какъ современномъ, такъ особенно бывшемъ, Терскея по сравнению съ Кунгеемъ. Объясняется ли это климатическими особенностями или чвмъ инымъ, - судить не берусь, но фактъ, что если кары и морены въ Кунгев насчитываются единицами и десятками, встръчаясь ръдко и изолированно, то въ Терскет мы видимъ ихъ сотнями; кары буквально устивають вст гребни этого хребта, располагаясь тесно другь около друга и придавая ему весьма характерную конфигурацію. Полагаю даже, что ровная линія хребта, всегда обращавшая на себя внимание путешественниковъ отсутствіемъ выдёляющихся вершинъ, легче можеть быть объяснена нивеллирующимъ вліяніемъ каръ, чёмъ поднятой пенепленъ 1). Картина эта поражаеть и издалека, напримъръ, отъ ст. Кутемалды, и вблизи; въ первомъ случат видны и верхніе горизонты каръ, еще живыхъ, посылающихъ крупные ледники, расположенные, в фроятно, не ниже 12-13.000 футь, вблизи же зато яснъе нижніе, уже мертвые. Послъдніе опу-

¹⁾ Cm. Davis n Huntington.

скаются даже до невиданной мною нигдѣ высоты 10.000 футъ. При сплошномъ и повсемѣстномъ распространеніи здѣсь этого явленія трудно даже указать наиболѣе интересныя мѣста. Но если взглянуть на хребетъ съ устьевъ Барскауна и Тона, то впечатлѣніе получится полное, а вмѣстѣ съ нимъ явятся и отвѣты на выставленныя выше темы. Смотря (см. рис. 1)



Macuma by

Рис. 1.

на SW отъ астрономическаго пункта Барскаунъ, мы видимъ серію вымершихъ каръ, съ колоссальными спускающимися изъ нихъ моренами; воды, вытекавшія изъ этихъ громадныхъ лед-


никовъ, образовали мощныя отложенія въ 60 кв. версть площадью; р.р. Барскаунъ и Тамга, при наличности этого ледниковаго періода, вѣроятно и не существовавшія, пріобрѣли свое значеніе при начавшемся таяніи и верхнихъ ледниковъ, достигнувъ наибольшаго развитія, глубоко прорѣзали широкимъ русломъ флювіоглаціальную толщу побережья, а теперь снова сильно сократились.

Нельзя ли усмотрѣть въ этомъ послѣднемъ фактѣ указаніе на прекратившееся уничтоженіе ледниковъ, на смѣну междуледниковаго періода ледниковымъ. Я думаю, что, по соотвѣтствію со всѣми послѣдними данными по изученію ледниковъ Туркестана, это сдѣлать можно. Если же наступленіе этого періода знаменуется не только пониженіемъ температуры, но и увеличеніемъ влажности, то условія для поднятіи уровня Иссыкъкуля у насъ тоже имѣются. Поднятіе это удовлетворяетъ вопросъ о конфигураціи южнаго побережья, отвѣчаетъ наблюденіямъ жителей г. Пржевальска и находится въ полномъ соотвѣтствіи съ выводами столь солиднаго автора, какъ Л. С. Бергъ 1).

Не менѣе интересна мѣстность Тура-тамъ (см. рис. 2). Такъ называется обширное плоское пространство между устьями р.р. Тонъ и Кукеликъ, южнѣе прибрежной возвышенности Безъ-Безикъ, по имени древней стратегической стѣны, неизвѣстнаго (китайскаго?) происхожденія ²). Стѣна эта, хотя и сильно пострадавшая, все еще выше сажени, перегораживаетъ попе-

¹⁾ См. Л. Бергъ. Озеро Иссыкъ-куль. Землевѣдѣніе 1904, стр. 1—86. Авторъ констатируетъ прибываніе озера съ 1901 г. (стр. 30 и др.), а ранѣе съ 1860 г. «всѣ авторы единогласно свидѣтельствуютъ о пепрерывномъ усыханія Иссыкъ-куля»; «теперешнее прибываніе Иссыкъ-куля нужно объяснять колебаніями климата сравнительно малаго періода» (стр. 33).

²⁾ Объ этихъ мѣстахъ иншетъ и Л. Бергъ, цитируя Бартольда (Ibid., стр. 2—3). «Въ долинѣ р. Тонъ, гдѣ и теперь видны значительныя развалины, былъ городъ Тонъ: въ трехъ дняхъ пути отъ Тона находился городъ Барсханъ, названіе котораго слышится еще въ имени рѣчки Барскоунъ. Этотъ городъ могъ выставить до 6.000 воиновъ.



are shidly assured avenue store (Puc. 2. gramme states at state and it рекъ упомянутое пространство въ меридіональномъ направленіи; по этой же линіи оно само весьма странно д'влится по уклону на двѣ части: правая, восточная, широкой долиной спускается къ устью р. Кукеликъ, лѣвая же представляетъ собой собственно долину Тона, до ея совмъстнаго устья съ Аксаемъ, Согласно первой покатости нътъ никакого значительного ръчного русла. но цёлый рядъ ручьевъ и арыковъ изъ Тона 1) ею пользуются; р. Кукеликъ также совершенно независима и даже скорве отклонена въ своемъ низовъв. Зато вторая, западная, покатость проръзана глубокимъ русломъ р. Тонъ, аналогичнымъ Барскауну, Тамгъ и т. п., но русло это сухо, воды, такъ его выработавшей, больше нътъ 2). Мы снова видимъ извъстныя уже несоотвътствія между обширной площадью наносныхъ толщъ, русломъ ръки, и ея современнымъ состояніемъ. Поднявъ глаза на замыкающую съ юга панораму, мы опять-таки находимъ всв нужные намъ отвъты: обрываясь отвъснымъ карнизомъ, растилается обширное волнистое плато, покрытое мощными моренными отложеніями и огороженное длинной цёнью каръ. Цёлый рядъ ледниковъ, соединяясь раньше на этой большой плошади, должень быль давать громадное оледенвніе ея: ясно что эти массы льда, сгладивъ хребеть, вмъств съ тъмъ долго защищали его отъ эрозіи 3), вызвавъ тъмъ самымъ образование ръзкаго уступа, очерчивающаго теперь прежнюю границу оледентнія. Обильныя воды, ниспадавшія по краямъ ледяного покрова, эродировали площадь Тура-тамъ, а затъмъ, ослабъвая, заполнили ее мощными флювіогляціальными отложеніями: продолжавшійся процессь интенсивнаго стаиванія оледенвнія, уничтоживъ низшіе горизонты, перешелъ выше; р. Тонъ, пріобрѣтя значеніе главнаго выводного протока водяныхъ массъ, возникавшихъ въ высокихъ и внутреннихъ ча-

Сама стъна Тура-тамъ удачно использована въ видъ акведука, дающаго хорошее конечное паденіе мельницъ.

²⁾ Я не могь также замѣтить сильной разницы между количествомъ воды въ ущельѣ и на Тура-тамъ, т. е. иѣтъ основаній предполагать теченія подъ галечной толщей.

³⁾ Это сохраняющее дъйствіе дьда адъсь именно хорошо подтверждается. См. Garwood «Features of Alpine scenery due to glacial Protection». 1910.

стяхъ хребта, усиливаетъ свою двятельность и проръзываетъ въ толив отложеній Тура-тамъ глубокое русло, по прямому и кратчайшему для себя направленію. Процессъ стаиванія, однако, прекращается, питаніе ръки почти также, мощное русло высыхаетъ, а жалкіе арыки-ручьи расползаются въ объ стороны отъ него, повинуясь волѣ человъка, сумъвшаго использовать первоначальные уклоны Тура-тамъ.

Изъ всѣхъ приведенныхъ разсужденій естественно вытекаеть и объясненіе еще одной морфологической особенности сѣвернаго склона Терскея.


Я говорю о чрезвычайно характерных для него внутренних продольных котловинах, типом которых можеть служить хотя бы вышеупомянутая долина Конурленъ - Алабашъ (См. рис. 3 и 4).


Вытянуто-эллиптическое, замкнутое пространство ея, около 150 квадратныхъ верстъ площадью (30 длиной и до 5 шириной), на 1.500—2.000 футъ ниже гребней, ограничивающихъ ее съ съвера (со стороны Иссыкъ-куля), не говоря уже о южныхъ, сразу поднимающихся надъ ней на 3.000—6.000 футъ; она всего лишь на 800 футъ выше озера, отстоя отъ него на 15 верстъ, т. е. на половинъ разстоянія до водораздъла хребта, превышающаго, въ свою очередь, озеро на 7.000 футъ.

Котловина не является расширеніемъ какой-либо долины, ибо всѣ онѣ здѣсь поперечныя; съ юга, съ хребта, она принимаетъ въ себя цѣлый рядъ рѣчекъ, въ числѣ ихъ четыре крупныхъ, выпускаетъ же въ озеро лишь одну (Акъ-Терекъ), прорывающуюся по прямому направленію. Дно котловины, на первый взглядъ плоское, имѣетъ, однако, рельефъ съ разницами высотъ до 80 саж.; во первыхъ, имѣется первоначальная пологая покатость его къ сѣверу, а во-вторыхъ, она измѣнена устьевой работой каждой изъ впадающихърѣкъ.

Въ низшей части ея имъется озерко Конурленъ, окруженное обширными болотами, трясинами, еле проходимыми, но изъ-за своей богатой травы поневолъ населенными киргизами ¹).


Западная часть (Ала-Башъ) суше и полого повышается къ краямъ, завершаясь «виражами»; профиль ихъ, удивительно





ровный, прямолинейно - покатый, чрезвычайно напоминаетъ пологую (уголъ 6°) покатость сѣвернаго берега Иссыкъ-

¹⁾ Жедая попасть въ кочевку, мы потратили часъ на переходъ 200 саженей этого болота, не смотря на помощь мъстныхъ людей; по ихъ словамъ «фарватеръ» постоянно мъняется и гдъ проходили вчера, сегодня уже можно завязнуть.



куля 1), и, очевидно, объ эти форрмы однороднаго происхожденія; туть же, наконець, на общемъ сглаженномъ фонъ выдѣляются маленькія изолированныя вершинки (Алабашъ и около нея). Такія же характерныя «утопленныя» горки имъются и на SW плоскомъ побережьи Иссыкъкуля 2), и по SO окраинъ ферганской котловины.

Всѣ перечисленныя особенности котловины Конурленъ-Алабашъ характеризують ее какъ осушившуюся озерную котловину недавняго прошлаго, возникновеніемъ и существованіемъ своимъ обязанную все той же схемѣ ледниковыхъ процессовъ Терскея.

Повторять ее здёсь въ третій разъ излишне, документація же моренами, карами и т. п. имѣется въ каждомъ ущельи (напримѣръ, Сары-Туръ, Ичка-Туръ

¹) Эта очень опредъленная и красивая по значенію картина открывается при взглядъ на О въ 6 верстахъ западнъе ст. Кутемалды по почтовому тракту.

²⁾ Видъ на эти бывшіе острова, полуострова и заливи, между ними, ярко иллюстрирующіе исторію усыханія Иссыкъ-кули, особенно хорошъ съ перевала Турайтырь въ Кунгей-Адатау.

и др.). Фактъ неудовлетворительнаго, какъ бы остановившагося, дренажа котловины въ настоящее время можеть находиться въ связи съ предположеннымъ поднятіемъ уровня Иссыкъ - куля. Подобныхъ озерноглаціальныхъ котловинъ по сѣверному склону Терскея много, и это обстоятельство тѣмъ интереснѣе, что въ Кунгеѣ ихъ нѣтъ; но вѣдь и слѣдовъ оледенѣнія въ немъ неизмѣримо меньше, а слѣдовательно зависимость обоихъ явленій ясна. Совершенно аналогичны взаимоотношенія Ферганскаго и Алайскаго хребта: въ первомъ почти нѣтъ слѣдовъ большого оледенѣнія, нѣтъ и котловинъ, во второмъ и то, и другое налицо 1).

Дальн'вйшій нашъ путь на западъ черезъ котловину Улахолъ—Семизъ-бель представилъ лишь рядъ подкр'впляющихъ доказательствъ изложенныхъ явленій. Резюмируя ихъ еще разъ, мы видимъ, что:

- 1. Различная морфологія хребтовъ Кунгей и Терскей-Алатау обусловлена преобладаніемъ ледниковой діятельности во второмъ изъ нихъ.
- 2. Различная конфигурація сѣвернаго и южнаго береговъ Иссыкъ-куля можетъ объясняться тѣмъ же порядкомъ ²).
- 3. Послѣдній междуледниковый періодъ Терскея кончается, если уже не конченъ. Наступиль ли ледниковый, или теперь промежуточная фаза равновъсія—неясно. Необходимо точное изученіе ледниковъ, не мимолетное экспедиціонное.
- 4. Въроятно поднятіе уровня Иссыкъ-куля, недавнее и продолжающееся.
- Удлиненная въ широтномъ направленіи форма озерныхъ котловинъ Терскея находится въ зависимости и связи

Котловины Алая, напримъръ Наукатская, около г. Оша, представляють собой точную копію описанной. Роль Иссыкъ-куля для нихъ вграль центральный бассейнъ Ферганы.

A не сложными необоснованными тектоническими процессами. См. Davis,

съ тектоническими его условіями, совпадая съ простираніемъ свитъ и продольныхъ сбросовъ.

Отъ урочища Карагоу мы свернули на югъ по почтовому тракту и, оставивъ область одного замкнутаго бассейна Тянь-Шаня, перенеслись въ другой—Нарынскій; эта вторая область еще менѣе изслѣдована, чѣмъ Иссыкъ-кульская, чрезвычайно сложна, но кое-что въ ней напоминаетъ первую. Путь нашъ лежалъ такъ: укрѣпленіе Нарынское—Терекъ-чатъ—Мукачи—Тутъ-куй — Алабуга — Улутузъ — Макмалъ — Ой-Каинъ — Кугартъ; перечислю наблюденія вдоль него.

Узкое и живописное ущелье, между ст. Кумбель-ата и Караунъ-куртъ, прорѣзаетъ мощную древнюю свиту разнообразныхъ песчаниковъ, сланцевъ и известняковъ, сильно перемятую, съ основнымъ простираніемъ на WNW. Въ расширеніи у ст. Сары булакъ террассы горизонтальныхъ молодыхъ отложеній озерно-рѣчныхъ. Долонскій перевалъ носитъ ясные слѣды ледниковой дѣятельности; долина сильно сразу расширяется, и ущелье смѣняется сглаженно-увалистымъ склономъ съ рыхлыми моренными накопленіями.

Ниже ст. Караунъ-куртъ известняки менѣе метаморфизованы и содержатъ намеки на фауну, въ видѣ члениковъ лилій, т. е это либо девонъ, либо карбонъ. Ближе къ ст. Онъ-арча древнія осадочныя свиты кончаются, ущелье также, и открывается широкое, увалистое, пониженное пространство боковыхъ мелкихъ долинокъ Нарына, сложенное уже какими-то молодыми рыхлыми образованіями. Пересѣкая его отъ Онъ-арча къ Нарынскому укрѣпленію, видно, что все сложено толщей свѣтлыхъ несцементированныхъ песчаниковъ, песковъ и мергелей, падающихъ на NWN и простирающихся далеко на западъ по правому берегу Нарына. Въ этихъ слабыхъ породахъ размывъ дъйствуетъ весьма энергично; дорога непрерывно ныряетъ въ глубокія долинки и овраги, параллельно вытянутые на SW,

по большей части совершенно сухіе, но съ сильно развитыми террассами. Посл'яднія, очевидно, флювіо-гляціальнаго происхожденія, судя по многочисленнымъ карамъ, завершающимъ вершинки долинокъ въ хребтѣ Нура.

Въ 6 верстахъ ниже укрѣпленія, на лѣвомъ берегу Нарына. у дороги обнажаются плотные мелкозернистые, красные песчаники, со включеніями песчаниковъ же, сланцевъ и кремня, частью окатанными, частью угловатыми; паденіе ихъ на NW. Выше, какъ булто несогласно, песчаники боле светлые, а у Акъ-кія они покрыты свътло-сърымъ массивнымъ известнякомъ съ Productus giganteus, Dielasma, кораллами и лиліями. Ниже Акъ-кія въ береговыхъ разрѣзахъ у устья р. Онъ-арчи песчаниковая слоистая толіца, подлежащая известнякамъ, ясно согнута въ синклиналь, съ NO осью; далее же, вероятно, имется антиклиналь, судя по паденію на NW известняковъ, тянущихся значительной грядой вдоль дороги съ юга. Западнъе устья р. Атбаши, прорывающей известняки удивительно эффектнымъ каньономъ, съ выгнутыми ствнками и котлами, они постепенно отходять отъ дороги на югь. Около урочища Суакъ-Капчигай карбона уже не видно, а большія обнаженія состоять изъ свътлой рыхлой толщи песковъ со слоистыми глинами, нарушенной весьма сильно сложными мелкими складками и сбросами, N()-го простиранія. Свита эта (съ которой мы встр'єтились впервые между Онъ-арча и Нарыномъ) отсюда пріобрѣтаеть уже господствующее значеніе, чрезвычайно сильно отражаясь на характеръ мъстности, сообщая ей совершенно специфическій характеръ со стильными пустынными колоритами.

Поверхность почвы глинистая, плотная, съ солевыми выцвѣтами и корками, вся растрескавшаяся и покрытая лишь скудными пучками степной растительности, наполовину высохшей (уже въ концѣ мая!).

Сухія русла овраговъ и даже большихъ долинъ, съ жалкими

зарослями колючихъ кустарниковъ, дополняють этотъ своеобразный ландшафтъ.

Въ разрѣзахъ овраговъ и ихъ водотечей видна сильно глинистая лёссовидная порода, съ прослоями мелкой гальки древнихъ осадочныхъ породъ; образованіе подобныхъ отложеній спорадическими потоками, различной силы, пустыннаго типа, вполнѣ здѣсь ясно; такого же происхожденія, вѣроятно, породы Ферганскихъ «адыровъ».

Слоистость при этомъ процессв получается правильная, равномфрная, и вполнъ въроятно, что разъ здъсь маленькій ручей даеть наслоенія по 1/4-1 аршина мощностью, то большія долины могли давать гораздо бол'є мощные слои, наблюдаемые въ Ферганъ. На общемъ желто-съромъ фонъ пейзажа рѣзко выдѣляются темно-зеленыя пятна лѣса у самаго русла Нарына; широкая (4 — 5 верстъ) долина его по правому берегу окаймлена громадными, отчетливыми террассами: число ихъ достигаетъ шести, и особенно хороша эта картина противъ урочища Терекъ-чатъ. Въ продолжение всъхъ трехъ дней нашего пути вдоль Нарына дуль сильный, раскаленный западный вътеръ, по словамъ туземцевъ, вообще здъсь доминирующій. Аналогичный съ изложеннымъ характеръ мъстность сохраняетъ по низовью р. Алабуги и ея притоковъ, но составъ и тектоника «нарынской» 1) толщи здёсь видны лучше. Долина Алабуги идеть по южному крылу большой антиклинали NO-го простиранія: крыло это обнажено очень хорошо громадными вертикальными разръзами у устьевъ р.р. Мукачи и Туюкъ-су, а особенно на подъемѣ къ перевалу Дарбаза. Ядро антиклинали, сильно сжатое, вверообразное, видно въ цёломъ ряде левыхъ

¹⁾ Терминъ, предложенный Davis'омъннока, конечно. единственно возможный, ибо ни возраста, ни параллелизацій, сколько-пибудь удовлетворительныхъ, мы не знаемъ. Названіе Аргентова «соленосная» свита менѣе удобно, ибо она не вездѣ соленосна.

овраговъ Алабуги — Улу-тузъ, Макмалъ, Карангы-тугай и др.; благодаря пластамъ гипса и каменной соли, содержащимся въ этомъ ядрѣ, оно рисуется весьма отчетливо съ праваго берега, особенно отъ развалинъ коканской крѣпости Чулакъ и могилъ Ширдакъ. Дислоцированныя «нарынскія отложенія» около р. Тутъ-куй (Туюкъ-су) въ верху обнаженій рѣзко абрадированы и покрыты грубымъ темнымъ горизонтально-пластовымъ конгломератомъ; въ другихъ мѣстахъ это соотношеніе менѣе отчетливо. Вся страна къ западу отъ Алабуги до перевала Уразъ-ханъ и немного лишь за него покрыта все той же рыхлой слоистой толщей, но лишь болѣе разноцвѣтной, принимающей послѣ антиклинала снова SOS-ое паденіе; сначала оно пологое (10°), но ближе къ грядѣ Чааръ-Ташъ становится круче.

Строеніе гряды Чааръ-Ташъ раскрыто рѣчкою Ой-Каинъ:—мощные сѣрые известняки карбона, содержащіе Productus giganteus, кораллы и криноидеи, неясно залегая, какъ бы переходять, изгибаясь, изъ гряды Янгызъ-кыръ, черезъ переваль Ой - Каинъ, на ОNО; въ 4 верстахъ сѣвернѣе перевала они прорваны свѣтлой, мѣстами красной породой гранитнаго типа.

Контактъ виденъ въ ущельи рѣчки, справа подножія перевала Ой-Каинъ. Нарынская свита сохранилась краснымъ клочкомъ на самомъ перевалѣ, свидѣтельствующимъ о первоначальномъ сплошномъ ея распространеніи; далѣе она начинается уже отъ соединенія р.р. Ой-Каинъ и Кылъ-дау, падая на NNO, сначала, въ мѣстѣ налеганія на палеозой, конечно, круто, а затѣмъ полого, и занимаетъ къ сѣверу громадное пониженное пространство долинъ Кугарта и Атая.

Рѣка Кугартъ, покидая продольное ущелье въ палеозойскихъ сланцахъ Ферганскаго хребта, глубоко прорѣзаетъ свои прежнія отложенія, заполнившія чрезвычайно широкую древнюю долину; схема террассъ здѣсь (пять, какъ на Алабугѣ) поразительная по красотѣ.

1-го іюня мы перевалили черезъ Кугартъ и съ его ножевиднаго гребня бросили послѣдній взглядъ на оригинальный, печальный, но по своему красивый, нарынскій край.

Интересъ, заключающійся въ его изученіи, по моему, чрезвычайно великъ, но дѣло это весьма сложное. Двѣ основныхъ темы придется именно здѣсь разработать:

- 1. Гдѣ и какимъ образомъ сочетаются чисто пликативныя цъпи Фергано-Алайскія съ горстами центральнаго Тянь-Шаня 1).
- 2. Въ чемъ заключалась исторія края въ мезозойское и третичное время, какова истинная природа «нарынской формаціи», и дъйствительно ли она повъствуетъ намъ объ исчезнувшемъ, изолированномъ бассейнъ, совершенно самостоятельномъ.

RÉSUMÉ. Participant à l'expédition du professeur K. Bogdanovitch pour l'étude du tremblement de terre de Sémiretchensk, l'auteur a parcouru, au printemps 1911, l'itinéraire Vierny—rivière Kébin — défilé Bouam et après avoir suivi la rive septentrionale du lac Issyk-koul, il est arrivé le 13 Mai à Prjévalsk (Karakol). L'itinéraire inverse l'a conduit le long du bord méridional de l'Issyk-koul jusqu'à Orto-takoï, de là à la fortification Naryn et, par les vallées des rivières Naryn et Alabouga et par la passe Kougart, au Ferghana (ville d'Och). Le parcours de toute la route à partir de Prjévalsk (environ 800 klm.) n'ayant duré que 15 jours, les observations recueillies présentent un caractère assez superficiel, mais comme elles offrent quelques données nouvelles qui ne figurent pas dans la relation spéciale du tremblement de terre, l'auteur en donne ici un aperçu succinct (dans la supposition que

См. взгляды Davis и Keidel, въ цатированныхъ работахъ, на строеніе Тяпь-Шани.

les lecteurs soient au courant des travaux de I. Mouchkétow, Friedrichsen, Keidel, Arghentow, Prinz.

Le versant Nord de l'Alataou Terskéi se caractérise par

- 1) des zones de formations géologiques orientées parallèlement vers le Nord-Est dans la partie orientale, et s'approchant de la direction Est, avec très faible déviation au Sud-Est, dans la partie occidentale:
- 2) la ligne, également parallèle, du contact des granites avec les calcaires carbonifériens; cette ligne sur laquelle se trouvent de nombreuses sources thermales (24°-46°C) et qui ressemble beaucoup à la ligne de roupture de Kébin (épicentre du séisme) paraît être d'une grande importance tectonique et séismique;
- 3) une zone de calcaires carbonifères s'étendant plus près du lac en dehors de la zone des granites; plus loin ces calcaires supportent en discordance de stratification des dépôts friables rouges ou jaunâtres, composés de conglomérats, de grès et de puissantes argiles stratifiés.

L'auteur s'arrête avec détails à cette assise, portant l'attention sur le vague des interprétations par Friedrichsen, Keidel etc., des diverses couches qu'ils désignent sous le nom général de Chanchaischichten. Cette dénomination est peu commode et des recherches plus détaillées sont indispensables. Résumant la littérature sur la question et comparant les données publiées jusqu'ici avec celles obtenues par lui durant ses travaux au Ferghana, l'auteur trouve que sous le nom de Chanchaï-Schichten, des auteurs allemands, avaient été groupés les représentants du carbonifère, du crétacé inférieur, du tertiaire, du postpliocène et même des alluvions, uniquement par suite de la présence du grès rouge. La clé des rapports mutuels de ces assises est dans le Ferghana. L'opinion de Friedrichsen que l'assise rouge du bord Sud de Issyk-koul présente des Schuttablagerungen est absolument inexacte, car c'est la même, que celle observée à Bouam, infracrétacée-tertiaire, fortement disloquée et plissée (rivière Ton, etc.). La parallélisation des grès rouges carbonifériens avec l'assise de Djity-ogous est aussi inexacte: Keidel a été induit en erreur par les assertions de Friedrichsen. Les dépôts houillifères «d'Angara» la supportent en concordance, souvent au Tian-Chan, toujours au Ferghana.

En discordance de stratification l'assise rouge est surmontée, sur les bords du lac actuel et dans ses anses d'autrefois (Bouam-Kok-Moïnak), de couches horizontales de dépôts sabloargileux, bigarrés ou de couleur claire, d'Issy-koul. Enfin on remarque autour du lac des terrasses récentes très nettes.


D'un haut intérêt est la configuration des bords de l'Issyk-koul qui, en relation avec la morphologie des chaînes du Kounghéi et du Terskéi, amène l'auteur aux conclusions suivantes:

- 1) La différence dans la morphologie de ces deux arêtes est due à l'intensité beaucoup plus grande de l'amplitude glaciaire du Terskéi, intensité avec laquelle se trouvent aussi en rapport les différences de configuration entre les bords Nord et Sud du lac.
- Pour le Terskéi, la dernière période interglaciaire touche à sa fin, si toutefois elle n'est déjà terminée.
- 3) Il est fort possible que le niveau de l'Issyk-koul se soit élevé dans ces derniers temps.
- 4) L'étirement dans le sens du parallèle des cuvettes intérieures lacustres du Terskéi est en relation, d'une part avec l'histoire de la glacification de l'arête, d'autre part avec sa tectonique et sa composition géologique.

De nombreuses preuves d'une ancienne glacification ont aussi été constatées sur le chemin vers le Naryn. Des kars glaciaires s'observent même parfois à la hauteur de 2.500 mètres. A l'aval de la fortification Naryn et dans le voisinage de la passe Kougart les calcaires renferment une faune du carbonifère inférieur.

En résumant ses observations dans la région du Naryn, l'auteur soulève deux questions intéressantes, méritant une étude sérieuse:

- 1) A quel point et de quelle manière les chaînes purement plicatives des régions du Ferghana et de l'Alaï se joignent-elles aux horsts et aux massifs du Tian-Chan central?
- 2) Quelle est l'histoire de la région aux époques mésozoïque et tertiaire, quelle est la vraie nature de la «formation du Naryn» et celle-ci, témoigne-t-elle effectivement d'un bassin indépendant, anjourd'hui disparu?





Станки Иссыкъ-кульскихъ отложеній въ долинъ р. Чу выше ст. Кокъ-Мойнакъ.



Южный берегъ оз. Иссыкъ-куль около устья р. Барскаунъ. Озерная террасса и аркозовые песчаники ея нижняго горизонта.