H 201.



Лѣсоразведеніе безъ поливки въ Туркестанѣ и его значеніе для края.

Туркестанъ, какъ извъстно, принадлежитъ къ мъстностямъ Россіи наиболье бъднымъ льсами; изъ громадной площади края, достигающей слишкомъ 60 милліоновъ десятинъ, едва лишь 350,000 десятинъ покрыты настоящими льсными насажденіями, состоящими изъ горныхъ льсовъ; остальные 6 милл. дес. (цифра крайне гадательная) кустарныхъ зарослей, обыкновенно причисляемые тъ льсному богатству края, представляютъ степныя заросли, которыя весьма характерны для среднеазіатскихъ степей, но едва ли заслуживаютъ названія льса. Въ числь этихъ 6 милл. дес. есть нькоторое количество тугайныхъ льсовъ и зарослей, растущихъ по берегамъ ръкъ, на затопляемой во время половодья почвъ, но площадь ихъ въ общемъ весьма незначительна. О распредъленіи льсовъ въ Туркестанъ можно судить по прилагаемой таблицъ, на стр. 346.

Къ лѣснымъ богатствамъ Туркестана по справедливости слѣдуетъ также причислить весьма значительныя культурныя насажденія, которыя встрѣчаются повсемѣстно на орошаемой почвѣ оазисовъ и вмѣстѣ съ садами придаютъ послѣднимъ полный жизни зеленѣющій видъ. Пространство этихъ культурныхъ насажденій въ точности неизвѣстно, но во всякомъ случаѣ оно въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ весьма значительно. Такимъ образомъ всѣ лѣсныя богатства туркестанскаго края естественно могутъ быть раздѣлены на три группы:

- 1) культурныя насажденія на орошаемыхъ земляхъ въ оазисахъ,
- 2) степныя заросли изъ саксаула и т. п. кустарниковъ и, наконецъ,
- 3) настоящіе ліса, покрывающіе склоны горь Тянь-Шаньской и Памиро-Алайской системъ на высоті отъ 3 до 10 тысячъ футовъ надъ уровнемъ моря. Искусственныя древесныя насажденія въ оазисахъ, состоящія изъ различныхъ сортовъ тала, тополя, карагача и фруктовыхъ деревьевъ (по преимуществу тута и абрикоса), слу-

Площадь подъ лъсными и кустарными насажденіями въ Туркестанъ.

	Сыръ-Дарынская область.						Самаркандская.				Ферганская.						анъ.	
области и уъзды.	Ташкентскій.	Чимкентскій.	Ауліэагин- скій.	Перовскій.	Казалинскій.	Аму-Дарьин- скій отдълъ.	BCETO.	Самарканд- скій.	Ходжентскій.	Дживакскій.	BCETO.	Маргелан- скій.	Кокандскій.	Андижанскій.	Наманган- скій,	Ошскій.	BCEFO.	Въ Туркестанъ.
		Приблизительная цлощадь въ десятинахъ.																
Горные лѣса.			二		P.CO.					0.000	37.00	D1 57 14	2 P	OB (I		100		
Грецкій орѣхъ. Древовид. мож- жевельникъ	550	_					550			10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Parq. I	1081 JUST 1081 JUST 1081		102300	250	01/10	102550	1 031 0 0
(арча) Ель и пихта Проч. листвен-	4017 —	4970 —	2667 315				11654 315		20000	61000 —	129000 —	19965 —	13905 —		1730 5200			
ныя породы.	10	3240	1818			-	5068	410	-		410	<u></u>		47930	4670	4018	56618	62 96
Степные и ту- гайные лѣса и кустарники.		/			TP MA	BILL GE	a sequiti	- (H)	and bac	Top Rational	The Carlo	TO TRUMB	TOWNERSON ACTES ON COMME	RAGISORY.	Zed vest		ON ON O	7.09
(Саксаулъ и т. п.) *)	_	250000	600000	2000000	125 0000	1000000	5100000	\ \	200 - 200 17	1100000	1100000		11000	Tarpous Princes	4000	4000	15000	62 15000
Итого	4577	258210	604800	2 0 0 0000	1250000	1000000	5117587	48410	20000	1161000	12 29410	19965	24905	150230	15 8 50	8293	219243	6566240

^{*)} Площадь степныхъ насажденій весьма гадательна.

жатъ, главнымъ образомъ, для удовлетворенія надобностей населенія въ строевомъ и подѣлочномъ лѣсѣ, а также отчасти и въ топливѣ. Населеніе прекрасно понимаетъ всю важность такихъ насажденій и по мѣрѣ потребленія древеснаго матеріала производитъ новыя подсадки.

Степныя заросли, состоящія изъ различныхъ кустарныхъ породъ, между которыми на первомъ мёстё стоитъ саксаулъ, занимавшія еще лётъ тридцать тому назадъ огромныя пространства въ степяхъ Туркестана, уцёлёли въ прежнемъ видё отъ безпощаднаго истребленія только въ немногихъ глухихъ уголкахъ туркестанскихъ степей. Всё саксаульныя заросли по Сыръ-Дарьё и на громадномъ разстояніи вокругъ населенныхъ центровъ истреблены безпощадно; саксаулъ бёжалъ (кетты), по словамъ киргизовъ, въ степь и надежды на его возвращеніе нётъ почти никакой, такъ какъ всё степные кустарники даютъ корневую поросль очень туго, а естественное возстановленіе ихъ зарослей задерживается, какъ особенностями степнаго климата и почвы, перекочевками киргизовъ съ ихъ стадами, такъ и возрастающей потребностью увеличивающагося населенія края въ топливё и въ древесномъ углё.

Такое положение дель съ степными зарослями въ высшей стенени печально, такъ какъ степная поросль, скрвиляя своей корневой системой песчаную почву, препятствуеть выдуванію ея вътромъ, а следовательно и образованію сыпучихъ песковъ — этого бича Средней Азіи. Истребленіе степныхъ зарослей уже дало себя почувствовать въ Бухарф, гдф движущіеся пески съ каждымъ годомъ передвигаются далве и, надвигаясь на культурные оазисы, засыпають сады, поля и селенія. Недалеко то время, когда почти тоже мы увидимъ и въ Туркестанъ, или върнъе когда дъятельность песковъ на столько станеть зловредной, что никакія человіческія силы не будуть въ состояніи положить ей предвль. Лісоразведеніе въ степяхъ, которыя некогда были покрыты зарослями, представляеть даже при орошеніи чрезвычайныя трудности и едва-ли когда либо въ значительныхъ размърахъ осуществится, такъ какъ оно стоить очень дорого и требуеть воды, которой такъ мало въ Туркестанъ. О лъсоразведении безъ поливки гдъ нибудь въ кизылъкумахъ и думать нечего; оно быть можеть въ некоторыхъ местахъ и возможно, но можно предугадать, что даже при затратъ большихъ средствъ дастъ весьма плохіе результаты. Если въ болве возвышенныхъ мъстностяхъ подъ Ташкентомъ (1520 ф.) близко къ горамъ, гдв дольше продолжаются весенніе дожди, лесоразведеніе безъ орошенія, какъ мы увидимъ ниже, даетъ кое-какіе, хотя и не особенно блестящіе результаты, то въ открытыхъ степяхъ, вдали отъ горъ, гдѣ бездождный періодъ продолжается дольше и лѣтняя температура выше, на успѣхъ его едва-ли можно надѣяться.

Горные льса Туркестана, состоящие изъ древовиднаго можжез вельника, оръха, тополя и другихъ лиственныхъ, частью фруктовыхъ породъ, подверглись въ свое время такимъ же опустошеніямъ, какъ и степныя заросли. Начиная съ глубокой древности до 1879 г., когда быль положень некоторый предель безпощадной вырубке этихъ льсовъ, горныя насажденія истреблялись съ неослабной энергіей, результатомъ чего было подное исчезновеніе ихъ во многихъ болве доступныхъ мъстностяхъ и значительное уменьшение даже въ самыхъ глухихъ, трудно доступныхъ, ущельяхъ. Въ началъ VIII века, когда арабы вторглись въ Фергану, лесныя насажденія не только покрывали сплошной массой горы, окружающія долину, но и спускались по берегамъ рвчекъ до самаго дна последней, до границы культурной растительности. Въ Наманганъ 90-лътніе старики помнять еще, когда фисташникъ произрасталъ на лежащихъ къ сверу отъ города, въ настоящее время безплодныхъ и лишенныхъ растительности, возвышенностяхъ. Еще лътъ 50 тому назадъ строевая арча (древовидный можжевельникъ) спускалась до Наная, теперь-же ее можно найти только версть за 30 отъ этого селенія.

Въ бассейнъ Зеравшана было не лучше; къ концу 70-хъ годовъ все пространство отъ Пенджекента до Урмитана было оголено отъ древесной и кустарной растительности. Съ 1879 года, когда послъдовало безусловное воспрещение добычи угля изъ горнаго лъса въ бывшемъ Зеравшанскомъ округв и были приняты общія лісоохранительныя м'тры, истребление горныхъ лесовъ несколько пріостановилось, многіе скаты и ущелья покрылись вновь зеленвющими подростающими насажденіями, но все же осталось множество обнаженныхъ склоновъ и опуствишихъ хребтовъ, кои на всегда потеряли свое лесное богатство и уже не способны къ естественному лъсовозстановленію. Между тьмъ эти-то горныя насажденія, которыя такъ дъятельно истреблялись туземцами, эти лъса арчи, тополя и дикихъ деревьевъ, которыя такъ усердно пережигались на уголь, сплавлялись внизъ по Зеравшану или свозились въ долины, представляють драгоцвинвищее украшение Туркестанскихъ горъ, значеніе котораго прекрасно понимають ті же тувемцы; «лісь есть мать воды» (суны анасы дарахъ) — говорять они. Если горные

лвса вообще играютъ громадную роль для данной страны, сохраняя горы отъ разрушенія, распредёляя болёе равномёрно влагу, спускающуюся въ долины, предохраняя почву отъ вліянія в'втра и ръзкихъ колебаній температуры, то въ Туркестань, гдь преоблалають обнаженные, состоящіе изъ рыхлыхъ породъ склоны, гдв температура лътомъ повышается до 50 градусовъ, а въ теченін почти полугодія не бываеть дождя, гдв, наконець, каждая капля воды пріобр'втаетъ особую цівность, потому что ея очень мало, а мъстами и вовсе нътъ, - горнымъ лъсамъ присуще исключительное и огромное въ экономіи края значеніе. Древесные корни, переплетаясь между собою охраняють почву, въ особенности на крутыхъ склонахъ, отъ сползанія и смыванія внизъ на дно котловинъ и ущелій и такимъ образомъ защищаютъ склоны горъ отъ разрушенія и обнаженія горныхъ породъ. Л'всныя насажденія, затіняя почву, предохраняють ее, какъ отъ непосредственнаго действія солнца, такъ и вообще отъ ръзкихъ колебаній температуры, что съ одной стороны уменьшаеть разрушающее вліяніе посл'вднихъ на почву и горныя породы, а съ другой, предупреждая быстрое таяніе сніга способствуєть болье равномірному и постепенному стоку водь. Такой постепенный, равном врный стокь, какъ дождевыхъ, такъ и преимущественно снѣговыхъ водъ имѣетъ для Туркестана первостепенное значеніе. Многія селенія Ферганы и въ особенности Самаркандской области, расположенныя въ бассейнъ Зеравшана, по склонамъ горъ, на клочкахъ удобной земли, ежегодно страдають отъ внезапныхъ наводненій, оползней и другихъ явленій, твсно связанныхъ съ двятельностью проточныхъ водъ, размывающихъ пахотныя поля, заваливающихъ ихъ камнями, портящихъ ирригаціонные каналы и превращающихъ плодородныя земли въ безплодные, негодные для культуры пустыри.

Торные лѣса, покрывая склоны, съ которыхъ стекаютъ ручьи и рѣчки, пріобрѣтающіе громадное ирригаціонное значеніе въ долинѣ, въ высшей степени благотворно вліяютъ на равномѣрное поступленіе въ нихъ воды, затрудняютъ испареніе влаги и оберегаютъ ея источники; кромѣ того, какъ извѣстно, горный лѣсъ, это лучшая защита отъ лавинъ столь часто бывающихъ въ Европѣ (въ Альпахъ), повторяющихся нерѣдко и въ Туркестанѣ (въ особености въ Дарвазѣ и Каратегинѣ). Словомъ, польза, приносимая горнымъ лѣсомъ вообще, а въ особенности въ такой сухой и бѣдной водами странѣ какъ Туркестанъ, дѣйствительно громадна, и если добавить, что горный лѣсъ растетъ часто на такихъ кругыхъ

склонахъ и почвахъ, которые непригодны для культурныхъ растеній, то окажется, что на сохраненіе и возращеніе его должно быть обращено особое исключительное вниманіе. Наконецъ, есть еще одно чрезвычайно важное обстоятельство, на которое какъ кажется, при обсуждении значения горнаго леса въ Туркестане до сихъ поръ не обращали вниманія. Дівло въ томъ, что весь Туркестанъ (и Закаспійская область), какъ это признано всеми, находится въ состояніи усыханія. Есть ли такое усыханіе явленіе періодическое, находится ли, другими словами, Туркестанъ въ період'в усыханія или же высыхаеть постоянно и безостановочно это вопросъ второстепенный (ръшение котораго однако скоръе можно ожидать въ последнемъ смысле); достаточно установить тотъ факть, что во всемъ туркестанскомъ бассейнъ замъчаются одни и тъ же явленія: озера постепенно сокращаются и высыхають, ледники уменьшаются въ объемъ и отступають, количество воды въ ръкахъ и ръчкахъ уменьшается, испареніе почти повсемъстно во много разъ превышаетъ количество выпадающихъ осадковъ; словомъ, совершается цёлый рядъ явленій, показывающихъ, что вся страна отъ Памира до Кавказа, отъ Гиндукуша и до бассейна Иртыша (мы здёсь не касаемся однородныхъ явленій въ восточномъ Туркестанъ и т. п.) медленно и постепенно осущается, становится бъднъе влагой и слъдовательно все менъе и менъе пригодной для человъческой жизни. Есть даже основание полагать, что процессъ высыханія, которому подвергается такъ называемая Средняя Азія, не остается безъ вліянія на сопред'яльныя страны; весь юго-востокъ Европы (а следовательно и Европейской Россіи), и юго-западъ Сибири, лежащіе на периферіи этой огромной площади изъ которой высасывають влагу СВ. сухіе вътры, медленно и незамътно, но почти несомивнно высыхають и пріобретають все болве и болве особенности континентальнаго, сухаго климата. Параллельно съ высыханіемъ и объдненіемъ влагой Туркестана, все большія и большія пространства захватывають пески, передвигающіеся подъ вліяніемъ в'втра и засыпающіе культурные оазисы и селенія, обозначаются різче крайности температуры, климать становится суше и условія жизни въ стран'в тяжел'ве. Конечно, вс'в изложенныя явленія совершаются чрезвычайно медленно; многія столътія еще взоръ нашъ будуть радовать роскошныя поля въ бассейнъ Зеравшана и прекрасные оазисы Ферганы, но не надо забывать, что съ каждой истребленной десятиной степныхъ зарослей, съ каждымъ необдуманнымъ шагомъ въ дълв эксплоатаціи

горныхъльсовъ, мы приближаемся на нъсколько лътъ кътому времени, когда въ Туркестанъ наступитъ полное и нераздъльное господство подвижныхъ песковъ, когда грандіозныя его ръки Сыръ и Аму превратятся въ жалкіе ручьи подобно Теджену и Мургабу и когда населеніе страны будетъ вынуждено покинуть насиженныя съ искони въковъ мъста и двинуться на новыя. Съ другой стороны, можно сказать съ увъренностью, что отдаленіе этой ужасной поры на многіе годы вполнъ во власти человъка; бережное сохраненіе горнаго лъса и степныхъ зарослей, возможно широкое развитіе орошенія въ связи съ расширеніемъ культурныхъ насажденій и бережливое пользованіе водой могутъ вполнъ обезпечить успъхъ въ борьбъ человъка съ природой Туркестана и отодвинуть на неопредъленное время грядущія невзгоды.

Высказанныя положенія, кажется намъ, вполнъ достаточно выясняють значеніе ліса вообще и въ особенности горнаго въ Туркестанв, и указывають то направление, котораго следуеть держаться при разрешении леснаго вопроса въ этой стране. Съ этой точки зрвнія въ Туркестанв пріобрвтаеть большое значеніе не только л'всоохраненіе, но и л'всоразведеніе, о которомъ намъ придется сказать несколько словь. Мы здёсь не будемъ останавливаться на разведеніи искуственныхъ насажденій въ культурныхъ оазисахъ на орошаемой почвъ, такъ какъ оно всегда велось въ общирных размерах и въ особенности процветает въ настоящее время. Мы сообщимъ только тв попытки лесоразведенія въ Туркестань, которыя были предприняты на безплодныхъ склонахъ горъ и въ степи безъ орошенія, такъ какъ они представляють не только существенный теоретическій интересь, но и важны въ практическомъ смыслъ, какъ опыты превращенія безплодныхъ земель въ лесныя насажденія, значеніе которыхъ въ общей экономіи края не подлежить сомниню. Наиболие интересные опыты были сделаны въ самаркандской и въ сыръ-дарьинской областяхъ.

Искусственныя лѣсонасажденія безъ орошенія въ самаркандской области состоять изъ слѣдующихъ четырехъ лѣсныхъ дачъ: 1) Аманкутанская горная лѣсная дача, расположенная около кишлака Аманкутанъ по дорогѣ изъ Самарканда въ Шахрисябсъ (Шааръ-Сабизъ) въ 40 верстахъ отъ Самарканда и занимающая площадь въ 335 десятинъ. 2) Багринская степная лѣсная дача, расположенная около кишлака Вагринъ, по той же дорогѣ, въ 22 верстахъ и отъ Самарканда, въ 135 дес. 3) Чупанатинская лѣсная дача расположена на высотахъ Чупанъ-ата, на лѣвомъ берегу р. Зеравшана, въ 11 вер-

стахъ отъ Самарканда, по ташкентской дорогв, въ 25 десятинъ, и 4) Агалыкская горная лёсная дача, въ Агалыкскомъ ущельё, 15 версть западне Аманкутана, въ 5 десятинъ. Такимъ образомъ, всехъ искусственныхъ лесонасажденій въ области насчитывается около 500 дес. Первый опыть искусственнаго л'ясонасажденія быль произведенъ еще въ бывшемъ Зеравшанскомъ округъ осенью 1879 года и законченъ весною въ 1880 году, по инипіатив и подъ руководствомъ генерала Королькова. Мъстомъ посалки было избрано Каратюбинское ущелье, а именно склоны горъ у верховьевъ протекающей здесь Каратюбинской речки, около кишлака Аманкутана. Причины, вследствие которых в посадка была произведена въ этой мъстности, были слъдующія. Между Шахрисябскими горами и арыкомъ Даргомъ лежитъ безводная степь, имѣющая въ длину 60-70 верстъ, а въ ширину около 10. Вследствіе отсутствія оросительной воды степь эта представляется пустынной равниной, сильно раскаляемой солнцемъ въ лътнее время и поросшей верблюжьей колючкой (Alhagi camelorum). Тёмъ не менёе, въ этой пустынной степи ближе къ горамъ по каратюбинской дорогъ встръчаются различныя указанія на то, что эта безводная містность была нікогда цвітущимъ оазисомъ. Развалины кишлаковъ, кладбища, засохшія деревья и заброшенные оросительные каналы свидетельствують, что здъсь нъкогда было значительное осъдлое население. На памяти мъстныхъ старожиловъ льтъ 60 тому назадъ въ степи еще была жизнь, но уже и тогда приходившая къ упадку. Степь эту въ то время орошалъ Янги-арыкъ, бравшій начало изъ р. Зеравшана, а въ Каратюбинскомъ ущельв, около Аманкутана, произрасталъ лесъ. Каратюбинская ръчка была тогда многоводнъе льтомъ и давала менъе воды весной, причемъ вешнія воды ея впадали въ Янгиарыкъ, пересвкавшій річку почти подъ прямымъ угломъ; въ случав особенно сильной прибыли водъ весной, онв спускались по шлюзу за Янги-арыкъ къ Даргому. Съ теченіемъ времени ліса около Аманкутана были вырублены и Каратюбинская ръчка, все болве и болве разливаясь весной, прорвала шлюзы и преградила теченіе Янги-арыка. Такимъ образомъ, вся площадь земли къ западу отъ пересвченія Янги-арыка, Каратюбинской рвчкой осталась безъ орошенія и превратилась въ пустынную степь; немного орошенной земли осталось лишь по берегамъ рвчки, воды которой путемъ арыковъ орошають несколько оазисовъ ниже Каратюбинскаго ущелья.

Возобновленіе ліса въ Каратюбинскомъ ущель в около Аманку-

тана имъло, такимъ образомъ, цълью регулировать количество воды въ ръкъ и съ теченіемъ времени возстановить заброшенный Янгиарыкъ. Склоны горъ около Аманкутана съ глинистой почвой, покрытые рёдкой травяной растительностью и по своей крутизнё недоступные для хлібопашества, были выбраны містомь насажденія. Весной на почвъ вспаханной четыре раза мъстными плугами на глубину шести вершковъ, были проведены борозды поперегъ горы на 4 — 5 арш. одна отъ другой и въ нихъ были посажены подъ кетмень однольтніе съянцы былой акаціи, айланта, карагача и гледичіи въ аршинномъ разстояніи другь отъ друга. Сплошная посадка упомянутыхъ породъ заняла около 10 десятинъ; въ теченіе льта она была четыре раза очищена отъ сорныхъ травъ, причемъ почва взрыхлялась на глубину около 2 вершковъ. Очистка почвы отъ сорныхъ травъ была произведена между рядами трехколеснымъ скобелемъ, между саженцами-кетменемъ. Всв упомянутыя работы съ устройствомъ питомника и съ покупкой необходимаго инвентаря обошлись въ 1000 рублей. Успъхъ насажденія превзощелъ всв ожиданія; всѣ саженцы принялись и уже осенью своею зеленью рѣзко выдёлялись на выжженных солнцемъ склонахъ горъ. Такимъ образомъ, однолътние саженцы 6 вершковъ высоты, посаженные весной послів дождей не только съ успізхомъ перенесли шестимісячное бездождное и жаркое лъто, но и дали приростъ около 1/, арш. въ вышину и около 1/4 вершка въ толщину. Въ виду успъшности этого опыта л'всоразведенія въ горахъ, въ томъ же 1880 г. были предприняты посадки и въ степи. Мъстомъ опыта была избрана безводная степь, лежащая къ югу отъ Самарканда между арыкомъ Даргомъ и Шааръ-сабизскими горами. Климатическія условія этой мъстности значительно хуже условій въ горахъ около Аманкутана; хотя количество выпадающей влаги въ этихъ двухъ мъстностяхъ приблизительно и одинаково (въ теченіе 6-7 місяцевъ дождя не бываеть вовсе), но за то степь около Даргама раскаляется солнцемъ значительно больше, чъмъ склоны горъ у Аманкутана. Кромъ того, въ степи нъсколько разъ въ теченіе льта дуетъ гармсиль, т. е. горячій вітеръ, отъ котораго листья на растеніяхъ сохнутъ и сами они на нъкоторое время останавливаются въ ростъ. Для опытной посадки быль отведень около кишлака Багринь участокъ земли, къ распашкѣ котораго приступили весною 1880 г. Распашка производилась туземными плугами на глубину до 6 вершк. Послѣ вспашки мъста посадки съянцевъ отмъчались маркерами, причемъ разстояніе между рядами равнялось 3 арш.; посадка была произ-

ведена подъ колъ рядами, на 1 арш. свянецъ отъ свянца. Участокъ, засаженный съянцами въ 1880 г., равнялся 20 десятинамъ. Очистка насажденія отъ сорныхъ травъ была произведена въ теченіи літа 4 раза, между рядами трехколеснымь скобелемь, а между сажениами-кетменемъ. Къ осени насаждение красовалось зеленымъ оазисомъ среди выжженой степи. Гдв почва не была сильно засорена сорными травами, тамъ принялись всв саженцы и дали приростъ лишь немногимъ менъе, чъмъ въ Аманкутанъ. Мъстами, гдъ обильно росъ полукустарникъ Rosa berberifolia и злакъ Cynodon dactylon, отличающиеся сильнымъ ростомъ и глубокой корневой системой. саженцы имъли слабый видъ и очевидно росли плохо. Впослъдствін въ такихъ містностяхъ саженцы погибли и въ нихъ избівгали дёлать насажденія. Трехколесный конный скобель, которымъ производилась очистка насажденія отъ сорныхъ травъ, принятый въ образцовыхъ степныхъ лъсничествахъ южной Россіи, оказался неудобнымъ; устроенный для черноземной почвы скобель, не смотря на уменьшеніе разм'вровъ ножей, работалъ плохо на лесс'в-глинистой, плотной почвъ, засоренной камнями и поросшей полукустарниками. Непригодность указаннаго скобеля для данной почвы вызвала видоизмѣненіе его, приспособленное для обработки плотной лессовой почвы съ твердыми корнями травъ и полукустарниковъ, а также для избъганія встръчающихся камней. Для этого скобелю были даны только два колеса, на оси которыхъ пом'вщались двигающіяся вверхъ и внизъ дві стойки. Верхніе концы стоекъ служатъ ручками, а нижніе снабжены трехугольными ножами. Ножи могли подниматься и опускаться вмёстё со стойками, чёмъ регулировалась глубина вспашки, и кром'в того, ихъ можно было поставить подъ большимъ или меньшимъ угломъ къ почвъ помощью цвии, соединяющей ихъ съ перекладиной, помвщавшейся между оглоблями на аршинъ впереди оси. При такомъ устройствъ скобеля легко избёжать камней наклоненіемъ ручки внизъ (ножи въ такомъ случав приподнимаются вверхъ) и работать въ плотной лессовой почвѣ, вслѣдствіе уменьшенія количества ножей. Въ 1880 г. около кишлака Багринъ было посажено 20 дес., въ 1881 г. - 65 дес. и въ 1882 г. -- 50 десятинъ. Такимъ образомъ, до 1882 года практиковался прежній общепринятый способъ сплошной посадки ліса. При такомъ способъ посадки на скатахъ горъ было замъчено, что насажденія на силошь вспаханныхъ склонахъ сильно страдаютъ отъ снёговыхъ и дождевыхъ водъ, которыя размываютъ почву и уносять внизь даже укоренившіеся саженцы. Во изб'яжаніе такого



неудобства были предприняты опыты посадки лёса по новой систем'в, состоявшей приблизительно въ слудующемъ. По склону горы колышками нам'вчались горизонтали на разстояніи 5-10 саж. одна оть другой, вдоль колышковъ разставлялись рабочіе съ кетменями, которые прежде всего снимали верхній слой почвы (дернъ) и укладывали на 2 арш. ниже колышковъ, въ видъ стънки, вышиною въ аршинъ или нъсколько болье. Затъмъ слой почвы, съ которой былъ снять дернь, вскапывался и земля отбрасывалась къ стенке до пополненія всего промежутка между нею и горой, причемъ наблюдалось, чтобы поверхность набросанной земли не поднялась выше колышковъ, т. е., чтобы она представляла горизонтальную поверхность съ небольшимъ уклономъ въ сторону горы. Такимъ образомъ получалась терраса, идущая горизонтально поперегь горы и имввшая въ ширину отъ 2 до 3 аршинъ. Вдоль наружнаго края террасы сажаются свянцы подъ колъ или подъ кетмень на разстояніи $1-1^{1}/_{2}$ арш. другъ отъ друга. Обсаженные такимъ образомъ горные склоны представляются перепоясанными горизонтальными террасами съ посадками, идущими одна надъ другой на разстояніи 5-10 саженъ. Какъ показалъ опытъ, такая посадка, какъ и сплошная, должна ежегодно въ теченіи 10 льть очищаться отъ сорныхъ травъ; но очистка въ первомъ случав производится только на террасв, т. е. на полосв земли не шире 3 аршинъ, и дълается исключительно ручнымъ способомъ, помощью кетменей, вследствіе недоступности террасъ для конной обработки. Преимущества новой системы посадки террасами сравнительно съ прежней состоять, повидимому, въ следующемъ. Сплошныя насажденія безъ большихъ затратъ возможны только на сравнительно пологихъ склонахъ горъ, гдъ можетъ быть примънена обработка почвы помощью плуговъ. Между тъмъ, такіе склоны почти повсемъстно уже распаханы и съ успъхомъ эксплоатируются мъстнымъ населеніемъ подъ посъвы богарной пшеницы, а отчасти ячменя и льна. Что же касается крутыхъ склоновъ, недоступныхъ для распашки, то они остаются свободными и часто негодны даже для пастбы скота. Такіе склоны наиболже подвергаются оползнямъ, обваламъ и страдаютъ отъ размывовъ, а следовательно более другихъ нуждаются въ укреплении ихъ древесной растительностью, обладающей более сильной корневой системой, чёмъ травы. Будучи почти совершенно негодными для культуры, крутые склоны имъютъ однако то существенное достоинство, что насажденія льса, произведенныя на нихъ по изложенной системь террасъ, удаются лучше, чвиъ гдв бы то ни было. Такимъ образомъ,

нользуясь системой террасъ, является возможность съ усибхомъ развести лесь на совершенно свободныхъ, никому ненужныхъ крутыхъ склонахъ, подвергающихся усиленнымъ денудаціоннымъ процессамъ, именно, вследствіе отсутствія на нихъ древесной растительности. Ладве, лвсь, разведенный на сплошь обработанной почвв на склонъ горы, на первыхъ порахъ задерживаетъ влагу менъе, чемъ обнаженные скаты, поросшіе травами. Вспаханная на глубину 6 вершковъ почва подъ сплошнымъ насаждениемъ усиденно размывается водами и смывается внизъ, весьма часто обнажая корни саженцевъ и портя насажденіе; такое смываніе верхняго слоя почвы не только ухудшаеть условія жизни растеній на скатахъ горь, но и вызываетъ весьма значительный расходъ на задёлываніе промоинъ, оконку подмытыхъ саженцевъ и подсадку новыхъ. При террасовидной посадкъ лъса размывовъ и сноса почвы не наблюдается. такъ какъ стекающія воды задерживаются ниже лежащими террасами. Опыть показаль, что террасы шириною въ 21/, арш., съ поверхностью, наклоненной въ сторону горы подъ угломъ около 12°, при разстояніи между ними въ 71/2 саж., могуть успъшно задержать всю влагу, выпадающую во время самыхъ сильныхъ ливней въ Аманкутанъ на склоны горъ, пересъченные такими террасами. Почва между террасами не размывается вследствіе того, что она не распахивается вовсе, оставаясь цёлиной, поросшей травной растительностью. Влага, выпадающая въ виде дождя и задержанная террасами, поглощается глубоко взрыхленнымъ слоемъ почвы, пропитываетъ его и, проникая внизъ, достигаетъ наконецъ водоноснаго слоя, увеличивая запасъ содержащейся въ немъ воды. Такимъ образомъ, система террасъ косвенно способствуетъ увеличенію количества ключевой воды, питающей въ течении лъта Каратюбинскую рвчку, имвющую весьма важное ирригаціонное значеніе.

Задерживающее вліяніе террасъ относительно осадковъ сказывается въ первый годъ ихъ устройства и посадки лёса; послёдній, имёя подъ собою почву, увлажненную на значительную глубину, развивается и растетъ лучше, чёмъ при сплошной посадкв. Такимъ образомъ, посадка лёса террасами не только уменьшаетъ разрушительное вліяніе вешнихъ водъ, но и способствуетъ увеличенію количества ключевой воды, имёющей по своемъ выходё изъ почвы важное ирригаціонное значеніе. Не смотря на то, что при посадкѣ лёса террасами всё работы ведутся въ ручную, посадка лёса и уходъ за нимъ по системѣ террасъ обходятся почти вдвое дешевле, чёмъ при сплошныхъ насажденіяхъ; объясняется этотъ фактъ тёмъ, что

въ первомъ случав подвергается обработкв лишь самая необходимая часть земли, а во второмъ весь участокъ, предназначенный поль насаждение обработывается сплошь. Первый опыть посадки по системъ террасъ былъ сдъланъ на 40 дес. въ 1882 г. въ горахъ около Аманкутана и далъ хорошій результать: саженцы къ концу льта дали большій прирость, чемь на участке, засаженномь сплошь. Въ томъ же году въ Аманкутанъ сплошнымъ насаждениемъ было разведено лъса 10 дес., а въ Багринъ 50 дес. Въ 1883 г. посадка на 130 дес. была произведена въ Аманкутанв и исключительно террасами: въ этомъ же году кромъ вышеперечисленныхъ древесныхъ породъ были посажены грепкій ор'яхъ, таврическая сосна и виргинскій можжевельникъ. Въ 1884 г. такимъ же способомъ было засажено въ Аманкутанъ еще 50 дес. Въ 1885 г. по той же системъ было засажено 20 дес. на высотахъ Чупанъ-ата. Не смотря на весьма неблагопріятныя почвенныя и климатическія условія этой последней местности, посадка оказалась удачной, такъ какъ террасы успешно задерживали дождевую воду, стекавшую съ обнаженныхъ склоновъ Чупанатинскихъ высотъ. Въ томъ же году въ Аманкутанскомъ сплошномъ насаждении 1880 и 1881 гг. на площади въ Десят, были прекращены очистка сорныхъ травъ и взрыхленіе почвы и произведено прореживание. Въ 1886-88 годахъ новыхъ посадокъ не производилось; былъ уходъ лишь за прежними. До 1888 г. расходъ на лъсныя насажденія покрывался изъ земскихъ суммъ, съ этого же года ассигновка денегъ стала производиться по смътъ министерства государственнымъ имуществъ. Съ 1889 г. работы по лесоразведению начались вновь; по лесной сметь этого года было предположено посадить 30 дес. около Аманкутана и 5 десят. на высотахъ Чупанъ-ата; но вследствіе различныхъ неблагопріятныхъ условій было сделано насажденій: около Аманкутана 15 десят. и въ Чупанъ-ата 5 дес. Наконецъ, въ 1890 г. въ Аманкутанъ было посажено 30 дес. Такимъ образомъ, лъсоразведение безъ орошенія въ самаркандской области, какъ можно судить изъ вышеизложенныхъ фактовъ, дало благопріятные результаты; благодаря принятой системъ террасообразныхъ посадокъ, лъсныя насажденія принимаются хорошо, растуть порядочно и въ скоромъ времени. надо полагать, принесуть существенную пользу затвненіемъ склоновъ и увеличеніемъ запаса ирригаціонной воды. При лісоразведеніи въ самаркандской области употреблялись преимущественно следующія древесныя породы: белая акація, грецкій оректь, карагачъ (Ulmus), айланть и таврическая сосна. На первомъ мість по

пригодности для лівсоразведенія безъ поливки слівдуеть поставить бълую акацію. Лерево это обладаетъ весьма цінными свойствами, позволяющими ему одинаково хорошо рости какъ на орошаемой почвъ, такъ и безъ искусственнаго орошенія. Вълая акація растеть довольно быстро, причемъ корни ея весьма легко приспособляются къ условіямъ содержанія влаги въ почвф; если почва сухая, корни углубляются глубоко въ землю, если же въ последней имется достаточное количество влаги, то они разстилаются почти у самой поверхности земли. Древесина бълой акаціи очень прочна, не гність и даетъ порядочный, хотя и не крупный строевой, подвлочный и дровяной лъсъ. Акаціи, посаженныя въ Аманкутанъ въ 1880 г., достигли черезъ десять лѣтъ 3,2 саженъ вышины и въ среднемъ 31/, дюймовъ толщины. Существеннымъ недостаткомъ этой породы является отмерзаніе побъговъ, происходящее вслъдствіе того, что періодъ роста бълой акаціи заканчивается поздней осенью и молодые побъги не успъваютъ созръть до наступленія сильныхъ морозовъ. Грецкій орвать, посаженный для опыта въ 1883-84 гг. въ Аманкутань, оказался весьма пригодной породой для облысенія горь; растеть, правда, онъ не быстро, но за-то стойко выдерживаеть засуху. Однольтніе саженцы, высаженные въ 1883 г., черезъ 7 льтъ достигли 1,7 саж. въ вышину, 2 дюйма въ толщину и на шестомъ году начали приносить плоды. Опыть посадки оръха въ Багринской степной дачё, сдёланный въ томъ же 1883 году, показаль, что въ степи онъ расти не можетъ. Карагачъ на склонахъ около Аманкутана растетъ хорошо, хотя и медленно, хорошо затвияетъ почву и удовлетворительно переносить засуху; посаженный въ Аманкутанъ въ 1880 г. онъ черезъ десять лётъ достигъ 1,8 саж. въ вышину и 2 дюйма въ среднемъ въ толщину. Неудобство разведенія карагача состоить въ томъ, что съмена его образуются въ окрестностяхъ Самарканда разъ въ теченіи 5-6 летъ. Айлантъ на сухой степной и горной почвъ растетъ хорошо, но съ 5 года ростъ его замедляется; кром'в того, въ холодныя зимы онъ сильно страдаетъ отъ морозовъ. Въ Аманкутанскомъ насаждении 1880 года айлантъ при средней толщинъ въ 3 дюйма выросъ въ вышину до 2,8 саж. Гледичія растеть очень медленно и сильно страдаеть оть мышей, подгрызающихъ ея корни, вслъдствіе чего для посадокъ болье не употребляется. Наконецъ хвойныя, таврическая сосна и виргинскій можжевельникъ, посаженные въ 1883 г. въ Аманкутанъ частью подъ защитой лиственныхъ насажденій, частью же самостоятельно, на открытыхъ мъстахъ засохли, а подъ защитой сначала росли очень

медленно (до 1887 г.), но потомъ стали давать довольно значительный приростъ (сосна 4—6 вершк. и можжевельникъ 6—8 вершк.). Стоимость культурныхъ работъ при посадкѣ лѣса сплошь и террасами, какъ мы указывали выше, далеко неодинакова; въ первомъ случаѣ она почти вдвое больше, чѣмъ во второмъ, какъ это видно изъ слѣдующихъ данныхъ. Посадка съ уходомъ въ теченіе перваго года 1 дес. сплошнаго насажденія обходится:

Вспашка почвы на глубину 6 вершк. и 4-хъ крат-

Дъланіе террасъ 32 рабочихъ дня по 40 коп Выкопка, сортировка и обръзка саженцевъ 1 рабочій	 1	» »	40 25 60	» » »
Выкопка, сортировка и обръзка саженцевъ 1 рабочій	1	» »	40 25 60	»
Выкопка, сортировка и обрѣзка саженцевъ 1 рабочій		» »	40 25	» »
Выкопка, сортировка и обрѣзка саженцевъ 1 рабочій		» »	40 25	» »
Выкопка, сортировка и обръзка саженцевъ 1 рабочій		» »	40 25	» »
Выкопка, сортировка и обръзка саженцевъ 1 рабочій		>	40	» [111]
Выкопка, сортировка и обръзка саженцевъ				
	12	p.	80	к.
насажденія террасами обходится:				
Посадка съ уходомъ въ теченіи перваго года	1 /	tec.	10	рнаго
cheannachmar dus annacheoleachad armedelland an ac-	KÖT			20 к.
и 16 лошадей по 60 к	0 1			
TREE COMMENTS OF THE PROPERTY	ALT.			— »
и кетменями сорныхъ травъ 4 раза въ течен лъта требуютъ 20 рабочихъ дней по 40 к		- 0	90	- - - »
Взрыхденіе почвы и уничтоженіе коннымъ скобелем				
40 коп. и 1 лошадь 1 руб		1	»	40 »
Подвозъ и доставление саженцевъ на мъсто, 1 ра	υ.			40
Посадка саженцевъ, 10 рабочихъ дней		4	»	ipagh.
маркировка, 2 расочих в дня	Tou			— »
по 40 коп	odi.	Z	"	40 » 80 »
		0	150	40 »
по 40 коп	OM.			
ное боронованіе			1	— K.

Такимъ образомъ, десятилѣтній опытъ показалъ, что лѣсоразведеніе безъ поливки и въ особенности на горныхъ склонахъ дало удовлетворительные результаты. Пока такое лѣсоразведеніе обходится сравнительно дорого, но безъ сомнѣнія, со временемъ, когда будутъ лучше изучены пріемы его и условія благопріятствующія произрастанію такихъ посадокъ, послѣднія обойдутся значительно дешевле. Было-бы ошибочно полагать, что затраты на лѣ-

соразведение безъ поливки могутъ вскорт окупиться эксплоатацией разведеннаго лъса; надо всегда имъть въ виду, что такое лъсоразведеніе имфеть преимущественно болфе широкое и чрезвычайно важное для Туркестана значеніе, -- затінить почву, предохранить ее отъ разрушенія, регулировать стеканіе воды по склонамъ и способствовать увеличенію запасовъ подземныхъ водъ, дающихъ начало ручьямъ и ръчкамъ. На будущее время, прежде чъмъ приступить къ лесоразведению безъ поливки следуетъ тщательно изучить мъстность и всегда предпочитать болье возвышенные, нъкогда заросшіе, а теперь оголенные склоны, затіненіе которых въ особенности желательно по темъ или другимъ причинамъ. Намъ кажется, что лесоразведение безъ поливки, если имъ умело пользоваться, можеть принести весьма значительную пользу странв. причемъ наиболве желательны и наиболве успвшны будуть посадки не въ степи, хотя-бы и у подошвы горъ, а именно въ горахъ, на изв'встной высот'в (отъ $2^{1}/_{2}$ до $6^{1}/_{3}$ тыс. фут.), гдв и температура ниже и воздухъ влажнъе и осадки чаще, чъмъ въ низменныхъ, спаленныхъ солнцемъ, и летомъ не получающихъ ни капли дождя, степяхъ.

Въ сыръ-дарьинской области очень интересный опытъ лъсоразведенія безъ орошенія, быль сдівлань по собственному почину и на свои средства Э. И. Мюллеромъ, преподавателемъ ташкентской гимназіи. Насажденіе расположено на пустынныхъ, неорошаемыхъ холмахъ около поселка Никольскаго въ несколькихъ верстахъ отъ г. Ташкента и занимаеть въ настоящее время поверхность около 10 десятинъ. Пять десятинъ было посажено въ 1882 г., а другія пять въ следующемъ 1883 г. Въ 1882 г. было посажено 30000 саженцовъ (18 тыс. айлантовъ, 8 тыс. бълой акаціи и 4 тыс. гледичій), а въ 1883 г. 40200 (25 тыс. айлантовъ, 2 тыс. бигноній, 12 тыс. былой акаціи, 1 тыс. гледичій и 200 штукъ грецкихъ орыховъ), всего около 70000 однолетнихъ саженцовъ, полученныхъ изъ самаркандскаго питомника. Посадка саженцовъ въ 1882 г., различныхъ обстоятельствъ, была закончена очень поздно-11 мая, и въвиду того, что саженцы бол'ве полутора м'всяца оставались выкопанными изъ земли, а почва была недостаточно подготовлена, имъла мало шансовъ на успъхъ; къ счастью во время посадки и до нея прошли дожди, увлажнившіе достаточно почву и благотворно повліявшіе на насажденіе. Уходъ за насажденіемъ состояль въ очисткі земли отъ сорныхъ травъ и ея разрыхленіи кетменями, что вполн'в достигало цівли, но значительно увеличивало расходы. Такъ, напр., въ 1889 г. очистка насажденія

отъ сорныхъ травъ потребовала 281 рабочій день и стоила 93 р. 22 кон. Въ 1888 г. никакого ухода за посадкой, въ виду отсутствія на это средствъ, не было, вследствіе чего въ насажденіи появились какіе-то черви, которые попортили много деревьевъ. Въ 1889 г. между прочимъ, деревца были подвергнуты обръзкъ лишнихъ вътвей. послѣ которой они стали рости лучше и стройнѣе. Въ слѣдующемъ 1890 г. работы въ насажденіи не производились и, на сколько можно было заключить, необходимости въ нихъ болве не ощущалось. Леревца въ описанномъ насаждении растутъ далеко не равномърно: рядомъ съ высокими зеленъющими деревьями встръчаются голые участки, на которыхъ саженцы пропали, что можетъ быть приписано неудовлетворительной подготовку почвы при посадку послуднихъ (мъстами почва была вспахана всего два раза и то очень не глубоко). Наиболе пригодными породами для разведенія въ степи безъ орошенія оказались білая акація и айланть. Многіе изъ этихъ деревьевь въ 1890 г. достигли 6, 7 и даже 9 аршинъ вышины при толщин& у основанія отъ $45^{1}/_{2}$ до $55^{1}/_{2}$ сантиметровъ. Одно айлантовое деревцо достигло даже 11 аршинъ вышины. Гледичіи и бигноніи растуть довольно плохо, большинство посл'яднихъ не выше 21/2 аршинъ. Грецкій орвхъ оказался для посадки при описанныхъ условіяхъ непригоднымъ; изъ 200 саженцевъ, посаженныхъ въ 1883 г., къ 1890 г. сохранился только одинъ экземпляръ. Вообще, большинство деревьевъ, не смотря на плохую подготовку почвы и медленный слабый рость въ первые годы послё посадки къ 1890 году на столько окрвило, что надо полагать, дальнвишее существование ихъ вполнъ обезпечено. Съ 1888 по 1890 гг. на такіе-же участки была произведена съ цілью опыта посадка фруктовыхъ саженцовъ (абрикосовъ, слива и т. п.), изъ коихъ лучше другихъ принялся урюкъ (абрикосъ). При посадкѣ урюковъ Э. И. Мюллеръ употребилъ следующій способъ: въ яме 8-ми вершковой глубины была сдёлана ломомъ ямка такой-же глубины, но гораздо уже, и въ эту последнюю быль посажень саженець. Примявъ слегка землю кругомъ саженца, на дно большой ямы поставили четырехъ вершковую глиняную трубу, и черезъ нее пропустили деревцо, затвмъ промежутокъ между боками ямы и ствнками трубы быль засыпанъ землей. По словамъ Э. И. Мюллера, такой способъ посадки дастъ возможность сохранить необходимую для деревца влагу въ почвъ и получить весьма удовлетворительные результаты. Одинъ изъ урюковъ, посаженный въ марте 1888 года, къ осени 1890 г. достигнуль 17 вершковъ высоты и имъль прекрасный видъ.

Опыть Э. И. Мюллера лисоразведения на безводных и слидовательно безплодныхъ ходмахъ въ окрестностяхъ Ташкента весьма интересенъ съ теоретической точки зрвнія; онъ вполнв доказываеть. что лісоразведеніе безъ орошенія въ туркестанскихъ степяхъ при извъстныхъ условіяхъ, а главное при любви къ дълу, возможно и даеть удовлетворительные результаты. Стоимость такого лесоразведенія довольно значительна, хотя и не особенно велика; весь расходь по описанной посадкъ съ 25 марта 1882 г. до 1 іюля 1890 г. составиль 1571 р. 70 к., т. е. 153 р. на одну десятину въ 8 лътъ, или 19 р. 12 к. ежегодно на десятину. Конечно, эта цифра не маленькая, но если принять во вниманіе, что это быль первый опыть, что многія условія удорожили стоимость посадки и ея поддержки, то окажется, что въ сущности сумма 19 р. 12 коп. приблизительно лишь въ 11/2—2 раза превышаетъ сумму лѣсоразведенія на пескахъ, гдв нибудь на югв Россіи. Во всякомъ случав, двятельность Э. И. Мюлдера, производившаго этотъ интересный опытъ и затратившаго боле полуторы тысячи своихъ собственныхъ денегъ, заслуживаеть поощренія и глубокой признательности. Съ практической точки зрвнія описанный опыть хотя и доказываеть полную возможность утилизировать для древесных в посадокъ некоторыя безводныя и безплодныя містности въ Туркестанів, однако едва-ли такая эксплоатація пустырей когда-либо привьется и будеть предпринята въ обширныхъ размърахъ. Въ Туркестанъ, гдъ при разведении лъса при орошении, тополь въ пятнадцатилътнемъ возрастъ даетъ бревна до 12 аршинъ длины и до 22 вершковъ толщины, едва ли найдется частный предприниматель, который бы рискнуль заняться лъсоразведеніемъ безъ поливки въ надеждъ черезъ тъ же пятнадцать лъть, послъ затраты массы труда и денегь, воспользоваться вырощеннымъ имъ малом врнымъ, карявымъ и плохаго качества льсомъ. Съ другой стороны, въ интересахъ края было бы весьма полезно покрыть всв пустыри и обнаженныя земли разведеннымъ такимъ образомъ лѣсомъ, но такія насажденія обойдутся очень дорого и едва ли принесутъ какую-либо существенную пользу, такъ какъ въ общемъ площадь ихъ будетъ ничтожна сравнительно съ степнымъ пространствомъ края. Кромв того, надо полагать, что насаждение безъ поливки, давшее довольно удовлетворительные результаты подъ Ташкентомъ (1520 ф. надъ ур. моря) вблизи высокихъ горъ, едва-ли можетъ разсчитывать на успъхъ въ открытой и далекой отъ возвышенностей степи. Повторяемъ, что опыть Э. И. Мюллера очень интересенъ и заслуживаетъ полнаго вниманія. Безкорыстная затрата своего труда, энергіи и денегь въ теченіи десяти лѣть—явленіе изъ ряда выдающіяся въ Туркестанѣ, гдѣ каждый, понатыкавшій въ землю колышковъ около своей дачи, ждетъ награды за «лѣсоразведеніе».

Резюмируя все вышеизложенное можемъ придти къ слѣдующимъ положеніямъ, кои, по нашему мнѣнію, должны быть приняты во вниманіе при болѣе правильной постановкѣ лѣснаго дѣла въ Туркестанѣ.

- 1) Степныя заросли и въ особенности горные лѣса имѣютъ громадное значеніе въ экономіи края.
- 2) Необходимо всёми силами заботиться о сохраненіи тёхъ и другихъ, для чего могутъ быть намёчены слёдующія мёры:
- 1. Слѣдуетъ немедленно предпринять тщательное изслѣдованіе горныхъ лѣсовъ и степныхъ зарослей, опредѣлить точно ихъ площадь, составъ, состояніе, изучить ихъ жизнь и вліяніе на окружающую среду, рѣшивъ, какіе участки горнаго лѣса должны быть неприкосновенны и какіе могутъ быть эксплоатированы. Осторожная эксплоатація горнаго лѣса можетъ до нѣкоторой степени задержать истребленіе степныхъ зарослей и если будетъ производиться осмотрительно, принесетъ скорѣе пользу, чѣмъ вредъ.
- 2. Необходимо усилить охрану лѣсовъ, увеличивъ число объѣздчиковъ, которыхъ слишкомъ недостаточно въ виду горнаго, трудно доступнаго и мало проходимаго мѣстоположенія возвышенныхъ частей Туркестана и разбросанности древесныхъ насажденій.
- 3. Посл'є изученія туркестанскихъ лісовъ выяснится особая важность обліссенія нісоторыхъ містностей, склоновъ и ущелій, которыя и должны быть покрыты насажденіями, разведенными безъ орошенія.
- 4. Сладуетъ содайствовать развитію добычи каменнаго угля и распространенію его, какъ топлива, среди населенія.

Мфры эти, при разумномъ и осторожномъ ихъ примфненіи могутъ не только сохранить существующія насажденія въ Туркестанъ, но и способствовать ихъ увеличенію, которое, въ особенности въ горахъ не только желательно, но и необходимо.

Кн. В. Массальскій.